©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Geranium

1 Stengel und Blattstiele rückwärtsgerichtet behaart; Blatt fast bis zum Grunde geteilt, in fiederteilige, linealische Zipfel aufgeschlitzt 2
- Stengel und Blattstiele abstehend oder anliegend, lang oder sehr kurz behaart; Blatt tief zerschlitzt oder weniger geteilt 3

2 Stengel und Blattstiele mit rückwärts streng anliegenden Haaren

Geranium columbinum

- Stengel oder Blattstiele mit rückwärts abstehenden Haaren

Geranium dissectum

3 Stengel und Blattstiele mit abstehenden, langen Haaren, andere Haare fehlen. Blätter bis zum Grunde geteilt mit linealischen Zipfeln

Geranium sanguineum

- Stengel und Blattstiele (z.T. unter längerer Behaarung versteckt) mit sehr kurzen (ca. 0,2-0,3 (-0,5) mm lang) flaumigen Haaren. Blätter bis zur Mitte oder wenig darüber geteilt, Blattzipfel keilförmig, vorn mehr oder minder eingeschnitten 4

4 Stengel und Blattstiele außer der sehr kurzen, flaumigen Behaarung ohne längere Behaarung

Geranium pusillum

- Stengel und Blattstiele außer der sehr kurzen, flaumigen Behaarung mit längeren, abstehenden Haaren 5

5 Abstehende, längere Haare gleichlang, meist zerstreut

Geranium pyrenaicum

- Abstehende längere Haare in zwei Größenordnungen: (oft nur zerstreute) längere und daneben viel kürzere und dichtere Haare. Behaarung insgesamt viel stärker als bei der vorigen Art.

Geranium molle

Heinrich Weber

Angelica silvestris - Angelica archangelica

Zur Unterscheidung von Jungpflanzen:

Angelica silvestris: Blatt behaart, Blattstiel oben rinnig

Angelica archangelica: Blatt kahl, Blattstiel oben rund

Antje Knutzen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: 1_3

Autor(en)/Author(s): Knutzen Antje

Artikel/Article: Angelica silvestris - Angelica archangelica 7