©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Zur Unterscheidung unserer Myriophyllum-Arten

von Heinrich E. Weber

1 Blattfiedern äußerst zart und haardünn, nur ca. 0,1 mm breit

Myriophyllum alternifolium DC.

1´ Blattfiedern 0,2 bis 0,25 mm breit 2

2 Blatt zart und weich, Blattfiedern meist im Abstand von mehr als 1 mm entfernt (Abb. 1)

Myriophyllum verticillatum L.

2´ Blatt derb und etwas starr, gewähnlich sehr eng (Abstand bis ca. 1 mm) gefiedert (Abb. 2)

Myriophyllum spicatum L.




Abb. 1 M. verticillatum L.




Abb. 2 M. spicatum L.

Mitarbeiter an diesem Heft:

Frahm, Jan-Peter, 23 Kiel, Waitzstr. 52
Raabe, Ernst-Wilhelm, 2305 Kitzeberg, Schloßkoppelweg 7b
Weber, Heinrich, 2 Hamburg 54, Torstraße 20
Woas, Steffen, 23 Kiel, Düsternbrooker Weg 2

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg
Redaktion: Gabriele Frahm

Anschrift der Redaktion: 23 Kiel, Hospitalstraße 20, Bot. Inst. II

Bezugsbedingungen: Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg erhalten die "Kieler Notizen" für den Jahresbeitrag von 15, - DM, Schüler und Studierende, soweit sie nicht Vollmitglieder der AG sind, gegen einen Jahresbeitrag von 5, - DM.
Nichtmitglieder der AG können die "Kieler Notizen" gegen 5, - DM im Jahresabonnement über die Redaktion beziehen.
Einzahlungen auf das Postscheckkonto der AG 103 433 PSchA Hamburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: 2_8

Autor(en)/Author(s): Weber Heinrich E.

Artikel/Article: Zur Unterscheidung unserer Myriophyllum-Arten 16