©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Zur Frühjahrs-Erfassung im Rahmen der Arealkartierung Schleswig-Holsteins

von E. -W. Raabe

Zahlreiche Pflanzenarten unseres Landes kommen so frühzeitig im Jahr zur Entwicklung und verschwinden schon wieder so frühzeitig im Sommer, daß sie im Hochsommer nicht mehr oder kaum noch ausreichend zu erfassen sind. Auf diese Arten ist also bei der Frühjahrs- bzw. Frühsommer-Begehung so gut zu achten, daß sie in den Beobachtungsflächen nach Möglichkeit vollständig erfaßt werden. Zu diesen Arten gehören vor allem:

Aira caryophyllea
Aira praecox
Apera spica venti
Phleum arenarium
Carex pulicaria
Carex dioica
Carex digitata
Carex verna
Arum maculatum
Juncus filiformis
Gagea spathacea
Gagea lutea
Allium ursinum
Fritillaria meleagr.
Paris quadrifolia
Ornithogalum umbell.
Platanthera chlor.
Orchis maculatus
Orchis fuchsii
Orchis latifolia
Polygonum bistorta
Cerastium glomeratum
Cerastium semedec.
Cerastium pumilum
Holosteum umbell.
Minuartia viscosa
Spergula vernalis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anemone hepatica
Myosurus minimus
Ranunculus ficaria
Ranunculus bulbosus
Ranunculus auricom.
Papaver dubium
Papaver argemone
Corydalis cava
Corydalis fabacea
Teesdalia nudicaulis
Erophila verna
Cardamine hirsuta
Cardamine flexuosa
Cardamine prat.
Cardamine bulbifera
Alliaria officinalis
Arabidopsis thal.
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactyl.
Chrysosplen. altern.
Chrysosplen. oppos.
Ribes silvestre
Ribes spicatum
Potentilla sterilis
Trifolium striatum
Trifolium micranthum
Vicia lathyroides
Viola hirta
Viola silvatica
Daphne mezereum
Circaea alpina
Circaea lutetiana
Circaea intermedia
Chaerophyll. temu.
Primula acaulis
Primula elatior
Primula officinalis
Trientalis europ.
Myosotis silvatica
Myosotis hispida
Myosotis stricta
Myosotis versicolor
Lamium maculatum
Stachys arvensis
Veronica verna
Veronica triphyllos
Veronica hederaefol.
Lathraea squamaria
Adoxa moschatell.
Valerianella dent.
Valerianella olit.
Arnoseris minima
Hypochoeris glabra
Senecio vernalis

Centaurea nigra L. - Schwarze Flockenblume in Hütten (1524)

von Olga Kalkstein

Im Juli 1971 fand ich eine unbekannte Flockenblume. Sie fiel besonders durch die dunkelbraunen, gefransten Hüllblätter, die wie ein Pelz wirken und durch die fehlenden strahlenden Randblüten auf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Raabe Ernst-Wilhelm

Artikel/Article: Zur Frühjahrs-Erfassung im Rahmen der Arealkartierung Schleswig-Holsteins 2