Fachinformationsdienst Biodiversitätsforschung
UB Universitäts Bibliothek Frankfurt am Main
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft

Die Vegetationskarte der Eilenriede bei Hannover

Lohmeyer, Wilhelm
Ellenberg, Heinz

1950

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen
Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:
Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-102293

Visual Library

Miljan, A. Vegetationsuntersuchungen an Naturwiesen und Seen im Otepääschen Moränengebiete Estlands. — Acta et Commut. univ. Tartuensis (Dorpatensis). A. **25.** Tartu 1933.

Preising, E. Nardo-Callunetea. Zur Systematik der Zwergstrauch-Heiden und Magertriften Europas mit Ausnahme des Mediterran-Gebietes, der Arktis und der Hochgebirge. — Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem. N. F. **1**, 1. Stolzenau 1949.

Tüxen, R. Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem. Niedersachsen. **3.** Hannover 1937 (Zugl. **81. - 87.** Jahresber. Naturhist. Ges. Hannover).

Die Vegetationskarte der Eilenriede bei Hannover

von W. LOHMEYER und H. ELLENBERG

(1 : 10 000, farbig) ist erschienen und kann durch die Zentralstelle für Vegetationskartierung in Stolzenau/Ws. bezogen werden (Preis 4.— DM).

Die Karte enthält die natürlichen Waldgesellschaften der Eilenriede:

Feuchter Stieleichen-Birkenwald (Querceto roboris-Betuletum molinietosum)

Frische Buchen-Mischwälder und Eichen-Hainbuchenwälder

Waldschwingel-Buchenmischwald (Querceto-Carpinetum festucetosum silvaticae)

Kraut-Buchenmischwald (Qu.-C. asperuletosum)

Lerchensporn-Eichen-Hainbuchenwald (Qu.-C. corydaletosum)

Feuchter Eichen-Hainbuchenwald (Qu.-C. stachyetosum)

Nasser Eichen-Hainbuchenwald (Qu.-C. filipenduletosum)

und deren Varianten sowie den

Feuchten Kiefern (Eichen-Birken)-Forst.

Ausführliche Erläuterungen sind unter dem Titel: „Die Waldgesellschaften der Eilenriede bei Hannover" von W. LOHMEYER im 99.—101. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover im Druck.

Tx.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (alte Serie)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: NF_2

Autor(en)/Author(s): Lohmeyer Wilhelm, Ellenberg Heinz

Artikel/Article: Die Vegetationskarte der Eilenriede bei Hannover 42