Lmk. Mentha silvestris L. Lamium maculatum L. Galeopsis latifolia Hoffm., speciosa Mill., pubescens Bess. Origanum vulgare L. Thymus serpyllum L. Stachys silvatica L., palustris L. Prunella vulgaris L. Lysimachia nummularia L., nemorum L. Polygonum lapathifolium L., hydropiper L., aviculare L. — mit aufrechtem Stengel. — Rumex conglomeratus Murr. Daphne mezereum L. Asarum europaeum L. Humulus lupulus L. Juncus articulatus L. Scirpus setaceus L. Polypodium phegopteris L. Asplenium trichomanes L.

Meiningen, d. 8. Nov. 1884.

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden u. kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.

(Fortsetzung.)

Aster species dubia. In den Teichgräben bei Tennstädt.
A. salicifolius Schott. Auf dem Friedhofe in Gangloffs. angepflanzt u. verwildert. Tennstädter Friedhof und in Gärten angepflanzt.
Bellis L. Gänseblume XIX. 2.
B. perennis L. Allgemein verbreitet.
Erigeron L. Dürrwurz XIX. 2.
C. canadensis L. Auf unbebautem Boden und Gartenland.
E. acer L. Auf Triften nicht selten.
Solidago L. Goldruthe XIX. 2.
S. virga aurea L. In den umliegenden Wäldern.
S. canadensis L. In Gärten als Zierpflanze gebaut.
Inula L. Alant XIX. 2.
I. helenium L. I. Ringleben, Cölleda u. Cannawurf angebaut.
I. germanica L. In den alten Weinbergen b. Nägelstädt, Amtmannsberg b. Tennst., an der Chaussee von Schwerstedt nach Straussfurt, Dreiseberg bei Gangloffsömmern.
I. salicina L. Auf Wiesen bei Tennstädt, Herbsleber Riet, in den Kiebitzen, Gr. Vargula. An Gräben bei Gangloffs., Straussfurt, Eislache.
I. hirta L. An den Abhängen der Unstrutberge zwischen Nägelstädt u. Gr. Vargula.
I. conyza DC. Im Chausseegraben zwischen Schwerstedt u. Staussfurt gefunden.
I. britannica L. Auf feuchten torfigen Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula, Ottenhausen, Gangloffs., hier in der Eislache unter dem Amtmannsberg.
Pulicaria Gärtner. Flohkraut XIX. 2.
P. vulgaris Gärtn. An Angern, Gräben, Wiesen. Auf dem Herbsleber Riete.
P. dysenterica Gärtn. Wie vorige. Teichgraben, a. Bruchteiche u. Gläserloche b. Tennst., Gr. u. Kleinballhausen, Schwerstedt u. a. O.
Madia Mol. Madie XIX. 2.
M. sativa Mol. Als Oelfrucht gebaut.
Bidens L. Zweizahn. XIX. 1.
B. tripartitus L. An Gräben, Sümpfen, Ufern.
B. cernuus L. Wie vorige, doch seltener.
Helianthus L. Sonnenrose XIX. 3.
H. annuus L. In Gärten als Zierpflanze u. in Feldern als Oelfrucht gebaut.
H. tuberosus L. Erdapfel, Tompinambur. Angebaut u. verwildert, am Sandsteinbruch in Kleinballhausen.
Rudbeckia L. Rudbeckie XIX. 2.
R. laciniata L. In Gärten kultiv. und verwildert.
Filago Tourn. Schimmelkraut XIX. 4.
F. germanica L. Äcker, trockene Wiesen.
F. arvensis L. Aecker, trockene Hügel.
F. minima L. Wie vorige.
Gnaphalium Tourn. Ruhrkraut XIX. 2.
G. silvaticum L. In lichten Wäldern auf Schlägen.
G. uliginosum L. Feuchte Aecker und Pfützen gemein.
G. dioicum L. Auf sonnigen Triften, an Wäldern.
G. margaritaceum L. In Gärten kultiviert.
Helichrysum Gaert. Immerschoen. XIX. 2.
H. arenarium DC. Am Steingraben bei Clingen.
Artemisia L. Beifuss XIX. 2.
A. absinthium L. Wermuth. In Gärten u. Feldern im Grossen gebaut.
A. abrotanum L. Wie vorige.
A. pontica L. An der Hatschke b. Tennstädt, in neuerer Zeit nicht mehr beobachtet.
A. campestris L. An trockenen Hügeln b. Tennst., Gangloffs, Greussen, Lützens. b) sericea DC. Tennst. am Kalkhügel, Rabenhütte b. Lützensömmern.
A. vulgaris L. An Zäunen, unbebauten Orten.
A. dracunculus L. In Gärten angepflanzt u. in Ringleben im Grossen kultiviert.
A. Tournefortiana Rchb. In Gärten gezogen.
Achillea L. Garbe. XIX. 2.
A. ptarmica L. Auf Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula u. Herbsleben.
A. millefolium L. Schafgarbe. Wiesen u. Wege. b) lanata Koch. Tretenburg, Galgenhügel b. Clingen, Dreiseberg b. Gangloffs., Läusebiel b. Schwerst. d) setacea WK. Im Hornholze.
A. nobilis L. Auf der hiesigen Stadtmauer, auf der Turmmauer der Neumühle, vor dem Hornholze, Kirchheilingen, Westgreussen.
Anthemis L. Hundskamille XIX. 2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

A. tinctoria L. Trockene, sonnige Hügel, Wegeränder, Mauern.
A. arvensis L. Unter dem Getreide häufig.
A. cotula L. Flussufer, Aecker, in Dörfern.
A. nobilis L. Römische Kamille. Angebaut.
A. Marschallii. An Ackerrändern an der Chaussee b. Kleinvargula in wenigen Exemplaren gefunden.

Matricaria L. Kamille XIX. 2.
M. chamomilla L. Auf Aeckern bei Tennst. selten, häufig bei Nausiss, Herrenschwende, Weissensee u. Ebeleben.
M. inodora L. Unter der Saat gemein.

Tanacetum Tourn. Rainfarn XIX. 2.
T. vulgare L. An Flussufern u. Wiesenrändern.
T. corymbosum Schultz bip. In den umliegenden Hölzern.
T. parthenium Schultz bip. Mutterkraut. In Gärten kultiviert, sonst an Wegen, Schutt u. in Dörfern verwildert.

Chrysanthemum L. Wucherblume. XIX. 2.
Chr. coronarium L. In Gärten kultiviert.

Leucanthemum Tourn. Kammerblume. XIX. 2.
L. vulgare Lmk. Auf Wiesen und in Wäldern.

Doronicum L. Gemswurz. XIX. 2.
D. pardalianches L. } In Gärten kultiviert
D. austriacum L. }

Senecio L. Kreuzkraut. XIX. 2.
S. spathulifolius DC. In den umliegenden Wäldern.
S. vulgaris L. Auf Aeckern, Wegen, Schutt gemein.
S. viscosus L. Im Horn- u. Blankenburger Holze b. Ringleben u. Walschleben.
S. silvaticus L. Im Fahner'schen Holze.
S. erucifolius L. Im Gebüsch b. Tennst. u. in den umliegenden Hölzern, bei Herbsl., unter dem Amtmannsberge, bei Gangloff- und Lützensömmern.
S. paluster DC. Auf sumpfigen Wiesen b. Mittelhausen.
S. Jacobaea L. Auf Rasenrainen.
S. nemorensis L. In den umliegenden Hölzern.

Calendula L. Ringelb. u. Totenblume. XIX. 2.
C. officinalis L. In Gärten kultiviert und b. Cannawurf u. Kindelbrück im Grossen gebaut.

Cirsium Tourn. Distel XIX. 1.
C. lanceolatum Scop. Auf Triften, Wegen gemein.
C. eriophorum Scop. An Wegen und Flussufern in der ganzen Umgebung, doch einzeln. Amtmannsberg, Tretenburg, Kiebitzen, Herbsleben, Naegelst., Schwerstedt, Greussen, Gebesee, Gr. Vargula, Unstrutufer.
C. palustre Scop. Auf Wiesen und Ufern in der ganzen Umgegend.
C. acaule All. Trockene Hügel, Triften u. Wege.
b) caulescens Pers. Wie vorige b. Tennstädt, Vargula etc.
C. bulbosum DC. Auf feuchten Wiesen b. Tennst. Unter dem Amtmannsberg, Kiebitzen, Mittelwiesen b. Tennstädt, Herbsleber Riet. Im Unstrut- und Gera-Thale.
C. oleraceum Scop. Feuchte Wiesen, Gräben, Gebüsch.
C. arvense Scop. Auf Aeckern u. wüsten Plätzen.
C. palustri-bulbosum Naeg. Auf den Wiesen der Unstrut zwischen Gebesee u. Walschleben.
C. palustri-oleraceum Naeg. Auf Torfwiesen b. Tennst. u. im Unstrutthale zwischen Herbsleben u. Gross-Vargula, auch auf den Wiesen der Gera bei Ringleben etc.
C. cano-oleraceum Naeg. Auf den Wiesen zwischen Waslchleben u. Riethnordhausen.
C. bulboso-acaule Naeg. Auf Torfwiesen b. Tennst. Riet u. auf dem See bei Weissensee.
C. bulboso-oleraceum Naeg. Auf Wiesen b. Tennst., Gr. Vargula, Naegelst. u. Ringleben.
C. oleraceo-bulbosum Naeg. Torfwiesen b. Tennstädt, Ottenhausen, See bei Weissensee.
C. oleraceo-acaule Hampe. Wie vorige. Walschleben, Ottenhausen, Bruchwiesen b. Tennst.

Silybum Vaill. Mariendistel. XIX. 1.
S. marianum Gärtn. In Gärten kultiviert, in Ringleben u. Gr. Ballhausen im Grossen gebaut u. in der Umgegend verwildert.

Carduus L. Distel. XIX. 1.
C. acanthoides L. An Wegen, Aeckern nicht selten.
C. crispus L. Wiesen, Wälder, Gebüsch, Ufer.
C. nutans L. Triften, Wege, Raine.

Onopordon Vaill. Eselsdistel XIX. 1.
O. acanthium L. Wege, gemein.

Lappa Tourn. Klette XIX. 1.
L. officinalis All. Wege, Wälder.
L. minor. DC. Wüste Plätze, Wege. Schutt.
L. tomentosa Lmk. Wie vorige, doch seltener.

Carlina Tourn. Eberwurz XIX. 1.
C. acaulis L. An den Unstrutbergen b. Naegelst. u. Gr. Vargula, Bruchstedt, Blankenburg, Dallstedter Trift.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

C. vulgaris L. Steinbrüche b. Tennst., Bruchstedt, Hornholz etc.

Serratula L. Scharte. XIX. 1.

S. tinctoria L. Auf Wiesen, im Gebüsch u. in Wäldern.

Carthamus Tourn. Saflor. XIX. 1.

C. tinctorius L. Bei Erfurt gebaut.

Cnicus Vaill. Benedikte XIX. 1.

C. benedictus L. In Ringleben im Grossen gebaut.

Centaurea L. Flockenblume XIX. 3.

C. jacea L. Auf trockenen Wiesen und Rasen.

b) decipiens Thuill. Warte bei Schwerstedt.

c) pratensis Thuill. Wie vorige.

C. phrygia L. Im Fahner'schen u. Tonnaischen Holze.

C. cyanus L. Unter dem Getreide häufig.

C. scabiosa L. Weinberge, Hügel, Raine.

C. maculosa Lmk. Auf den Stadtmauern in Tennst., Weissensee, Greussen, Kindelbrück, Langensalza, Dreiseberg b. Gangloffs., Naegelstedt.

C. solstitialis L. Hin u. wieder auf Luzerne- u. Linsenäckern b. Tennstädt, Haussoemmern u. Greussen, Goldklinge, bunte Mantel.

Lapsana Tourn. Milche XIX. 1.

L. communis L. Sehr häufiges Unkraut.

Arnoseris Gaert. Lammkraut. XIX. 1.

A. pusilla Lk. Auf sandigen Aeckern über den Sandsteinbrüchen b. Tennst.

Cichorium Tourn. Wegewarte. XIX. 1.

C. intybus L. An allen Wegen.

Thrincia Rth. Zinnensaat XIX. 1.

Th. hirta Rth. Auf salzhaltigen Wiesen unter der Tretenburg und See bei Weissensee.

Leontodon L. Loewenzahn. XIX. 1.

L. autumnalis L. Wiesen, Raine gemein.

L. hastilis L. Wie vorige.

Picris L. Bitterkraut. XIX. 1.

P. hieracioides L. Wiesen, Wegränder gemein.

Helminthia Juss. Wurmkraut. XIX. 1.

H. echioides Gaert. Auf Luzernäckern b. Tennst., Herbsleben, Mittels. u. Gr. Vargula selten.

Tragopogon L. Bocksbart (Haferwurz).

T. porrifolius L. Als Gemüse gebaut.

T. major Jacq. An sonnigen Anhöhen, Weinbergen.

T. pratensis L. Häufig.

b) minor Fries.

c) orientalis L. Diese weniger häufig in der Umgegend an Wegen, Chausseegräben. Steinbrüchen, steilen Aeckern, Amtmannsberg, Tretenburg.

Scorzonera L. Schwarzwurz. XIX. 1.

Sc. humilis L. Auf den Wiesen an der Gera zwischen Mittelhausen u. Gebesee.

Sc. hispanica L. Auf der Tretenburg b. Tennst. Am Steiger, Amtmannsberge, Greussen, Gangloffs., Naegelst.

Sc. glastifolia Willd. Am Judenhügel b. Langensalza.

Sc. asphodeloides Wallr. Auf der Tretenburg.

Sc. purpurea L. Auf Kalkbergen, Dreiseberg bei Gangloffs., Hengstberg bei Greussen.

Podospermum DC. Stielsame. XIX. 1.

P. laciniatum DC. Raine, Aecker und Wegeränder, Weinberge, ziemlich häufig. In den Weinbergen an dem Sauborn.

Hypochaeris L. Ferkelkraut. XIX. 1.

H. glabra L. Tennst., Gr. Urleben, Weissensee.

H. radicata L. Wiesen, Triften, Rasen gemein.

Achyrophorus Scop. Hachelkopf. XIX. 1

A. maculatus Scop. Auf Rasenrainen im Gerichtsfelde b. Tennst, Tretenburg, Silberhügel b. Gangloffs., Naegelstedt, Läusebiel.

Taraxacum Juss. Bumbaum, Loewenzahn.

T. officinale Web. Allgemein verbreitet. var. T. palustre DC. Auf sumpfigen Wiesen.

Leontodon erectus Hoppe.

L. salinus Poll. Wiesen unter der Tretenburg u. auf dem See bei Weissensee.

Chondrilla Tourn. Krümling. XIX. 1.

Ch. juncea L. Hin u. wieder b. Tennst. an den Gebirgen hinter der Klippmühle, im Chausseegraben nach Langensalza, Kirchheilingen, Greussen, über dem Taubenthale, a. Eselswege, zwischen Gross- u. Kleinvargula.

Lactuca L. Lattich. XIX. 1.

L. sativa L. Salat kultiviert.

L. virosa L. Am Hauptgraben auf dem See b. Weissensee.

L. scariola L. An Gräben, wüsten Plätzen u. Wegen um Tennstädt u. a. O. nicht selten.

L. saligna L. Chausseegräben von Schwerstedt bis zur Grossballh. Grenze auf Letteboden. Sandsteinbruch u. Lehmgrube b. Kleinballh., Chausseegraben unter dem Amtmannsberge, Schilfa an den Steinbrüchen nach dem hohen Berge zu, Bahnhof zu Straussfurt, auf Klee u. steilen Aeckern zwischen dem Läusebiel u. Gr. Ballhausen, immer auf Thon-, Kalk- u. Letteboden in Masse. Kleeäcker im Kirchthale auf Harnisch Plan, in den Hohlen des alten Haussömmerschen Weges u. in den Chausseegräben daselbst. Auf steinigen Aeckern, Steinbrüchen, Chausseegräben, b. Tennst. in der Goldklinge u. am Amtmannsberg b. Grossballhausen u. Schwer-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

stedt, Ringleben, Gangloffs. u. an a. Orten.

L. muralis Less. Im Horn- u. Blankenburger Holze.

L. perennis L. Soll bei Greussen vorkommen. Habe von dort noch keine Pflanze gesehen.

Mulgedium Cass. Milchlattich. XIX. 1.

M. alpinum Cass. Am Graben des Lindegarten im Himmelreich b. Tennst. verwildert.

Sonchus L. Saudistel. XIX. 1.

S. oleraceus L. Auf bebautem Boden häufig.

(Forts. folgt.)

Bibliothek.

1091) Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwiss. Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 1884. Juli-Dezemb. Dresden, 1885. [Tausch.]

1092) Procès-Verbaux des séances de la Société Royale Malacologique de Belgique. Tome XII, Août-Décembre 1884. Bruxelles. 1884 [Tausch.]

1093) Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1882—83. St. Gallen, 1884. [Tausch]

1094) Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. Tom. VII, Entr. 3. Buenos Aires 1884. [Tausch.]

1095) P. Magnus, Marrubium Aschersonii (vulgare-alysson), ein neuer Bastard. S. A. 1884.

1096) dto., über eine durch Polyporus Schweinizii Fr. getötete Weymouthkiefer im im Berliner Botanischen Garten. S. A. 1884.

1097) dto., über die Ausbildung der inneren Petala bei zweizähligen Orchideenblüten. S. A. 1884.

1098) dto., über eine besondere geograpraphische Varietät der Najas graminea Del. u. deren Auftreten in England. S. A. 1883.

1099) dto., Botanische Mitteilungen: a) Missbildung von Dianthus caryophyllus. b) Monströse Blüten einer Begonie. c) Anomale Vegetationserscheinungen. d) Mykologische Mitteilungen. S. A. Berlin, 1885. [Nr. 1095—1099 Gesch: Prof. Dr. Magnus-Berlin, K. M. d. J.]

1100) Procès-Verbaux des séances de la Société Royale Malacologique de Belgique. Tome XIII. Année 1884. Bruxelles. 1884. [Tausch.]

1101) Acta Horti Petropolitani. Tom. VIII. Fasc. 1—3. Petersburg, 1883—84. [Tausch.]

1102) A. Engler, Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte u. Pflanzengeographie. Bd. VI, Heft 3. Leipzig, 1885.

1103) Botanischer Verein in Magdeburg. Sitzungsberichte vom August bis Dezember 1884. [Tausch]

1104) Leopoldina. Amtl. Organ d. Kais. Leopold. Karol. Akademie der Naturforscher. 1885, Nr. 1—4. Halle, 1885. [Tausch.]

1105) Acta Horti Petropolitani. Tom. IX. Fasc. 1. Petersb. 1884. [Tausch.]

1106) Mitteilungen des K. K. Steiermärkischen Gartenbau-Vereines in Graz. Jahrg. 1884. Nr. 6—12. Graz, 1884. [Tausch.]

1107) Isis. Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Jahrg. VII. 1882.

1108) Lehmann, Dr. Rich. Über systematische Förderung wissenschaftlicher Landeskunde von Deutschland. S. A. Berlin, 1882 [Tausch.]

1109) Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin. Nr. 131—145. Berlin, 1883. [Tausch.]

(Forts. folgt.)

Zur Notiz!

Indem ich die Irmischianer auch dies Jahr zu recht fleissigen phänologischen Beobachtungen auffordere teile ich zugleich namens des Vorstandes mit, dass neue Formulare zur Einzeichnung derselben hergestellt worden sind und vom Vorsitzenden des Vereins portofrei an die Mitglieder versandt werden, welche ihren darauf bezüglichen Wunsch durch Postkarte zu erkennen geben.

Dr. H. Töpfer.

Litterarisches.

Deutsche Botanische Monatsschrift, herausgegeben von Prof. Dr. Leimbach in Sondershausen.

III. Jahrg. (1885) Nr. 3: Holuby, die Prunellen der Flora des Trentschiner Komitates i. Ungarn. Wörlein, Bemerkungen über neue oder kritische Pflanzen der Münchener Flora (Forts.) Töpffer, Gastein und seine Flora (Forts.) Entleutner, Flora von Meran in Tirol (Forts.) Dichtl, Nachträge zur Flora von Nieder-Österreich (Forts.) Röll, Thüringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung (Forts.) Zeitungsschau. Korrespondenzen: Huter. Anzeigen.

Druck der Fr. Aug. Eupel'schen Hofbuchdruckerei in Sondershausen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 1885

Autor(en)/Author(s): Buddensieg Franz Volkmar

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis. (Fortsetzung.) 21-24