©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(5. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis" von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.
In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau VI.

1588 Larentia viridaria F.
Fl: Ende Mai—Juni.
V: häufig in den Auen.

1593 Larentia aqueata Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: häufig westlich Neuburg/D. (bei Einbruch der Dunkelheit paarend!)

1595 Larentia fluctuata Hb.
Fl: Ende April—Juni und Anfangs Juli—August. V: häufig.

1600 Larentia didymata L.
Fl: Juni—Juli und August—Sept.
V: lokal an warmen feuchten Hängen. (Dämmerungsflieger).

1602 Larentia parallelolineata Retz.
Fl: Mitte August—September.
V: vereinzelt nicht häufig.

1604 Larentia montanata Bkh.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.

1607 Larentia suffumata Hb.
Fl: Mitte April—Juni. V: vereinzelt.

1608 Larentia qudrifasciaria Cl.
Fl: Mitte Juni—August.
V: weit verbreitet nicht selten.

1609 Larentia ferrugata Cl.
Fl: Von Ende April—September in 3 Generationen. V: häufig.

1609 a Larentia spadiciaria Schiff.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: weniger häufig, lokal.

1611 Larentia pomoeriaria Ev.
Fl: Mitte April—Juni und von Juli-August. V: lokal einzeln, in schattigen feuchten Waldstellen.

1612 Larentia designata Rott.
Fl: Juni—Juli. V: verbreitet, jedoch nicht häufig.

1614 Larentia fluviata Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni und August.
V: vereinzelt selten.

1615 Larentia vittata Bkh.
Fl: Mitte Mai und August.
V: lokal selten auf Galium im Auwald.

1616 Larentia dilutata Bkh.
Fl: Ende September—Oktober.
V: häufig (Eichen- u. Buchenwald).

1617 Larentia autumnata Gn.
Fl: Oktober—November.
V: häufig im Mischwald.

1650 Larentia cuculata Hufn.
Fl: Juni—September.
V: vereinzelt aber nicht selten.

1651 Larentia galiata Hb.
Fl: Juli. V: selten westl. Neuburg.

1653 Larentia rivata Hb.
Fl: Mai—Juni.
V: lokal im Auwald selten.

1654 Larentia sociata Bkh.
Fl: Mai—September (3 Generationen). V: häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1656 Larentia picata Hb.
Fl: Mitte Mai. V: einzeln westlich Neuburg/D.

1658 Larentia albicillata L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig im Mischwald.

1659 Larentia procellata F.
F: Ende Mai—Juni und Ende Juli—August. V: häufig im Mischwald.

1661 Larentia hastata L.
Fl: Juni. V: einzeln (scheinbar völlig lokal im Gebiet!).

1663 Larentia tristata L.
Fl: Mitte Juni—September.
V: häufig.

1666 Larentia molluginata Hb.
Fl: Juni. V: einzeln im Auwald westlich Neuburg/D.

1668 Larentia alchemillata L.
Fl: Juni—August. V: häufig an den bewaldeten Hängen und im Mischwald.

1669 Larentia hydrata Tr.
Fl: Mitte Juli. V: lokal selten, an warmen trockenen Südhängen.

1670 Larentia lugdunaria HS.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal vereinzelt. R: auf Nelkenbeere.

1671 Larentia unifasciata Hw.
Fl: Ende Juli—August.
V: einzeln im Auwald.

1674 Larentia albulata Schiff.
Fl: Ende Juni—Juli.
V: häufig auf Heideflächen.

1675 Larentia testaceata Donz.
Fl: Ende Mai—Juni.
V: einzeln in Erlenbeständen.

1676 Larentia slomeri Curt.
Fl: Ende Juni. V: einzeln westlich Neuburg/D. im Auwald.

1677 Larentia obliterata Hufn.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli.
V: häufig in den Auen.

1678 Larentia luteata Schiff.
Fl: Juni—Juli. V: häufig in feuchten Erlen- u. Birkenbeständen.

1680 Larentia bilineata L.
Fl: Ende Mai—Juni und August.
V: sehr häufig.

1683 Larentia sordidata F.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal häufig nördlich Neuburg/D.

1684 Larentia autumnalis Ström.
Fl: Ende Mai—Juni und Ende Juli—August. V: häufig im Auwald.

1686 Larentia capitata HS.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug.
V: vereinzelt in den Auen.

1687 Larentia silaceata Hb.
Fl: Ende Mai—Juni und Ende Juli—August. V: lokal häufig in feuchten schattigen Mischwäldern.

1688 Larentia corylata Thnb.
Fl: Mai--Juli.
V: vereinzelt nicht selten.

1689 Larentia badiata Hb.
Fl: Mitte März—April. V: lokal an geschützten Hängen, einzeln.

1690 Larentia berberata Schiff.
Fl: Ende Mai—Juni und Ende Juli—August. V: häufig.

1692 Larentia rubidata F.
Fl: Juni—Juli. V: einzeln an warmen Hängen.

1693 Larentia comitata L.
Fl: Mitte Juli—August. V: häufig.

1694 Larentia sagittata F.
Fl: Ende Juni—Juli.
V: lokal einzeln.

1695 Asthena candidata Schiff.
Fl: Mitte Mai—Juni.
V: weit verbreitet an den Hängen.

1699 Tephroclystia Hb. (Eupithecia Curt.) oblongata Thnbg.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

1703 Tephroclystia linariata F.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug.
V: häufig.

1706 Tephroclystia laquearia HS.
Fl: Ende Mai—Juni—Juli. V: selten.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1711 Tephroclystia pusillata F.
Fl: Ende April—Mai.
V: häufig im Fichtenwald.

1713 Tephroclystia indigata Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni und August.
V: vereinzelt.

1715 Tephroclystia togata Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.

1718 Tephroclystia venosata F.
Fl: Ende Mai—Juni. V: vereinzelt an sonnigen Hängen.

1726 Tephroclystia pimpinellata Hb.
Fl: Juni. V: selten.

1731 Tephroclystia assimilata Gn.
Fl: Mai—Juni und August.
V: häufig.

1734 Tephroclystia denotata Hb.
Fl: Mitte Juni—August.
V: vereinzelt.

1739 Tephroclystia vulgata Hw.
Fl: Ende Mai—Juli.
V: weit verbreitet.

1744 Tephroclystia castigata Hb.
Fl: Mai—Juni. V: häufig.

1746 Tephroclystia subnotata Hb.
Fl: Juni—Juli. V: vereinzelt.

1750 Tephroclystia helveticaria B.
Fl: Ende April—Mai?. V: lokal an Wacholder. R: im Oktober geklopft ergaben im Dezember den Falter.

1753 Tephroclystia satyrata Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.

1757 Tephroclystia succenturiata L.
Fl: Mitte Juli—August.
V: lokal häufig.

1757 c Tephroclystia subfulvata Hw.
Fl: Juli. V: vereinzelt auf Heideflächen.

1761 Tephroclystia scabiosata Bkh.
Fl: Ende Mai—Juni. V: vereinzelt in feuchten Biotopen.

1774 Tephroclystia plumbeolata Hw.
Fl: Juli. V: vereinzelt.

1776 Tephroclystia isogrammaria HS.
Fl: Ende Juni—Juli. V: einzeln.

1781 Tephroclystia tenuiata Hb.
Fl: Ende Juni—August. V: einzeln.

1783 Tephroclystia nanata Hb.
Fl: Mai und Ende Juli—August.
V: vereinzelt nicht selten.

1785 Tephroclystia innotata Hufn.
Fl: Juli—August. V: häufig.

1795 Tephroclystia exiguata Hb.
Fl: Ende Mai—Juni. V: vereinzelt im Auwald.

1797 Tephroclystia lanceata Hb.
Fl: Ende März—April. V: häufig an Weidekätzchen die am Nadelwaldrand stehen.

1799 Tephroclystia sobrinata Hb.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal in Wacholderbiotopen, häufig.

1804 Chloroclystis rectangulata L.
Fl: Juni—Juli. V: häufig.

1805 Chloroclystis debiliata Hb.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal westlich Neuburg/D., in feuchten Heidelbeerschlägen.

1807 Collix sparsata Tr.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: einzeln in den Auen.

1811 Phibalapteryx vitalbata Hb.
Fl: Mai und Ende Juli. V: lokal westlich an den Jurahängen.

1813 Phibalapteryx tersata Hb.
Fl: Juni. V: vereinzelt im Mischwald.

Boarminae

1823 Abraxas grossulariata L.
Fl: Ende Juni—Juli. V: vereinzelt, selten.

1824 Abraxas sylvata Sc.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal im Auwald.

1826 Abraxas marginata L.
Fl: Ende April—August, in mehreren Generationen, je nach Biotop.
V: häufig im Auwald.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1827 Abraxas adustata Schiff.
Fl: Je nach Lage, von Ende April—August. V: weit verbreitet, nicht selten.

1829 Bapta bimaculata F.
Fl: Mai—Juni. V: häufig im Auwald.

1830 Bapta temerata Hb.
Fl: Ende Mai—Juni.
V: häufig im Auwald.

1835 Deilinia pusaria L.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juni-August. V: lokal häufig.

1836 Deilinia exanthemata Sc.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug.
V: nicht häufig.

1837 Numeria pulveraria L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: lokal westlich Neuburg/D., Jurahänge.

1840 Ellopia prosapiaria L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal selten, nördlich Neuburg/D.
Var: var. prasinaria Hb.
V: lokal häufig.

1842 Metrocampa margaritata L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal häufig im Buchenwald.

1844 Ennomos autumnaria Wrnbg.
Fl: Ende August—September.
V: häufig.

1845 Ennomos quercinaria Hufn.
Fl: Mitte August—September.
V: lokal im Buchen- u. Eichenwald.

1846 Ennomos alniaria L.
Fl: Ende August—September.
V: lokal einzeln.

1847 Ennomos fuscantiaria Hw.
Fl: August—Oktober. V: häufig.

1849 Ennomos erosaria Bkh.
Fl: August—September.
V: weit verbreitet, nicht häufig.

1852 Selenia bilunaria Esp.
Fl: April—Mai u. Mitte Juli—Aug.
V: häufig.

1853 Selenia lunaria Schiff.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal einzeln westl. Neuburg/D., Südhang.

1854 Selenia tetralunaria Hufn.
Fl: April und Mitte Juli—August.
V: häufig.

1855 Hygrochroa syringaria L.
Fl: Mitte Juni—Juli.
V: lokal bei Neuburg, einzeln.

1857 Gonodontis bidentata Cl.
Fl: April—Mai. V: vereinzelt.

1858 Himera pennaria L.
Fl: Mitte September—Oktober.
V: häufig.

1861 Crocallis elinguaria L.
Fl: Mitte Juni—August, je nach Biotop. V: lokal vereinzelt nicht selten.

1865 Angerona prunaria L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig im Mischwald u. Auen.

1866 Ourapteryx sambucaria L.
Fl: Juni—Juli. V: häufig.

1867 Eurymene dolabraria L.
Fl: Mai—Juni, in heißen Sommern noch eine zweite Generation von August—September.
V: häufig im Eichenwald.

1868 Opisthograptis luteolata L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.

1869 Epione apicaria Schiff.
Fl: Juli—September.
V: häufig in den Auen.

1870 Epione parallelaria Schiff.
Fl: Juli—August.
V: lokal, nicht häufig.

1871 Epione advenaria Hb.
Fl: Mai—Juni. V: lokal häufig (schattige Heidelbeerparzellen).

1874 Venilia macularia L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig im Jura, lokal im Auwald.

1879 Semiothisa notata L.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal vereinzelt aber nicht selten

1880 Semiothisa alternaria Hb.
Fl: Ende Mai—Juli. V: häufig.

1881 Semiothisa signaria Hb.
Fl: Juni. V: nicht häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1882 Semiothisa liturata Cl.
Fl: Ende Mai—Juli. V: häufig.

1885 Hibernia rupicapraria Hb.
Fl: März. V: lokal an geschützten Schlehenhecken.

1886 Hibernia bajaria Schiff.
Fl: Oktober—November. V: häufig in den Auen und Südhängen.

1887 Hibernia leucophaearia Schiff.
Fl: Mitte Februar—April.
V: lokal häufig im Mischwald.

1888 Hibernia aurantiaria Esp.
Fl: Ende September—Oktober.
V: lokal häufig an geschützten Hängen.

1889 Hibernia marginaria Bkh.
Fl: Ende Februar—März.
V: häufig im Mischwald.

1891 Hibernia defoliaria Cl.
Fl: Mitte Oktober—November.
V: lokal häufig im Mischwald.

1894 Anisopteryx aescularia Schiff.
Fl: Mitte Februar—März.
V: häufig in den Auen.

1895 Phigalia pedaria F.
Fl: Mitte Februar—März. V: häufig.

1897 Biston hispidaria F.
Fl: Ende März—April. V: lokal im Eichenwald vereinzelt.

(Fortsetzung folgt)

Schwabens Störche 1962

Von Dr. Georg Steinbacher

Auch 1962 wurde wieder der schwäbische Storchenbestand registriert. Besonderer Dank gilt den Herren Schulleitern, die wie in jedem Jahr, freundlich, bereitwillig und entgegenkommend die Fragebögen ausfüllten, zurücksandten und so unsere Bestrebungen um Freund Adebar nachdrücklich unterstützten!

Gerade als die letzten Meldungen einliefen, erreichte uns die Nachricht, daß unser Storch mit dem Radolfzeller Ring BB 14412, über den wir schon mehrfach berichteten, sich im November 1962 wiederum in Dornach bei Solothurn eingestellt hat, um hier zu überwintern! Kurz sei nochmals seine Lebensgeschichte gestreift: 1960 wurde er mit drei Geschwistern im Storchennest in Ziemetshausen erbrütet und mit diesen im Augsburger Tiergarten vollends groß gezogen, nachdem seine Eltern abgeschossen worden waren. Zwei Geschwister zogen damals im Herbst ab, BB 14412 und das vierte überwinterten in Augsburg. Leider wurde das letztere im Sommer 1961 von einem Rohling getötet. Unser Storch zog dann am 24. 9. 1961 mit drei hier groß gezogenen Jungstörchen dieses Jahres ab, kehrte am 27. 9. wieder allein zurück, um Anfang Dezember bei strengem Frost zu verschwinden und am 19. 12. in Dornach bei Solothurn zu erscheinen. Hier wurde er täglich zweimal von Frau Anna Becker gefüttert und zwar bekam er viermal in der Woche Fleisch und dreimal Rheinfische. Er blieb bis zum 9. 3. 1962; am 11. 3. war er bereits wieder am Futterplatz im Augsburger Tiergarten. Jetzt verschwand er zwischen dem 2. und 7. 4. und stand am 30. 4. auf dem Storchennest in Ungersheim im Oberelsaß. Am 27. 6. erschien er mit seinem Artgenossen wieder über dem Augsburger Tiergarten, fiel hier allein ein und zog dann zwischen dem 20. und 30. 9. 1962 ab, also etwa zum gleichen Zeitpunkt, zu dem er im vorigen Jahr vergeblich zu starten versuchte. Und nun ist er wieder in Dornach bei Solothurn! Er hat also in knapp 12 Monaten dreimal die 280 km durchflogen, die Augsburg von Solothurn trennen, und hat einmal dazu nur etwa 2 Tage gebraucht. Zweimal legte er die 270 km von Ungersheim nach Augsburg zurück. Zweifellos sind die Entfernungen, die er dabei absolvierte, weit größer, denn ein Storch fliegt kaum geradlinig über Berg und Tal.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: 67

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 20-24