©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Nach Wüst „Prodromus einer Avifauna von Bayern" (Anz. Orn. Ges. in Bayern, S. 305) waren die Funde von Mindelaltheim das 16. und 17. bekanntgewordene Vorkommen vom Sichler in Bayern; außerdem ist das vom selben Autor genannte Maximum von 3 Ex. wieder erreicht worden.

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(6. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis" von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.
In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau VII

1903 Biston hirtaria Cl.
Fl: März—April. V: häufig.

1904 Biston strataria Hufn.
Fl: Ende März—April.
V: häufig im Mischwald.

1906 Amphidasis betularia L.
Fl: Mitte Mai—Juli. V: häufig.
Var: var. doubledayaria Mill. einzeln.

1921 Boarmia cinctaria Schiff.
Fl: Mai—Juni. V: verbreitet nicht selten.

1923 Boarmia gemmaria Brahm.
Fl: Ende Juli—August. V: nicht häufig, meist vereinzelt.

1925 Boarmia secundaria Esp.
Fl: Mitte Juli—August.
V: häufig im Fichtenwald.

1926 Boarmia ribeata Cl.
Fl: Ende Juni—August. V: nicht häufig, jedoch weit verbreitet im Fichtenwald.

1928 Boarmia repandata L.
Fl: Juni—Juli. V: häufig im Mischwald.

1929 Boarmia roboraria Schiff.
Fl: Juni—Juli. V: lokal verbreitet im Mischwald.

1930 Boarmia consortaria F.
Fl: Mai—Juni. V: häufig im Auwald.

1937 Boarmia bistortata Goeze.
Fl: Mitte März—April und Ende Juli—August. V: häufig im Mischwald.

1938 Boarmia consonaria Hb.
Fl: Ende April—Mai. V: lokal seltener.

1939 Boarmia luridata Bkh.
Fl: Mai—Juni. V: vereinzelt lokal im Eichenwald.

1940 Boarmia punctularia Hb.
Fl: Mitte April—Mai u. Ende Juli—August. V: häufig.

1948 Gnophos furvata F.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal westlich Neuburg/D. an Jurafelsen.

1951 Gnophos obscuraria Hb.
Fl: Ende Juli—September. V: lokal westlich Neuburg/D. an Felsen.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1994 Fidonia roraria F.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: lokal einzeln südwestlich Neuburg/D.

1997 Ematurga atomaria L.
Fl: Mitte April—Juni und Juli-Aug.
V: häufig.

1998 Bupalus piniarius L.
Fl: Ende Mai—Juli. V: häufig in Kiefernbeständen.

2006 Thamnonoma wauaria L.
Fl: Ende Juni—August.
V: verbreitet häufig in Gärten.

2011 Diastictis artesiaria F.
Fl: Juli—September.
V: lokal häufig in den Auen.

2012 Phasiane petraria Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: lokal an warmen sonnigen Waldstellen.

2017 Phasiane clathrata L.
Fl: Ende April—Mai und Anfangs Juli—August. V: häufig.

2018 Phasiane glarearia Brahm.
Fl: Juni—Juli. V: lokal häufig in den Auen.

2036 Scoria lineata Sc.
Fl: Ende Mai—Juli.
V: häufig in den Auen.

2041 Perconia strigillaria Hb.
Fl: Ende Mai—Juli. V: lokal in geschützten Ginsterbeständen.

Nolidae

2049 Nola cucullatella L.
Fl: Ende Juni—Juli. V: vereinzelt.

Cymbidae

2062 Sarrothripus revayanus Scop.
Fl: Mitte Juli—August.
V: vereinzelt lokal.

Chloéphoridae

2066 Earias chlorana L.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

2067 Hylophila prasinana L.
Fl: Mai—Juni.
V: häufig im Eichenwald.

2068 Hylophila (Chloéphora) bicolorana Füßl.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: vereinzelt, nicht häufig im Eichenwald.

Syntomidae

2071 Dysauxes ancilla L.
Fl: Mitte Juli—August. V: lokal westlich Neuburg/D., auf sonnigen gebüschreichen Stellen.

Arctiidae

2073 Spilosoma mendica Cl.
Fl: Anfangs Mai—Juni.
V: vereinzelt im Jura.

2074 Spilosoma lubricipeda Esp. (lutea Hufn.)
Fl: Mai—Juli. V: häufig.

2075 Spilosoma menthastri Esp. (lubricipeda L.)
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.

2076 Spilosoma urticae Esp.
Fl: Mai—Juni. V: lokal vereinzelt.

2077 Phragmatobia fuliginosa L.
Fl: Mitte April—Mai und Juli-Aug.
V: häufig.

2082 Parasemia plantaginis L.
Fl: Ende Mai—Juni.
V: häufig in den Auen.

2083 Rhyparia purpurata L.
Fl: Ende Juni—Juli.
V: lokal im Auwald.

2085 Diacrisia sanio L.
Fl: Ende Mai—Juni.
V: häufig in den Auen.

2092 Arctia caja L.
Fl: Mitte Juli—August.
V: häufig.

2111 Callimorpha dominula L.
Fl: Mitte Juli—August.
V: verbreitet im Jura.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

2112 Callimorpha quadripunctaria Poda (hera L.)
Fl: Mitte Juli. V: lokal aus südl. Kalkhängen, gerne auf Brombeerblüten.

2113 Coscinia striata L.
Fl: Juni—Juli. V: lokal vereinzelt im Jura.

2116 Hipocrita jacobaeae L.
Fl: Mitte Mai—Juni.
V: häufig in den Auen.

Lithosiinae

2119 Miltochrista miniata Forst.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: selten.

2123 Endrosa irrorella Cl.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal auf trockenen Heide- u. Waldstellen.

2127 Cybosia mesomella L.
Fl: Mitte Juni—August.
V: häufig im Auwald.

2129 Gnophria rubricollis L.
Fl: Ende Mai—Juli. V: lokal stellenweise häufig im Nadelwald.

2130 Oeonistis quadra L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: meist vereinzelt, in manchen Jahren häufig.

2131 Lithosia deplana Esp.
Fl: Ende Juni—September.
V: häufig im Nadelwald.

2133 Lithosia griseola Hb.
Fl: Mitte Juli—August. V: vereinzelt im Jura, in Waldlichtungen.

2134 Lithosia lurideola Zinck.
Fl: Mitte Juli—August.
V: häufig im Mischwald.

2135 Lithosia complana L.
Fl: Mitte Juli—August. V: lokal verbreitet, im Mischwald und an Hängen.

2140 Lithosia lutarella L.
Fl: Mitte Juli—August. V: häufig lokal in trock. lichten Auwald.

2142 Lithosia sororcula Hufn.
Fl: Mai—Juni. V: vereinzelt, häufig im Mischwald.

Zygaenidae

2150 Mesembrynus (Zygaena) purpuralis pythia F.
Fl: Mitte Juli—August.
V: häufig an den Jurakalkhängen.

2152 Silvicola (Zygaena) scabiosae scabiosae Scheven.
Fl: Ende Juni—Anfang Juli.
V: völlig lokal westlich Neuburg im lichten Mischwald, einzeln.

2155 Lictaria (Zygaena) achilleae Esp.
Fl: Juni—Juli. V: häufig im Auwald.

2161 Thermophila (Zygaena) meliloti Esp.
Fl: Anfangs Juli—August.
V: häufig in den Auen und auf den Höhen.

2162 Huebneriana (Zygaena) trifolii Esp.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal auf sonnigen feuchten Wiesen.

(Fortsetzung folgt)

Der Brachvogelbestand im Ries

Von Erwin Heer

Im „Anz. Ornith. Ges. Bay.", Heft 5, 1961, S. 424—442 brachten A. Gauckler und M. Kraus eine höchst wertvolle Arbeit über die Brutplätze des Brachvogels, des Rotschenkels und der Uferschnepfe in Nordbayern. Dabei wurde der Brachvogelbestand im Ries mit 15—20 Paaren für den Raum Bühl—Rudelstetten und mit 1—2 Paaren für die Löpsinger Wiese bei Nördlingen angegeben (S. 428).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: 67

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 62-64