©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(2. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis" von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.

In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau III.

Hesperiidae

271 Carterocephalus palaemon Pall.
Fl: Ende April—Mai und Mitte Juli bis August. V: überall häufig.

273 Adopaea lineola O.
Fl: Ende Juni—August. V: lokal verbreitet.

274 Adopaea silvester Poda. (= thaumas Hufn.).
Fl: ab Ende Juni. V: häufig.

275 Thymelicus actaeon Rott.
Fl: Juli. V: lokal auf den Jurahängen, einzeln.

276 Hesperia comma L.
Fl: Juli—August. V: überall häufig.

277 Ochlodes venata Brem. (= sylvanus Esp.)
Fl: Mai—Juni, und Ende Juli bis August. V: überall häufig.

280 Carcharodes alceae Esp.
Fl: im Juli und August. V: vereinzelt an Kalkhängen.

284 Pyrgus carthami Hbn.
Fl: Juni. V: verbreitet, nicht häufig.

291 Pyrgus alveus Hbn.
Fl: im Juli. V: lokal an den Hängen, einzeln.

296 Pyrgus malvae L.
Fl: ab Mitte April—Mai, dann im Juni—Juli. V: häufig. Var: taras Bergstr. seltener.

297 Erynnis tages L.
Fl: Mitte April—Mai, und wieder Mitte Juli—August. V: überall häufig.

Sphingidae

299 Acherontia atropos L.
Fl: Ende Juni und Anfang Oktober, Falter am Licht. Jedoch die Mehrzahl durch Puppen im September erhalten, die meist nach 14 Tagen schlüpften. Der Falter selbst ist schwer zu bekommen.

302 Laothoë populi L. (Smerinthus populi L., Amorpha Kirby).
Fl: ab Mitte Mai—Juni. V: häufig.

303 Smerinthus ocellata L.
Fl: Ende Mai—Juni. V: häufig.

304 Mimas tiliae L.
Fl: ab Mitte Mai—Juni. V: häufig.

306 Sphinx ligustri L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: überall häufig.

307 Herse (Protoparce) convolvuli L.
Fl: Ende Mai und August—September. V: nicht selten.

308 Hyloicus pinastri L.
Fl: Ende Mai—Juni und August bis September. V: häufig. 2. Gen. seltener.

312 Celerio (Deilephila) galii Rott.
Fl: Juni—Juli. V: vereinzelt, jedoch nicht selten.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

314 Celerio (Deilephila) euphorbiae L.
Fl: Mai—Juni. V: lokal häufig.

316 Celerio (Deilephila) lineata F. ssp. livornica Esp.
Fl: Ende Mai—Juni und August bis September. V: vereinzelt.

320 Deilephila (Pergesa Wkr.) elpenor L.
Fl: Mai—Juni. V: überall im Gebiet.

321 Deilephila (Pergesa Wkr.) porcellus L.
Fl: Mai—Juni und wieder im August. V: überall.

322 Proserpinus (Pterogon B.) proserpina Pall.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: vereinzelt

324 Macroglossum stellatarum L.
Fl: Juli und September—Oktober. V: häufig. (Selten als Überwinterer.)

326 Hemaris fuciformis L.
Fl: ab Mitte Mai—Juni. V: häufig am Donauufer.

327 Hemaris lityus L. (scabiosae Z.).
Fl: ab Mitte April—Mai und Ende Juli—August. V: lokal seltener westlich Neuburg.

Notodontidae (Wenn nichts weiter angegeben, alle Arten am Licht gefangen)

330 Harpyia (Cerura auct.) bicuspis Bkh.
Fl: ab Mitte Mai. V: selten. R: auf Birke.

331 Harpyia furcula Cl.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig. R: auf Saalweide und Zitterpappel.

332 Harpyia hermelina Goeze. (bifida Hbn.)
Fl: Ende März-Mai und im Juli. V: häufig. R: auf Pappelarten.

334 Cerura (Dicranura) erminea Esp.
Fl: Ende Mai-Juni. V: selten. (Mitternachtsflieger).

335 Cerura vinula L.
Fl: anfangs Mai. V: häufig. R: auf Weiden und Pappelarten.

336 Stauropus fagi L.
Fl: Mai-Juni und Juli. V: häufig in Buchenwäldern, in Bergheim einzeln.

338 Hybocampa (Hoplitis) milhauseri F.
Fl: Mitte Mai. V: vereinzelt. R: auf Eichen und Buchen.

339 Gluphisia crenata Esp.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: selten. R: in den Kronen alter Pappeln.

341 Drymonia guerna F.
Fl: Juni. V: selten. R: auf Eichenbüschen.

342 Drymonia trimacula Esp.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.

343 Drymonia ruficornis Hufn. (chaonia Hbn.)
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig. R: auf Eichen.

344 Pheosia tremula Cl.
Fl: Mai-Juni und Mitte Juli-August. V: häufig.

345 Pheosia gnoma F. (dictaeoides Esp.)
Fl: Ende April-Juni und Juli-September. V: lokal häufig. (Falter fliegt erst um Mitternacht ans Licht). R: auf Birke.

346 Notodonta ziczac L.
Fl: Ende April-Juni und Mitte Juli-September. V: häufig.

347 Notodonta dromedarius L.
Fl: Mai-Juni und Juli-September. V: häufig.

348 Notodonta phoebe Sieb. (tritophus Schiff.)
Fl: Mai-Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

350 Notodonta terva Hbn. (tritophus Esp.)
Fl: Anfangs Mai-Juni. V: selten. R: an Pappeln.

351 Peridea anceps Goeze (trepida Esp.).
Fl: Mai-Juni. V: häufig. R: auf Eichen, Buchen, seltener auf Birke.

353 Leucodonta bicoloria Schiff.
Fl: Mitte Mai bis Juli. V: lokal nicht selten. (Die Falter sind bei Dunkelheit nach Gewitterregen an den unteren Zweigen u. Ästen abzuleuchten. R: in den Wipfeln der Birke.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

356 Odontosia carmelita Esp.
Fl: Ende April-Mai. V: selten. R: in den Wipfeln warmstehender Birken.

358 Lophopteryx camelina L.
Fl: Mai-Juli. V: häufig. Var: f. giaffina Hbn. vereinzelt.

359 Lophoteryx cuculla Esp.
Fl: Mai-Juli. V: lokal, selten westlich Neuburg. R: auf Feldahorn.

361 Pterostoma palpina L.
Fl: ab Mitte Mai-Juni und Juli-September. V: häufig.

362 Ptilophora plumigera Esp.
Fl: Erst nach Frost, etwa Ende Oktober-Dezember. V: vereinzelt.

363 Phalera bucephala L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig. R: gesellig auf Ulme, Hasel, Birke, Pappel.

366 Clostera (Pygaera) anastomosis L.
Fl: Mai und wieder ab Juli. V: selten. R: auf Zitterpappel.

367 Clostera (Pygaera) curtula L.
Fl: April-Mai und Juli-August.
V: häufig.

368 Clostera (Pygaera) anachoreta F.
Fl: Ende April und Mitte Juli. V: seltener. R: auf Pappel und Weide.

369 Clostera (Pygaera) pigra Hufn.
Fl: Ende April-Juni und Juli-August.
V: häufig.

Lymantriidae

377 Orgyia gonostigma F.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal selten, westl. Neuburg (Donau).

378 Orgyia recens Hbn. (antigua L.)
Fl: Mitte Mai-Juni und August-September. V: häufig.

383 Dasychira selenitica Esp.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig in den Auen.

385 Dasychira fascelina L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.

386 Dasychira abietis Schiff.
Fl: Anfangs Juli. V: lokal, westlich Neuburg in Altfichtenbeständen.
(Scheint nur völlig lokal im Gebiet zu sein, da der Falter sehr selten gefunden wird.)

387 Dasychira pudibunda L.
Fl: Anfangs Mai-Juni. V: häufig.
R: Buche und andere Laubbäume.

388 Euproctis chrysorrhoa L.
Fl: Juli-August. V: häufig. R: besonders auf Obstbäume, Eiche (polyphag).

389 Porthesia similis Fuessl.
Fl: Mitte Juni-August. V: lokal häufig.

391 Arctornis L-nigrum Muell.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal in Buchenwäldern, mit Jungwuchs.

392 Leucoma (Stilpnotia) salicis L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.

393 Lymantria dispar L.
Fl: Mitte Juli-August. V: lokal selten.

394 Lymantria monacha L.
Fl: Mitte Juli-September. V: In manchen Jahren häufiger.
Var: f. eremita O., und f. nigra Frr. nicht selten unter der Stammform.

Lasiocampidae

402 Malacosoma neustria L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig.

403 Malacosoma castrensis L.
Fl: Mitte Juli. V: sehr lokal, selten, westl. Neuburg. R: auf Wolfsmilch.

406 Trichiura crataegi L.
Fl: Ende August-September. V: lokal in den Auwäldern u. Wiesen.

408 Poecilocampa populi L.
Fl: Oktober-November. V: häufig, jedoch erst nach stärkeren Frösten.

410 Eriogaster catax L.
Fl: Ende September-Oktober. V: westl. Neuburg/D. selten. R: auf Weißdorn.

411 Eriogaster lanestris L.
Fl: Mitte März-April. V: häufiger im Auwald. R: auf Schlehe.

414 Lasiocampa guercus L.
Fl: Ende Juni-August. V: nicht häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

415 Pachygastria (Lasiocampa) trifolii Schiff.
Fl: Ende Juni-September. V: häufig, auf Auwaldwiesen.

417 Macrotylatia rubi L.
Fl: Mai-Juli. V: häufig, besonders im Auwald. (Im Gegensatz zu den anderen Spinnerarten, flogen mir von dieser Art mehr Weibchen ans Licht als Männchen. Dabei ist interessant, daß die Tiere zum Leuchttuch laufen. Sie fliegen meist auf 3—4 m zum Lichtschein und laufen dann im Gras näher. (♂ fliegen früher).

419 Philudoria (Cosmotriche) potatoria L.
Fl: Mitte Juli. V: häufig im Auwald.

420 Cosmotriche (Selenephera) lunigera Esp.
Fl: Ende Juli-August. V: vereinzelt, Var: f. lobulina Esp. häufiger.
R: auf Fichten und Weißtannen.

422 Epicnaptera tremulifolia Hbn.
Fl: Anfangs Mai-Juni. V: vereinzelt.

424 Gastropacha quercifolia L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.

425 Gastropacha populifolia Esp.
Fl: Juni-Juli. V: sehr selten.

426 Odonestis pruni L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: häufig.

427 Dendrolimus pini L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt, in manchen Jahren häufiger.

Endromididae

431 Endromis versicolora L.
Fl: März-April. V: häufig in Jungbirkenpflanzungen.

Lemoniidae

435 Lemonia dumi L.
Fl: Mitte Oktober. V: selten.

Saturnidae

440 Eudia pavonia L.
Fl: Mitte März-Mai. V: häufig an Waldrandbuschzonen.

Syssphingidae (Aglia)

441 Aglia tau L.
Fl: Ende März-Mai. V: häufig in den Buchenwäldern westl. Neuburg/D. (Sobald die Sonne den Waldboden erwärmt, etwa um halb 9 Uhr, suchen die Männchen nach den Weibchen).

Drepanidae

442 Drepana falcataria L.
Fl: Ende April-Mai und im Juli-August. V: häufig.

444 Drepana harpagula Esp.
Fl: Anfangs Mai und Mitte Juli. V: lokal selten. R: Erle, Eiche.

445 Drepana lacertinaria L.
Fl: Ende Mai-Juni u. Ende Juli-Aug. V: In Birkenparzellen häufig.

446 Drepana binaria Hufn.
Fl: Mitte bis Ende Mai. Die kleinere Sommerform gen. aest. aestivaria Lempke von Juli-August. V: häufig im Buchenwald. R: auch auf Eiche und Erle.

447 Drepana cultraria F.
Fl: Ende April-Mai. Die dunklere Sommergeneration, gen.aest. aestiva Speyer. Ende Juli-September. V: häufig lokal im Altbuchenbestand.

448 Cilix glaucata Scop.
Fl: Mai-Juni = Frühjahrsform, gen. vern. obscurata Lempke. 2. Gen. fliegt ab Juli-August. V: häufig. R: auf Schlehen an geschützten Stellen.

Thyrididae

449 Thyris fenestrella Scop.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: nicht selten, jedoch lokal an warmen trockenen Hängen westl. Neuburg/D., an Waldrändern mit Clematis-Bewuchs. Die Falter fliegen im Sonnenschein!

Noctuidae

451 Panthea coenobita Esp.
Fl: Ende Mai-Juni. V: In Fichtenwäldern verbreitet nicht selten.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

453 Diphtera alpium Gb.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig im Eichenwald.

454 Demas coryli L.
Fl: Mitte April-Juni, und wieder im August. V: lokal häufig.

455 Acronycta leporina L.
Fl: Juni-Juli. V: teils häufig im Auwald.

456 Acronycta aceris L.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig im Mischwald.

457 Acronycta megacephala L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.

458 Acronycta alni L.
Fl: Juni-Juli. V: lokal, westl. Neuburg/D.

459 Acronycta strigosa F.
Fl: Ende Mai-Juni. V: An sonnigen Hängen mit Schlehen vereinzelt.

461 Acronycta tridens Schiff.
Fl: Ende Mai-Juni. V: vereinzelt.

462 Acronycta psi L.
Fl: Mitte Mai-Juni, und Ende Juli-August. V: häufig.

463 Acronycta cuspis Hb.
Fl: Ende Mai-Juli. V: lokal selten bei Sehensand.

464 Acronycta menyanthidis View.
Fl: Juni-August. V: lokal selten nördl. Neuburg (Moorbewohner).

465 Acronycta auricoma F.
Fl: Mai-Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

466 Acronycta euphorbiae F.
Fl: Mai und Juli. V: nicht häufig bei Riedensheim.

468 Acronycta rumicis L.
Fl: Ende April-Mai und Juni-Juli. V: häufig.

469 Craniophora ligustri F.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.

476 Arsilonche albovenosa Goeze.
Fl: (April-Mai und August). Ein Belegstück am 12. 7. 46 in Bergheim am Licht gefangen. V: selten.

477 Agrotis strigula Tr.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: In Heidekrautbiotopen häufig.

480 Agrotis signum F.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal selten westlich Neuburg/D.

482 Agrotis janthina Esp.
Fl: Ende Juni-Aug. V: lokal häufig.

483 Agrotis linogrisea Schiff.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt am Licht.

484 Agrotis fimbria L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig (sehr variabel).

488 Agrotis punicea Hb.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: Im ganzen Gebiet doch immer nur einzeln.

489 Agrotis augur F.
Fl: Juli. V: häufig.

496 Agrotis pronuba L.
Fl: Juni-Juli, einzeln aber auch im August. V: häufig in vielen Variationen.

497 Agrotis orbona Hufn.
Fl: Mitte Juli. V: im Auwald selten.

498 Agrotis comes Hb.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt nicht häufig.

505 Agrotis triangulum Hufn.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: häufig.

506 Agrotis baja F.
Fl: Juli-September. V: häufig.

514 Agrotis c-nigrum L.
Fl: Ende Mai-Juni und Ende August-Oktober. V: häufig.

515 Agrotis ditrapezium Bkh.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt lokal.

517 Agrotis stigmatica Hb.
Fl: August. V: nicht häufig.

518 Agrotis xanthographa Schiff.
Fl: Mitte August-September. V: häufig im Auengebiet.

520 Agrotis umbrosa Hb.
Fl: August-September. V: lokal häufig, auf Sandboden im Auwald.

521 Agrotis rubi View.
Fl: Ende Mai-Juli und Ende August-September. V: verbreitet.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

524 Agrotis brunnea F.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: weit verbreitet in feuchtwaren Mischwäldern.

525 Agrotis primulae Esp.
Fl: Mai-Juni. V: lokal häufig (westlich Neuburg/D.).

531 Agrotis multangula Hb.
Fl: Ende Juni-September. V: nördl. Neuburg/D., teils häufig.

537 Agrotis plecta L.
Fl: Ende Mai-Juni und Mitte Juli-August. V: häufig.

568 Agrotis forcipula Hb.
Fl: Ende Juni-Juli. V: nordwestlich Neuburg selten.

578 Agrotis putris L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: häufig (je nach Höhenlage schon im Mai).

579 Agrotis cinerea Hb.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt selten.

580 Agrotis exclamationis L.
Fl: Juni-Juli und August-September. V: häufig.

588 Agrotis nigricans L.
Fl: Mitte Juli-Aug. V: lokal häufig.

593 Agrotis tritici L.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt.

599 Agrotis obelisca Hb.
Fl: Ende Juli-August. V: südwestlich Neuburg/D. selten.

602 Agrotis corticea Hb.
Fl: Juni-Juli. V: Im Auwald häufig.

603 Agrotis ypsilon Rott.
Fl: Mitte August-Sept. V: häufig.

604 Agrotis segetum Schiff.
Fl: Mitte Juni-Juli u. Mitte August-September. V: häufig.

606 Agrotis saucia Hb.
Fl: Juni-Juli = ? Einwanderer aus dem Süden, im September am Licht gefangen. V: selten.

616 Agrotis praecox L.
Fl: Juli-August. V: nicht selten.

617 Agrotis prasina F.
Fl: Juni-Juli. V: häufig im Mischwald.

618 Agrotis occulta L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: verbreitet im Mischwald.

619 Pachnobia rubricosa F.
Fl: Mitte März-Mitte April. V: lokal häufig (Weidekätzchen u. am Licht).

620 Pachnobia leucographa Schiff.
Fl: Anfangs April. V: lokal häufig (an Weidekätzchen nur an wenigen Tagen zu fangen).

625 Charaeas graminis L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig.

626 Epineuronia popularis F.
Fl: Ende August-Sept. V: häufig.

627 Epineuronia cespitis F.
Fl: Ende August-September. V: verbreitet nicht selten.

628 Mamestra leucophaea View.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: nicht häufig.

630 Mamestra advena F.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: nördlich Neuburg/D. vereinzelt.

631 Mamestra tincta Brahm.
Fl: Anfangs Juni-Juli. V: nördlich Neuburg/D., verbreitet lokal.

632 Mamestra nebulosa Hufn.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig im Auwald.

633 Mamestra brassicae L.
Fl: Ende Mai-Juni und Juli-Sept. V: häufig.

634 Mamestra persicariae L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.

637 Mamestra oleracea L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.

638 Mamestra aliena Hb.
Fl: Juni. V: lokal westl. Neuburg/D.

639 Mamestra genistae Bkh.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig, in manchen Jahren seltener.

640 Mamestra dissimilis Kn.
Fl: Mai-Juni und August-September. V: vereinzelt.

641 Mamestra thalassina Rott.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: in manchen Jahren häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

642 Mamestra contigua Vill.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.

643 Mamestra pisi L.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.

646 Mamestra trifolii Rott.
Fl: Ende Mai-Juni und Mitte Juli-September. V: häufig.

650 Mamestra glauca Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: lokal selten westlich Neuburg/D.

653 Mamestra dentina Esp.
Fl: Mitte Mai-Juni, einzeln im Aug. V: häufig.

659 Mamestra reticulata Vill.
Fl: Ende Mai-Juli. V: vereinzelt.

666 Mamestra chrysozona Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.

667 Mamestra serena F.
Fl: Anfangs Mai-Juni und einzeln im August. V: häufig.

677 Dianthoecia filigramma Esp. Var: xanthocyanea Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: vereinzelt selten.

681 Dianthoecia albimacula Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.

682 Dianthoecia nana Rott.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.

683 Dianthoecia compta F.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.

684 Dianthoecia capsincola Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.

686 Dianthoecia cucubali Füssl.
Fl: Ende Mai-Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

687 Dianthoecia carpophaga Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig. (Ist der Mai kalt, so verlängert sich die Flugzeit bis in den Juli hinein 23. 7. 61).

692 Bombycia viminalis F.
Fl: Juli. V: westl. Neuburg/D. selten.

693 Miana ophiogramma Esp.
Fl: Ende Juni-Juli. V: nicht selten.

695 Miana strigilis Cl.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig. Var: var. aethiops Hw.

696 Miana latruncula Hb.
Fl: Juni-Juli. V: nicht häufig. Var: var. praeduncula Hb. selten.

697 Miana bicoloria Vill.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt jedoch nicht selten.

703 Bryophila raptricula Hb.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt nicht selten.

711 Bryophila perla F.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt.

712 Diloba coeruleocephala L.
Fl: September-Oktober. V: häufig.

717 Apamea testacea Hb.
Fl: Ende Juli-September. V: lokal an sonnigen sandigen Hängen.

722 Celaena matura Hufn.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt selten.

733 Hadena porphyrea Esp.
Fl: Ende August-Oktober. V: weit verbreitet.

739 Hadena adusta Esp.
Fl: Mitte Mai-Juli. V: selten.

747 Hadena sordita Bkh.
Fl: Mitte Mai-Juli. V: häufig, an warmen trockenen Hängen.

749 Hadena gemmea Tr.
Fl: August-September. V: einzeln.

753 Hadena monoglypha Hufn.
Fl: Juni-Juli. V: häufig. Variiert sehr.

755 Hadena lateritia Hufn.
Fl: Juli. V: selten.

757 Hadena lithoxylea F.
Fl: Ende Juni-Aug. V: lokal häufig.

758 Hadena sublustris Esp.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.

760 Hadena rurea F.
Fl: Juni-Juli. V: lokal häufig.

762 Hadena scolopacina Esp.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt, nicht überall.

763 Hadena basilinea F.
Fl: Ende Mai-Juni. V: lokal warme trockene Hänge.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: 66

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 16-22