©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(3. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis" von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.

In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau IV.

764 Hadena gemina Hb.
Fl: Juni. V: selten im Mischwald westlich Neuburg/D.

765 Hadena unanimis Tr.
Fl: Juni. V: lokal nicht selten.

767 Hadena secalis L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: häufig in reicher Variationsbreite.

789 Ammoconia caecimacula F.
Fl: September. V: einzeln.

803 Polia chi L.
Fl: Ende August-September. V: nicht häufig.

805 Brachionycha nubeculosa Esp.
Fl: März-April. V: vereinzelt an Ulmenstämmen.

806 Brachionycha sphinx Hufn.
Fl: Ende September-November. V: häufig.

808 Miselia oxyacanthae L.
Fl: September-Oktober. V: weit verbreitet.

810 Dichonia aprilina L.
Fl: Mitte August-Okt. V: häufig.

819 Dipterygia scabriuscula B.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt bei Bittenbrunn.

821 Rhizogramma detersa Esp.
Fl: Juli-August. V: häufig. (Durch die Vernichtung der Berberitzen wird diese Art in unserm Gebiet sehr an Zahl abnehmen).

823 Chloantha polyodon Cl.
Fl: Ende Mai-Juli. V: lokal nicht selten.

827 Polyphaenis sericata Esp.
Fl: Ende Juni-Juli. V: vereinzelt.

830 Trachea atriplicis L.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.

834 Euplexia lucipara L.
Fl: Ende Mai-Juni und August. V: häufig.

836 Brotolomia meticulosa L.
Fl: Ende April, Mai und ab Mitte August-Oktober. V: häufig.

837 Mania maura L.
Fl: Ende Juli-August. V: Im ganzen Auengebiet verbreitet. Sitzt gerne an dunklen Orten knapp über dem Wasser (Fähre, Brücken).

838 Naenia typica L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt, nicht häufig.

840 Helotropha leucostigma Hb.
Fl: Ende Juli-August. V: lokal selten (R: auf Wasserschwertlilie).

841 Hydroecia nictitans Bkh.
Fl: Mitte August-September. V: weit verbreitet, nicht selten.

841 a Hydroecia lucens Frr.
Fl: Mitte Juni-Ende August. V: häufig im Moorgebiet.

842 Hydroecia micacea Esp.
Fl: August-September. V: weit verbreitet, doch immer einzeln.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

848 Gortyna ochracea Hb.
Fl: Ende August-Oktober. V: breitet, nicht häufig.

849 Nonagria nexa Hb.
Fl: Ende August-September. V: lokal in feuchten Auwaldsenken, einzeln.

852 Nonagria typhae Thnb.
Fl: August-Oktober. V: lokal, im Rohrkolbenbiotop häufig.

853 Nonagria geminipuncta Hatchett.
Fl: August. V: nicht häufig bei Riedensheim im Schilfgürtel.

868 Tabinostola Hellmanni Ev.
Fl: Mitte Juli-August. V: überall im ganzen Gebiet vereinzelt.

869 Tapinostola fulva Hb.
Fl: Ende August-September. V: lokal selten an feuchten Biotopen.

873 Luceria virens L.
Fl: Ende Juli-September. V: häufig,

874 Calamia lutosa Hb.
Fl: Ende August—Oktober. V: einzelt im ganzen Gebiet.

876 Leucania impudens Hb.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig im Auwald (Lohwiesen).

877 Leucania impura Hb.
Fl: Ende Juni—Juli. V: häufig auf feuchten Auwaldwiesen.

878 Leucania pallens L.
Fl: Ende Mai—Juni und Juli—September. V: häufig im Auwald.

879 Leucania obsoleta Hb.
Fl: Mai—Juni. V: vereinzelt, selten.

880 Leucania straminea Tr.
Fl: Juli—August. V: lokal häufiger.

890 Leucania comma L., var. turbida Hb.
Fl: Ende Mai—Juni u. Ende August-September. V: lokal verbreitet.

893 Leucania L-album Hb.
Fl: Juni und Ende August—September. V: lokal nicht selten.

902 Leucania conigera F.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: verbreitet nicht selten.

903 Leucania albipuncta F.
Fl: Mitte Juni—August. V: zelt in den Auen.

904 Leucania lithargyria Esp.
Fl: Mitte Juni—August. V: häufig.

906 Leucania turca L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig im Mischwald.

907 Mythimna imbecilla F.
Fl: Juni—Juli. V: lokal nördlich Neuburg/D. Schuttermoor.

913 Grammesia trigrammica Hufn.
Fl: Im Jura schon Ende Mai, im Flachland Juni—Juli. V: häufig.

917 Caradrina quadripunctata F.
Fl: Mai—Juni—Juli. V: häufig besonders in Ortschaften.

930 Caradrina respersa Hb.
Fl: Ende Juni—Juli. V: nicht häufig.

932 Caradrina morpheus Hufn.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: vereinzelt im Auwald.

933 Caradrina alsines Brahm.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig.

934 Caradrina taraxaci Hb. (blanda Schiff.)
Fl: Ende Juni—August. V: weit verbreitet, nicht selten.

935 Caradrina ambigua F.
Fl: Juli-August. V: lokal nicht selten

936 Caradrina pulmonaris Esp.
Fl: Ende Juni—Juli. V: westlich Neuburg/D. vereinzelt nicht häufig.

942 Petilampa arcuosa Hw.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal nicht selten.

944 Rusina umbratica Goeze. (tenebrosa Hb.)
Fl: Juni—Juli. V: häufig.

949 Amphipyra tragopoginis L.
Fl: Mitte Juli—August. V: häufig.

952 Amphipyra perflua F.
Fl: Ende August—September. V: nicht häufig, im Auwald (Ulmenbestände).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

953 Amphipyra pyramidea L.
Fl: Ende Juli—Oktober. V: häufig im Auwald.

959 Taeniocampa gothica L.
Fl: Ende März—April. V: häufig an blühenden Weidenkätzchen.

960 Taeniocampa miniosa F.
Fl: Ende März—April. V: lokal nicht häufig. R: auf Buscheichen, besonders auf den Höhen.

961 Taeniocampa pulverulenta Esp.
Fl: Mitte März—April. V: häufig lokal, an Weidenkätzchen.

962 Taeniocampa populeti Tr.
Fl: Ende März—April. V: lokal selten an Schwarzpappelkätzchen.

963 Taeniocampa stabilis View.
Fl: Mitte März—April. V: häufig an Weidenkätzchen.

965 Taeniocampa incerta Hufn.
Fl: Mitte März—April. V: häufig an Weidenkätzchen.

966 Taeniocampa opima Hufn.
Fl: Ende März—April. V: lokal vereinzelt.

967 Taeniocampa gracilis F.
Fl: Mitte März—Mai. V: häufig lokal.

968 Taeniocampa munda Esp.
Fl: Mitte März—April. V: weit verbreitet, nicht selten.

969 Panolis griseovariegata Goeze.
Fl: März—Mai. V: in wechselnder Häufigkeit. (Falter auch an Weide und Schlehenblüten).

970 Mesogona oxalina Hb.
Fl: Ende August—September. V: Im Augebiet lokal häufig.

976 Calymnia pyralina View.
Fl: Ende Juni—Juli. V: in manchen Jahren häufiger.

977 Calymnia affinis L.
Fl: Mitte Juli—August. V: Westlich Neuburg lokal selten.

979 Calymnia trapezina L.
Fl: Ende Juli—August. V: häufig.

980 Cosmia paleacea Esp.
Fl: Ende Juli—August. V: selten.

986 Dyschoorista fissipuncta Hw.
Fl: Ende Juni—Juli. V: häufig, besonders an Kopfweiden.

987 Plastenis retusa L.
Fl: Ende Juni—September. V: lokal häufig.

994 Orthosia lota Cl.
Fl: Ende August—September. V: verbreitet nicht selten.

995 Orthosia macilenta Hb.
Fl: Ende August—Oktober. V: lokal vereinzelt.

996 Orthosia circellaris Hufn.
Fl: August—Oktober. V: häufig.

997 Orthosia helvola L.
Fl: Mitte September—Oktober.
V: Im Eichenwald häufig.

999 Orthosia pistacina F.
Fl: Ende September—Oktober.
V: häufig.

1006 Orthosia litura L.
Fl: Mitte September—Oktober.
V: häufig.

1009 Xanthia citrago L.
Fl: September. V: Warme sonnige Höhen mit Lindenbewuchs, einzeln.

1011 Xanthia aurago F.
Fl: September—Oktober. V: einzeln, nicht häufig, westl. Neuburg.

1012 Xanthia lutea Ström.
Fl: Ende August—September.
V: Im Auengebiet häufig.

1013 Xanthia fulvago L.
Fl: Mitte August—September.
V: Im Auengebiet häufig.

1015 Xanthia gilvago Esp.
Fl: September. V: weit verbreitet, nicht selten.

1016 Xanthia ocellaris Bkh.
Fl: Ende August—September.
V: lokal selten.

1017 Hoporina croceago F.
Fl: Mitte September—März.
V: lokal vereinzelt, auf warmen, trockenen Hängen mit Eichenbuschgruppen westlich Neuburg.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: 66

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 45-47