©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

er vom 1. 1. 1946 am Wiederaufbau des furchtbar von Bomben zerschlagenen Kölner Zoos mit; der damalige Direktor, Dr. Werner Zahn, kannte ihn aus jener Zeit, als er selbst Assistent am Berliner Zoo gewesen war. Im Juni 1947 eröffnete der Kölner Zoo wieder seine Pforten, am 5. 8. des gleichen Jahres trat Karl Solin sein neues Amt im Augsburger Heimattiergarten an. Er nahm tatkräftig an verantwortungsvoller Stelle an seiner Umgestaltung in einen Zoo mit Tieren aus aller Welt teil; er legte mit Hand an, um alle Kriegsfolgen und Zerstörungen zu beseitigen. Seine Aufgabe war es auch die Tierpfleger anzuleiten, die ihnen neuen, fremdartigen Gäste zu betreuen; er sorgte dafür, daß unser Tiergarten ein wahres Schmuckkästchen wurde und blieb.

Jeder Freund unseres Zoos weiß, was der Augsburger Tiergarten und seine Besucher diesem tätigen, verantwortungsbewußten, nimmermüden Mann zu danken haben. Wir alle wünschen ihm viele weitere Jahre erfolgreicher Arbeit.

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(4. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis" von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.

In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau V

1021 Orrhodia vau-punctatum Esp.
Fl: September—März. V: vereinzelt nicht häufig.

1024 Orrhodia vaccinii L.
Fl: Ende September—April.
V: im Eichenwald häufig.

1026 Orrhodia rubiginea F.
Fl: September—März.
V: häufig lokal.

1028 Scopelosoma satellitia L.
Fl: September—Mai. V: häufig.

1030 Xylina socia Rott.
Fl: September—April.
V: verbreitet nicht häufig.

1031 Xylina furcifera Hufn.
Fl: August—März. V: weit verbreitet.

1034 Xylina ornithopus Rott.
Fl: August—April. V: häufig.

1037 Calocampa vetusta Hb.
Fl: Ende August—April. V: häufig.

1038 Calocampa exoleta L.
Fl: Mitte August—April.
V: lokal nicht häufig.

1039 Calocampa solidaginis Hb.
Fl: September—April. V: lokal westlich Neuburg selten.

1040 Xylomiges conspicillaris L.
Fl: Mitte April—Mai. V: selten.
Var: var. melaleuca View., vereinzelt.

1043 Lithocampa ramosa Esp.
Fl: Ende April—Mai. V: westlich Neuburg lokal selten.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1050 Calophasia lunula Hufn.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal an den Jurahängen westl. Neuburg.

1063 Cucullia verbasci L.
Fl: Mitte April—Mai. V: häufig.

1064 Cucullia scrophulariae Cap.
Fl: Ende April—Mai. V: lokal, westlich Neuburg/D. (Südhänge).

1066 Cucullia lychnitis Rbr.
Fl: Ende Mai—Juni. V: einzeln westlich Neuburg/D.

1082 Cucullia umbratica L.
Fl: Mai—Juli. V: häufig.

1084 Cucullia lucifuga Hb.
Fl: Mai und Mitte Juli—August. V: häufig.

1085 Cucullia lactucae Esp.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli. V: vereinzelt.

1087 Cucullia chamomillae Schiff.
Fl: Ende April—Juni. V: häufig.

1092 Cucullia gnaphalii Hb.
Fl: Mai—Juni. V: selten im Mischwald.

1099 Cucullia artemisiae Hufn.
Fl: Ende Mai—Juni und Juli—Aug. V: häufig.

1100 Cucullia absinthii L.
Fl: Mitte Juni—August. V: lokal häufig, besonders an warmen trokkenen Hängen.

1107 Anarta myrtilli L.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug. V: lokal Schuttermoor.

1120 Heliaca tenebrata Sc.
Fl: Ende April—Juni. V: warme sonnige Hänge, häufig.

1130 Heliothis ononis F.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig an den sonnigen Hängen.

1131 Heliothis dipsacea L.
Fl: im Mai einzeln, im August häufiger an trockenen Hängen.

1132 Heliothis scutosa Schiff.
Fl: Mitte Mai—Juni und August. V: lokal nicht häufig.

1144 Pyrrhia umbra Hufn.
Fl: Juni—Juli. V: vereinzelt.

1152 Acontia luctuosa Hb.
Fl: Mai—Juni und August. V: häufig auf trockenen Hängen.

1184 Erastria argentula Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig, besonders Waldwiesen.

1185 Erastria uncula Cl.
Fl: Mitte Mai—Juli. V: auf Sumpfwiesen häufig.

1187 Erastria venustula Hb.
Fl: Juni. V: lokal nicht häufig, westlich Neuburg/D.

1189 Erastria deceptoria Sc.
Fl: Ende Mai—Juni. V: häufig auf Sumpfwiesen.

1190 Erastria fasciana L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.

1192 Rivula sericealis Sc.
Fl: Ende Mai—Juni und Ende Juli—September. V: häufig.

1193 Prothymnia viridaria Cl.
Fl: Ende April—Mai und Ende Juli. V: auf trockenen Auwiesen verbreitet.

1197 Emmelia trabealis Sc.
Fl: Mai—Juni und August. V: häufig.

1202 Scoliopteryx libatrix L.
Fl: Ende Juni—Juli und Ende Aug.-März. V: häufig.

1206 Abrostola triplasia L.
Fl: von Mai—August. V: häufig.

1207 Abrostola asclepiadis Schiff.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal, häufig im Juragebiet.

1208 Abrostola tripartita Hufn.
Fl: Mitte Mai—August. V: häufig.

1209 Plusia c-aureum Kn.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal im feuchten Auwald.

1211 Plusia moneta F.
Fl: Juni—Juli. V: lokal nicht häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1214 Plusia variabilis Pill.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: in manchen Jahren häufiger, sonst vereinzelt.

1215 Plusia modesta Hb.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: lokal verbreitet.

1218 Plusia chrysitis L.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

1221 Plusia chryson Esp.
Fl: Juli. V: vereinzelt im Mischwald.

1222 Plusia bractea F.
Fl: Mitte Juni—August. V: vereinzelt in wärmeren Lagen.

1225 Plusia festucae L.
Fl: Mitte Juni—August. V: verbreitet nicht selten.

1227 Plusia gutta Esp.
Fl: Juli—August. V: vereinzelt, nicht selten.

1231 Plusia pulchrina Hw.
Fl: Juni—Juli. V: häufig.

1232 Plusia jota L.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: vereinzelt in schattigen Waldstellen.

1234 Plusia gamma L.
Fl: Ende Mai—Juni, dann Ende Juli—August und September—Oktober. V: überall häufig.

1248 Euclidia mi Cl.
Fl: Mai—Juni und Juli—August. V: häufig.

1249 Euclidia glyphica L.
Fl: Ende März—April, Mai u. Mitte Juli—August. V: häufig.

1271 Catephia alchymista Schiff.
Fl: Ende Mai—Juni. V: selten westlich Neuburg/D.

1272 Catocala fraxini L.
Fl: Ende August—Oktober. V: lokal häufig.

1273 Catocala electa Bkh.
Fl: Mitte Juli—September. V: häufig.

1277 Catocala nupta L.
Fl: August—September. V: häufig.

1280 Catocala sponsa L.
Fl: August. V: Im Eichenwald häufig.

1281 Catocala promissa Esp.
Fl: Ende Juli—August. V: häufig im Eichenwald.

1304 Toxocampa pastinum Tr.
Fl: Ende Juni—Juli. V: verbreitet nicht selten.

1305 Toxocampa viciae Hb.
Fl: Mitte Mai. V: selten.

1308 Laspeyria flexula Schiff.
Fl: Mitte Juni—August. V: lokal vereinzelt.

1309 Parascotia fuliginaria L.
Fl: Ende Juni—Juli. V: vereinzelt nicht häufig.

1314 Zanclognatha tarsipennalis Tr.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig.

1315 Zanclognatha tarsicrinalis Knoch.
Fl: Juni. V: lokal häufig.

1316 Zanclognatha grisealis Hb.
Fl: Ende Mai—Juli. V: vereinzelt.

1319 Zanclognatha emortualis Schiff.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: einzeln, aber regelrecht am Licht.

1320 Madopa salicalis Schiff.
Fl: Mai—Juni. V: vereinzelt nicht häufig.

1325 Herminia tentacularia L.
Fl: Juli. V: vereinzelt nicht häufig.

1326 Pechipogon barbalis Cl.
Fl: Mitte Mai—Juli. V: lokal selten.

1327 Bomolocha fontis Schalen.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal häufig. Var: var. terricularis Hb. einzeln.

1329 Hypena proboscidalis L.
Fl: Mai—Juni und Juli—August. V: häufig.

1331 Hypena obesalis Tr.
Fl: August—September. V: häufig.

1333 Hypena rostralis L.
Fl: Juli und September—Mai. V: weit verbreitet.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Thyatiridae (Cymatophoridae)

1341 Habrosyne derasa L.
Fl: Juni—Juli. V: weit verbreitet nicht selten.

1342 Thyatira batis L.
Fl: Juni und August. V: häufig.

1343 Tethea (Cymatophora) or Schiff.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug.
V: verbreitet nicht selten.

1344 Tethea ocularis L.
(octogesima Hbn.)
Fl: Mai—Juni. V: vereinzelt.

1346 Tethea duplaris L.
Fl: Mitte Juni—Juli.
V: häufig im Auwald.

1349 Polyploca flavicornis L.
Fl: März—April. V: lokal jedoch nicht selten im Birkenwald.

1350 Polyploca ridens F.
Fl: Mitte April—Mai.
V: vereinzelt im Auwald.

Brephidae

1351 Brephos parthenias L.
Fl: März—April. V: lokal häufig, an Waldrändern mit Birkenschlägen.

1352 Brephos nothum Hb.
Fl: Mitte März—April. V: lokal verbreitet.

Geometrinae

1355 Pseudoterpna pruinata Hufn.
Fl: Juli—August. V: lokal westlich Neuburg, in Waldschlägen mit Ginsterbeständen.

1358 Geometra papilionaria L.
Fl: Ende Juni—August. V: häufig in Birkenparzellen.

1359 Geometra vernaria Hb.
Fl: Juni—Juli. V: nicht häufig im Mischwald.

1361 Euchloris pustulata Hufn.
Fl: Ende Juni—Juli. V: selten im Auwald.

1362 Euchloris smaragdaria F.
Fl: Ende Juli. V: einzeln bei Riedensheim im Mischwald.

1367 Nemoria viridata L.
Fl: Mai—Juni. V: südlich Neuburg im Burgwald einzeln.

1372 Thalera fimbrialis Sc.
Fl: Ende Juli—August. V: lokal häufig.

1373 Thalera putata L.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal, im Mischwald.

1374 Thalera lactearia L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: lokal nicht selten.

1375 Hemithea strigata Müll.
Fl: Juni—Juli. V: weit verbreitet, nicht selten.

Acidaliinae

1382 Acidalia trilineata Sc.
Fl: Ende Juni—Juli. V: lokal westlich Neuburg vereinzelt.

1385 Acidalia similata Thnbg.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: häufig, besonders in den Auen.

1397 Acidalia muricata Hufn.
Fl: Mitte Mai—Juli. V: häufig.

1398 Acidalia dimidiata Hufn.
Fl: Juli—August. V: vereinzelt.

1414 Acidalia virgularia Hb.
Fl: Ende Mai—Juli. V: häufig.

1440 Acidalia bisetata Hufn.
Fl: Ende Juni—August. V: häufig.

1445 Acidalia rusticata F.
Fl: Mitte Juli. V: lokal selten westlich Neuburg, Trockenhänge.

1452 Acidalia humiliata Hufn.
Fl: Ende Juni. V: vereinzelt an den Südhängen.

1459 Acidalia aversata L.
Fl: Mitte Juni—August. V: häufig.
Var: var. spoliata Stgr.. V: häufig.

1460 Acidalia emarginata L.
Fl: Ende Juni—August. V: weit verbreitet.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1401 Acidalia immorata L.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig im Auwald.

1462 Acidalia rubiginata Hufn.
Fl: Mai und Ende Juli—August.
V: lokal im Auwald häufig.

1468 Acidalia marginepunctata Goeze.
Fl: Juni und August—September.
V: vereinzelt nicht selten.

1472 Acidalia incanata L.
Fl: Ende Mai—Juni und Ende Juli.
V: lokal vereinzelt an trockenen Hängen.

1475 Acidalia remutaria Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: weit verbreitet nicht selten, im lichten Gebüsch.

1479 Acidalia immutata L.
Fl: Mitte Juni—August. V: lokal auf feuchten Wiesen.

1481 Acidalia strigaria Hb.
Fl: Mitte Juli. V: selten in den Auen.

1488 Acidalia ornata Sc.
Fl: Mai—Juni und Mitte Juli—Aug.
V: häufig auf trockenen Wiesen.

1493 Ephyra pendularia Cl.
Fl: Mai—Juni und Mitte Juli—Aug.
V: häufig im Mischwald.

1494 Ephyra orbicularia Hb.
Fl: Mai. V: sehr selten.

1496 Ephyra annulata Schulze.
Fl: Ende April—Mai und Mitte Juli-August. V: lokal an den Südhängen westlich Neuburg.

1500 Ephyra punctaria L.
Fl: Mai und Ende Juli—August.
V: verbreitet im Eichenwald.

1502 Ephyra linearia Hb.
Fl: Mai—Juli.
V: im Buchenwald nicht selten.

1504 Rhodostrophia vibicaria Cl.
Fl: Juni—Juli.
V: lokal an Jurahängen.

1508 Timandra amata L.
Fl: Mitte Mai—Juni und Ende Juli-August. V: häufig.

Larentiinae

1516 Ortholita plumbaria F.
Fl: Juni—Juli. V: lokal häufig an warmen trockenen Hängen.

1518 Ortholita limitata Sc.
Fl: Juli—August. V: lokal westlich Neuburg auf den Hängen.

1526 Ortholita bipunctaria Schiff.
Fl: Mitte Juli—August. V: häufig an den Jurasüdhängen.

1527 Mesotype virgata Rott.
Fl: Mitte April und Ende Juni-Juli.
V: nicht selten, jedoch lokal.

1528 Minoa murinata Sc.
Fl: Ende April—Mai und Juli—Aug.
V: häufig im Auwald.

1529 Odezia atrata L.
Fl: Ende Mai—Juni. V: häufig in den Auen.

1538 Anaitis praeformata Hb.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: nicht selten.

1539 Anaitis plagiata L.
Fl: Mitte Mai—Juni und August—September. V: vereinzelt.

1542 Chesias spartiata Füssl.
Fl: Ende September—Oktober.
V: lokal häufig in Ginster.

1547 Lobophora polycommata Hb.
Fl: Mitte März—April.
V: verbreitet, nicht selten.

1549 Lobophora carpinata Bkh.
Fl: Ende März—April.
V: vereinzelt.

1550 Lobophora halterata Hufn.
Fl: Ende April—Mai. V: lokal vereinzelt.

1551 Lobophora sexalata Hb.
Fl: Mitte Mai—Juni und Mitte Juli-August. V: lokal häufig.

1555 Cheimatobia Stph.
(Operopthera Hb.) boreata Hb.
Fl: Oktober—November. V: lokal an Altbuchen westlich Neuburg.

1556 Cheimatobia Stph.
(Operopthera Hb.) brumata L.
Fl: Oktober—November. V: häufig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

1558 Triphosa dubitata L.
Fl: Ende Juli, überwintert bis April.
V: häufig.

1559 Eucosmia certata Hb.
Fl: April—Juni. V: häufig. (Wird durch die Vernichtung der Futterpflanze Berberis vulgaris natürlich selten werden.)

1561 Eucosmia undulata L.
Fl: Juni—Juli. V: vereinzelt lokal, jedoch nicht selten.

1562 Scotosia vetulata Schiff.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: nicht selten.

1563 Scotosia rhamnata Schiff.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: vereinzelt nicht häufig.

1564 Lygris reticulata F.
Fl: Mitte Juli—August.
V: Auwald selten.

1565 Lygris prunata L.
Fl: Juli—August.
V: lokal vereinzelt.

1566 Lygris testata L.
Fl: August—September.
V: lokal im Auwald häufig.

1567 Lygris populata L.
Fl: Mitte Juni—Juli.
V: lokal häufig.

1570 Larentia dotata L.
Fl: Ende Juni—August.
V: lokal im Auwald häufig.

1571 Larentia fulvata Forster.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: vereinzelt westlich Neuburg/D.

1572 Larentia ocellata L.
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—Aug.
V: häufig.

1573 Larentia bicolorata Hufn.
Fl: Ende Juni—Juli. V: weit verbreitet, besonders im Auwald.

1574 Larentis variata Schiff.
Fl: Mitte Mai—Juni und Mitte August—September. V: häufig.

1576 Larentia juniperata L.
Fl: Mitte Oktober. V: lokal an Wacholderbüschen häufig.

1578 Larentia siterata Hufn.
Fl: Ende August, überwintert bis April. V: verbreitet nicht selten.

1580 Larentia truncata Hufn.
Fl: Je nach Lage, von Juni—Sept.
V: weit verbreitet, nicht selten.

1581 Larentia immanata Hw.
Fl: Mitte Juli—August. V: lokal vereinzelt westlich Neuburg/D.

1582 Larentia firmata Hb.
Fl: Ende August—September.

1582 a Larentia obeliscata Hb.
Fl: Ende Mai—Juni. V: lokal häufig in etwa 30jährigen Kiefernbeständen.

1586 Larentia aptata Hb.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: im Jura vereinzelt westlich Neuburg/D.

1587 Larentia olivata Bkh.
Fl: Ende Juli—August. V: vereinzelt westlich Neuburg/D.

(Fortsetzung folgt)

Kurze Mitteilungen

1. Storch, Eulen und Taucher wieder jagdbar

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilt unter dem 30. 5. 1962 mit, daß die Oberste Jagdbehörde durch Rechtsverordnung gemäß Artikel 2 des Bayerischen Jagdgesetzes im Einverständnis mit dem Staatsministerium des Inneren eine Reihe von Vogelarten für jagdbar erklären wird, sobald das inzwischen vom Landtag beschlossene Änderungsgesetz zu diesem Gesetz im Senat behandelt worden ist. Bei den oben genannten Vogelarten handelt es sich um den Weißen Storch, um alle Eulenarten, den Schwarzhals-, den Rothals- und den Zwergtaucher.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: 66

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 61-66