©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Baur-Löweneckschule in Oberhausen ein Paar. Fräulein O. Heckl sah im Südteil von Neusäß in großen Obstgärten ein Paar, das sicher dort genistet hat, und konnte auch in anderen Ortsteilen die Art rufen hören. Herr Dr. Oblinger wies zwei weitere Paare in Westheim—Lohwald nach.

Herr V. Sandler beobachtete ein Paar vom Herbst 1959 ab am Westrand von Leipheim. Herr A. Lacher teilt mit, daß Lauingen seit etwa 6 Jahren von Türkentauben bewohnt wird. Heute finden sich hier im Stadtgebiet 6—8 Paare. Frau Furchtner entdeckte ein Paar in Lindau im Park der Villa Holdereggen. Herr A. Schmid sah in der Feldflur von Altisheim eine Taube am 28. 4. 60 und ein Paar am 26. 5. 60. In Ulm, etwas jenseits der bayerischen Grenze, hat sich der Bestand an Türkentauben beträchtlich vermehrt. Hier hielt sich am 29. 11. 60 allein am Hühnerfutterplatz des Grundstücks Zinglerstraße 76 ein Schwarm von etwa 40 Türkentauben auf.

Ich wäre allen, die Türkentauben an anderen Stellen des Augsburger Stadtgebiets und im Regierungsbezirk Schwaben feststellen, zu Dank verpflichtet, wenn sie mir ihre Beobachtungen übermitteln würden.

Die Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung

Ein Nachtrag zu dem Verzeichnis von Otto Käser

Von Franz Martin

Seit dem Erscheinen des Verzeichnisses der Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung von Käser im 6. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg von 1954 konnte von den Mitgliedern der entomologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, hauptsächlich durch die Herren Rudolf Müller, Käser, Sauter und Wiehler beim Lichtfang, eine Anzahl weiterer Arten in dem Sammelgebiet mit etwa 30 km Radius um Augsburg festgestellt werden.

Bei der Bestimmung so mancher Art wurden wir wieder von den Herren der Zoologischen Staatssammlung in München, insbesondere von Herrn Wolfsberger, in liebenswürdiger Weise unterstützt. Ihnen sei hiefür bestens gedankt.

Für eine Anzahl der im Verzeichnis von Käser bereits aufgeführten Arten wurden inzwischen neue Fundplätze, sowie die seinerzeit nicht angegebene Futterpflanze der Raupe ausfindig gemacht. Diese Ergänzung des Verzeichnisses von 1954 muß jedoch einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.

Dem Nachtrag liegt, wie auch dem Verzeichnis von 1954, der Katalog von Staudinger und Rebel zu Grunde.

Für die Hauptsammelplätze bzw. Fundorte innerhalb des obengenannten Sammelgebietes werden nachstehende Abkürzungen gewählt:

Augsburg innerhalb des bebauten Stadtgebietes A St;

Anhauser Tal	AT;	Horgau	Ho;	Streitheimer Forst	StF;
Friedberg	FDB;	Kissinger Heide	KH;	Thierhaupten	Th;
Haunstetter Wald	HW;	Siebenbrunn	Sb;	Welden	Wn;
Haspelmoor	HM;	Siebentischwald	S;	Wellenburg	W;

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Die weiterhin angewandten Abkürzungen bedeuten:

V	Vorkommen (Fundort)	Ab	Abart
G	Generation	E	Ei
Fl	Flugzeit	R	Raupe
Fu	Futterpflanze der Raupe	P	Puppe
Üb	Überwinterungsstadium	F	Falter

Soweit in dem nachfolgenden Verzeichnis der für Augsburg und Umgebung seit 1954 weiterhin festgestellten Arten keine Angaben enthalten sind, kann wegen bisher zu geringer Beobachtung noch keine gültige Aussage gemacht werden.

Drepanidae

Drepana Schrk.
cultraria F. V: StF; G: 2; Fl: V. u. VIII.; Fu: Buche; Üb: P;

Notodontidae

Drymonia Hb.
trimaculata Esp. V: FDB am Licht; Fl: V./VI.;

Notodonta O.
phoebe Sieb. V: FDB am Licht; Fl: V./VII.;
tritophus Esp. V: FDB am Licht; Fl: VI.

Lophopteryx Stph.
cuculla Esp. V: FDB am Licht; Fl: IV.—VII.;

Noctuidae

Agrotis O.
orbona Hufn. V: FDB am Licht; Fl: VII.
comes Hb. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;
rubi View. V: A St; Fl: ? u. IX.;
multangula Hb. V: FDB am Licht; Fl: V/VI.;
putris L. V: FDB, HM; Fl: ? u. VII.;
praecox L. V: am Licht; Fl: VII.;

Pachnobia Gn.
rubricosa F. V: FDB am Licht; Fl: IV.;
leucographa Hb. V: FDB am Licht; Fl: ? - VI.;

Mamestra Hb.
albicolon Hb. V: FDB am Licht; Fl: VI.;
glauca Hb. V: HM selten; G: 1; Fl: V./VI; Fu: Vacc. myrtillus; Üb: P.;

Dianthoecia B.
filigrama Esp.
var. xanthocyanea Hb. V: FDB am Licht; Fl: V.—VII.;

Miana Stph.
ophiogramma Esp. V: FDB am Licht; Fl: VII.;

Hadena Schrk.
adusta Esp. V: FDB am Licht; Fl: ? - VII.;
gemmea Tr. V: Lützelburg am Licht; Fl: VIII.;
sublustris Esp. V: HM nicht häufig; G: 1; Fl: V.—VII.; Fu: Gräser
scolopacina Esp. V: FDB am Licht: Fl: V - ?;
basilinea F. V: HM, Sb nicht häufig; G: 1; Fl: VI.-VII.; Fu: Gräser; Üb: R.;
gemina Hb. V: Überall in d. Umgeb.; G: 1; Fl: V.-VI.; Fu: Gräser; Üb: R.;

Brachioycha Hb.
sphinx Hufn. V: HM selten; G: 1; Fl: X.;

Helotropha Ld.
leucostigma Hb. V: Sb; Fl: VIII.;

Hydroecia Gn.
micacea Esp. V: FDB am Licht; Fl: ? - IX.;
petasitis Dbld. V: FDB; Fl: IX.;

Gortyna Hb.
ochracea Hb. V: FDB am Licht; Fl: VIII./IX.;

Leucania Hb.
straminea Tr. V: Sb am Licht; Fl: VIII.;
vitellina Hb. V: Sb am Licht; Fl: VIII.;

Caradrina Hb.
ambigua F. V: HM, A St; G: 2; Fl: VI! u. VIII.; Fu: Niedere Pflanzen; Üb: R.;

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download www.zobodat.at

Amphipyra O.
perflua F. V: FDB an Köder; Fl: VII.-VIII.;

Toeniocampa Gn.
pulverulenta Esp. V: FDB, HM nicht häufig; G: 1; Fl: III./IV.; Fu: Traubenkirsche;
opima Hb. V: FDB am Licht; Fl: III.;

Plastensis B.
subtusa F. V: FDB; Fl: VI.-VIII.; Fu: Pappel;

Orthosia O.
nitida F. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;

Calocampa Stph.
solidaginis Hb. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;

Xylomyges Gn.
conspicillaris L. V: FDB am Licht; Fl: III.;

Heliothis O.
peltigera Schiff. V: FDB am Licht; Fl: V.;

Abrostola O.
asclepiadis Schiff. V: FDB, Sb am Licht; Fl: VII.-VIII.;

Catocala Schr.
promissa Esp. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;

Taxocampa Gn.
viciae Hb. V: FDB am Licht; Fl: V.;

Hypena Schr.
obesalis Tr. V: FDB am Licht; Fl: V.;

Geometridae

Acidalia Tr.
herbariata F. V: A St; Fl: VI.;
humiliata Hufn. V: Th; Fl: VI.;

Ephyra Dup.
pupillaria Hb. V: FDB am Licht; Fl: IX.;

Lobophora Curt.
sexalisata Hb. (sexalata Retz.); V: FDB am Licht; Fl: V.-VII.;

Lygris Hb.
assosiata Bkh. V: FDB am Licht; Fl: VI.;

Larentia Tr.
firmata Hb. V: FDB am Licht, W; Fl: VIII.-IX.;
didymata L. V: FDB am Licht; Fl: VII.;
pomoeriaria Ev. V: FDB, Oberschönefeld; Fl: VII.;
designata Rott. V: FDB am Licht; Fl: V.;
fluviata Hb. V: FDB am Licht; Fl: X.;
vittata Bkh. V: FDB am Licht; Fl: VII.;
obliterata Hufn. V: S; Fl: VII.;
capitata HS. V: FDB, Th.; Fl: V.-VII.;
rubidata F. V: W; Fl: VII.;

Asthena Hb.
anseraria HS. V: Sb; Fl: VII.;

Tephroclystia Hb.
indigata Hb. V: FDB am Licht; Fl: V.;
abietaria Goeze. V: FDB am Licht; Fl: VII.;
togata Hb. (abjectaria Goeze); V: Westl. Wälder; G: 1; Fl: V.-VI.;
venosota F. V: FDB am Licht; Fl: V.-VII.;
assimilata Gn. V: FDB am Licht, Th; Fl: VI.-VII.;
albipunctata Hw. V: FDB am Licht; Fl: V.;
selinata HS. V: FDB am Licht; Fl: V.;
succenturiata L. V: FDB und KH am Licht; Fl: VII.-VIII.;
plubeolata Hw. V: FDB am Licht; Fl: VII.;
immundata Z. V: FDB am Licht; Fl: V.-VI.;

Arctiidae

Deiopeta Stph.
pulchella L. ab. semisignata Spul. V: FDB am Licht; Fl: V.;

Sesiidae

Sesia F.
vespiformis L. V: W; Fl: VII.; Fu: Eichenstöcken;
formicaeformis Esp. V: Th; Fl: VII.; Fu: an Weidenstämmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: 64

Autor(en)/Author(s): Martin Franz

Artikel/Article: Die Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung. Ein Nachtrag zu dem Verzeichnis von Otto Käser 46-48