© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Verzeichnis

der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918

gesammelten Käfer.

Rieden, Bezirk Füssen, von dieser Stadt in nördlicher Richtung 5,2 km entfernt, westlich der Staatsstraße in einem vom Riedener Bach durchflossenen Talkessel 814 m ü. d. M. Gegen Osten der Sendenberg, gegen Westen der Faulenberg ca 950 m, nach Norden der 1000 m hohe Zwieselberg. Östl. der Weiler Osterreinen hart am Abhang ins Lechtal. Der Staatsstraße entlang die zerstreuten Häuser von Ehrwang. Südwestl. Hopfen am Hopfensee; am Fuße des Faulenberges der Faulensee und die Höllmühle. Auf dem Ehrwang die Mündung der Weissenseer Ach in den Lech.

Fellheim, Bahnstation der Linie Memmingen—Ulm, vom ersterem 11 km, von letzterem 42 km entfernt, 568 m ü. d. M. in dem hier sehr breiten Illertal, an der Memminger Ach, welche hier durch einen „Gries" genannten und aus Weiden, Erlen, Eschen und Birken bestehenden Auwald fließt. Der Ort ist von der Iller $^1/_2$ km entfernt und liegt also hart an der Württemberger Grenze.

Rd. bedeutet Rieden.
Fh. „ Fellheim.

I. Adephaga.

I. Familie **Cicindelidae.**
Sandläufer.

1. Gatt. Cicindela Linné.
Sandläufer.

silvicola Latr. Rd. und Fh.
hybrida a. virescens Letzner. Fh. selten.
hybrida v. riparia Latr. Fh.
hybrida a. transversalis Dej. Fh. 1 Expl. a. d. Iller gef.
campestris L. Rd. u. Fh. gem.
campestris a. coerulescens Schilsky. Fh. sehr selten.

II. Familie **Carabidae.**
Laufkäfer.

2. Gattung. Cychrus. Fabr.
Schaufelläufer.

rostratus L. Rd. und Fh.
attenuatus F. Tegelberg bei Füssen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

3. Gatt. Carabus. Latreille. Echte od. Großlaufkäfer.
(Procrustes Bon.) coriaceus L. Rd. und Fh.
violaceus L. a. subcrenatus Geh. Fh.
violaceus v. exasperatus Dft. Fh.
irregularis F. Tegelberg bei Füssen.
intricatus L. Altenstadt a. Ill.
auronitens F. Rd.
auronitens a. perviridis Reitt. Rd. 2 Stück.
convexus F. Rd. und Fh.
nitens L. Rd. Altenstadt a. I.
auratus L. Rd. selten. Fh. nicht selten.
auratus a. picipes Letz. Fh. 2 ♂
granulatus L. Rd. und Fh.
granulatus a. rufofemoratus Letz. Fh.
cancellatus Illg. Rd. u. Fh.
cancellatus a. femoralis Geh. Fh.
Ullrichi Germ. Rd. u. Fh.
arvensis Hbst. Rd. Sendenberg einigemale im Frühj. unter Steinen.
arvensis a. ruficrus Geh. 1 ♂ 1894 Sendenberg.
nemoralis Müll. Winterrieden bei Babenhausen u. Höhen bei Altenstadt a. I.
silvestris Pz. Tegelbg. b. Fss.
glabratus Payk. Rd. u. Fh.

4. Gatt. Leistus. Frölich. Bartlaufkäfer.
ferrugineus L. Fh.

5. Gatt. Nebria. Latreille. Dammläufer.
picicornis. Rd. a. Lech hfg. Fh. im Geniste a. d. Iller. nach Hochwasser.
brevicollis F. Rd. und Fh.

6. Gattung. Notiophilus. Duméril. Eillaufkäfer.
palustris Duft. Rd.
biguttatus F. Winterrieden.

7. Gatt. Omophron. Latr. Grundlaufkäfer.
limbatum F. Fh. a. d. Achselt.

8. Gatt. Elaphrus. Fabricius. Raschläufer.
uliginosus F. Rd. Achmündung sehr selten.
cupreus Duft. Rd. feuchte Stellen a. Faulenberg. Fh. an der Ach.
riparius L. Fh.
Ullrichi W. Redtb. Rd. und Fh. selten.
aureus Müll. Fh. selten.

9. Gattung. Lorocera. Latreille. Riemenhorn auch Rennläufer.
pilicornis F. Rd. nicht hfg. Fh. an der Ach häufig.

10. Gattung. Clivina. Latr. Spreizlaufkäfer.
fossor L. Rd.
collaris Hbst. Fh. im Illersand häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

11. Gatt. Dyschirius. Bonelli. Übelhand, auch Fanglaufkäfer.
globosus Hbst. Rd. u. Fh.
12. Gattung. Broscus. Panz. Kopflaufkäfer.
cephalotes L. Rd. am Lech nicht häufig.
13. Gatt. Asaphidion. Gozis. Schnellaufkäfer.
caraboides Schr. Rd. u. Fh. Lech- u. Illersand gem.
pallipes Duft. Rd. und Fh. Lech- u. Illersand gem.
flavipes L. Rd. u. Fh. hfg.
14. Gatt. Bembidion. Latr. Ahllaufkäfer.
foraminosum St. Rd. auf Lechsand nicht selt. Der Käfer ist ein guter Flieger u. ich konnte die Tierchen bei Sonnenschein nur mit dem Netz erbeuten. Bei dieser Gelegenheit fing ich auch einige Schnarrheuschrecken mit purpurrot. Hinterflügeln. (Bryodema tuberculata F.), die in Schwaben nur noch bei Hinterstein i. Allgäu vorkommt. Außerdem (nach Redtenbacher) in Bayern noch im Riß- und Isartal.
pygmaeum F. Rd. auf Lechsand häufig.
lampros Hbst. Rd. auf Lechsand häufig.
punctulatum Drap. Fh. auf Illersand häufig.
dentellum Thbg. Fh. auf Illersand häufig.
Starcki Schm. Fh. an der Ach selten.
adustum. Fh. zieml. häufig.
prasinum Duft. Fh.
fasciolatum Duft. Fh.
tricolor F. Fh. auf Illersand gemein.
tibiale Duft. Fh. selten.
testaceum Duft. Rd. u. Fh.
Andreae v. femoratum Stm. Fh. häufig.
ustulatum L. Rd. und Fh.
rupestre L. Fh.
lunatum Duft. Fh. selten.
modestum F. Rd. am Lech ziemlich häufig.
décorum Pz. Rd. häufig, Fh. gemein.
monticola St. Rd. und Fh.
ruficorne St. Tegelberg bei Füssen 2 St. Fh. selten.
decoratum Duft. Fh. selten.
4 guttatum F. Rd. a. L. hfg.
4 maculatum L. Rd.
tenellum Erichs. Rd.
Schüppelli Dej. Fh. i. Frühj. a. d. Ach unter Laub hfg.
articulatum Gyllh. Fh. nicht selten.
obtusum Serv. Fh. einige Stücke im Herbst unter Baumrinde, wo der Käfer wohl zu überwint. suchte.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

biguttatum F. Rd. und Fh.

15. Gattung. Ocys. Stephens.
quinquestriatus Gyllh. Rd. und Fh.

16. Gatt. Tachys. Stephens. Schnellaufkäfer.
bistriatus Duft. Fh. häufig.
4 signatus Duft. Fh. gemein.

17. Gattung. Tachyta. Kirby.
nana. Rd.

18. Gattung. Trechus. Clairville. Spitzlaufkäfer.
discus F. Fh. i. Gen. d. Achs.
micros Herbst. Rd. am Hopfensee selten.
quadristriatus Schr. Rd. u. Fh.
rubens F. Fh. Bei Altenstadt a. Iller im Geniste des Fabrikkanals 1 Stck.

19. Gatt. Patrobus. Steph. Tropflaufkäfer.
excavatus Payk. Rd. u. Fh.

20. Gatt. Panagaeus. Latr. Kreuzlaufkäfer.
crux major L. unter Steinen selten. Rd. und Fh.
crux a. Schaumi Ganglb. Fh. 4 Exemplare.

21. Gattung. Chlaenius. Bonelli. Sammtläufer.
vestitus Payk. Bei Hopfen sehr selten.
nitidulus Schr. Rd. an den Abhängen b. Osterreinen. Fh. an der Ach selten.
nitidulus v. tibialis Dej. w. d. vor.
nigricornis F. Bei Osterreinen selten.

22. Gattung. Oodes. Bonelli. Zweckenlaufkäfer.
helopioides F. Fh. an der Ach selten.

23. Gatt. Badister. Dejean. Wanderlaufkäfer.
bipustulatus. Rd. unt. Moos und Steinen nicht selten.
sodalis Duft. Rd. und Fh. selten.

24. Gatt. Ophonus. Steph.
puncticollis Payk. Winterrieden, sandige Äcker.
brevicollis Serv. Fh. Illergries selten.
pubescens Müll. Rd. u. Fh. in den Blüten von Cirsium oleraceum nicht selten.

25. Gatt. Harpalus. Latr. Schnellaufkäfer.
aeneus F. Rd.
aeneus v. confusus Dej. Fh.
latus L. Rd.
luteicornis Duft. Fh. selten.
honestus Duft. Rd. selten.
politus Dej. Winterrieden selten.
tardus Panz. Winterrieden selten.

26. Gatt. Trichotichnus. Moravitz.
laevicollis Duft. Rd. selten.

27. Gatt. Acupalpus. Dej. Spitzpalpenlaufkäfer.
meridianus L. Fh.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

28. Gattung. Bradycellus. Erichson. Plumpläufer.
collaris Payk. Fh.
29. Gatt. Diachromus. Erichson. Farblaufkäfer.
germanus L. Fh. sehr selten.
30. Gatt. Anisodactylus. Dej. Ungleichtarsiger Laufkäfer.
binotatus F. Rd. und Fh.
binotatus v. spurcaticornis Dej. Fh.
31. Gatt. Zabrus. Clairville. Rückenlaufkäfer.
tenebrioides Goeze. Fh.
32. Gattung. Amara. Bonelli. Knallaufkäfer.
plebeja Gyllh. Fh.
similata Gyllh. Fh.
ovata F. Rd. selten.
montivaga Stm. Fh. sehr selten.
communis Pz. Rd. häufig.
convexior St. Rd.
aenea Deg. Rd.
spreta Dej. Rd.
eurynota Pz. Rd. sehr selt.
familiaris Duft. Rd.
bifrons Gyllh. Fh. selten.
apricaria Payk. Rd. selten.
aulica Pz. Rd.
equestris Duft. Fh. selten.
33. Gatt. Stomis. Clairville. Freßlaufkäfer.
pumicatus. Fh.
34. Gattung. Abax. Bonelli. Kiellaufkäfer.
ater L. Rd., Fh. nicht selt.
parallelus Duft. Fh. selten.
ovalis Duft. Rd. nicht selt.
carinatus Duft. Rd.
35. Gattung. Molops. Bonelli. Striemenlaufkäfer.
piceus Panz. Rd. und Fh. ziemlich häufig.
36. Gattung. Pterostichus. Bon. Schlanklaufkäfer.
macer Marsh. Fh. sehr selt.
lepidus Lesk. Rd. nicht hfg.
cupreus L. Rd. und Fh.
coerulescens L. Fh.
puncticollis Dej. Rd. 1 ♀
vernalis Pz. Rd. häufig.
oblongopunctatus F. Rd. nicht selten.
niger Schall. Fh.
vulgaris L. Fh. gemein.
nigrita F. Fh.
anthracinus. Rd. nicht hfg.
interstinctus Illg. Rd. gem.
strenuus Pz. Rd. gemein.
melas Creutz. Rd. und Fh.
metallicus F. Rd. und Fh.
multipunctatus Dej. Rd. n. häufig.
37. Gattung. Laemostenus. Bon. Kellerlaufkäfer.
terricola Hbst. Fh. einige Stücke im Keller des hies. Schulhauses.
38. Gattung. Calathus. Bon. Kreisellaufkäfer.
fuscipes Goeze. Rd. u. Fh. gemein.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

melanocephalus L. Rd. hfg.

39. Gattung. Synuchus. Gyllenhal. Felslaufkäfer.
nivalis Pz. Fh.

40. Gattung. Agonum. Bon. Rundhals.
ruficorne Gz. am Hopfensee. Fh. an der Ach häufig.
assimile Payk. Rd. und Fh. häufig.
6 punctatum L. Rd. u. Fh.
6 punctatum a. montanum. Rd. selten.
Mülleri Hbst. überall gem.
viduum Pz. Am Hopfensee Fh. an der Ach häufig.
micans Nicol. Fh. a. d. Ach häufig.
dorsale Pont. Fh. gemein.

41. Gattung. Lebia. Latreille. Prunklaufkäfer.
crux ninor L. Rd. sehr selt.

42. Gatt. Lionychus. Wissmann. Punktlaufkäfer.
quadrillum Duft. Rd. u. Fh.
quadrillum a. bipunctatus Heer. Fh. nicht häufig.

43. Gatt. Metabletus. Schmidt. Mooslaufkäfer.
pallipes Ziegl. Rd.

44. Gattung. Dromius. Bon. Rindenlaufkäfer.
agilis F. Fh. häufig.
fenestratus F. Rd. sehr selt.
4 maculatus L. Rd. und Fh. häufig.
4 nodatus Pz. Fh. zieml. hfg.

III. Familie. **Haliplidae.** Seidl. Schwimmer.

45. Gattung. Haliplus. Latr. Bachschwimmer.
ruficollis. Fh. u. Winterried.

IV. Familie. **Dytiscidae.** Aubé. Schwimmkäfer. -

46. Gatt. Hygrotus. Steph.
decoratus Gyllh. Rd. selten.

47. Gatt. Bidessus. Scharp.
unistriatus Illg. Fh.
geminus F. Fh. häufig.

48. Gatt. Hydroporus. Clairville. Zwergschwimmk.
assimilis Payk. Fh. häufig.
pictus F. Im Hopfensee hfg.
granularis L. Fh. häufig.
palustris L. Fh. und Umgebung gemein.
marginatus Duft. Fh.
discretus Fairm. Rd., bei Hopfen.

49. Gattung. Noterus. Clair. Weiherschwimmkäfer.
clavicornis Deg. Fh.

50. Gatt. Laccophilus. Leach. Lachenfreund.
obscurus Panzer. Fh. und Winterrieden.

51. Gattung. Agabus. Leach. Klauenschwimmkäfer.
melanarius Aubé. Fh. selten.
guttatus Payk. Rd. selten.
bipustulatus L. Rd. und Fh. häufig.
paludosus F. Rd. u. Fh. hfg.
uliginosus L. Fh.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Sturmi Gyllh. Rd. in den Tümpeln b. d. Höllmühle.
undulatus Schrk. Fh. hfg.
52. Gatt. Platambus. Thomson.
maculatus L. Rd. a. Lechufer.
53. Gatt. Ilybius. Erichson. Schlammschwimmkäfer.
fuliginosus F. Rd. u. Fh.
ater Deg. Rd. a. d. W. Ach.
obscurus Marsh. Rd. selten.
guttiger Gyllh. Fh. selten.
54. Gatt. Rhantus. Lacordaire. Besprengter Schk.
punctatus Geoffr. Fh.
55. Gatt. Acilius. L. Scheibenschwimmkäfer.
sulcatus L. Winterrieden.
56. Gatt. Dytiscus. L. Großtaucher.
marginalis L. Rd. u. Fh.

V. Familie. **Gyrinidae.** Aubé. Taumel- oder Drehkäfer.
57. Gatt. Gyrinus. Geoffroy. wie oben.
nadator L. Fh.

II. Polyphaga.

A. Staphylinoidea.

Linienkäfer, auch Kurzdecker oder Ohrwurmkäfer.

VI. Familie. **Staphilinidae.** wie oben.
58. Gattung. Micropeplus. Latr. Kurzrock.
porcatus F. Rd. und Fh.
59. Gatt. Megarthrus. Steph. Großgliedlinienkäfer.
denticollis Beck. Fh. selten.
60. Gatt. Proteinus. Latr. Vorstrecklinienkäfer.
brachypterus F. Rd. n. selt.
61. Gatt. Anthobium. Steph. Blütenlinienkäfer.
sorbi Gyllh. Rd. selten.
torquatum Marsh. Rd. selt.
limbatum Fr. Rd.
minutum F. Rd.
62. Gattung. Phyllodrepa. Thomson.
floralis Payk. Rd. selten.
63. Gatt. Omalium. Gravenhorst. Flachlinienkäfer.
rivulare Payk. Rd. u. Fh.
caesum Grav. Fh.
64. Gatt. Xylodromus. Heer.
concinnus Marsh. Fh. hfg.
65. Gattung. Lathrimaeum. Erichson. Feldlinienkäfer.
atrocephalum Gyllh. Fh.
66. Gatt. Arpedium. Erichs. Mauslinienkäfer.
quadrum Grav. Fh. häufig. In den Wintermonaten öft. im Zimmer gefang.
67. Gattung. Lesteva. Latr. Lochlinienkäfer.
longelytrata Goeze. Fh. n. häufig.
68. Gattung. Geodromicus. Redtenbach. Erdlinienk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

plagiatus F. Fh. häufig.

69. Gattung. Anthophagus. Gravenhorst. Blumenfr.
bicornis a. nivalis Rd. 1895 1 ♂.
caraboides L. Rd. häufig.
praeustus Müller. Fh. selt.

70. Gatt. Deleaster. Fabr. Bockfallenlinienk.
dichrous Grav. Hopfensee. Fh. hfg; an lauen Sommerabend. im Garten am Lampenschirm öft. gef.

71. Gatt. Coprophilus. Latr. Kotliebhaber.
striatulus F. Rd. nicht hfg.

72. Gatt. Trogophloeus. Mannerheim. Graslinienk.
dilatatus Er. Rd.
corticinus Grav. Fh.
rivularis Motsch. Fh. selt.

73. Gatt. Haploderus. Steph. Geradhalslinienkäfer.
caelatus Grav. Fh.

74. Gatt. Oxytellus. Gravenhorst. Scharflinienk.
rugosus F. Rd. u. Fh. hfg.
insecatus Grav. Fh.
sculptus Grav. Fh.
sculpturatus Grav. Fh. hfg.

75. Gattung. Platystethus. Mannh. Breitlinienkäfer.
avenarius Geoffr. Rd. hfg.

76. Gatt. Bledius. Mannh. Wurflinienkäfer.
opacus Block. Fh. sehr selt.
fracticornis Payk. Rd. selt.
dissimilis Er. Fh. selten.

77. Gattung. Oxyporus. F. Pilzlinienkäfer.
rufus L. Winterrieden in Pilzen häufig.

78. Gattung. Stenus. Latr. Schmallinienkäfer.
biguttatus L. Rd. hfg.
bipunctatus Erichs. Rd. hfg.
guttula Müll. am Hopfensee sehr selten.
bimaculatus Gyllh. Fh. u. Rd. gemein.
Juno Payk. Fh.
ater Mannh. Fh. selten.
clavicornis Scp. Rd. zieml. s.
providus Er. Fh.
buphthalmus Gr. Am Hopfensee.
nanus Illg. Rd. selten.
humilis Er. Rd.
brunipes Steph. Rd.
tarsalis Ljemgh. Rd. hfg.
similis Herbst. Rd. hfg.
cicindeloides Schall. Rd. nicht selten.
pubescens Steph. Rd. n. selt.
binotatus Ljungh. Am Hopfensee sehr selten.
pallitarsus Steph. Rd. hfg.
bifoveolatus Gyll. Rd. s. selt.

79. Gattung. Astenus. Steph. Rainlinienkäfer.
filiformis Latr. Rd. Sendenberg i. Frühj. b. Ameisen.
augustatus Payk. Im Frühjahr bei Ameisen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

80. Gatt. Paederus. F. Langlinienkäfer.
sanguinicollis Steph. Fh. hfg.
gemellus Kr. Rd. hfg.
litoralis Grav. Rd. u. Fh. hfg.
brevipennis Lacord. Fh. selt.
81. Gatt. Stilicus. Serville. Dünnhalslinienkäfer.
augustatus Geoffr. Fh.
rufipes Germ. Rd.
orbiculatus Payk. Fh.
82. Gatt. Scopaeus. Kraatz.
sulcicollis Steph. Fh. s. selt.
83. Gatt. Medon. Stephens.
melanocephalus F. Fh. s. slt.
84. Gatt. Lathrobium. Gravenh. Heimlichlebender.
multipunctatum Grav. Rd.
elongatum L. Rd. sehr selt.
geminum Kr. Fh.
fulvipenne Grav. Rd.
longulum Grav. Rd.
85. Gatt. Cryptobium. Mannerheim. Krummlinienk.
fracticorne Payk. Rd.
86. Gattung. Xantholinus. Serville. Gelbhaar.
punctulatus Payk. Rd.
augustatus Steph. Rd.
glabratus Grav. Fh. selten.
tricolor F. Rd. häufig.
linearis Oliv. Rd. und Fh. nicht selten.
linearis v. longiventris Heer. Rd. selten.
87. Gatt. Nudobius Thomson.
lentus Grav. Boos bei Fh.
88. Gatt. Neobisnius. Ganglb.
prolixus. Fh.
89. Gatt. Philonthus. Steph. Mistlinienkäfer.
splendens F. Rd. hfg.
laminatus Creutz. Rd.
laevicollis Lac. Fh.
nitidus F. Zwieselb., Fh. slt.
aeneus Rossi. Fh.
carbonarius Gyllh. Rd.
temporalis Rey. Rd.
atratus Grav. Rd.
rotundicollis Mén. Rd.
sordidus Grav. Rd.
fimetarius Grav. Boos.
marginatus Stroem. Rd.
fuscipennis Mannh. Rd.
varius Gyllh. Fh.
immundus Gyllh. Fh.
sanguinolentus Grav. Rd.
ventralis Grav. Rd. u. Fh.
quisquiliarius Gyllh. Fh.
longicornis Steph. Rd.
cruentatus Gmel. Rd.
varians Payk. Rd.
micans Grav. Rd.
fulvipes F. Rd.
tenuis F. Winterrieden.
vernalis Grav. Rd. u. Fh.
splendidulus Grav. Fh.
nigritulus Grav. Fh.
rubripennis Kiesw. Fh.
90. Gatt. Staphylinus. L. Raublinienkäfer.
pubescens Degeer. Rd.
fossor Scop. Füssen (Kalvarienb.) Altenstadt a. Ill. selt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fulvipes Scop. Rd., Altenstadt a. Iller sehr selten.
caesarius Cederh. Rd. hfg., Fh. selten.
erythropterus L. Rd. sehr selten.
olens Müll. (Ocypus Kob.) Rd. häufig, Fh. selten.
ophthalmicus Scop. Winterrieden und Fh.
similis F. Rd. häufig.
fuscatus Grav. Rd. u. Fh.
brunnipes F. Altenstadt a. I.
picipennis F. Rd.
aenocephalus Degeer. Rd.
ater G. Fh. im Keller des hies. Schulhauses 1 Stck.
globulifer Geoffr. Winterr.

91. Gattung. Ontholestes. Ganglb. (Leistotrophus Kr.)
tessellatus Geoffr. (nebulosus F.) Rd. und Fh.
murinus L. Rd. und Fh.

92. Gatt. Emus. Curtis. Goldhaarlinienkäfer.
hirtus L. Bei Altenstadt a. I. 1 Stück.

93. Gatt. Creophilus. Mannerh. Fleischliebhaber.
maxillosus L. Rd. u. Fh. b. Aas oft häufig.

94. Gattung. Quedius. Steph. Mistfresser.
ochripennis Mén. Boos.
fulgidus F. Rd.
mesomelinus Marsh. Rd.
cinctus Payk. Rd. und Fh.
fuliginosus Grav. Rd.
boops Grav. Fh.

95. Gattung. Heterothops. Steph.
dissimilis Grav. Fh. selten.

96. Gattung. Mycetoporus. Mannh. Mooslinienkäfer.
brunnens Marsh. Rd. selten.
longulus Mannh. Fh.

97. Gatt. Bolitobius. Leach. Schwammlinienkäfer.
trinotatus Er. Rd. häufig.
thoracius F. (pygmaeus F.) Rd. häufig.
lunulatus L. Rd. häufig in Steinpilzen.

98. Gattung. Bryocharis. Lacordaire.
analis Payk. Rd. zieml. selt.

99. Gatt. Conosoma Kraatz. Kegelkieferlinienkäfer.
littoreum L. Rd. und Fh.

100. Gattung. Tachyporus. Gravenh. Fluchtlinienk.
chrysomelinus L. Rd. u. Fh.
hypnorum F. Rd. und Fh.
solutus Er. Fh.
abdominalis F. Rd. selten.
obtusus L. Rd. häufig.

101. Gatt. Tachinus. Grav. Flinklinienkäfer.
flavipes F. Rd. häufig.
rufipennis Grav. Altenstadt a. Iller selt. a. Fabrikkan.
rufipes Deg. Rd. häufig.
laticollis Grav. Rd. häufig.
collaris Grav. Rd. häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

102. Gatt. Oligota. Mannh. Kurzlinienkäfer.
flavicornis Lac. Fh. selten.
103. Gatt. Leptusa. Kraatz.
augusta Aubé. Fh.
104. Gattung. Bolitochara. Mannh. Pilzlinienkäfer.
lunulata Payk. Rd. selten.
105. Gatt. Autalia. Mannh. Zwerglinienkäfer.
rivularis Grav. Rd.
106. Gatt. Falagria. Mann. Nachtlinienkäfer.
thoracica Curt. Rd. selten.
nigra Grav. Fh. selten.
obscura Grav. Fh. häufig.
107. Gatt. Tachyusa. Erichs. Eillinienkäfer.
balteata Er. Rd.
108. Gatt. Gnypeta. Thomson.
carbonaria Mann. Fh.
109. Gattung. Atheta. Thom. (Homalota Man.) Glattlaufk.
sulcifrons Steph. Fh.
longicornis Grav. Fh.
110. Gatt. Astilbus. Steph.
canaliculatus F. Rd. hfg.
111. Gattung. Phloeopora. Er. Rindenlinienkäfer.
sestacea Mannh. Fh.
112. Gatt. Oxypoda. Mannh. Schmarotzlinienkäfer.
lividipennis Mannh. Rd.
opaca Grav. Rd. und Fh.
113. Gatt. Aleochara. Gravenhorst. Staublinienk.
curtula Goeze. Rd.
crassicornis Lac. Fh.
intricata Man. Fh.
lanuginosa Grav. Rd.
bilineata Gyllh. Rd.
bipustulata L. Rd.

VII. Familie. **Pselaphidae.** Sauley. Zwergkäfer.

114. Gattung. Brachygluta. Thoms.
fossulata Reichb. Fh.
115. Gatt. Pselaphus. Herbst. Ameisenzwergkäfer.
heisei Herbst. Fh.

VIII. Familie. **Clavigeridae.** Preysler. Keulenkäfer.

116. Gatt. Claviger. Preysler. Ameisenkeulenkäfer.
testaceus Preysler. Fh.

IX. Familie. **Scydmaenidae.** Reitter. Tastkäfer.

117. Gattung. Scydmaenus. Latr. Ameisentastkäfer.
tarsatus Müll. Fh.

X. Familie **Silphidae.** Reitter. Aaskäfer.

118. Gattung. Choleva. Latr. Lahmaaskäfer.
cisteloides Fröl. Rd. und Fh. häufig.
119. Gatt. Catops. Paykull. Moderaaskäfer.
fumatus Spence. Rd.
fuscus Panz. Rd. im Keller an Fässern.
alpinus Gyll. Rd.
morio F. Fh.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

120. Gattung. Ptomaphagus. Illiger.
subvillosus Goeze. (sericeus Panz.) Winterrieden.
121. Gattung. Necrophorus. Fabricius. Scharraask. oder Totengräber.
humator Goeze. Fh.
interruptus Steph. Fh.
„ v. centrimaculatus Rtt. Fh. 1 Stück.
investigator Zett. Boos.
vespilloides Hbst. Rd. u. Fh.
vespillo L. Rd.
122. Gatt. Necrodes. Leach. Leichenaaskäfer.
littoralis L. Fh.
123. Gatt. Thanatophilus. Samouelle.
dispar Herbst. Fh.
sinuatus F. Rd.
rugosus L. Rd.
124. Gatt. Oeceoptoma. Sam.
thoracicum L. Rd. u. Fh.
125. Gatt. Blitophaga. Reitt.
opaca L. Fh.
126. Gatt. Xylodrepa. Thoms.
4 punctata Schreber. Fh.
127. Gattung Silpha. L. Schabenaaskäfer.
carinata Hbst. Rd.
obscura L. Rd. und Fh.
tristis Illg. Rd. und Fh.
tyrolensis v. nigrita Creutz. Auf d. Schlicke b. Füssen.
128. Gatt. Ablattaria. Reitter.
laevigata F. Rd.
129. Gatt. Phosphuga. Leach.
atrata L. Rd. und Fh.

XI. Fam. **Liodidae.** Reitter. Feuchtkäfer. Schattenkäfer.

130. Gattung. Liodes. Latreille. Schattenfeuchtkäfer.
dubia Kug. Rd.
131. Gatt. Cyrtusa. Erichson. Krümmerin.
minuta Ahrens. Fh.
132. Gattung. Amphicyllis. Erichs. Umherwälzer.
globus v. ferrugineus St. Fh.
133. Gattung. Agathidium. Illiger. Rindenfeuchtkäfer.
nigripenne F. Illertissen.
seminulum L. Fh.
laevigatum Er. Fh.

XII. Familie. **Corylophidae.** Reitter. Schildkäfer.

134. Gattung. Corylophus. Leach. Zwergschildkäfer.
cassidoides Marsh. Fh.

XIII. Fam. **Trichopterygidae.** Flach. Haar- od. Federflügler. (Ptiliidae Reitter.)

135. Gatt. Ptiliolum. Flach. Flaumflügler.
Kunzei Heer. Rd. Ehrwanger Viehweide aus trock. Kuhfladen geklopft.
136. Gatt. Trichopteryx. Kirby. Mistfederflügler.
grandicollis Mannh. Ehrwanger Viehweide.
atomaria Deg. Fh., kommt g. i. d. Häus., a. Fenst. gef.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

intermedia Gillm. Rd. u. Fh.
fascicularis Herbst, Fh.
sericans Heer. Rd.

XIV. Familie. **Scaphidiidae.** Reitter. Nachen- od. Kahnk.

137. Gattung. Scaphosoma. Leach, Fadenkahnkäfer.
assimile Er. Fh.

XV. Familie. **Histeridae.** Schmidt. Stutzkäfer.

138. Gatt. Platysoma. Leach. Rindenstutzkäfer.
compressum Hrbst. Mindelheim unt. morsch. Eichenrinde.

139. Gattung. Cylistosoma. Lewis.
augustatum Hoffm. Rd.

140. Gattung. Hister. Linné. Glanzstutzkäfer.
unicolor L. Ehrwanger Viehweide in Kuhfladen hfg.
terricola Germar. Ehrwang. Viehweide i. Kuhflad. hfg.
merdarius Hoffm. Fh.
cadaverinus Hoffm. Rd.
funestus Er. Fh. nicht hfg.
bissexstriatus F. Rd.
purpurascens Hbst. Fh. selt.
carbonarius Hoffm. Fh.
v. 14 striatus Gyll. Rd.
bimaculatus L. Fh., b. Altenstadt a. Iller selten.

141. Gattung. Dendrophilus. Leach. Baumstutzkäfer.
punctatus Herbst. Fh.

142. Gattung. Gnathoncus. Erichson. Kieferbugst.
punctulatus Thoms. Rd. u. Fh. ziemlich selten.

143. Gattung. Saprinus. Er. Miststutzkäfer.
semistriatus Sevila. Viehweiden b. Hopfen. Fh. n. selten.

B. Palpicornia. Latr.

Kolben- oder Palpenhörner.

XVI. Familie **Hydrophilidae.** Kolbenwasserkäfer.

144. Gatt. Helephorus. F. Runzelwasserkäfer.
nubilis F. Fh. zieml. hfg.
aquaticus L. Rd. u. Fh.
granularis L. Fh.
viridicollis Steph. Rd.

145. Gatt. Hydraena. Kugelann. Zwergwasserk.
riparia Kugelann. Fh. hfg.

146. Gatt. Hydrobius. Leach. Schlammwasserk.
fuscipes L. Rd. und Fh.

147. Gattung. Anacaena. Thomson.
limbata F. Fh.

148. Gatt. Enochrus. Thom.
melanohephalus Ol. Rd. selt.

149. Gatt. Helochares. Mulsant. Sumpfwasserkäfer.
griseus F. Rd. häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

150. Gattung. Chaetarthria. Steph. (Cyllidium Er.) Lachenwasserkäfer.
seminulum. Fh. hfg.
151. Gatt. Laccobius. Erichs. Lachenwasserkäfer.
minutus L. Rd. u. Fh. gem.
scutellaris Motsch. Fh.
gracilis Motsch. Rd.
nigriceps Thom. Altenstadt a. Iller.
152. Gatt. Limnebius. Leach. Pflanzenwasserk.
truncatellus Thunbg. Fh.
153. Gattung. Coelostoma. Brulle. (Cyclonotum Er.) Kugelrückenwasserkäfer.
orbiculuve F. Am Hopfensee, Fh.
154. Gatt. Hydrous. Dahl. Riesenkolbenwasserkäf.
aterrimus. Rd.
155. Gattung Sphaeridium. F. Mistwasserkäfer.
scarabaeoides L. Rd. und Fh. gemein.
bipustulatum F. Rd. u. Fh. gemein.
156. Gatt. Cercyon. Leach. Erd- oder Steinwasserk.
ustulatus Preys. A. Hopfens.
impressus St. Fh.
haemorrhoidalis F. Rd.
melanocephalus L. Rd. und Fh.
unipunctatus L. Rd. und Fh.
quisquilius L. Rd. u. Fh.
pygmaeus Illg. Rd.
nigriceps Marsh. Rd.
flavipes Thbg. Rd.
157. Gattung. Megasternum. Muls. Großbrustwasserk.
boletophagum Mars. Winterrieden, Fh.
158. Gatt. Cryptopleurum. Muls. Punktschwimmk.
minutum F. Rd. u. Fh.

C. Cantharoidea.

XVII. Familie. **Cantharidae.** Leach. Weichkäfer.
159. Gatt. Homalisus. Geoffroy. Flachweichk.
suturalis v. monochlorus. Torre. Rd. sehr selten.
160. Gatt. Dictyopterus. Latr. Blumenweichk.
aurora Herbst. Rd. nur 2 Stück erbeutet.
rubens Gyllh. Rd. selten.
161. Gatt. Pyropterus. Muls.
affinus Payk. Rd. selten.
162. Gatt. Platycis. Thoms.
minuta F. Rd. sehr selten.
163. Gattung. Lygistopterus. Muls. Sommerweichk.
sanguineus L. Rd. u. Fh.
164. Gatt. Lampyris. Geoffroy. Leuchtweichk. Johannisw.
noctiluca L. Hopferwald, Fh. im Gries.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

165. Gatt. Phausis. Leconte. Johanniskäferchen, Glühwurm.
splendidola L. Rd. und Fh. gemein.
166. Gatt. Podabrus. Westwood. Buschweichkäfer.
alpinus Payk. Rd. häufig. Fh. und Eisenburgerwald selten.
167. Gatt. Cantharis. L. (Telephorus Deg.) Warzenträger od. Heckenweichkäfer.
abdominalis F. Rd.
„ v. cyannipennis Bach. Rd. nicht hfg.
violacea Payk. Füssen, Weißhaus, Straße n. Tirol, selten!
fusca L. Rd., Fh. hfg.
rustica Fall. Rd., Fh. hfg.
tristis F. Rd.
obscura L. Rd., Fh.
albomarginata Märk. Fh.
nigricans Müll. Rd., Fh. hfg.
pellucida F. Rd.
livida L. Rd., Fh.
„ v. rufipes Herbst (dispar F) Rd., Fh.
figurata. Fh. selten.
4 punctata Müll. (assimilis Payk). Rd. u. Fh.
rufa L. Fh.
„ v. liturata Fall. Rd. u. Fh.
pallida Goeze (bicolor Pz.) Rd.
fulvicollis Redtb. (bicolor Herbst). Rd., Fh.
haemorrhoidalis F. Fh. selt.
168. Gatt. Absidia. Mulsant.
pilosa Payk. Rd. i. d. Lechauen 3 ♂.
169. Gattung. Rhagonycha. Eschscholtz. Hack.-, auch Hainweichk.
translucida Kryn. Rd.
fulva Scop. (melanura Oliv) Rd. u. Fh. gemein.
limbata Thoms. Rd.
femoralis Brull. Rd.
lignosa Müll. Rd.
atra L. Fh. selten.
170. Gatt. Malthinus. Latreille. Kurzweichling.
biguttulus Payk. Rd.
flaveolus Payk. Rd.
171. Gattung. Malthodes. Kiesenwetter. Wachsweichkäfer.
marginatus Latr. Rd.
guttifer Kiesew. Fh.
minimus L. Fh.
dispar Germ. Rd.
maurus Cast. „
172. Gattung. Drilus. Olivier. Kammweichk.
concolor Arh. Altenstadt a. d. Iller selten.
173. Gatt. Troglops. Erichson. Lochdrüsenk.
albicans L. Rd. u. Fh. hfg., vielfach am Fenster des Wohnzimmers gesammelt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

174. Gattung. Charopus. Er. Grasdrüsenk.
flavipes Payk. Fh. an trockenen Abhängen.
175. Gatt. Hypebaeus. Kies.
flavipes F. Fh. wie voriger.
176. Gatt. Ebaeus. Erichson. Kleindrüsenk.
flavicornis Erichs. Fh.
177. Gattung. Axinotarsus. Motschulsky. Axttarsendrüsenk.
ruficollis Oliv. Fh. selten.
178. Gatt. Malachius. Fabricius. Warzendrüsenk.
aeneus L. Rd. u. Fh.
marginellus Olov. Rd.
bipustulatus L. Rd. u. Fh.
179. Gattung. Anthocomus. Erichson. Blumendrüsenk.
bipunctatus Harrer (equestris F.) Fh.
fasciatus L. Rd.
180. Gatt. Dasytes. Fabricius. Haardrüsenk.
niger L. Rd.
obscurus Gyllh. Rd.
coeruleus Deg. Fh. selten.
plumbeus Müll. Fh. hfg.
fusculus Illg. Fh. hfg.
181. Gatt. Haplocnemus. Steph. Einfachschiener.
nigricornis F. Fh.

XVIII. Fam. **Cleridae.** Klug. Rauchkäfer.

182. Gattung. Opilo. Latreille. Holzrauchk.
mollis L. Rd. u. Fh.
183. Gatt. Thanasimus. Latr. Ameisenrauchk.
formicarius L. Rd., Fh.
184. Gatt. Trichodes. Herbst. Bienenrauchk.
apiarius L. Rd., Fh.
185. Gatt. Corynetes. Herbst. Kolbenrauchk.
coeruleus Degeer. Fh. selt.
„ v. ruficorus St. Rd. u. Fh. hfg.

XIX. Fam. **Byturidae.** Latr. Himbeerkäfer.

186. Gattung. Byturus. Latr. Himbeerk.
fumatus F. Rd. u. Fh. gemein.
tomentosus F. Rd. u. Fh. weniger hfg.

XX. Fam. **Ostomidae.** Reitter. Schimmerkäfer.

187. Gatt. Nemosoma. Latr. Borkenschimmerk.
elongata L. Fh. nicht hfg.
188. Gatt. Tenebrioides. Piller. (Trogosita Olivier) Hausschimmerk.
mauritanicus L. Fh. nicht selten.

XXI. Fam. **Nitidulidae.** Erichs. Schimmerk.

189. Gatt. Cateretes. Herbst (Cercus Latr.) Frühschimmerk.
pedicularius L. Rd. zieml. hfg.
190. Gatt. Heterhelus. Duv.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

scutelaris Heer. (sambuci Erichs.) Boos a. Sambucus racemosus hfg.

191. Gatt. Brachypterus. Kugelann. Blütenschimmerkäfer.

urticae. Rd. auf Urtica dioica sehr hfg.

192. Gatt. Soronia. Erichson.

punctatissima Illg. Fh. unter Rinde selten.

grisea L. Fh. weniger selt.

193. Gatt. Epuraea. Erichs. Saftschimmerk.

depressa Gyllh. Fh. zieml. hfg.

melina Er. Rd. selten auf Blüten.

terminalis Mannh. Fh. selten unter Rinde.

obseleta F. Fh. am Baumsafte.

longula Er. Rd. selten.

florea Er. Fh. zieml. selten.

variegata Herbst. Fh. selt.

194. Gatt. Omosita. Erichs. Moderschimmerk.

discoidea F. Fh. im trock. Miste nicht hfg.

195. Gatt. Nitidula F. Aasschimmerk.

bipunctata L. Hopfen u. Fh.

flavomaculata Rossi. Fh. selt.

196. Gattung. Meligethes. Steph. Honigschimmerk.

rufipes Gyllh. Rd. u. Fh. nicht selten.

lumbaris Sturm. Fh. nicht selten.

coracinus Sturm. Rd. auf Blüten hfg.

aeneus F. Rd. u. Fh. gemein.

viridescens F. Rd. zieml. hfg.

umbrosus Sturm. Fh. selten.

flavipes Sturm. Rd. zieml. selten.

197. Gatt. Pocadius. Erichs. Pilzschimmerk.

ferrugineus F. Fh. u. Winterrieden in Staubpilzen.

198. Gatt. Cychramus. Kugel. Schwammschimmerk.

luteus F. Rd. u. Fh. hfg. auf Weißdorn.

199. Gatt. Glischrochilus. Murray (Ips F). Schlupfschimmerkäfer.

4 pustulatus L. Rd. zieml. häufig.

200. Gattung. Pityophagus. Shuckard.

ferrugineus L. Rd. unter Fichtenrinde.

201. Gattung. Rhizophagus. Herbst. Wurzschimmerk.

grandis Gyllh. Rd. und Altenstadt a. I. je 1 Stück.

ferrugineus Payk. Rd. zieml. häufig.

nitidulus F. Altenstadt a. I. zieml. hfg.

bipustulatus F. Fh. nicht selt.

politus Hellw. Fh. u. Altenstadt a. I. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

dispar Payk. Altenstadt a. I. sehr selten.

XXII. Fam. **Cucujidae.** Reitt. Flachkäfer.

202. Gatt. Monotoma. Herbst. Einzelnschnittflachk.

picipes H. Rd. zieml. hfg.

203. Gatt. Silvanus. Latreille. Waldflachk.

fagi Guér (similis Er.) Fh. selten.

204. Gatt. Laemophloeus. Stephens. Bastflachk.

ferrugineus Steph. Fh. nicht selten.

XXIII. Fam. **Cryptophagidae.** Reitter. Schlupfkäfer.

205. Gatt. Telmatophilus. Heer. Sumpfschlupfk.

caricis Oliv. Fh. nicht selt.

206. Gatt. Paramecosoma. Curtis. Langleibschlupfk.

melanocephala Herbst. Fh. im Geniste an der Iller.

207. Gatt. Cryptophagus. Herbst. Verborgenfresser.

badius Strm. Fh. selten.

acutangulus Gyllh. Rd. in altem Stroh.

208. Gatt. Atomaria. Steph. Zwergschlupfk.

fuscicollis Mannh. Fh. unter abgefall. Laub.

mesomelaena Hbst. Fh. auf Wiesen.

pusilla Payk. Fh. zieml. hfg.

fuscipes Gyllh. Fh.

209. Gattung. Ephistemus. Steph. Aufseherschlupfk.

globulus Payk. Rd. nicht selten.

XXIV. Fam. **Erotylidae.** Bed. Rindenkäfer.

210. Gatt. Tritoma. Fabric. Dreischnittrindenk.

bipustulata F. Rd. an Baumschwämmen.

XXV. Fam. **Phalacridae.** Flach. Glanzk.

211. Gatt. Phalacrus. Payk. Kahlglanzk.

fimetarius F. Rd. u. Fh. gemein.

212. Gatt. Olibrus. Erichs. Glattglanzk.

aeneus F. Fh. auf Kamille.

affinis Strm. Rd. a. Wiesen häufig.

bicolor F. Fh. auf Wiesen nicht selten.

bimaculatus Küst. Fh. auf Wiesen zieml. hfg.

213. Gatt. Stilbus. Seidlitz. Blumenglanzk.

testaceus Panz. Fh. nicht selten.

XXVI. Fam. **Lathridiidae.** Mannerheim. Saftk., auch Heimlichnager.

214. Gatt. Lathridius. Herbst. Modersaftk.

angusticollis Gyllh. Rd. selten.

215. Gatt. Enicmus. Thoms.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

minutus L. Rd. u. Fh. gemein.
transversus Oliv. Rd. unt. abgefall. Laub.

216. Gatt. Cartodere. Thoms.
elongata Curtis. Fh. an aufgehängter Wäsche.

217. Gattung. Corticaria. Marsham. Rindensaftk.
pubescens Gyllh. Rd. u. Fh. häufig.
serrata Payk. Rd. häufig.
elongata Gyllh. Fh.

218. Gatt. Melanophthalma. Motschulsky.
fusculav. trifoveolata Redtb. Fh.

XXVII. Fam. **Mycetophagidae.** Reichenbach. Pilzfresser.

219. Gatt. Litargus. Erichs. Flinkpilzk.
connexus Geoffr. (bisfasciatus F.) Winterrieden.

220. Gatt. Typhaea. Curtis. Rohrkolbenpilk.
stercoriarea L. (fumata L.) Rd. u. Fh. in Wohnungen und Scheuern.

XXVIII. Fam. **Cisidae.** Mellié. Baumschwammk.

221. Gatt. Cis. Latr. Schwammholzk.
comptus Gyllh. Fh. an trockenem Holze.
boleti Scop. Fh. hfg.
hispidus Gyllh. Fh. hfg.
micans F. Fh.

XXIX. Fam. **Colydiidae.** Reitt. Fadenk.

222. Gattung. Cerylon. Latr. Splintfadenf.
histeroides F. Illertissen an alten Stöcken.
ferrugineum Steph. Fh. unter Rinde.

223. Gatt. Ditoma. Herbst. Zweischnittfadenk.
crenata F. Altenstadt a. I.

XXX. Fam. **Endomychidae.** Reitter. Pilzk.

224. Gatt. Mycetaea. Steph. Stickpilzk.
hirta Marsh. Fh.

XXXI. Fam. **Coccinellidae.** Muls. Kugelk., Marienk.

225. Gatt. Subcoccinella. Huber. Kleekugelk.
24 punctata L. Rd. u. Fh. hfg., besond. auf Kleefeld.

226. Gattung. Hippodamia. Mulsant.
13 punctata L. Rd. häufig.
7 maculata Deg. Rd. auf Sumpfwiesen.

227. Gattung. Adonia. Muls. Adoniskäferchen.
variegata. Rd. zieml. hfg.

228. Gatt. Anisosticta. Duponchel. Punktkugelk.
19 punctata L. Rd. auf nassen Wiesen.

229. Gatt. Aphidecta. Weise.
obliterata L. Rd. hfg. auf Kiefern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

230. Gatt. Adalia. Mulsant.
bipunctata L. Rd. u. Fh.
„ a. interpunctata Haw. Fh.
„ a. 6 pustulata L. Rd.
„ a. 4 maculata Scop. „

231. Gatt. Coccinella. Linné. Blattlauskugelk., Sonnenkälbchen, Frauenk.
7 punctata L. Rd. u. Fh.
5 „ L. Rd. zieml. hfg., Fh. selten.
hieroglyphica L. Rd. nicht selten.
10 punctata L. (variabilis F.) Rd. häufig, besonders am Faulensee.
10 punctata a. bimaculata Pont. Rd. hfg.
punctata a. 10 pustulata L. Rd. hfg.
„ a. austriaca Schrank. Rd. hfg.
„ a. nigrina Weise. Fh. hfg.
conglobata. Rd.

232. Gatt. Mysia. Mulsant. Stinkkugelk.
oblongoguttata L. Rd., Altenstadt a. I.

233. Gattung. Anatis. Muls. Unschuldkugelk.
ocellata L. Rd., Altenstadt, auf Weißdornblüten.

234. Gatt. Halyzia. Muls. Pikanter Kugelk.
sedecimguttata L. Rd.

235. Gattung. Vibidia. Muls. Schwielenkugelk.
12 guttata Poda. Rd.

236. Gatt. Thea. Muls. Schaukugelk.
22 punctata L. Rd. u. Fh. nicht selten.

237. Gattung. Calvia. Muls. Kahlkugelk.
10 guttata L. Rd. sehr selt.
14 guttata L. Rd. zieml. häufig.

238. Gattung. Sospita. Muls. Retterkugelk.
20 guttata L. Rd. sehr selt.

239. Gatt. Propylaea. Muls.
14 punctata L. Rd. selten.

240. Gatt. Chilocorus. Leach. Baumkugelk.
renipustulatus Scriba. Rd. häufig.
bipustulatus L. Fh. hfg. an Weidenstämmen.

241. Gatt. Exochomus. Redtb. Dammkugelk.
4 pustulatus L. Rd.
„ v. distinctus Brull. Fh. 1 Stück.

242. Gatt. Platynaspis. Rdtb. Breitschildk.
luteorubra Goeze. Bei Ulm.

243. Gattung. Pullus. Muls.
ferrugatus Moll. (Scymnus analis F.) Rd.
suturalis Thunb. (Scymnus discoideus Schneid.) Fh. sehr selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

244. Gatt. Scymnus. Kugelann. Laubkugelk.
frontalis F. Fh. nicht hfg.
rubromaculatus Goeze (pygmaeus Fouc.) Rd. n. selt.
245. Gattung. Nephus. Muls. Kleinkugelk.
4 maculatus Hbst. Fh. im Herbst unter Baumrinde nicht selten.
Redtenbacheri Muls. Rd. sehr selten.
246. Gatt. Stethorus. Weise.
punctillum Weise. Rd. sehr selten.
247. Gattung. Coccidula. Kugelann. Sumpfkugelkäfer.
scutellata Hbst. Babenhausen auf nassen Wiesen an der Günz.
rufa Hbst. Rd. hfg. auf Moorwiesen.

D. Dascilloidea.

XXXII. Fam. **Helodidae.** Klimmkäfer.
248. Gatt. Helodes. Latreille. Zweckenklimmk.
minuta L. Rd. auf Weiden hfg.
249. Gattung. Cyphon. Payk. Laub- oder Jochklimmk.
variabilis Thunbg. Rd. hfg.
padi L. Rd. hfg.
coarctatus Payk. Rd. hfg.
250. Gatt. Hydrocyphon. Redtb. Wasserklimmk.
deflexicollis Müll. Rd. hfg.
251. Gatt. Eubria. Latreille.
palustris Germ. Rd. hfg.
XXXIII. Fam. **Dryopidae.** Kuwert. (Parnidae). Flußkäfer od. auch Schlammkäfer.
252. Gatt. Dryops. Olivier. (Parnus F.) Klauenflußk.
striatopunctatus Heer. Fh.
viennensis Heer. Fh.
253. Gattung. Riolus. Muls.
cupreus Müller. Fh. hfg.
XXXIV. Fam. **Georyssidae.** Fugenkäfer.
254. Gatt. Georyssus. Latr. Erdaufreißer.
substriatus Heer. Rd. auf Lechsand.
XXXV. Fam. **Dermestidae.** Reitt. Speckk.
255. Gattung. Dermestes. L. Hausspeckk., Fellfresser.
Frischi Kugel. Fh. am Aase.
murinus L. Hopfen.
bicolor F. Fh.
lardarius L. Rd. u. Fh.
256. Gattung. Attagenus. Latreille. Schabspeckk.
piceus Oliv. Rd. u. Fh. häufig.
piceus v. megatoma F. Rd.
pellio L. Rd. u. Fh. zieml. häufig.
punctatus Scop. Fh. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

257. Gattung. Megatoma. Samouelle. Holzspeckt.
undata L. Rd. nicht hfg.
258. Gattung. Trogoderma. Lartr. Hautzernager.
nigrum Herbst. Rd. selten. Fh. selten.
259. Gattung. Anthrenus. Fabricius. Blumenspeckk.
pimpinellae F. Fh. selten.
scrophulariae L. Rd.
museorum L. Rd. u. Fh. häufig; seine Larven sind den Insektensammlungen sehr schädlich.
fuscus Oliv. (claviger Erichs.) Rd. nicht häufig.
260. Gatt. Trinodes. Latr. Wandspeckk.
hirtus F. Fh. im ehemal. isr. Schulhause hfg.

XXXVI. Fam. **Byrrhidae.** Reitter. Pillen- oder Rundkäfer.

261. Gattung. Simplocaria. Marsham. Lockenpillenk.
semistriata Forst. Fh. selten.
262. Gattung. Morychus. Er. Beschmiert. Pillenk.
aeneus F. Fh. hfg.
263. Gattung. Pedilophorus. Steffahny.
nitidus Schall. Fh.
264. Gattung. Cytilus. Erichson. Moderpillenk.
sericeus Forst. (varius F.) Rd. hfg.
265. Gatt. Byrrhus. Linné. Pillenk.
fasciatus Forst. Fh. zieml. selten.
arietinus Steff. Fh. zieml. selten.
pilula L. Fh. u. Rd. gemein.
pustulatus Forst. Rd. selten.
luniger Germ. Rd. selten.
glabratus Heer. Tegelberg bei Füssen.
signatus Panz. Säuling bei Füssen.

XXXVII. Fam. **Dascillidae.** Tourn. Zottenk.

266. Gatt. Dascillus. Latr. (Atopa Payk.) w. o.
cervinus L. Rd., Mkt. Oberdorf, Illereichen.

XXXVIII. Fam. **Elateridae.** Candèz. Schnellk., Schmiede.

267. Gattung. Brachylacon. Motschulsky. Mausschnell.
murinus L. Rd. u. Fh. gemein.
268. Gattung. Corymbites. Latreille. Scheitel-, auch Spitzfleckschnellk.
pectinicornis L. Rd. zieml. hfg. auf Wiesen um Füssen.
cupreus F. Rd. häufig.
cupreus v. aeruginosus F. Rd.
purpureus Poda (haematodes F.) Rd. u. Fh.
tesselatus L. Rd. u. Fh. hfg.
269. Gatt. Selatosomus. Stph. (Diacanthus Latr.), Breit-, auch Zweidornschnell.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

aeneus L. Rd. selten, Fh. häufig.
aeneus a. germanus L., Rd. häufig.
aeneus a. coeruleus Schilsky. Rd. sehr selten.
cruciatus L. Fh. ziemlich selten.
affinis Payk. Rd. sehr selt.

270. Gatt. Prosternon. Latreille, holosericeus Ol. Rd. u. Fh. hfg.

271. Gatt. Sericus. Eschsch. Sericosomus Redtb. Bergschnellk.
brunneus L. Rd. zieml. selten.
„ v. tibialis Redtb. Rd. selten.
subaeneus Redtenbch. Rd. sehr selten.

272. Gatt. Dolopius. Eschsch. Wiesenschnellk.
marginatus L. Rd. u. Fh. häufig.

273. Gatt. Agriotes. Eschsch. Ackerschnellk.
ustulatus Schall. Rd. u. Boos häufig.
ustulatus v. flavicornis Panz. Rd. u. Fh. selten.
lineatus L. Rd. u. Fh. häufig.
obscurus L. Rd. u. Fh. gemein.

274. Gatt. Synaptus. Eschsch. Blumenschnellk.
filifornis F. Rd. sehr häufig, Fh. häufig.

275. Gatt. Adrastus. Eschsch. Erdschnellk.
limbatus F. Rd. u. Fh. häufig.
pallens Erichs. Rd. u. Fh.
montanus Scopoli. Rd. selt.

276. Gatt. Cryptohypnus. Eschsch. Sandschnellk.
riparius F. Rd. ziemlich selten.

277. Gattung. Hypnoidus. Stephens. Steinschnell.
dermestoides Herbst. Fh. auf Illersand hfg.
dermestoides v. tetragraphus Germ. Rd. zieml. selten.
meridionalis Lap. (lapidicola Germ.) Fh. hfg.

278. Gatt. Cardiophorus. Eschsch. Herzschnellk.
atramentarius Erichs. Fh. auf Sanddorn sehr selt.
cinereus Herbst. Fh. nicht selten.

279. Gattung. Melanotus. Eschsch. Schwarzrückenschneller.
rufipes Herbst. Rd. u. Fh.
punctolineatus Pelerin (niger F.). Fh. selten.

280. Gatt. Elater. Linné. Feuerschnellk.
pomonae Step. Rd. selten.
sanguinolentus Schrank. Rd. u. Fh. ziemlich hfg.
ferrugatus Lac. Rd. zieml. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

elongatulus F. Rd. 1 Expl.
balteatus L. Rd. u. Fh. zieml. häufig.
nigroflavus Goeze (crocatus Lap.). 2 St. auf d. Höhen bei Hopfen.
erythrogonus Müll. Rd. 2 Expl.
tristis L. Rd. (Im Bachtal bei Ussenburg 2 Expl.)
aethiops Lac. (scrofa Germar). Rd. 1 Expl.

281. Gatt. Limonius. Eschsch. Grasschnellk.
pilosus Leske (nigripes Gyllh.) Rd. selten.
aeruginosus Oliv. (cylindricus Payk.). Rd. u. Fh. hfg.
minutus L. Rd. u. Fh. hfg.
parvulus Panz. Fh. selten.

282. Gatt. Pheletes. Kiesenwetter. Betrüger.
quercus Ol. (lythrodes Germ.) Rd. nicht selten.

283. Gatt. Athous. Eschsch. Blütenschnellk.
hirtus Herbst. Rd. u. Fh. sehr häufig.
niger L. Rd. sehr hfg.
vittatus Fabr. Rd. u. Fh. sehr hfg.
haemorrhoidalis F. Rd. u. Fh. gemein.
subfuscus Müll. Rd. u. Fh. nicht selten.
Zebei Bach. Rd. manches Jahr einzelne Stücke.

284. Gatt. Denticollis. Piller (Campylus Fisch.), Erlenschnellk.
linearis L. Rd. nicht hfg. Fh. gemein.

XXXIX. Fam. **Eucnemidae.** Bonvouloir = Trixagidae Reitter. Sägek.

285. Gatt. Trixagus. Kugelann. (Throscus Latr.) Blattsägek.
dermestoides L. Rd. u. Fh. häufig.

XL. Fam. **Buprestidae.** Marseul. Prachtkäfer.

286. Gatt. Poecilonota. Eschscholtz (Lampra Meg.) Laubprachtk.
rutilans F. Rd. manches Jahr auf jungen Erlen nicht selten.

287. Gatt. Buprestis. Linné. (Ancylochira Eschsch.) Holzprachtk.
rustica L. Rd. u. Fh. nicht selten.

288. Gatt. Anthaxia. Eschsch. Blumenprachtk.
nitidula L. Rd. hfg.
4 punctata L. Rd. u. Fh. sehr hfg.

289. Gatt. Agrilius. Curtis. Gesträuchprachtk.
viridis L. Rd. zieml. selten.
„ a. linearis F. Rd.
„ a. nocivus Ratzbg. Fh.
„ a. fagi „ „
betuleti Ratzbg. Rd. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

integerrimus Ratzbg. Rd. zieml. selten.

290. Gatt. Trachys. Fabricius. Haselprachtkk.

minuta. Mindelheim u. Fh. zieml. selten.

XLI. Fam. **Lymexylidae.** Walzenk., Holzbohrer.

291. Gatt. Hylecoetus. Latr. Waldwalzenk.

dermestoides L. Rd. u. Fh. nicht selten.

XLII. Fam. **Lyctidae.** Reitter. Splintk.

292. Gatt. **Lyctus.** F. w. oben.

linearis Goeze (canaliculatus F.) Fh. zieml. selt.

XLIII. Fam. **Ptinidae.** Reitter. Hausk., Holzbohrer.

293. Gatt. Niptus. Boieldieu.

hololeucus Falderm. Fh. ziemlich häufig (im Paramentenschrank d. Schloßkapelle u. i. Schulhause).

294. Gatt. Ptinus L. Bohrhausk.

fur L. Rd. u. Fh. gemein.

brunneus Duft. Rd. nicht selten.

raptor Sturm. Rd. nicht selt.

XLIV. Fam. **Anobiidae.** Kiesenwetter. Holzk.

295. Gatt. Hedobia. Sturm. Thronholzk.

imperialis L. Fh. selten.

296. Gatt. Ernobius. Thoms. Astholzk.

abietinus Gyllh. Rd. u. Altenstadt a. I.

mollis L. Rd. nicht selten.

297. Gatt. Anobium. Fabr. Pochholzk.

pertinax L. Rd. u. Fh. zieml. häufig.

striatum Oliv. Rd. u. Fh. in Balk., Möb. etc. gemein.

rufipes F. Fh. nicht selten.

298. Gatt. Sitodrepa. Thoms.

panicea L. Fh. in Speisekammern.

299. Gatt. Ptilinus. Geoffroy. Federhornholzk.

pectinicornis L. Fh. zieml. selten.

300. Gattung. Xyletinus. Latreille. Bohrholzk.

ater Panz. Fh. nicht hfg.

E. Heteromera.

XLV. Fam. **Oedemeridae.** Schmidt Linnaea. Schmalk., Scheinböcke.

301. Gatt. Calopus. Fabr. Bergschmalk.

serraticornis L. Fh. selten.

302. Gatt. Anoncodes. Duponchel. Sonnenschmalk., Schmalbauch.

rufiventris Scop. Rd., Fh. nicht selten.

rufiventris v. ♀ limbicicollis Reitter. Fh. selten.

ustulata F. Fh. zieml. selt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fulvicollis Scop. Rd. zieml. selten.
adusta Panz. Fh. nicht selt.

303. Gattung. Chrysanthia. Schmidt. Goldschmalk.
viridissima L. Rd. u. Fh. häufig.
viridis Schmidt. Rd. u. Fh. weniger hfg.

304. Gatt. Oedemera. Olivier. Dickschenkel, auch Heideschmalk.
flavipes F. bei Blaubeuren gesammelt.
subulata. Wie voriger.
flavescens L. Rd. u. Fh. gem.
virescens L. R. u. Fh. gemein.
lurida Marsh. Rd. sehr selt.

XLVI. Fam. **Pythidae.** Scheinrüßler oder Schnauzenk.

305. Gatt. Pytho. F. Flachscheinrüßler.
depressus L. Fh. sehr selten.

306. Gatt. Rhinosimus. Latreille. Hainschnauzenk.
ruficollis L. Rd. selten.
planirostris F. Fh. selten.

XLVII. Fam. **Pyrochroidae.** Feuerkäfer.

307. Gatt. Pyrochroa. Geoffr. Kammfeuerk.
serraticornis Scop. (rubens F.) Fh. sehr häufig; auch aus in morsch. Zwetschgenbaum gefund. Larven gezogen.
pectinicornis L. Fh. sehr selten.

XLVIII. Fam. **Anthicidae.** Schmidt. Blumenk.

308. Gatt. Anthicus. Payk. Schirmblumenk.
humilis Germ. Rd. nicht hfg.
floralis L. Rd. selt. Fh. 1 St.
hispidus Rossi. Rd. zieml. slt.
formicarius. Fh. selten.

XLIX. Fam. **Meloidae.** Reizkäfer.

309. Gatt. Meloë. Linné. Ölreizk., Maiwurm.
proscarabaeus L. Rd. u. Fh. nicht selten.
violaceus Marsh. Hopfen, selten.
scabriusculus Brdt. Rd. zieml. selten.

310. Gatt. Lytta. Fabr. Blasenreizk., Pflasterk.
vesicatoria L., bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz gefang., im Gebiete nicht beobachtet.

L. Fam. **Rhipiphoridae.** Gerstäcker. Fächerfühlerk.

311. Gatt. Metoecus. Gerst. (Rhipiphorus F.) w. o.
paradoxus L. Altenstadt a. Iller. (Von Herrn Alt gefunden).

LI. Fam. **Mordellidae.** Springkäfer.

312. Gattung. Mordella. L. Stachelspringk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

maculosa Naezen Act. Rd. u. Fh. nicht selten.
fasciata F. Rd. u. Fh. hfg.
aculeata L. Rd. u. Fh. hfg.

313. Gatt. Mordellistena. Costa.
abdominalis F. Rd. u. Fh. zieml. selten.
humeralis L. Rd. zieml. selt.
pumila Gyllh. F. nicht selt.

314. Gatt. Anaspis. Geoffroy. Afterspringk.
frontalis L. Rd. häufig.
thoracica L. Rd. nicht hfg.
rufilabris Gyllh. Rd. zieml. selten.

LII. Fam. **Melandryidae.** Seidlitz. Schwarz- auch Braunk., Düsterk.

315. Gatt. Melandrya. Fabr. Holzbraunk.
caraboides L. Fh. nicht hfg.

316. Gattung. Hypulus. Payk. Schlupfdüsterk.
quercinus Quens. bei Altenstadt a. Iller.

LIII. Fam. **Lagriidae.** Wollk.

317. Gatt. Lagria F. Buschwollk.
hirta L. Rd. u. Fh. hfg.

LIV. Fam. **Alleculidae.** Seidlitz. AuchCistelidae.Fadenk.

318. Gatt. Gonodera. Muls. (Cistela Geof.) Pflanzenfadenk.
murina L. Fh. nicht selt.
murina a. thoracica F. Fh. nicht selten.

319. Gatt. Cteniopus. Solier. Blütenfadenk.
sulphureus L. Bei Blaubeuren gesammelt, im Gebiet nicht beobachtet.

LV. Fam. **Tenebrioidae.** Kraatz. Schattenk.

320. Gattung. Blaps. Fabr. Trauerschattenk.
lethifera Marsh. (similis Latr.) Fh. u. Winterried. in Kellern nicht selten.

321. Gatt. Opatrum. Fabr. Staubschattenk.
sabulosum L. Fh. nicht hfg.

322. Gattung. Scaphidema. Redtb. Nachenschattenk.
v. bicolor F. Fh. zieml. selten.

323. Gattung. Hypophloeus. Fabr. Rindenschattenk.
unicolor Piller. Bei Altenstadt a. I.

324. Gatt. Tenebrio. Linné. Hausschattenkäfer. Mehlwurm.
molitor L. Rd., Fh., insbes. bei Bäckern gemein.

F. Phytophaga.

LVI. Fam. **Cerambycidae.** Ganglbauer. Bockkäfer.

325. Gattung. Spondylis. F. Waldbock.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

buprestoides L. Rd., Fh. selten.

326. Gatt. Prionus. Geoffroy. Forstbock, Sägebock.

coriarius L. Rd. hfg.

327. Gatt. Rhagium. Fabr. Schrotbock.

sycophanta Schrank. Fh., Winterrieden nicht hfg.

mordax Deg. Rd., Fh. hfg.

bifasciatum F. Fh. nicht häufig.

inquisitor L. Rd. nicht hfg.

328. Gatt. Oxymirus. Muls. Schulterbock.

cursor L. Rd., Boos nicht häufig.

329. Gattung. Stenochorus. Fabr. (Toxotus Serville) Blumenbock.

meridianus Panz. Rd., Fh. sehr hfg.

330. Gatt. Pachyta. Steph. Vierfleckbock.

quadrimaculata. Rd., Fh., Boos nicht selten.

331. Gatt. Evodius. Leconte. Fleckenbock. (Pachyta Muls.) Feistbock.

clathratus F. Auf der roten Wand bei Füssen zu weilen häufig.

clathratus F. a. nigritus Pic. w. v.

332. Gatt. Acmaeops. Leconte. Kugelhalsbock.

collaris L. Rd., Fh. hfg.

333. Gatt. Gaurotes. Leconte. Blaubock.

virginea L. Rd., Fh. nicht selten.

334. Gatt. Pidonia. Mulsant. Schnürhalsbock.

lurida F. Rd., Füssen rote Wand, Fh. zieml. hfg.

335. Gattung. Leptura. L. Schmalbock, Halsbock.

livida F. Rd. selten.

maculicornis Deg. Rd., Fh. häufig.

rubra L. Rd., Fh. gemein.

sanguinolenta L. Rd. zieml. häufig.

dubia Scopoli. Rd. zieml. häufig.

cerambiciformis Schrank. (8 maculata Fabr.) Rd., Fh. hfg.

336. Gatt. Strangalia. Serville. Schmalbock.

4 fasciata L. Fh. selten.

aethiops Poda (atra Laich). Fh. manches Jahr nicht selten.

melanura L. Rd. u. Fh.

nigra L. Rd. selten.

attenuata L. Rd. selten.

337. Gatt. Alosterna. Muls.

tabacicolor Deg. (laevis F.) Rd. u. Fh. häufig.

338. Gatt. Grammoptera. Serville. Blütenbock.

ruficornis F. Rd. nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

339. Gattung. Caenoptera. Thoms. Kurzdeckenbock, auch Fliegenbock.
minor L. Rd., rote Wand bei Füssen, Fh. hfg.
umbellatarum Schreb., wie voriger, aber selten.
340. Gatt. Obrium. Curtis. Zwergbock.
brunneum L. Rd., Markt Oberdorf, Ottobeuren selt.
341. Gatt. Gracilia. Serville. Schlankbock.
minuta F. (pygmaea F.) Markt Oberdorf, Altenstadt a. I. sehr selten.
342. Gattung. Criocephalus. Muls. Widderbock, auch Halsgrubenbock.
rusticus L. Rd., Fh. selten.
343. Gatt. Asemum. Eschsch. Düsterbock.
striatum L. Rd. zieml. selt.
„ v. agreste F. Rd. selten.
344. Gatt. Tetropium. Kirby (Isarthron Redtenbach.). Sommerbock, Gleichgliedhornbock.
castaneum L. Rd. selten.
„ v. luridum L. Rd. u. Fh. selten.
„ v. aulicum F. Rd. nicht selten.
„ v. fulcratum F. Rd. nicht selten.
fuscum F. Rd. selten.
345. Gatt. Phymatodes. Mls. Baumbock.
testaceus L. Rd., Fh. manchmal häufig.
testaceus a. variabilis L. Rd., Fh. manchmal hfg.
testaceus a. praeustus F. Fh. selten.
346. Gatt. Callidium. Fabr. Scheibenbock.
aeneum Deg. (dilatatum Payk.) Rd., Fh. selten.
violaceum L. Rd. u. Fh. gemein.
347. Gatt. Hylotrupes. Serville. Hausbock, Bohrbock.
bajulus L. Rd. u. Fh. hfg. Ich beobachtete einige Exemplare b. Ausschlüpf. aus einem Sims (Fensterbrett) des hiesigen Schulhauses, der schon einige Jahre angebracht war, ein Beweis, daß die Tiere zur Entwicklung mehr. Jahre benötigen. Das Brett mußte später, weil völlig zerfressen, erneuert werden. In Länge sehr veränderlich (10 bis 20 mm).
348. Gatt. Aroma. Serville. Moschusbock.
moschata L. Rd. u. Fh. manches Jahr häufig.
349. Gatt. Xylotrechus. Chevrolat.
antilope Zetterst. Rd. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

350. Gatt. Clytus. Laichartg. Zierbock.
arietes L. Rd. u. Fh. nicht selten.
rhamni Germ. Rd. u. Fh. selt.
351. Gatt. Anaglytus. Muls. Zierbock.
mysticus L. Rd. selten.
352. Gatt. Lamia. Fabricius. Weberbock.
textor L. Rd. nicht selten; Fh. häufig.
353. Gatt. Monochamus. Curtis. Langhornbock.
sartor F. Bei Füssen sehr selten.
sutor L. Rd. in 10 Jahren 2 mal beobachtet u. da in mehr. Exempl. beisammen.
354. Gatt. Acanthoderes. Serville. Dornbock.
clavipes Schrank. Hopfen sehr selten.
355. Gatt. Acanthocinus. Steph. (Astynomus Deg.) Zimmerbock.
aedilis L. Rd., Altenstadt nicht selten.
356. Gatt. Liopus. Serville. Glattbock.
nebulosus L. Fh., Altenstadt zieml. selten.
357. Gatt. Pogonochaerus. Gemminger. Wimperbock.
hispidus L. Rd. u. Fh. hfg.
fasciculatus Deg. Rd. selt. als der vorige.
358. Gatt. Agapanthia. Serv. Scheckhornbock.
villosoviridescens Deg. (angusticollis Gyllh.). Rd. u. Fh. sehr hfg. auf Weiden und Disteln.
359. Gatt. Saperda. Fabr. Pappelbock.
carcharias L. Fh. zieml. selten.
populnea L. Rd. u. Fh. hfg.
scalaris L. Hopfen, Boos, Altenstadt a. I.
360. Gatt. Tetrops. Steph. Augenbock.
praeusta L. Rd. u. Fh. hfg.
361. Gatt. Stenostola. Muls. Zitterbock.
nigripes. Rd., Fh. nicht selten.
362. Gatt. Phytoecia. Muls. Pflanzenbock.
cylindrica L. Fh. nicht selten.
coerulescens Scop. (virescenz F.) Fh. nicht hfg.
coerulescens a. obscura Bris. Fh. selten.
363. Gatt. Oberea. Mulsant. Linienbock.
pupillata Gyllh. Rd. u. Fh. auf Lonicera selten.
oculata L. Rd. u. Fh. auf Salix incana oft hfg.
linearis L. Rd. auf Corylus avellana auf dem Sendenberg sehr selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

LVII. Fam. **Chrysomelidae.** Blattkäfer.

364. Gatt. Donacia. Fabr. Rohrkäfer.
crassipes F. Schwansee bei Hohenschwangau hfg.
clavipes F. Rd. hfg.
aquatica L. (vittata Oliv.) Rd. nicht selten.
vulgaris Zschach. (typhae Ahr.) Rd. nicht selten.
simplex F. (linearis Hoppe). Rd., Fh. zieml. hfg.

365. Gattung. Plateumaris. Thomson.
sericea a. micans Panzer. Rd. u. Fh. hfg.
sericea a. armata Pak. Fh. häufig.
sericea a. nymphaeae F. Fh. sehr selten.
consimilis Schr. (discolor Hoppe). Rd. sehr selten.
rustica Kunze. Rd. nicht selt.

366. Gatt. Orsodacne. Latr. Keimbeisser.
cerasi L. Rd. zieml. selt.
„ a. lineola Lac. Rd. sehr selten.
„ a. limbata Ol. Altenstadt a. I. sehr selt.
„ a. Duftschmidi Weis. wie voriger.

367. Gatt. Zeugophora. Kunz. Jochblattkäfer.
subspinosa F. Fh. sehr selt.
flavicollis Marsh. Rd. hfg.

368. Gatt. Lema. Lacordaire. Blatthähnchen.
puncticollis Cart. Fh. nicht selten.
Erichsoni Suffr. Fh. sehr selten.
cyanella L. Rd. u. Fh. häufig.
melanopus L. Rd. hfg.

369. Gatt. Crioceris. Geoffr. Spargelk., Lilienhähnch.
lilii Scop. (merdigera F.) Rd., Fh. auf Lilien zieml. häufig.
merdigera L. (brunea F.) Rd., Fh. wie voriger.
asparagi L. Fh. auf Spargelpflanzen zieml. häufig.

370. Gatt. Labidostomis. Redtenbach. Sägeblattk.
tridentata L. Rd. auf Bergwiesen nicht hfg.
longimana L. Rd. selten.

371. Gatt. Clytra. Laichart. Sägehorn.
quadripunctata L. Rd. u. Fh.
laevinscula Ratzebg. Fh. ziemlich häufig.

372. Gatt. Gynandrophthalma. Lacordaire. (Cyaniris Chevrol.) Haldenblattkäfer.
cyanea L. Rd., Fh. hfg.
flavicollis Charp. Fh. selt.
affinis Hellw. Rd. hfg.
xanthaspis Germ. Rd. nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

373. Gatt. Coptocephala. Chevrolat. Stutzkopf.
rubicunda Laich. Rd. hfg.
374. Gatt. Cryptocephalus. Geoffroy. Fallblattk.
sericeus L. Rd. häufig.
„ a. pratorum Suffr. Rd. zieml. selten.
aureolus Suffr. Rd. zieml. selten.
cristula Duft. Fh. hfg.
violaceus Laich. Rd. hfg.
nitidus L. Rd. hfg.
coryli L. Rd. zieml. hfg.
coryli a. dorsosignatus Reitt. Rd. selten.
variegatus F. Rd. nicht selt.
octopunctatus Scop. Rd., Fh. häufiger als der vor.
signatus Lch. Rd. zieml. hfg.
cordiger L. Rd. nicht selt.
flavipes F. Rd. hfg.
pini L. Rd. häufig.
biguttatus Scop. Rd. nicht selten.
bipunctatus a. immaculipennis Pic. Rd. sehr selt.
bipunctatus v. sanguinolentus Scop. Rd. sehr selt.
vittatus F. Rd. hfg.
frenatus Laich. Rd. hfg.
Moraei L. Rd. hfg.
ocellatus Drap. (Geminus Gyllh.) Rd. hfg.
labiatus L. Rd. selten.
375. Gatt. Pachybrachus. Redtenb. Scheckenblattk.
hieroglyphicus Laich. Rd. häufig.
hippophaës Suffr. Fh. hfg.
376. Gatt. Pachnephorus. Redtenbach. Duftblattk.
pilosus Rossi (avenarius Panz.) Rd. hfg.
377. Gatt. Bromius. Redtenbacher. Achselblattk.
obscurus L. Bei Hopfen zieml. selten.
378. Gatt. Gastroidea. Hope. (Gastrophysa Chevr.) Wegblattk.
polygoni L. a. ruficollis F. Fh. selten.
379. Gatt. Timarcha. Latr. Tatzenblattk.
metallica Laich. Rd., Fh., Winterrieden nicht selten.
380. Gatt. Chrysomela. Linné. Goldblattk.
orichalcea Mull. Rd. nicht selten.
hyperici Forst. (fucata F.) Rd. sehr selten.
geminata Payk. Rd. sehr selten.
brunsvicensis Gravh. (duplicata Zenk.) Rd. sehr selt.
staphylea L. Rd. zieml. häufig.
haemoptera L. Rd., Fh. nicht selten.
purpurascens Germ. Auf d. Höhen b. Ussenburg u. a. Zwieselbg. zieml. selt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

goettingensis L. Rd. hfg.
varians Schaller. Rd., Fh. häufig.
varians a. pratensis Weise. Rd. zieml. selten.
cerealis L. Rd. selten.
fastuosa Scop. Rd., Fh. häufig.
graminis L. Rd., bei der Hollmühle zieml. hfg.
coerulans Scriba (violacea Panz.) Rd., Fh. hfg.
coerulans v. menthastri Suffr. Fh. zieml. selten.
polita L. Rd. hfg.

381. Gatt. Chrysochloa. Hope. (Orina Motsch.)
intricata a. Anderschi. Duftsch. Pöllatschlucht u. bei der Marienbrücke zu Hohenschwangau selten.
gloriosa a. virgo Ws. bei Ussenburg selten.
gloriosa a. nubila Weise. Auf dem Tegelberg selten.
gloriosa a. superba Oliv. Rd. sehr selten.
cacaliae Schrank. Tegelbei Füssen hfg.
speciosissima Scopoli. Tegelberg selten.
speciosissima a. Letzneri Weise. Tegelberg nicht selten.

382. Gattung. Phytodecta. Kirby. (Gonioctena Redtenbach.) Hainblattk.
viminalis L. Rd. sehr selt.
Linnaeana Schrank. Rd., Fh. zieml. hfg.
Linnaeana a. decostigma Duft. Fh. sehr selten.
Linnaeana a. nigricollis Westh. Rd., Fh. sehr hfg.
Linnaeana a. Satanas Westh. Rd., Fh. hfg.
5 punctata F. Rd. hfg.
punctata a. unicolor Weise. Rd. sehr selten.

383. Gatt. Phyllodecta. Kirby. (Phratora Redtenbacher) Weidenblattk.
tibialis Suffr. Rd. gemein.
vitellinae L. Rd., Fh. gem.
„ a. brevicollis Motsch. Fh. sehr selten.

384. Gattung. Hydrothasa. Thomson. (Helodes Payk.) Bachblattkäfer, Sumpfhähnchen.
aucta F. Rd. zieml. hfg.

385. Gatt. Prasocuris. Latr. Lauchhähnchen.
phellandrii L. Rd. auf Caltha palustris hfg.
junci Brahm (violacea F.) bei Hopfen hfg.

386. Gatt. Phaedon. Latr. Glanzblattk.
laevigatus Duft. Rd., Fh. häufig.
cochleariae F. Rd., Fh. hfg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cochleraiae a. neglectus Sahlbg. Bei Hopfen sehr selten.
armoraciae L. Rd. u. Fh. häufig.

387. Gattung. Plagiodera. Erichson. Weidenblattk.
versicolor Laich. (armoraciae F.) Fh. nicht hfg.

388. Gatt. Melasoma. Steph. (Lina Redtenb.) Buschblattkäfer.
aenea L. Rd. sehr selten.
cuprea F. Bei Hohenschwangau nicht selten.
20 punctata Scop. Bei Altenstadt a. I. selten.
populi L. Rd., Fh. häufig.
saliceti Weise. Fh. häufig.
tremulae F. Rd., Fh. hfg.

389. Gattung. Agelastica. Redtenb. Erlenblattk.
alni L. Fh. nicht selten.

390. Gatt. Luperus. Geoffr. Langhorn, Fadenbl.
pinicola Duft. Rd. hfg.
longicornis F. Rd. zieml. häufig.
flavipes L. Rd., Fh. hfg.

391. Gatt. Lochmaea. Weise.
capreae L. Rd. hfg.
suturalis Thoms: Rd. sehr selten.
crataegi Forst (sanguinea F.) Hopfen, Fh. zieml. selt.

392. Gattung. Galerucella. Crotsch. Fallblattk.
viburni Payk. Rd., Fh. hfg.
lineola F. Rd., Fh. sehr häufig.
calmariensis L. Rd. zieml. selten.
tenella L. Rd. hfg.

393. Gatt. Galeruca. Geoffr. (Adimonia Laicharting). Flachblattk.
tanaceti L. Rd. häufig.
pomonae Scop. (rustica Schallh.) Rd. häufig.

394. Gattung. Sermylassa. Reitter. Zierblattk.
halensis L. Fh. nicht hfg.

395. Gattung. Crepidodera. Chevrolat. Springblattk.
femorata Gyllh. Rd. zieml. selten.
melanostoma Redtb. Rd. sehr häufig.
ferruginea Scop. Rd. sehr häufig.

396. Gattung. Chalcoides. Foudras. Weidenflohk.
aurata Marsh. Rd., Fh. häufig.

397. Gatt. Hippuriphila. Foudras. Schachtelhalmflohkäfer.
Modeeri L. Rd. auf Lechsand sehr selten.

398. Gatt. Mantura. Steph.
Matthewsi Curt. Rd. sehr selten.

399. Gatt. Chaetocnema. Stephens. (Plectroscelis

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Redtenbacher) Schienenzahnblattk.
concinna Marsh. Fh. selt.
aridula Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.
Sahlbergi Gyllh. Rd. sehr selten.

400. Gattung. Psylliodes. Berthold. Flohblattkäfer.
napi F. Fh. nicht selten.
affinis. Rd., Fh. häufig.
hyoscyami v. chalcomera Illg. Fh. zieml. selten.

401. Gatt. Haltica. Geoffroy. Hüpfblattk.
tamaricis Schrank (consobrina Dftsch.) Rd., Fh. häufig.
oleracea L. Rd., Fh. hfg.
pusilla Duft. Rd. hfg.

402. Gatt. Hermaeophaga. Foudr. Bingelkrautflohk.
mercurialis F. Rd. auf Mercurialis perennis nicht selten.

403. Gattung. Phyllotreta. Foudras. Erdfloh.
armoraciae Koch. Rd. auf Cochlearia Armoracia im Schulgarten sehr selten.
flexuosa Illg. Rd. sehr selt.
„ a. fenestrata Ws. Fh. sehr selten.
sinuata Redtenb. (vittata F.) Rd., Fh. häufig.
undulata Kutsch. Rd., Fh. sehr häufig.
undulata a. bilineata Ws. Fh. selten.
nemorum L. Rd., Fh. auf Kohlarten und Rettig in Gärten gemein.
nigripes F. (lepidii Koch) wie voriger gemein.

404. Gatt. Aphtona. Chevr. Wolfsmilchflohk.
cyparissiae Koch. Winterrieden nicht selten.
venustula Kutsch. Rd., Fh. häufig.

405. Gattung. Longitarsus. Latr. Langfußblattk.
anchusae Payk. Rd. hfg.
holsaticus L. Rd. hfg.
luridus Scop. Rd. hfg.
„ a. 4 signatus Duft. Rd. selten.
atricillus L. Rd. hfg.
suturellus L. (thoracicus Steph.) Rd. nicht selten.
melanocephalus Deg. Rd. häufig.
longipennis Kutsch. Fh. selten.
pratensis Panz. Rd. nicht selten.
succineus Foudr. Fh. nicht selten.
jacobaeae Waterh. (tabidus Panz.) Fh. zieml. hfg.

406. Gatt. Sphaeroderma. Steph. Kugelblattk.
testaceum F. (cardui Gyllh.) Rd., Fh. auf Disteln hfg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

rubidum Graëlls (testaceum Gyllh.) Selten. als vorig.

407. Gatt. Hispella. Chapuis. Dornblattk.

atra L. Um Rd. auf trock. Bergwiesen nicht selten.

408. Gatt. Cassida. Linné. Schildblattk.

viridis L. Rd. nicht selt.

azurea F. (lucido Suffr.) auf ein. Kleeacker (Trifolium hybridum) zwisch. Rd. u. Hopfen im Sommer 1901 auf Silene-Arten in mehr. Exempl. gefangen.

margaritacea Schall. Winterrieden nicht selten.

margaritacea a. melanocephala Suffr. Winterrd. slt.

flaveola Thunbg. (obsoleta Illg.) Rd. auf Disteln hfg.

nebulosa L. Rd. selten.

atrata F. Rd. zieml. selt.

rubiginosa Mull. Rd., Fh. sehr hfg.

vibex L. Rd., Fh. sehr häufig.

denticollis Suffr. Fh. zieml. selten.

sanguinolenta Müll. Rd. nicht hfg.

vittata Villers (oblonga Illg.) Fh. sehr selten.

LVIII. Fam. **Lariidae.** Schilsky. Samenkäfer.

409. Gatt. Spermophagus. Steven. Distelsamenk.

sericeus Geoffr. (cardui Boh.) Fh. sehr selten.

410. Gattung. Laria. Scop. (Bruchus L.) Schotenk.

rufimana Bohem. Fh. 1 Ex.

atomaria L. Fh. nicht selt.

loti Payk. Fh. 1 Stück 1916 gefangen.

411. Gattung. Bruchidius. Schilsky.

unicolor Oliv. (olivacius Germ.) Fh. selten.

G. Rhynchophora.

LIX. Fam. **Anthribidae.** Kurzrüßler.

412. Gatt. Urodon. Schönherr. Resedenrüßler.

suturalis F. Fh. nicht selt. auf Reseda lutea.

rufipes Oliv. Fh. daselbst häufig.

413. Gatt. Platyrrhinus. Clairville. Breitrüsselk.

resinosus Scop. (latirostris F.) Auf den Höhen von Illereichen selten.

414. Gatt. Platystomus. Schneider. Rindenrüsselk.

albinus L. Rd. u. Fh. nicht selten.

415. Gattung. Anthribus. Geoffroy. (Brachytarsus Schönherr.) Kurztarser.

fasciatus Forst. (scabrosus F.) Fh. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

variegatus Geoffr. (varius F.) Rd. hfg.

LX. Fam. **Curculionides.** Rüsselkäfer.

416. Gatt. Otiorrhynchus. Germ. Dickmaulrüßler.

geniculatus Germ. Rd. nicht selten.

armadillo Rossi. Rd. nicht selten.

armadillo v. obsitus. Rd. sehr selten.

niger F. Rd. nicht selten.

clavipes Bon. (tenebricosus) Rd. nicht selten.

morio F. (unicolor) Rd., Fh. hfg.

porcatus Hbst. Rd. hfg.

scaber L. (septentrionis Hbst.) Rd. nicht selten.

singularis L. (picipes F.) Rd. nicht selten.

salicis Ström. (lepidoptorus F.) Rd. hfg.

gemmatus Scop. Füssen, rote Wand, häufig.

ovatus L. Rd., Fh. nicht selten.

ligustici L. Rd. u. Fh. nicht häufig.

417. Gattung. Phyllobius. Schönh. Blattnager, Grünrüßler.

calcaratus F. (glaucus Scop.) Rd. nicht selten.

calcaratus a. atrovirens Gyllh. Rd., häufiger Fh.

calcaratus v. densatus Schilsky. Rd. nicht selt., Fh.

psittacinus Germ. Rd., Fh. ziemlich hfg.

psittacinus a. acuminatus Boh. Fh. zieml. hfg.

maculicornis Germ. Rd. hfg., Fh. nicht selten.

piri L. Rd., Fh. häufig.

„ a. maliGyllh. Fh.1St.

argentatus L. Rd. häufig.

oblongus L. Rd., Fh. hfg.

„ a. floricola Herbst. Rd. selten.

pomonae Ol. Rd., Fh. hfg.

virideaeris Laich. (parvulus Gyllh.) Rd. nicht häufig.

viridicollis F. Rd. häufig.

418. Gatt. Polydrusus. Germ. Taurüsselkäfer.

impar Gozis (mollis Germ.) Rd., Fh. häufig.

atomarius Ol. Rd., Fh. häufig.

mollis Ström. (micans F.) Rd. ziemlich selten.

mollis a. chlorophanus Wsth. Fh. selten.

amoenus Germ. Rd. zieml. häufig.

sericeus Schall. Rd., Fh. zieml. hfg.

cervinus L. Rd., Fh. zieml. häufig.

cervinus a. melanotus Steph. Rd., Fh. sehr selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tereticollis Deg. (undatus F.) Rd., Fh. selten.
pterygomalis Boh. Rd., Illertissen selten.

419. Gatt. Sciaphilus. Steph. Schattenrüsselk.
asperatus Bonsd. (muricatus F.) Rd., Fh. häufig. Ich sammelte 1 Stück, das auf der recht. Kopfseite kein Auge besitzt. Die Stelle ist glatt und beschuppt.

420. Gattung. Liophloeus. Germar. Rindennager.
tessulatus Müller. Rd. nicht selten.

421. Gatt. Strophosomus. Steph. Sandrüsselk.
melanogrammus Forster. (coryli F.) Rd. häufig.
obesus Marsh. (capitatus Deg.) bei Ulm 1 Stück.
faber Herbst. Rd. 1 Stück.

422. Gattung. Barynotus. Germ. Hochrückenrüßler.
obscurus F. Rd. nicht selt.
moerens F. Rd. ziemlich selten.

423. Gatt. Sitona. Germar. Schmalrüsselkäfer.
regensteinensis Herbst. Winterrieden selten.
tibialis Herbst. Fh. selten.
lineatus L. Rd., Fh. gemein.
suturalis Steph. Fh. selten.
suleifrons Thunbg. Rd., Fh. häufig.
flavescens Marsh. Rd., Fh. häufig.
hispidulus F. Rd., Fh. hfg.

424. Gattung. Tropiphorus. Schönherr. Kielrüsselk.
carinatus Mull. (mercurialis F.) Rd. 1 Stück.

425. Gatt. Chlorophanus. Germar. Grünrüßler.
viridis L. Fh. hfg.
gibbosus. Rd. hfg.

426. Gattung. Tanymecus. Schönh. Schlankrüsselk.
palliatus F. Fh. nicht selt.

427. Gatt. Cleonus. Schönh. Heiderüsselk.
grammicus Panz. Fh. 2 Stck.

428. Gatt. Lixus. F. Schwanzrüsselk.
algirus L. (angustatus F.) Rd. sehr selten.

429. Gatt. Larinus. Germar. Distelrüsselk.
sturnus Schall. Rd. hfg., Fh. seltener.
jaceae F. Rd. häufig., Fh. seltener.
planus Herbst (flavescens Germ.) Rd., Fh. nicht selt.

430. Gattung. Rhinocyllus. Germ. Maulrüsselk.
conicus Froelich. (latirostris L.) Rd., Fh. hfg.

431. Gatt. Hypera. Germar. Keulenrüsselk.
intermedia Boh. Rd. nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

comata Boh. Rd. nicht selten.

432. Gattung. Phytonomus. Schönh. Eirüsselkäfer.

punctatus F. Rd., Fh. zieml. hfg.

rumicis L. Fh. zieml. selt.

asperatus a. histrio Boh. Rd. 1 Stück.

arator L. (polygoni L.) Fh. 2 Stück.

pedestris Payk. Rd. nicht selten.

variabilis Herbst. Rd., Fh. zieml. hfg.

nigrirostris F. Rd. nicht selten.

nigrirostris a. Stierlini Cap. Rd. 1 Stück.

433. Gatt. Alophus. Schönh. Herzrüsselk.

triguttatus F. Rd., Fh. nicht häufig.

434. Gatt. Lepyrus. Germ. Spindelrüsselk.

palustris Scop. (colon L.) Rd., Fh. nicht selten.

435. Gatt. Hylobius. Germ. Forstrüsselk.

piceus Deg. Auf d. Schlicke bei Füssen 1 Stück.

abietis L. Rd., Fh. gemein.

436. Gatt. Liparus. Olivier. (Molytes Schönh.) Dickrüsselkäfer.

glabrirostris Küst. Rd. nicht selten.

germanus L. Rd. hfg., Fh. zieml. selten.

coronatus Goeze. Fh. nicht häufig.

437. Gatt. Liosoma Steph. Glattleibrüsselk.

deflexum Panz. Fh. 1 Stck.

438. Gatt. Pissodes. Germ. Pechrüsselk.

piceae Illg. Fh. 1 Stück.

notatus F. Rd. nicht selt.

pini L. Rd. selten.

439. Gatt. Magdalis. Germ. Walzenrüsselk.

flavicornis Gyllh. Rd. sehr selten.

quercicola Weise. Fh. sehr selten.

cerasi L. Rd., Fh. nicht selten.

carbonaria L. Rd. sehr selten.

frontalis Gyllh. Rd. sehr selten.

duplicata Germ. Rd. sehr selten.

nitida Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.

violacea L. Rd., Fh. hfg.

440. Gatt. Anoplus. Schönh. Fußrüsselk.

roboris Suffr. Fh. zieml. hfg.

setulosus Kirsch. Fh. zieml. häufig.

441. Gatt. Eremotes. Wollaston. (Rhyncolus).

ater L. (chloropus F.) Rd.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

442. Gatt. Rhyncolus Germ. Stutzrüsselk.
truncorum Germ. Fh. hfg.
443. Gatt. Cossonus. Clairville. Holzwurm.
linearis F. Fh. 1 Stück.
444. Gatt. Cryptorrhynchus. Illiger. Fugenrüsselk.
lapathi L. Rd., Fh. nicht selten.
445. Gattung. Coeliodes. Schönh. Windrüsselk.
trifasciatus Bach. Fh. sehr selten.
dryados Gml. Rd., Fh. nicht selten.
446. Gattung. Stenocarus. Thomson.
fuliginosus Marsh. Rd., Fh. selten.
447. Gatt. Cidnorrhinus. Thomson.
4 maculatus L. Fh. selten.
448. Gatt. Ceuthorrynchidius Duval.
troglodytes F. Rd., Fh.
449. Gatt. Ceuthorrhynchus. Germ. Falzrüsselk.
posthumus Germar. Fh. 1 Stück.
geographicus Goeze. Fh. nicht selten.
litura F. Fh. sehr selten.
rugulosus Herbst. Fh. sehr selten.
campestris Gyllh. Rd. nicht selten.
pollinarius Forst. Fh. zieml. häufig.
denticulatus Schrank. Rd., Fh. ziemlich häufig.
macula = alba Herbst. Fh. sehr selten.
punctiger Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.
marginatus Payk. Rd. 1Stck.
syrites Germ. Rd. 1 Stück.
rapae Gyllh. Rd. 1 Stück.
turbatus Schultze. Rd., Fh. nicht selten.
atomus Boh. Rd., Fh. ziemlich häufig.
pleurostigma Mrsh. Rd., Fh. zieml. selten.
erysimi F. Hopfen b. Rd. 1 Stück.
450. Gatt. Rhinoncus. Steph. Hackenrüsselkäfer.
pericarpius L. Rd. nicht selten.
451. Gattung. Poophagus. Schönh. Grasrüsselkäfer.
sisymbrii F. Fh. selten.
452. Gattung. Baris. Germ. Glanzrüsselk.
picicornis Marh. (abrotani Germ.) Fh. nicht selten. Auf Artemisia vulgaris.
Talbum L. Rd., Fh. nicht selten.
453. Gattung. Balaninus. Samouelle. Nußrüßler.
nucum L. Rd. nicht selten, Fh. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

454. Gatt. Balanobius. Jek. Bohrrüßler.
crux F. Rd., Fh. nicht selt.
salicivorus Payk. Rd., Fh. zieml. häufig.
pyrrhoceras Marsh. Fh. selt.

455. Gatt. Anthonomus. Germ. Blütenrüßler.
varians Payk. Rd., Fh. zieml. häufig.
pomorum L. Rd., Fh. zieml. selten.
humeralis Panz. Fh. sehr slt.
sorbi Germ. Fh. zieml. hfg.
druparum L. Rd., Fh. selt.

456. Gatt. Dorytomus. Steph. Buschrüsselk.
longimanus Forst. (vorax F.) Rd., Fh. nicht selten.
longimanus a. macropus Redtenb. Fh. 1 Stück.
tremulae Payk. Rd. 1 Stck.
tortrix L. Rd. nicht selt.
flavipes Panz. Fh. selten.
Schönherri Faust. Rd. selt.
melanophthalmus Payk. Rd. nicht selten.
melanophthalmus v. lateralis Faust. Rd. sehr selten.
affinis Payk. Rd., Fh. sehr selten.
salicis Walton. Rd. selten.
dorsalis L. Rd. selten.
„ a. Linnei Faust. Rd. sehr selt.
„ a. nigrifrons Faust. Rd. sehr selten.

457. Gatt. Notaris. Steph. acridulus L. Am Hopfensee nicht selten.

458. Gatt. Grypidius. Steph. Krummrüsselk.
equiseti F. Rd., Fh. nicht selten.

459. Gatt. Bagous. Schönherr. Sumpfrüsselk.
nigritarsus Thomson. Rd. nicht selten.

460. Gattung. Acalyptus. Schönh. Unverhüllter.
carpini Herbst. Altenstadt 1 Stück.
carpini a. alpinus Villa. Fh. 1 Stück.

461. Gatt. Tychius. Germ. Pfriemrüsselk.
5 punctatus L. Fh. selten.
meliloti Steph. Fh. sehr selten.
tomentosus Herbst. Rd., Fh. nicht selten.

462. Gatt. Sibinia. Germ. Zwergrüßler.
viscariae L. Fh. selten.

463. Gatt. Orchestes. Ill. (Rhynchaenus Clairville.) Hüpfrüsselkäfer.
lonicerae Herbst. Rd. nicht selten.
fagi L. Fh. selten.
rufitarsus Germ. F. nicht selten.
salicis L. Rd.. Fh. nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

populi F. Fh. nicht selten.

464. Gatt. Rhamphus. Clairville. Krummschnabel.

pulicarius Herbst. Fh. hfg.

465. Gatt. Mecinus. Germ. Wiesenrüsselk.

collaris Germ. Rd. selten.

pyraster Herbst. Fh. nicht selten.

466. Gattung. Gymnetron. Schönherr. Nackbauchrüßler.

beccabungae v. veronicae Germ. Rd. nicht selten.

tetrum F. Rd., Fh. zieml. häufig.

antirrhini Payk. Fh. selt.

467. Gatt. Miarus. Steph.

longirostris Gyllh. Fh. nicht selten.

graminis Gyllh. Rd., Fh. zieml. häufig.

campanulae L. Rd., Fh. zieml. häufig.

468. Gatt. Cionus. Clairville. Wollblumenrüßler.

tuberculosus Scop. (verbasci F.) Rd. zieml. hfg.

scrophulariae L. Rd., Fh. zieml. häufig.

hortulans Geoffr. Rd., Fh. nicht selten.

thapsi. Rd., Fh. nicht selt.

alauda Herbst. Füssen, rote Wand selten.

469. Gattung. Nanophyes. Schönh. Kleinrüsselk.

marmoratus Goeze (lythri F.) Rd., Fh. nicht selt.

470. Gatt. Apion. Herbst. Birnrüsselkäfer, Spitzmausrüßler.

pomonae F. Rd., Fh. nicht selten.

craccae L. Rd., Fh. nicht selten.

cerdo Gerst. Rd. selten.

opeticum Bach. Rd. selt.

subulatum Kirby. Fh. selt.

carduorum Kirby. Fh. sehr selten.

onopordi Kirby. Rd. hfg.

fuscirostre F. Rd. selten.

aeneum F. Fh. auf Malven nicht selten.

radiolus Kirby. Fh. auf Malven nicht selten.

laevigatum Payk. (sorbi F.) Fh. zieml. häufig.

urticarium Herbst (vernale Payk.) Rd. sehr selten.

pallipes Kirby. Rd., 1 Stck.

rufirostre F. Fh. auf Malven nicht selten.

pubescens Kirby. Rd., Fh. auf Malven nicht selten.

atomarium Kirby. Fh. selt.

seniculus Kirby. Rd., Fh. häufig.

frumentarium Payk. Rd. selt.

flavipes Payk. Rd., Fh. je 1 Stück.

apricans Herbst (fagi Kirby) Rd. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

aestivum Germ. (trifolii Bach). Auf Kleefeldern nicht selten.
assimile Kirby. Rd., Fh. häufig.
sedi Germ. Rd. 1 Stück.
brevirostre Herbst. Rd. sehr selten.
marchium Herbst. Rd., Fh. häufig.
violaceum Kirby. Fh. selt.
Spencei Kirby. Fh. 1 Stck.
meliloti Kirby. Fh. sehr selten.
virens Herbst. Rd., Fh. häufig.
ononis Kirby. Rd. selten.
loti Kirby. Rd., Fh. je 1 Stück.
aethiops Herbst. Fh. selt.

471. Gattung. Rhynchites. Schneider. Blattroller.
betulae L. Rd., Fh. zieml. häufig.
tomentosus Gyllh. Fh. ziemlich häufig.
germanicus Herbst. Fh. zieml. häufig.
cupreus L. Rd. zieml. hfg.
populi L. Fh. nicht selt.

472. Gattung. Attelabus L. Rollrüßler.
nitens Scop. (curculionides L.) Fh. selten.

473. Gatt. Apoderus. Olivier. Haselrüßler.
coryli L. Rd. nicht selten.

LXI. Fam. **Nemonychidae.**

474. Gatt. Rhinomacer F. Langnasenrüßler.
attelaboides F. Bei Altenstadt 1 ♀.

LXII. Fam. **Ipidae.** Eichhoff. Borkenkäfer.
(Scolytidae Kirby. Bostrichidae F.)

475. Gatt. Scolytus Geoffr. Stutzbastkäfer.
multistriatus Marsh. Fh. sehr selten.

476. Gatt. Hylesinus F. Waldbastkäfer.
fraxini Pauz. Fh. gemein.

477. Gatt. Dendroctonus. Erichson. Baumtöter.
micans. Bei Altenstadt 1 St.

478. Gattung. Hylurgops. Leconte.
palliatus Gyllh. Rd., Fh. hfg.

479. Gatt. Hylastes. Erichs. Holzmacher.
ater Payk. Rd., Fh. nicht selten.
cunicularis Erichson. Rd. nicht selten.
opacus Erichs. Fh. nicht selten.

480. Gatt. Myelophilus (Blastophagus). Eichh.
piniperda L. Fh. selten.

481. Gatt. Polygraphus. Erichson.
polygraphus L. (pubescens F.) Fh. zieml. häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

482. Gattung. Crypturgus. Erichs. Verborgenwirker, Zwergborkenkäfer.
hispidulus Thomson. Rd. 1 Stück.
pusillus Gyllh. Rd. nicht selten.
cinereus Herbst. Rd. nicht selten.

483. Gattung. Cryphalus. Erichs. Baumborkenkäf.
abietes Ratzebg. Rd. nicht selten.

484. Gatt. Xyloterus. Erichs. Holzzerstörer.
lineatus Oliv. Rd. zieml. selt.

485. Gattung. Xylocleptes. Ferrari. Holzdieb.
bispinus Duft. Fh. nicht selten.

486. Gatt. Pityophthorus. Eichhoff.
micrographus L. Rd., Fh. nicht häufig.

487. Gattung. Pityogenes. Bedel.
chalcographus L. Rd., Fh. nicht häufig.

488. Gattung. Ips. Degeer. (Bostrychus F., Tomicus Latr.)
typographus L. Rd. nicht selten.
laricis F. Rd. nicht selten.
suturalis Gyllh. Rd. selten.

489. Gatt. Dryocoetes. Eichh.
autographus Ratzeb. Rd. u. Fh. nicht selten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Pröbstle Leonhard

Artikel/Article: Verzeichnis der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Käfer 187-230