© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Verzeichnis

der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden[1]) in den Jahren 1899 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918

gesammelten Schmetterlinge.

Rd. = Rieden. Fh. = Fellheim.

Abkürzungen von Autornamen:

Auriv. = Chr. Aurivillius. Bois. = Boisduval. Bart. = M. Bartel. Bilb. = Billberger. Bkh. = Borkhausen. Cl. = Clerck. Curt. = Curtis. Dalm. = Dalman. Don. = Donzel. Dup. = Duponchel. Esp. = J. Chr. Esper. Ev. = E. Eversmann. F. = J. Ch. Fabricius. Gn. = A. Guenée. Hb. = J. Hübner. Hein. = H. v. Heinemann. HS. = Herrich-Schäffer. Hufn. = Hufnagel. Hw. = A. H. Haworth. Illg. = Illiger. L. = C. v. Linné. Latr. = P. A. Latreille. Ochs. = F. Ochsenheimer. Rott. = Rottemburg. Sc. = Scopoli. Schiff. = Schiffermiller. Schr. = Fr. Schrank. Steph. = J. F. Stephens. Thbg. = Thunberg. Tr. = Fr. Treitschke. Vill. = F. de Villiers. Wallgr. = Wallengreen. Westw. = Westwood.

A. Rhopalocera.

Keulenhörner.

I. Fam. **Papilionidae.**
Schwanzfalter, Ritter.

1. Gattung. Papilio. L.
Schwanzfalter.

podalirius L. Segelfalter. Rd. u. Fh. nicht selten, jedoch manches Jahr nicht beobachtet.

machaon L. Schwalbenschwanz. Rd. u. Fh. häufig.

2. Gatt. Parnássius. Latr.
Augenspiegel.

apóllo L. Falkenstein bei Pfronten.

(„ v. melliculus, bei

[1]) Über Ortsangaben siehe die Bemerkungen in meinem Käferverzeichnis. In den Jahren 1899 mit 1902 betrieb ich das Sammeln von Schmetterlingen nur im Anschluß an den Käferfang. Deshalb sind von Riedens Umgebung nur wenige Falter aufgezählt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz und bei Blaubeuren von mir gesammelt).

II. Fam. **Pieriedae.** Weißlinge.

1. Gatt. Aporia. Hb. Baumweißling.
   crataegi L. Nicht häufig, manches Jahr gar nicht beobachtet.
2. Gattung. Pieris. Schrk. Krautweißling.
   brassicae L. Kohlw. Rd., Fh. gemein.
   rapae L. Kl. Kohlweißling, Rd., Fh. gemein.
   napi L. Rd., Fh. weniger häufig.
   napi gen. aest. napaeae Esp. Fh.
3. Gattung. Euchloë. Hb. Aurorafalter.
   cardamines L. Schaumkrautfalter. Rd., Fh. nicht selten.
4. Gatt. Colias. F. Kleefalter, Gelblinge.
   hyale L. Gelber Heufalter. Rd., Fh. häufig.
   edusa F. Postillon. Fh. nicht so häufig wie vor.
5. Gatt. Gonopteryx. Latr. Zitronenfalter.
   rhamni L. Rd., Fh. häufig.
6. Gatt. Leptidia. Billb. Senfweißling.
   sinapis L. Fh. ziemlich selten.

III. Fam. **Nymphalidae.**

1. Gattung. Apatura. Ochs. Schillerfalter.
   iris L. Blauschll. Rd., Fh. nicht selten.
   (ilia Schiff. v. clytie Schiff. Rotschll. bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz gesammelt).
2. Gatt. Limenitis. Fabr. Eisfalter.
   populi L. Großer Eisvogel. Fh. sehr selten.
   camilla L. (sibylla L.) Kl. Eisvogel. Fh. sehr selt.; in den Wäldern bei Boos häufiger.
3. Gatt. Vanessa. F. Eckfalter.
   antiopa L. Trauermantel. Rd. u. Fh. nicht selten.
   jo L. Tagpfauenauge. Rd., Fh. gemein.
   urticae L. Kleiner Fuchs; wohl nebst Kohlweißling unser gemeinster Tagfalter.
   polychloros L. Groß. Fuchs. Rd., Fh. seltener.
4. Gatt. Polygonia. Hübn. Weißes C.
   c album L. Fh. nicht hfg.
5. Gatt. Pyrameis. Hb.
   atalanta L. Admiral. Rd., Fh. zieml. häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cardui L. Distelfalter. Fh. häufig.

6. Gattung. Arachnia. Hb. Landkarte.

levana L. Fh. selten; in Wäldern bei Boos häufig.

v. prorsa L. Fh. selten; in Wäldern bei Boos hfg.

7. Gatt. Melitaea. Fabr. Scheckfalter.

aurinia Rott. Ehrenpreisfalter. Fh.

cinxia L. Rd.

(didyma i. d. fränk. Schweiz bei Waischenfeld gesammelt).

athalia Rott. Wachtelweizenfalter. Fh.

dictynna Esp. Punktfalter. im Pleßer Ried.

8. Gatt. Argynnis. F. Perlmutterfalter.

selene Schiff. Gem. Perlm. im Pleßer Ried.

euphrosyne L. Fh. im Gries häufig.

dia L. Klst.Perlmutterf. Fh.

ino Esp. Schillernder Perlmutterfalter. Fh.

latonia L. Kleiner Perlmutterfalter. Fh.

niobe L. Mittlerer Perlmutterfalter. Rd.

adippe L. Hügelperlmutterfalter. Rd.

aglaia L. Großer Perlmutterfalter. Rd., Fh.

paphia L. Silberstrich, Kaisermantel. Rd., Fh. häufig.

9. Gattung. Melanargia. Meigen. Schachspielfalt.

galatea L. Schachbrett. Rd., Fh. häufig.

10. Gatt. Maniola. Schrk. Schwarzlinge. (Erebia. Boisduval.) Kaffeevögel.

medusa F. Buntaugenschw. Rd., Fh. häufig.

„ v. hippomedusa Ochs. Fh. nicht häufig.

aethiops Esp. Waldschwarzling. Fh. selten; häufig. in den Wäldern bei Boos.

ligea L. Fleckenschwanz. Rd. u. Hopfen; auch bei Waischenfeld und Blaubeuren von mir gesamm.

11. Gattung. Satyrus. F. Breitbandringler.

(briseis L. Kl. Waldportier. Bei Waischenfeld in der fränk. Schweiz von mir gesammelt.)

semele L. Ockerbindiger Waldportier. Fh. i. Gries sehr selten; bei Boos häufiger.

dryas Sc. (phaedra). Blaukornauge. Im Pleßer Ried häufig.

12. Gattung. Aphantopus. Wallgr. Grasvogel.

hyperantus L. Rd. u. Fh. hfg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

13. Gatt. Epinephele. Hb. Kuhaugen.
jurtina L. Rd. u. Fh. hfg.
14. Gatt. Coenonympha. Hb. Kleinäugler.
hero L. Braunes Scheinsilberauge. Fh.
iphis Schiff. Weißfleckiger Zittergrasfalter. Fh.
arcania L. Weißbindiger Rostflügel. Fh.
pamphilus L. Klein. Heufalter. Fh.
tiphon Rott. Großer Heufalter. Im Pleßer Ried.
15. Gattung. Pararge. Hb. Scheckaugen.
egeria L. v. egerides Stgr. in den Wäldern bei Boos und Winterrieden nicht selten.
megaera L. Mauerfuchs. Fh. selten.
maera L. Brauner Augenvogel. Fh. zieml. häufig.
achine Sc. In den Wäldern bei Boos häufig.

IV. Fam. **Erycinidae.** Scheckfalter.

Trotz eifriger Mühe ist es mir bisher nicht geglückt, den wohl sicher im Gebiet vorkommenden Nemeobius lucina L. zu beobachten.

V. Fam. **Lycaenidae.**

1. Gatt. Thecla. F. Zipfelfalt.
pruni L. Pflaumenfalter. Fh. selten.
2. Gatt. Callophris. Billb. Grünling.
rubi L. Brombeerfalter.
3. Gatt. Zephyrus. Dalm.
betulae L. Birkenzipfelfalter. Fh. nicht selten; jedoch habe ich bisher nur ♀ erbeutet.
4. Gatt. Chrysophanus. Hb. Goldfalter, Feuerfalter.
(virgaureae L. Dukatenvogel; erbeutete ich bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz).
hippothoë L. Klein. Ampferfalter im Pleßer Ried.
phlaeas L. Goldvogel. Rd. u. Fh.
dorilis Hufn. Brauner Ampferfalter. Fh.
5. Gattung. Lycaena. F. Bläulinge.
argus L. Groß. Silberfleckbläuling. Fh.
icarus Rott. Hauhechelbläuling. Fh.
bellargus Rott. Himmelbl. Bläuling. Fh.
corydon Poda. Grünblauer Bläuling. Fh.
(damone Ev. Esparsetten-Bläuling. Bei Waischenfeld).
semiargus Rott. Violetter Bläuling. Fh.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cyllarus Rott. Ginster-Bläuling. Fh.
euphemus Hb. Moorwiesen-Bläuling. Fh.
arion L. Schwarzgfl. Blg. Fh.

6. Gatt. Cyaniris. Dalm.
argiolus L. Kleiner Argus. Fh. selten.

B. Netrocera.

Spindelhörner.

VI. Fam. **Hesperiidae.** Dickköpfe.

1. Gatt. Pamphila. F. Golddickkopf.
palaemon Pallmer. Gemein. Golddickkopf. Fh.

2. Gattung. Adopaea. Billb.
lineola Ochs. Schwarzkolb. Dickkopf. Fh. sehr hfg.
thaumas Hufe. Rotkolbig. Dickkopf. Fh. seltener.

3. Gatt. Augiades. Hb.
comma L. Kommafalter. Fh. nicht selten.
sylvanus Esp. Walddickkopf. Fh. häufig.

4. Gatt. Carcharodus. Hb. Fensterfleckfalter.
alceae Esp. Malvenfalter. Fh.

5. Gattung. Hesperia. F. Würfelfleck.
carthami Hb. Fh. sehr selten; auch bei Waischenfeld gesammelt, scheint dort nicht selten.
malvae L. Malvenwürfeldickkopf. Fh.

6. Gatt. Thanaos. Boisd.
tages L. Schotenkleedickkopf.

C. Heterocera.

Mit anderen Fühlern.

VII. Fam. **Sphingidae.** Schwärmer.

1. Gatt. Macroglossa. Ochs. Langrüßler.
stellatarum L. Taubenschwanz. Rd., Fh. hfg.

2. Gatt. Deilephila. Ochs. Abendschwärmer.
lineata v. livornica. Esp. 1 Exempl. bei Rd. gefg.
euphorbiae L. Wolfsmilchschwärmer. Fh. aus gesammelten Raupen gezogen. Selten!
galii Rott. Labkrautschw. Fh. aus gesammelter Raupe gezogen. Selten.
vespertilio Esp. Fledermausschwärmer. 1 Expl. bei Rieden erbeutet.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

3. Gattung. Choerocampa. Dup. Weinschwärmer.
elpenor L. Mittl. Weinschwärmer. Rd., Fh. zieml. häufig.
porcellus L. Klein. Weinschwärmer. Rd. seltener.
4. Gatt. Sphinx. Ochs. Echte Schwärmer.
ligustri L. Ligusterschw. Rd., Fh. nicht selten.
convolvuli L. Windenschwärmer. Rd. öfters gesammelt; in Fh. noch nicht beobachtet.
pinastri L. Tannenpfeil. Rd., Fh. zieml. hfg.
5. Gatt. Acherontia. Ochs. Totenkopf.
atropos L. Rd., Fh. aus gesammelten Raupen gezogen; manches Jahr jedoch nicht aufzufinden.
6. Gatt. Smerinthus. Ochs. Zackenschwärmer.
tiliae L. Lindenschwärmer. Rd., Fh. selten.
„ ab. brunnea Bart. Rd. sehr selten.
ocellata L. Abendpfauenauge. Rd., Fh. nicht selt.
populi L. Pappelschwärm. Rd. ziemlich selten.

VIII. Fam. **Notodontidae.** Bois. Rückenzahnspinner.

1. Gatt. Cerura. Schrank. Gabelschwänze.
bifida Hb. Kleiner Gabelschwanz. Fh. aus gesammelten Raupen gezogen; selten.
vinula L. Großer Gabelschwanz. Rd., Fh. wie voriger, jedoch nicht selt.
2. Gatt. Stauropus. Germ.
fagi L. Buchenspinner. Bei Boos sehr selten.
3. Gatt. Notodonta. Ochs. Zahnspinner.
ziczac L. Rd. einige Expl. erbeutet.
phoebe Siebert. Rd. einige Exemplare erbeutet.
4. Gatt. Leucodonta. Stgr.
bicolora Schiff. Weißer Zahnspinner. 1 Stück bei Boos gefangen.
5. Gatt. Pterostoma. Germ.
palpina L. Sichelspinner. Rd. 1 Exemplar.
6. Gattung. Phalera. Hb. Mondvogel.
bucephala L. Mondfleck. Fh. vielfach aus gesammelten Raupen gezogen. An diesem Falter habe ich zum ersten Mal nach dem Schlüpfen die Entfaltg. d. Flügel beobacht.
7. Gatt. Pygaera. Ochs. Afterheber.
curtula L. Fh. sehr selten.

IX. Fam. **Drepanida.** Bois. Sichelflügler.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

1. Gatt. Drepana. Schneider.
falcataria L. Fh., in den Wäldern bei Boos.

X. Fam. **Saturniidae.** Bois.

1. Gatt. Saturnia. B. Nachtpfauenauge.
pavonia L. Kleiner Nachtpfau. Fh. aus gesamm. Raupen gezogen.

2. Gatt. Aglia. Ochs. Nagelfleck.
tau L. Fh. im Walde bei Boos.

XI. Fam. **Lemoniidae.**
Im Gebiet noch keine Art beobachtet.

XII. Fam. **Thaumatopoeidae.**
Bisher im Gebiet keine Art gesammelt.

XIII. Fam. **Endromididae.** Bois.
Nur eine Gattung. Endromis. Ochs. Scheckflügel.
versicolora L. 1 ♂ bei Illereichen gefunden.

XIV. Fam. **Lasiocampidae.**
Auriv. Echte Spinner. Glucken.

1. Gatt. Malacosoma. Hb.
neustria L. Ringelspinner. Fh. nicht selten.
(castrensis L. Wolfsmilchspinner. Bei Waischenfeld gefangen.

2. Gatt. Lasiocampa. Schr. Zottenspinner.
quercus L. Eichenspinner. Fh. nicht selten; auch aus gesammelten Raupen gezogen.
trifolii Esp. Fh. wie vor.

3. Gatt. Macrothylacia. Ramb.
rubi L. Brombeerspinn. Fh.

4. Gatt. Cosmotriche. Hb.
potatoria L. Grasglucke. Fh. des öfteren gezüchtet.

5. Gatt. Gastropacha. Ochs.
quercifolia L. Eichenblatt. Rd., Fh. selten; auch aus gef. Raupen gezogen.

6. Gattung. Dendrolimus. Germ.
pini L. Fichtenspinner. Rd., Fh. nicht selten; in verschied. Aberationen.

XV. Fam. **Lymantriidae.** Bois. Streckfüße.

1. Gattung. Orgya. Ochs. Bürstenbinder.
gonostigma F. Beinstrecker. Fh. manches Jahr nicht selten; auch gezüchtet.
antiqua L. Die Alte. Fh. wie voriger.

2. Gatt. Dasychira. Steph. Wollfuß.
fascelina L. Rötl. Streckfuß. Rd.
pudibunda L. Gemeiner Streckfuß. Rd.

3. Gatt. Stilpnotia. Westw. Ringelfuß.
salicis L. Weidenspinner. Fh. gemein.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

4. Gatt. Lymantria. Hb. Schwammspinner.
dispar L. Gem. Schwammspinner. Fh. nicht hfg.
monacha L. Nonne. Fh. in letzterer Zeit selten.
5. Gatt. Porthesia. Steph. Schwan.
similis. Fueßl. Heller Goldafter. Fh. häufig.
6. Gatt. Euproctis. Hb. Goldafter.
chrysorrhoéa L. Dunkler Goldafter. Fh. selten.

XVI. Fam. **Noctuidae.** Eulen.
a) Acronyctinae.
1. Gattung. Panthea. Hb. Mönch.
coenobita Esp. Rd. selten.
2. Gatt. Acronycta. Ochs. Buntraupeneule.
megacephala F. Großkopfeule. Fh. häufig.
tridens Schiff. Dreizackeule. Fh. häufig.
psi L. Pfeileule. Fh. ziemlich selten.
auricoma F. Goldhaareule. Fh. häufig.
rumicis L. Ampfereule. Fh. nicht häufig.
3. Gatt. Graniophora. Snell.
ligustri F. Ligustereule. nicht häufig.
b) Trifinae.
4. Gattung. Agrotis. Ochs. Feldeule.
fimbria L. Gelbe Bandeule. Rd. nicht selten.
„ a. rufa Tutt. Rd. selten.
„ a. brunnea Tutt. Rd. selt.
punicea Hb. Fh. sehr selt. (bisher nur 3 Stück gefangen!)
augur. Braungraue Feldeule. Fh. häufig.
pronuba L. Hausmutter. Fh. häufig.
„ ab. innuba Fr. Fh. seltener.
baja F. Unscheinbare. Fh. häufig.
c nigrum L. Schwarzes C. Fh. zieml. häufig.
ditrapezium Bkh. Fh. nicht häufig.
xanthographa Schiff. Gelbmackeleule. Fh. häufig.
rubi View. Brombeerfeldeule. Fh. selten.
brunnea F. Braune Feldeule. Fh. nicht selten.
plecta L. Blindlatticheule. Fh. nicht selten.
putris L. Brandflügeleule. Fh. selten.
exclamationis L. Fragezeicheneule. Fh. häufig.
nigricans L. Schwärzliche Feldeule. Fh. selten.
corticea Hb. Rindenfarb. Feldeule. Fh. selten.
ypsilon Rott. Ypsiloneule. F. häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

segetum Schiff. Saateule. Fh. häufig.
prasina F. Lauchgrüne Feldeule. Fh. häufig.
5. Gattung. Sora. Hein.
leucographa. Fh. selten.
6. Gatt. Charaeas. Steph. Graseule.
(graminis L. Bei Waischenfeld gesammelt.)
7. Gattung. Epineuronia. Rebel. Locheule.
popularis F. Rd. selten.
8. Gattung. Mamestra. Tr. Gemüseeulen.
leucophaea View. Weißgraue Garteneule. Fh. nicht selten.
advena F. Fremdling. Fh. ziemlich häufig.
nebulosa Hufn. Bewölkte Garteneule. Fh. häufig.
brassicae L. Kohleule. Fh. häufig.
persicariae L. Knöterich-eule. Fh. häufig.
oleracea L. Gemüseeule. Fh. selten.
genistae Bkh. Ginstereule. Fh. nicht selten.
thalassina Rott. Berberitzeneule. Fh. nicht hfg.
pisi L. Erbseneule. Fh. selt.
nana Hufn. (dentina Esp.) Fh. selten.
reticulata Vill. Genetzte Eule. Fh. selten.
chrysozona Bkh. Gelbgürtel-eule. Fh. selten.
9. Gatt. Dianthoecia. Boisd. Kapseleule.
nana Rott. (conspersa Esp.) Fh. selten.
rivosa Strom. (cucubali Fuessl.) Fh. selten.
carpophaga Bkh. Fh. selt.
10. Gatt. Miana. Steph. Farbeule.
strigilis Cl. Striegeleule. Fh. häufig.
„ ab. aethiops Hw. Mohreule. Fh. seltener.
„ v. latruncula Hb. Fh. wie voriger.
11. Gatt. Bryophila. Tr. Mooseule.
algae F. Algeneule. Fh. sehr selten.
(perla F. Perleule. Bei Waischenfeld gesammelt.)
12. Gatt. Diloba. Boisd. Zweilappeneule.
caeruleocephala L. Blaukopf. Fh. zieml. häufig.
13. Gattung. Hadena. Schr. Wurzeleule.
porphyrea Esp. Porphyreule. Fh. selten.
adusta Esp. Fh. sehr selt.
monoglypha Hufn. Fh. häufiger.
lithoxilea F. Fh. selten.
rurea ab. alopecurus. Fh. nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

basilinea F. Wurzelstricheul. Bei Winterrd. 1 St. erbeut.
secalis L. (didima Esp.) Zwillingseule. Fh. nicht selten.
„ ab. nictitans Esp. Blinzeleule. Fh. etwas seltener.

14. Gatt. Polia. Tr. Weißl. Eule.
chi L. Chi-Eule. Fh. selt.

15. Gatt. Brachionycha. Hb. Klaueneule.
sphinx Hufn. Fh. selten.

16. Gattung. Miselia. Steph.
oxyacanthae L. Sonnenscheue Weißdorneule. Fh. nicht selten.

17. Gattung. Dichonia. Hb.
aprilina L. Aprileule. Fh. sehr selten.

18. Gatt. Rhizogramma. Led.
detersa Esp. Fh. sehr selt.

19. Gatt. Chloantha. Boisd.
polyodon Cl. Zahnwelleneule. Fh. selten.

20. Gattung. Trachea. Hb.
atriplicis L. Meldeneule. Fh. häufig.

21. Gatt. Euplexia. Steph.
lucipara L. Flammeneule. Fh. zieml. selten.

22. Gatt. Brotolomia. Led.
meticulosa L. Scheintoteule. Fh. häufig.

23. Gatt. Mania. Treitschke.
maura L. Schwarz. Ordensband. Fh. 1 Expl. gef.

24. Gatt. Jaspidea. Boisd. Jaspiseule.
(celsia L. Grüne Kreuzeule bei Waischenfeld 1 Expl. erbeutet.)

25. Gattung. Hydroecia. Guenée.
nictitans Bkh. Ufereule. Fh. sehr selten.

26. Gattung. Calamia. Hb. Rohreule.
lutosa Hb. 1 ♀ bei Rd. gefangen.

27. Gatt. Leucania. Ochs. Lichte Eulen.
impudens Hb. Fh. zieml. selten.
impura Hb. Unreine Graseule. Fh. etwas häufiger.
vitellina Hb. Dottergelbe Graseule. Fh. selten.
conigera F. Zapfentragende Graseule. Fh. selten.
albipuncta F. Weißpunkt-Graseule. Fh. nicht selt.
lithargyrea Esp. Bleifarb. Graseule. Fh. nicht selt.
turca L. Türken-Eule. Fh. sehr selten; bisher 1 Expl. gefangen.

28. Gatt. Gammesia. Steph.
trigrammica Hfn. 3 Linieneule. Fh. häufig.

29. Gatt. Caradrina. Ochs. Glanzeule.
quadripunctata F. 4 punktige Glanzeule. Fh. hfg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

alsines Brahm. Hühnerdarmeule. Fh. häufig.
taraxici Hb. Löwenzahneule. Fh. selten.

30. Gatt. Rhusina. Bois.
umbratica Goeze. Schatteneule. Fh. zieml. häufig.

31. Gatt. Amphipyra. Ochs. Laufeule.
tragopogonis L. Bocksbarteule. Fh. zieml. häufig.
pyramidea L. Pyramideneule. Fh. häufiger als vorige.

32. Gattung. Taeniocampa. Guenée. Frühlingseulen.
stabilis View. Laubholzeule. Fh. selten.

33. Gatt. Mesogona. Boisd. Winkeleulen.
oxalina Hb. Sauerkleeeule. Fh. zieml. häufig.

34. Gattung. Calymnia. Hb. Ulmeneulen.
affinis L. Verwandte Ulmentaube. Fh. nicht selten.
trapezina L. Trapez-Eule. Fh. nicht selten.

35. Gattung. Dyschorista. Lederer.
fissipuncta Hw. Pappelrindeneule. Fh. selten.

36. Gatt. Orthosia. Ochs. Geradstricheulen.
lota Clerk. Wollweideneule. Fh. nicht selten.
circellaris Hufn. Kreismackeleule. Fh. zuweil. häufig.
pistacina F. Fh. selten.
litura L. Fleckeneule. Fh. nicht selten.

37. Gattung. Xanthia. Tr. Goldgelbeule. Kätzcheneule.
fulvago L. Bräunlichgelbe Kätzcheneule. Fh. hfg.

38. Gattung. Orrhodia. Hb.
vau punctatum Esp. Vau-Eule. Fh. nicht selten.

39. Gattung. Scopelosoma. Curt.
satellitium L. Mordraupeneule. Fh. selten.

40. Gattung. Xylina. Ochs. Holz- oder Rindeneulen.
socia Rott. Gelbgraue Rindeneule. Fh. nicht häufig.
furcifera Hufn. Blaugraue Rindeneule. Fh. sehr selt.

41. Gatt. Calocampa. Steph. Moderholzeulen.
vetusta Hb. Fh. sehr selt.
exoleta L. Fh. etwas wenig. selten als vorige.

42. Gatt. Cucullia. Schrk. Mönchseulen.
thapsiphaga Tr. Wollkrautfresser. Fh. selten.
umbratica L. Schattenmönchseule. Fh. selten.
lactucae Esp. Lattichmönch. Fh. sehr selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

43. Gatt. Pyrrhia. Hbn. Feuereule.
umbra Hufn. Braune Feuereule. Fh. sehr selten.
44. Gatt. Erastria. Ochs. Graseulen.
argentula Hb. Silberstreif. Graseule. Fh. häufig.
uncula Cl. Hackengraseule. Fh. häufig.
deceptoria Sc. Trügerische Graseule. Fh. selten.
fasciana L. Gebänderte Graseule. Fh. selten.
45. Gatt. Rivula. Guenée. Bacheule.
sericealis Sc. Seidenglanz-Bacheule. Fh. sehr selt.
c. Scoliopteryginae.
46. Gattung. Scoliopteryx. Germ. Krummflügeleule.
libatrix L. Krebssuppe. Fh. sehr häufig.
d. Quadrifinae.
47. Gatt. Habrostola. Ochs.
triplasia L. Fh. sehr selt.
tripartita Hufn. Fh. selten.
48. Gattung. Plusia. Ochs. Metall- oder Goldeulen.
moneta F. Eisenhutgold. Fh. selten.
variabilis Pall. Veränderl. Goldeule. Fh. sehr selten.
modesta Hb. Bescheidene Goldeule. Fh. sehr selt.
chrysitis L. Messingeule. Fh. häufig.
bractea F. Goldblatteule. Rd. 1 Expl. gefangen.
gamma L. Pistolenvogel. Fh. gemein.
49. Gatt. Euclidia. Ochs. Wieseneule.
mi Cl. M-Wieseneule. Fh. hfg.
glyphica L. Braune Wieseneule. Fh. häufig.
50. Gatt. Catocala. Schr. Ordensbänder.
fraxini L. Blaues Ordensband. Fh. selten.
electa Bkh. Weidenkarmin. Fh. sehr häufig.
nupta L. Rotes Ordensband. Fh. selten.
51. Gatt. Toxocampa. Gn. Wickeneulen.
pastinum Tr. Violettegraue Wickeneule. Fh. selten.
e. Hypeninae.
52. Gatt. Laspeyria. Germ.
flexula Schiff. In den Wäldern bei Boos selten.
53. Gatt. Zanclognatha. Led.
tarsipennalis Tr. Federfußeule. Fh. nicht selten.
54. Gatt. Madopa. Steph. Kahlaugeneule.
salicalis Schiff. Weidenkahlaugeneule. Fh. selt.
55. Gatt. Boniolocha. Hb.
fontis Thunbg. Schmarotzereule. Fh. zieml. selten.
56. Gattung. Hypena. Tr. Barteule.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

proboscidalis L. Nesselbarteule. Fh. nicht selt.
rostralis L. Hopfenschnabeleule. Fh. selten.
obesalis Tr. Fette Barteule. Fh. selten.

XVII. Fam. **Cymatophoridae.** Spinnereulen.

1. Gatt. Habrosyne. Hb. (Gonophora Brd.)
derasa L. Achateule. Fh. zieml. häufig.
2. Gatt. Thyatira. Ochs.
batis L. Rosenvogel. Fh. häufig.
3. Gatt. Cymatophora. Tr.
flavicornis L. (or F.) Gelbhorn. Fh. häufig.
duplaris L. Doppelpunkteule. Fh. häufig.

XVIII. Fam. **Brephidae.**

Bisher noch keine Art beobacht.

XIX. Fam. **Geometridae.** Spanner.

a. Geometrinae.
1. Gattung. Geometra L.
papilionaria L. Grünblatt. Fh. sehr selten.
2. Gattung. Euchloris. Hb.
vernaria Hb. Fh. sehr selt.
3. Gattung. Thalera. Hb.
putata L. Fh. zieml. selt.

b. Acidaliinae.
4. Gattung. Acidalia. Tr. Kleinspanner.
similata Thnbg. Bei Boos nicht selten.
dimidiata Hufn. Halbierter Kleinspanner. Fh. nicht selten.
virgularia Hb. Fh. nicht slt.
bisetata Hufn. Zweiborstenkleinspanner. Fh. nicht selten.
aversata L. Abändernder Kleinspanner. Fh. nicht selten.
„ ab. spoliata Stgr. Fh. sehr selten.
immorata L. Fh. selten.
remutaria Hb. Fh. nicht selten.
strigillaria Hb. Fh. selten.
ornata Sc. Geschmückter Kleinspanner. Fh. nicht selten.
5. Gatt. Timandra. Dup.
armata L. Fh. nicht selten.

c. Larentiinae.
6. Gattung. Ortholitha. Hb. Steinspanner.
limitata Sc. Fh. nicht selt.
bipunctaria Schiff. Fh. hfg.
7. Gatt. Minoa. Tr.
murinata Sc. Wolfsmilchsp. Fh. zieml. selten.
8. Gattung. Odezia. Bois.
atrata L. Trauerspanner. Fh. selten.
9. Gattung. Anaitis. Dup.
praeformata Hb. Fh. sehr selten.
10. Gatt. Lobophora. Curt. Lappenspanner.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

sexalata Retz. Fh. zieml. selten.

11. Gatt. Operophthera. Hb. (Cheimatobia. Steph.) Frostspanner.

brumata L. Fh. nicht selt.

12. Gatt. Thriphosa. Steph.

dubitata L. Fh. zieml. selt.

13. Gatt. Eucosmia. Steph.

certata Hb. Fh. nicht selt.

undulata L. Fh. selten.

14. Gatt. Scotosia. Steph. Wegdornspanner.

vetulata Schiff. Fh. nicht selten.

rhamnata Schiff. Fh. nicht selten.

15. Gattung. Lygris. Hb. Langleibspanner.

reticulata F. Bei Boos zieml. selten.

prunata L. Fh. selten.

testata L. Fh. nicht selt.

populata L. Fh. ziemlich selten.

16. Gattung. Larentia. Tr. (Cidaria). Schattenspanner.

dotata L. Fh. selten.

fulvata Forst. Fh. sehr selt.

ocellata L. Fh. selten.

bicolorata Hufn. Fh. selt.

variata Schiff. Fh. nicht selten.

siterata Hufn. Fh. zieml. selten.

truncata Hufn. Fh. nicht slt.

olivata Bkh. Fh. selten.

viridaria F. Fh. selten.

fluctuata L. Fh. häufig.

montanata Bkh. Fh. nicht häufig.

quadrifasciaria Cl. Fh. nicht häufig.

ferrugata Cl. Fh. nicht selt.

pomoeriaria Ev. Fh. sehr selten.

dilutata Bkh. Fh. sehr selt.

sociata Bkh. Fh. nicht selt.

albicillata L. Fh. nicht selt.

procellata F. Fh. selten.

hastata L. Fh. zieml. selt.

tristata L. Fh. häufig.

testaceata Don. Fh. selt.

obliterata Hufn. Fh. selt.

bilineata L. Fh. häufig.

sordidata F. Fh. selten.

autumnalis Ström. Fh. sehr häufig.

capitata H. S. Fh. selten.

corylata Thunbg. Fh. selt.

berberata Schiff. Fh. selt.

comitata L. Fh. sehr selten.

17. Gatt. Tephroclystia. Hübner.

succenturiata L. Fh. selt.

18. Gatt. Chloroclystis. Hb.

rectangulata L. Fh. selten.

19. Gatt. Phibalapteryx. Steph.

tersata Schiff. Fh. selten.

d. Orthostixinae.

Von dieser Gruppe habe ich bisher keine Art gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

e. Boarmiinae.

20. Gatt. Abraxas. Leach.
grossulariata L. Stachelbeerspanner. Fh. häufig.
sylvata Sc. Waldulmenspanner. Fh. ziemlich selten.
marginata L. Fh. sehr hfg.

21. Gattung. Bapta. Steph.
bimaculata F. Fh. selten.
temerata Hb. Fh. nicht selten.

22. Gattung. Deilinia. Hb.
pusaria L. Fh. nicht selten.
exanthemata Sc. Fh. nicht selten.

23. Gattung. Ellopia. Tr.
prosapiaria **v.** prasinaria Hb. In den Wäldern bei Boos.

24. Gatt. Metrocampa. Latr.
margaritaria L. In den Wäldern bei Boos selten.

25. Gatt. Selenia. Hübner. Mondfleckspanner.
bilunaria **g. aes.** juliaria Hw. Fh. sehr selten.

26. Gatt. Hygrochroa. Hb.
syringaria L. Fliederspann. Bei Boos sehr selten.

27. Gatt. Angerona. Dup.
prunaria L. Schlehenspann. Fh. häufig.
„ ab. sordiata Fuessl. Fh. seltener.

28. Gatt. Urapteryx. Leach.
sambucaria L. Hollunderspanner. Rd., Fh. sehr slt.

29. Gattung. Epione. Dup.
apiciaria Schiff. Fh. nicht selteu.
parallelaria Schiff. Fh. sehr selten.
advenaria Hb. Frühlingsspanner. Fh. nicht selt.

30. Gattung. Venilia. Dup.
macularia L. Taubnesselspanner. Fh. häufig.

31. Gatt. Semiothisa. Hb.
alternaria Hb. Fh. selten.
signaria Hb. Fh. selten.
liturata Cl. Im Walde von Boos nicht selten.

32. Gatt. Hibernia. Latr.
bajaria Schiff. Fh. häufig.
leucophaearia Schiff. Fh. häufig.
aurantiaria Esp. Fh. selt.

33. Gattung. Boarmia. Tr. Rindenspanner.
cinctaria Schiff. Bei Boos selten.
perversaria Bois. Fh. selt.
repandata L. Wellenflügelspanner. Fh. häufig.
„ ab. maculata Stgr. Fh. 1♂.
lichenaria Hufn. Flechtenspanner. Fh. selten.

34. Gattung. Gnophos. Tr.
furvata Schiff. Fh. sehr selten.
obscuraria Hb. Fh. selten.
dilucidaria Schiff. Bei Boos selten.

35. Gatt. Hematurga. Led.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

atomaria L. Heidekrautspanner. Fh. häufig.

36. Gatt. Bupalus. Leach.
pinarius L. Kieferspanner. Fh. nicht selten.

37. Gatt. Thamnonoma. Led.
wauaria L. Fh. zieml. hfg.

38. Gatt. Phasiane. Dup.
clathrata L. Gitterflügelspanner. Fh. häufig.

39. Gattung. Scoria. Steph.
lineata Sc. Fh. selten (auch bei Waischenfeld, fränk. Schweiz).

XX. Fam. **Nolidae.**

Bisher keine Art im Gebiet gefunden.

XXI. Fam. **Nycteolidae (Cymbidae).**

1. Gattung. Earias. Hübner.
chlorana L. Fh. nicht selt.

XXII. Fam. **Synthomidae.** H. S. Stutzflügler.

1. Gatt. Syntomis. Ochs.
phegea L. Weißfleckiger Stutzflügel. Fh. sehr selt.

XXIII. Fam. **Arctiidae.** Steph. Bären.

1. Gatt. Spilosoma. Steph. Fleckenbären.
lubricipedum Esp. Gelber Fleckbär. Fh. selten.
menthastri Esp. Minzenfleckbär. Fh. selten.

2. Gatt. Phragmatobia. Steph.
fuliginosa L. Zimmtbrauner Fleckbär. Fh. nicht selt. Auch aus Raupen gezogen.

3. Gattung. Parasemia. Hb. Wiesenbären.
plantaginis L. Wegerichbär. Fh. häufig.
„ v. et ab. hospita Schiff. Fh. seltener.

4. Gattung. Rhyparia. Hb.
purpurata L. Fh. sehr selt. 2 Stück aus gesammelten Raupen gezogen.

5. Gattung. Diacrisia. Hb.
sannio L. (russula L.) Fh. häufig.

6. Gattung. Arctia. Schrk. Bär.
caja L. Gemeiner Bär. Fh. häufig; auch gezüchtet.

7. Gatt. Callimorpha. Latr.
dominula L. Jungfernbär. Rd. und bei Boos selten.

8. Gatt. Hypocrita. Hb. (Euchelia.)
jacobaeae L. Jakobsbär. Fh. häufig.

9. Gattung. Endrosa. Hb. Mottenspinner.
irrorella Cl. Fh. nicht selt.

10. Gattung. Cybosia. Hb.
mesomela L. Elfenbeinmottenspinner. Fh. zieml. häufig.

11. Gattung. Atolmis. Hb. (Gnophria. Steph.)
rubricollis L. Rothals. Fh. selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

12. Gatt. Oeonistis. Hb. Flechtenspinner.
quadra L. Fh. u. Boos zieml. häufig.
13. Gatt. Lithosia. Fabr. Flechtenspinner.
deplana Esp. Fh. selten.
lurideola Zink. Bei Boos nicht selten.

XXIV. Fam. **Anthroceridae.** (Zygaenidae). Widderchen.
1. Gatt. Anthrocera. Scop. Schwarzhorn, Blutstropf.
purpuralis Brünich. Fh. nicht selten.
achilleae Esp. Schafgarben-widderchen. Rd. selten.
meliloti Esp. Wicken-widderchen. Fh. nicht selten.
filipendulae L. Steinbrech-widderchen. Fh. nicht selten.
transalpina Esp. v. astragali Bkh. Rd. selten.
2. Gatt. Procris. F. (Ino. Leach.)
statices L. In den Wäldern bei Boos nicht selten.

XXV. Fam. **Cochlidiidae.** Schneckenraupenfalter.
1. Gatt. Cochlidion. Hb.
limacodes Hfn. Fh. selten.

XXVI. Fam. **Psychidae.** Sackträger.
1. Gattung. Sterrhopteryx. Hübner.
hirsutella Hb. Rauhhaarig. Sackträger. Fh. sehr selt.
2. Gatt. Epichnopteryx. Hb.
pulla Esp. Grauschwarzer Sackträger. Fh. nicht slt.

XXVII. Fam. **Pyralidae.** Lichtmotten. Zünsler.
1. Gattung. Aphomia. Hb. Hummelnestzünsler.
sociella L. Fh. nicht selten.
2. Gatt. Galleria. F. Wachszünsler.
melonella L. Fh. selten.
3. Gatt. Crambus. F. Langtaster-Zünsler.
tristellus Schiff. Silberpfeil. Fh. nicht selten.
perlellus Sc. Perlenzünsler. Fh. nicht selten.
margaritellus Hb. Perlmuschelzünsler. Fh. nicht selten.
pinellus L. Fh. selten.
myellus Hb. Fh. nicht selt.
chrysonuchellus Sc. Fh. nicht selten.
hortuellus Hb. Fh. selten.
culmellus L. Halmzünsler. Fh. nicht selten.
pratellus L. Wiesenzünsler. Fh. nicht selten.
pascuellus L. Weidenzünsl. Fh. sehr selten.
4. Gattung. Catastia. Hb.
marginea Schiff. Goldfrans. Trauerzünsler. Bei Boos sehr selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

5. Gatt. Salebria. Zeller.
semirubella Scop. Fh. zuweilen häufig.
6. Gattung. Aglossa. Latr.
pinquinalis L. Fettzünsler. Fh. nicht selten.
7. Gattung. Pyralis. L.
farinalis L. Mehlzünsler. Fh. nicht selten.
8. Gatt. Nymphula. Schr. Nymphe.
stagnata Don. Wasserzünsler. Fh. nicht selt.
nymphaeata L. Seerosenzünsler. Fh. seltener als voriger.
9. Gatt. Perinephele. Hb.
lancealis Schiff. Lanzenzünsler. Fh. selten.
10. Gatt. Psammotis. Hb.
hyalinalis Hb. Glaszünsler. Fh. selten.
11. Gatt. Eurrhypara. Hb.
urticata L. Nesselzünsler. Fh. zieml. häufig.
12. Gattung. Scoparia. Hw.
crataegella Hb. Weißdornzünsler. Fh. sehr selten.
13. Gatt. Syllepta. Hb.
ruralis Sc. Schönzünsler. Fh. nicht selten.
14. Gattung. Pionea. Gn.
stachydalis Zk. Zistzünsler. Fh. selten.
forficalis L. Kohlzünsler. Fh. selten.
olivalis Schiff. Fh. selten.
15. Gatt. Pyrausta. Schrk.
sambucalis Schiff. Hollunderzünsler. Fh. selten.
nubilalis Hb. Fh. nicht selten.
aurata Sc. Goldzünsler. Fh. nicht selten.
16. Gatt. Dioryctria. Z.
abietella Schiff. Tannenzünsler. Fh. und bei Boos sehr selten.

XXVIII. Fam. **Thyrididae.**

Einzige Gattung: Thyris Illg.
fenestrella Sc. Fensterflügler. Fh. sehr selten.

XXIX. Fam. **Tortricidae.** Wickler.

1. Gattung. Acalla. Hb.
emargana F. Fh. selten.
variegana Schiff. Blattwickler. Fh. nicht selt.
2. Gattung. Pandemis. Hb.
corylana F. Nußwickler. Fh. nicht selten.
3. Gatt. Tortrix. L. Echte Wickler.
ministrana L. Fh. nicht selten.
viridana L. Eichenwickler. In den Wäldern bei Boos nicht selten.
paleana Hb. Fh. ziemlich selten.
wahlbomiana L. Buschwickler. Fh. selten.
4. Gattung. Phalonia. Hb. (Conchylis Leder.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

aleella Schulze. Fh. selten.
5. Gatt. Euxanthis. Hb.
hamana L. Fh. selten.
6. Gatt. Olethreutes. Hb. (Argyroploce Hb.)
pruniana Hb. Zwetschgenwickler. Fh. nicht selt.
7. Gatt. Notocelia. Meyr.
uddmanniana L. Fh. selten.
8. Gattung. Epiblema. Hb.
trigeminana Steph. Fh. selt.
9. Gatt. Carpocapsa. Tr.
pomonella L. Apfelwickler. Fh. nicht selten.

XXX. Fam. **Cossidae.** Holzbohrer.
1. Gattung. Cossus. F.
cossus L. (ligniperda). Weidenbohrer. Fh. nicht selten.

XXXI. Fam. **Aegeriidae. (Sesiidae)** Glasflügler.
1. Gatt. Aegeria. F. (Trochilium).
apiformis Cl. Bienenschwärmer. Fh. sehr selten.
2. Gatt. Sciapteron. Stgr.
tabaniforme Rott. Bremsensesie. Fh. sehr selten.
3. Gatt. Trochilum. Scop.
tipuliforme Cl. Johannisbeersesie. Fh. sehr selt.
spheciforme Gerning. Wespensesie. Fh. sehr selt.

XXXII. Fam. **Pterophoridae.** Federmotten, Geistchen.
1. Gatt. Platyptilia. Hb.
gonodactyla Schiff. Graugeistchen. Fh. ziemlich selten.
2. Gatt. Pterophorus. Geoffr.
lithodactylus Tr. Spitzfedergeistchen. Fh. selten.
3. Gatt. Alucita. Wlsghm.
pentadactyla L. Fünffedergeistchen. Fh. nicht selten.

XXXIII. Fam. **Gelechiidae.** Schmalflügelmotten.
1. Gattung. Psecadia. Hb. Vogelkotmotte.
decemgutella Hb. Fh. zieml. selten.
funerella F. Fh. nicht selten.
2. Gatt. Depressaria. Hw. Flachleibmotte.
albipunctella Hb. Fh. selt.
3. Gattung. Endrosis. Hb.
lacteella Schiff. Fh. nicht selten.
4. Gattung. Tachyptilia. Heinemann.
populella Cl. Espeneinpunktmotte. Fh. nicht selten.

XXXIV. Fam. **Hyponomeutidae.** Schnauzenmotten.
1. Gattung. Hyponomeuta. Latr.
plumbellus Schiff. Fh. nicht selten.
malinellus Zeller. Apfelschnauzenmotte. Fh. ziemlich häufig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cognatellus Hb. Fh. nicht häufig.

2. Gatt. Cerostoma. Latr.
radiatellum Don. Fh. nicht selten.

XXXV. Fam. **Tineidae.** Motten.

1. Gatt. Trichophaga. Rag.
tapetiella L. Tapetemotte. Fh. selten.

2. Gattung. Nematois. Hb. Langhornmotten.
metallicus Poda. Messinglanghornmotte. Fh. ziemlich häufig.

3. Gatt. Adela. Latr. Langfühlermotte.
degeerella L. Gelbband-Langhornmotte. Fh. ziemlich häufig.

XXXVI. Fam. **Gracilaridae.**

1. Gattung. Gracilaria. Zeller.
alchimiella Sc. Fh. nicht selten.

XXXVII. Fam. **Hepiolidae.** Wurzelbohrer.

1. Gattung. Hepiolus. F.
humili L. Großer Hopfenwurzelbohrer. F. zieml. häufig.
hecta L. Kleinster Hopfenwurzelbohrer. Fh. nicht selten.

NB.! Ich habe im Gebiete noch eine hübsche Anzahl von Mikrolepidopteren (Kleinschmetterlingen) beobachtet; allein deren Bestimmung und Präparation fiel mir zu beschwerlich, zumal mein Hauptaugenmerk der Käferwelt gewidmet ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Pröbstle Leonhard

Artikel/Article: Verzeichnis der vom Hauptlehrer LeonhardPröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1899 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Schmetterlinge 231-250