© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Index zu M. Britzelmayr's Hymenomyceten-Arbeiten

von

Prof. Dr. Franz v. Höhnel

in

WIEN.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Um die Benützung von M. Britzelmayr's Arbeiten über die deutschen Hymenomyceten zu erleichtern habe ich mir einen Index hergestellt, der zunächst zu meinem eigenen Gebrauch bestimmt, durch diese Veröffentlichung auch Anderen zugänglich gemacht wird.

M. Britzelmayr's Arbeiten bestehen aus einem teils in den Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Augsburg, teils im „Botanischen Centralblatt" publizierten aus 19 Teilen bestehenden Texte (468 Seiten), und aus 761 selbständig (bei Friedländer in Berlin) publizierten Tafeln.

Der Index besteht aus 4 Teilen.

I. Der erste Teil gibt ein Verzeichnis der 19 Textpublikationen. Die 15 ursprünglichen Veröffentlichungen sind im Index zusammen als ein Band von 390 Seiten gedacht; die darin enthaltenen Angaben sind in der Weise zitiert, dass einfach die Seite dieses Bandes angegeben ist wo sich die betreffende Angabe befindet. Im ersten Teile des Indexes geben die in Klammern stehenden Zahlen (1—18), (19—34), etc. an, welche Seitenzahlen des Bandes den Seiten der einzelnen 15 Mitteilungen entsprechen. So ist beispielweise: Hymenom. aus Südbayern im 28. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins p. 122 als p. 94 zitiert. Da Jeder, der Britzelmayr's Arbeiten mit Vorteil benützen will, die Separatabzüge zur Hand haben muss, kann er sich diesen alle 15 Mitteilungen enthaltenden Band herstellen, und die hier im Indexe angewendete Paginierung anbringen.

Die 4 Revisionen der Diagnosen sind im Index nach den Seitenzahlen der Separatabdrücke zitiert.

II. Der zweite Teil des Index bezieht sich auf die Anordnung der 761 Tafeln. Hier finden sich die Angaben, auf welchen Tafeln die einzelnen Gattungen etc. dargestellt sind. In jeder Gattung oder Gruppe (z. B. Leucospori) sind die Tafeln nach den fortlaufenden Nummern der Arten (die auf den Tafeln angegeben sind) geordnet.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

III. Der dritte Teil ist der eigentliche Index. Er führt die einzelnen Gattungen in systematischer Reihenfolge auf. In jeder Gattung sind die Arten alphabetisch geordnet. Die von Britzelmayr aufgestellten Arten sind durch Fettdruck herausgehoben. Die Index-Tabellen dieses III. Teiles zeigen fünf Kolumnen. Die erste Kolumne enthält den Artnamen; die zweite die Nummern der Tafeln; die dritte die Nummern der Arten auf den betreffenden Tafeln; die vierte die Seitenzahlen in dem zu einem Bande von 390 Seiten zusammengefassten 15 ursprünglichen Text-Mitteilungen, und bei den Britzelmayr'schen Arten auch der Separat-Abdrücke der 4 Revisionen der Diagnosen; die fünfte Kolumne zeigt Britzelmayr's Angaben über die Sporengrössen in μ; die sechste endlich enthält einige Angaben über die Sporengrössen von anderen Autoren. Die hiebei gebrauchten Abkürzungen der Autoren-Namen sind am Schlusse des Indexes erklärt. Da Quélet (in flore mycologique) keine Breitenangaben macht, sind bei diesem Autor noch Angaben über die Sporenform beigefügt (z. B. sph. = sphaerique u. s. w.).

IV. Der vierte Teil des Indexes enthält die Artnamen aller in Britzelmayr's Arbeiten erwähnten Pilze alphabetisch angeordnet, mit Beifügung der Gattung, in welcher die Art zu finden ist. Der Schluss des Indexes erklärt die bei den Autoren-Namen gebrauchten Abkürzungen.

Ich übergebe diesen Index der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, dass er seinen Zweck, die vielen brauchbaren Angaben in Britzelmayr's Hymenomyceten-Arbeiten für die Kenntnis der mitteleuropäischen Pilze besser und vollständiger, als dies bisher der Fall war nutzbar zu machen, möglichst ausgiebig erfüllen möge.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

I. Teil des Index.

I.

Die Hymenomyceten Augsburgs und seiner Umgebung. Von Britzelmayr. (Mit 10 Tafeln). 25. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. 1879. p. 21—36. (1—18).

II.

Hyporhodii und Leucospori aus Südbayern. 26. Bericht des Nat. Ver. in Augsburg. p. 135—148. (19—34).

IIIa.

Dermini aus Südbayern. (Mit 19 Tafeln). p. 1—8. (35—42). Berlin, Friedländer & Sohn. 1882.

IIIb.

Dermini und Melanospori aus Südbayern. 27. Ber. d. Nat. Ver. Augsburg. p. 149—196. (43—92).

IV.

Hymenomyceten aus Südbayern. 28. Ber. d. Nat. Ver. Augsburg. 1885. p. 121—160. (93—134).

V.

Hymenomyceten aus Südbayern (Schluss), Polyporei, Hydnei, Thelephorei, Clavariei und Tremellinei. Mit einem Verzeichnisse sämtlicher als „Hymenomyceten aus Südbayern“ veröffentlichten Arten. 29. Ber. d. Nat. Ver. Augsburg. 1887. p. 273 -306. (135—170).

VI.

Hymenomyceten aus Südbayern. 30. Ber. d. Nat. Ver. Augsburg. 1890. p. 3—34. (171—204).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

VII.

Hymenomyceten aus Südbayern. R. Friedländer, Berlin. 1890. p. 1–4. (205—208).

VIII.

Hymenomyceten aus Südbayern. R. Friedländer, Berlin. 1891. p. 3—15. (209—222).

IX.

Separat-Abdruck. Materialien zur Beschreibung der Hymenomyceten. Bot. Centralblatt. Nr. 15—17 (1893). p. 1—22. (223–244).

X.

Hymenomyceten aus Südbayern (Schluss). Mit Verzeichnissen der im I.—X. Teile veröffentlichten Arten und Formen. 31. Ber. d. Nat. Ver. Augsburg. 1894. p. 159—222. (245–310).

XI.

Das Genus Cortinarius. Bot. Centralblatt Nr. 27. (1892). Separat-Abdruck, p. 1—18. (311—328).

XII.

Zur Hymenomycetenkunde I. Reihe. Im Bot. Centralblatt. 1895. Nr. 22 p. 273—281; Nr. 23 p. 305 — 313. Separat-Abdruck p. 1—16. (329—346).

XIII.

Zur Hymenomycetenkunde II. Reihe. Im Bot. Centralblatt. 1896. (68. Bd.) p. 108 — 112 und p. 137 — 145; Separat-Abdruck p. 1—13. (347–360).

XIV.

Zur Hymenomycetenkunde III. Reihe. Im Bot. Centralblatt. 1897. Nr. 28 p. 49–59 und Nr. 29 p. 87–96. Separat-Abdruck p. 1—19. (361–382).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

XV.

Zur Hymenomycetenkunde III. Schluss. Separat-Abdruck p. 1—8. (383—390). Besteht nur aus einem Index.

Revision der Diagnosen zu den von M. Britzelmayr aufgestellten Hymenomyceten-Arten.

I. Botanisches Centralblatt. 1898. Bd. 73. p. 129—135; 169—175; 203—210. Sep. 1—20.

II. „ „ 1898. Bd. 75. p. 163—178; Sep.-Abdr. p. 1—16.

III. „ „ 1899. Bd. 77. p. 356-362; p. 395-402; 433—441; Sep.-Abdr. p. 1—22.

IV. „ „ 1899. Bd. 80. p. 57—66; p. 116—126; Sep.-Abdr. p. 1—20.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

II. Teil des Index.

Leucospori, 1—165.
Hyporhodii, 166—211.
Dermini, 212—296.
Melanospori, 297—340.
Cortinarius, 341—429.
Gomphidius, 430—434.
Paxillus, 430, 432, 434, 442.
Hygrophorus, 435—458.
Lactarius, 459—481.
Russula, 482—527.
Cantharellus, 528—532.
Nyctalis, 528.
Marasmius, 469, 491, 533—544.
Lentinus, 545—552, 556.
Trogia, 551.
Panus, 552—555.
Schizophyllum, 556.
Lenzites, 556—558.
Boletus, 559—590.
Polyporus, 591—660.
Trametes, 611, 613, 614, 632, 633, 654 u. 660.
Daedalea, 614, 615, 637 u. 654.
Merulius, 615, 637, 638, 642, 654 u. 655.
Solenia, 655, 660.
Porothelium, 655.
Hydnum, 661—696.
Irpex, 668, 674, 691, 692, 694.
Radulum, 669, 692, 694.
Mucronella, 669.
Odontia, 692, 696.
Grandinia, 692, 695.
Caldesiella, 693.
Sistotrema, 694.
Persooniana, 694.
Phlebia, 695.
Lopharia, 695.
Telephorei, 697—721.
Craterellus, 697, 698, 707, 709, 711.
Thelephora, 699—704, 707—709, 714.
Stereum, 704—706, 708—710, 712, 714—717.
Corticium, 705, 706, 710, 713 bis 715, 717—719.
Cyphella, 706.
Hymenochaete, 716.
Peniophora, 719.
Coniophora, 719, 720.
Hypochnus, 720, 721.
Karstenia, 721.
Clavariei, 722—752.
Tremellinei, 753—761.

Amanita.					
bellulus Britz.	31, 90	127, 475, 476	81, 224, Rev. I. 2	8—10/6	
citrinus	42,49,69, 158	293, 327, 405, 741	205, 363	10—11/9—10 10—14/8—10	Schr. 8—10/8; Qu. sphérique 8 μ; St. 8/7 μ; Boud. 10—11 μ;
coccola	35	259	119	8—10/8	Qu. ovoide, ellips 10—14 μ; Sacc. 11—12/8 μ; Boud. 13—15/5—7 μ;
excelsus F. lutescens	69	404	205	8/6	S. 8—9/5—6; Sacc. 8—9/5—6 μ;
jonquilleus Quel.	69	404	223	8/6	Boud. 11—13/7—9 μ;
lenticularis	70	401	205, 331	6, 4—6	Qu. ovoid. sph. 6—8 μ;
mappa	31, 34	122, 119	5, 176	8—9/6—8	Sacc. 7—10 μ diam;
mappa var. alba	31	123	5, 176	8—9/6—8	
— var. citrina	89	473	223	10/8	Qu. sph. 8 μ:
— F. minor	91, 109	481, 482, 563	223	8—10	
muscarius	32	124		10—12/8	S. 10—12/6—7; Qu. ovoid. sph. 7 μ; St. 15/11 μ; V. 10—11/6—8 μ; Sacc. 9 bis 10/7—8 μ; Boud. 10—11/6 bis 7 μ;
— F. puella	49	326		10—12/8	
nitidus	105	551	224	8—10	Qu.; ovoid. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

olens Br.	89	471, 472	224, Rev. I. 2	10/7—8	
pantherinus	34	125	5	6—10	S. 7—8/4—5; Qu. ovoid. all. 10—12 μ; V. 9—10/8—9 μ; Sacc. 7—9/5—7 μ;
permundus Br.	90	477	224, Rev. I. 2	10/6	
phalloides F. alba	50	329	5, 176	8—10	V. 7—9 μ;
— var. virescens	31	121	5	8—9/6—8	
porphyrius F. major	88	470	223	8—10	Qu. sphaerique 10 μ; Sacc. 8—10 μ diam.;
— F. tenuior	50, 90	330, 474	223	9—10	
recutitiformis Br.	109	564	224, Rev. I. 2	12	
recutitus	109	562	224	10—12/8	Qu. sphaer. 10 μ; Sacc. 8—9/6 μ; Boud. 11—12/7—9 μ;
rubescens	32	126		7—9/6—8	S. 8—9/6—6½; Qu. ellips. 8 μ; V. 8—9/6—7 μ; Sacc. 7—9/6 μ; Boud. 10—11/6—7 μ;
russuloides	120	626	247	10—11/8	Sacc. 10/7—8 μ;
strobiliformis	103	544	224	12—14/8	Qu. ovoid. subsph. ellips. 10 μ; Sacc. 13—14/8—9 μ; Boud. 10—13/6—8 μ;
vaginatus Bull.	32, 74	128, 414	176, 205	10—14	S. 11—13; Qu. ovoid. 12 μ; V. 10—12 μ; Sacc. 10—15 μ. diam; Guill. 12 μ;
— var. fulva	158	742	363	10	
vernalis	49	328	223	8—10/6—7	
Lepiota.					
acutesquamosus	29	130	5	8—10/2—3	Qu. ellips. 6—8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

alba	107	555	224	14—18/4—6	Qu. ellips. 18 μ; Sacc. 12—14/6 bis 7 μ;
amianthinus	42	295	177	4--5/2—3	S. 4½—6/2—3; Qu. ovoid. all. 7 μ; Sacc. 5—6/4 μ;
augustanus Br.	33, 74	133, 415	81, 209, 347, Rev. I. 2	6—8/2—4	
Carcharias	34	135	177	2—4/2—3	S. 5/3; Qu. ovoid. 5—6 μ; V. 5—6/3 μ; Sacc. 4/3 μ;
— F. isabellina	158	744	363	4	
carecti Br.	67	391	177, Rev. I. 3	3—3½/2	
cepaestipes F. cretacea	52, 91	333, 480	224	10—11/6—7	S. 5—6/3½—4½; Qu. ellips. 10 μ;
cinnabarinus	42	294		8/3—4	Bäuml. 4/2½—3 μ;
clypeolarius	29, 34	132, 120	5, 120	18--20/4--5	S. 16—20/5—6; Qu. ellips. fusif. 18 μ; Sacc. 18—20/5—6 μ;
cristatus	1, 158	1.743	6, 81, 363	6—8/2—3, 8—4	S. 6—8/3—4; Qu. ellips. 7—8 μ; Berl. 6—8/3—4 μ; Sacc. 7 bis 8/4-- 5 μ;
destinatus Br.	71	407	Rev. I. 3	6/3—4	
ermineus	110	566	224	14/6	S. 10—13/4; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10—12 μ;
excoriatus	37, 110	268, 567	119, 224	14—18/8—9 14—20/7—10	S. 12—17/7—10; Qu. ellips. 13 μ; Beck. 12·3—15/7·4—8·5 μ; Sacc. 14—16/9—11 μ;
flavifolius Br.			Rev. I. 3	5—6/3	
gracilentus Krombh.	110	565	224	12—14/8—10	Qu. ovoid. all. 13 μ; Bäuml. 10—12/6—7 μ; Sacc. 10 bis 11/7½ μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

granulosus	1	2	177	5—6/3	S. $4^1/^2$—5/2—3; Qu. ovoid. 6 μ; St. 5/1·5 μ; Sacc. 4/3 u;
— F. rufescens	37	269	120, 177	4—5/2	
— F. sphagnorum	111	569	224	6/4	
noscitatus Br.	33, 91	131, 479	81, 224, Rev. I. 3	4—5/2—3	
parmatus Br.	29, 74	140, 416	81, 209, Rev. I. 2	14—16/5—7	
parvannulatus	33	136	82	3—4/2	
pinguis	70, 72	403, 410	205	4—5/2—3	
polystictus	1, 71	3, 409	6, 31	4/2—3	Sacc. 4—5/2$^1/_2$—3 μ;
procerus	29	129		16—18/10—12	S. 14—20/7—10; Qu. ellips. 14 μ; St. 17—21/10—17 μ; V. 16—20/10—12 μ; Sacc. 14—22/10—12 μ;
rhacodes	51	331	247	10—12/5—6	S. 9—12/5$^1/_2$—6$^1/_2$; Sacc. 10 bis 12/6—7 μ;
rorulentus	30	134	82	14/4—5	Qu. ellips. 10 μ;
sociabilis Br.	35, 37, 88	260, 270, 478	120, 224, Rev. I. 3	8—10/4	
status Br.	71	406	Rev. I. 3	5/3—4	
Armillaria.					
aurantius	75	418	209	6/4	S. $4^1/_2$—$5^1/_2$/$2^1/_2$—3;
bulbiger	51, 57	332, 343			S. 7—9/4—5; Qu. 10 μ; Sacc. 7—10/4—5 μ;
focalis	74, 76	417, 421	209	6—8/4—5	Qu. ovoid. sph. 3—4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fracticius Br.	111	568	224, Rev. I. 4	4—5	
luteovirens	57	344	209	6—8/4	Qu. ovoid. sph. 6—7 μ;
melleus	30	137	6	10/8	S. 9/6; St 7/5 μ; Sacc. 9/6 μ;
mucidus	52	334		16—18	Sacc. 16/13 μ;
ramentaceus	70	402	205	6—8/4	
roborosus Br.	131	658	331, Rev. I. 3	6/4—5	
robustus	35	261	120	6/3—4	Qu. ovoid. sph. 7 μ;
subcavus	42	297	178	8/6	
subdehiscens Br.	48, 76	325, 422	209, Rev. I. 4	6/4—5	
subimperialis Br.	33, 88	138, 469	82, 224, Rev. I. 4	12—14/5—6	

Tricholoma.

adscriptus Br.	44, 78	306, 432	181, 209, 348, Rev. I. 9	10—11/6	
adstringens	36	266	121	8—9/4	
aestuans	147	710	347	12—14/4	
albellospermus Br.	162	756	364, Rev. I. 10	8/4	
albobrunneus	39	271	180	6/4	Guill. 4 *á* 6 μ; S. 5—6/3—4; Qu. ovoid. sph. 5 μ; V. 5—6/4 μ; Sacc. 4 bis 6/3½ μ;
Allescheri Br.	4, 86	1, 453	8, 83, 209, Rev. I. 6	6/3—4	
amicus	24	160	83	6—7/3—4	Sacc. 6—7/3—4 μ;
angustifolius Br.	134	665	331, Rev. I. 6	10/6	
arcuatus	44	303	182	8/4	Sacc. 10 μ;
atrosquamosus	55	339	181	10/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

brevipes	3	2	9	8—10/5—6	S. 7—9/5—6 μ; Sacc. 8/5 μ; Guill. 10/6 μ;
bufonius	26	157	83, 181	10—12/6—7	K. 3—4/2—3 μ;
caelatus	123	637	248	8/4—5	Sacc. 8/4 μ;
caesariatus	40, 149	275, 715	121, 182, 348	10/4—6, 8/4	
chrysenterus	160	748	364	6—8/5—6	Qu. ovoid. 3—4 μ;
civilis	114	580	182, 225	6/3—4, 6/2	
cognatus	56	341	182	8/3—4	Sacc. 10 μ;
Columbetta	12, 27, 112	93, 147, 570	31, 82, 225	6—8/3—4, 6—8/4	S. 6/4—5; Qu. sph. 5 μ; Sacc. 6—7/4½ μ;
congregabilis Br.	38	274	121, 181 Rev. I. 6	10/6	
consequens Br.	135, 178	669, 95	31, 332, Rev. I. 8	6—7/4—5	
convexoplanus Br.	134	666	332, Rev. I. 6	10/6	
coryphaeus	131, 132	659 a, 659 b	331	6/4	
crassifolius	26	155	83	6—8/4—5	Sacc. 6—8/4—5 μ;
cremeo-griseus Br.	135	670	332, Rev. I. 8	6—7/3	
cuneifolius	133	663	331	6/4	Sacc. 4—6/2—3 μ;
— var. cinereorimosa	92, 95	486, 498	225	6/4½	
cuneiformis Br.	93, 94	491, 497	225, Rev. I. 6	6—8/4	
deliberatus Br.	24, 161	165, 752	83, 348, 364, Rev. I. 8	10—12/4—6, 10/6	
densilamellatus Br.	125	645	248, Rev. I. 8	8/5—6	
enudatus Br.	113, 120	576, 627	248, Rev. I. 5	8/6	
equestris	53, 37	336, 272	120, 180	6—7/4—5, 6/4	S. 6—7/4—4½; Qu. ellips. 6 μ; Sacc. 6—8/4 μ;
— F. asperospora	128	655	247	6—7/3—3½	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

excissus	24, 78	172, 430	84, 181, 210	8—10/4 6	Sacc. 8—10/4 μ;
favillaris	115	584	226	6/3	
flavobrunneus	35	263 (neben 262)	120, 180	6—7/4—5	Qu. ovoid. 6 μ; Sacc. 6—7/4 bis 5 μ;
— F. compacta	113	572	224	6/4	
frumentaceus	43, 128	301, 654	180, 247	5—6/3—4	Sacc. 6 μ;
furvus	36	264	120, 181	8—9/6—7	Sacc. 8—9/6—7 μ;
gigantulus Br.	73	412	209, Rev. I. 5	8—10/6	
— F. odora	159	747	364	10/8	
grammopodius	23	168	84	6—8/5—6	Sacc. 5 μ diam.;
gravabilis Br.	113	575	225, Rev. I. 7	8/6—7	
graveolens	77	428	210	8/3	S. 6/4;
guttatus	32	146	82	4—6/3	Qu. ovoid. 6 μ; Sacc. 4—6/3 μ;
hordus	148	713	347	8—10/4—6	
humilis	25, 94	171, 495	84, 226	6—8/4—5, 9/6	S. 7 8/4—5; V. 7—8/4—5 μ; Sacc. 7—8/5—6 μ;
ignorabilis Br.	87	463	209, Rev. I. 10	10/6—8	
illecebrosus Br.	112	571	224, Rev. I. 4	8—9/6 7	
imbricatus	30	149	82	6/4	S. 6—7/4—5; Qu. ovoid. 8 μ; Sacc. 6/4—5 μ;
immarcescens Br.	68, 151	397, 718	181, 348, Rev. I. 9	6—8/4—5	
immundus	58, 73, 76	346, 413, 423	181, 209	8—10/4	Qu. prunif. 8 μ;
inamoenus	26	158	181	12/6—7	S. 6/4; Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 9—11/5—7 μ;
iudeprensus Br.	66, 150	389, 719	181, 348, Rev. I. 10	6—8/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

indetritus Br.	39	273	120, Rev. I. 5	8--10/6—8	Sacc. 8—10/6—8 μ;
ionides F. minima	93	492	225	6—8/3—4	Qu. ellips. 6—8 μ; V. 5/2 bis 3 μ;
— F. lamellis-roseis	115	583	225	8—9/4—5	
irinus?	5	1	8, 182	6/4	S. 6—7/4½—5 μ; Sacc. oviod. 8 μ;
lanicutis Br.	36, 72	263 (neben 264) 411	120, Rev. I. 5	6—7/4	
lascivus	93	488	225	6--7/3½—4½	Sacc. 8—10/3—3.5 μ;
— F. robusta	93	489	225	6-7½/3½-4½	
lautiusculus Br.	78	431	210, Rev. I. 8	8—10/4	
Lepista	115	581	225		
leucocephalus	150	717	348	5—6/4—5	Sacc. 9—10/7—8 μ; Lanzi 5 bis 6/4 μ;
lilacinus	92	487	225	4—6/2—3	
luridatus Br.	93	490	224, Rev. I. 5	8—10/6	
luridus	2, 75	1, 420	180, 209	5—6/3--4 6—7/4—5	S. 5—6/3½—4½; Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
luteolospermus Br.	126	647	248, Rev. I. 8	8/4—6	
lutescenti albus Br.	149	714	347, Rev. I. 7	6—8/3—4	
melaleucus	4	2	181	6--8/4—5	S. 6—8/4—5 μ; Sacc. 9—10/5 bis 6 μ; Barb. 8/4—5 μ;
—F. porphyroleucus	22, 94	169, 494	84, 181, 226	10/5—6, 8/4	
mollicellus Br.	125	646	248, Rev. I. 8	8/4	
montanus Br.	123	638	248, Rev. I. 7	8/4--5	
nictitans	112	573	224	8/6	Qu. ovoid. 6 μ; Sacc. 7—8/5 μ;
nudus	26	162	9, 182	6--8/4	S. 6—8/4 μ; Sacc. 6—8/3—4 μ; Guill. 8/6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

nudus var. major	23	163	83, 182	6—9/4—5	
panaeolus	25, 94, 134	166, 496, 368 b	83, 225, 332	6—7/4—5, 8/3—4, 8/5—6	Sacc. 5/3 μ;
— var. calceola	23	167	83	8/5—6	Sacc. 8/5—6 μ;
patulus	114	578	225	6/4—5	Sacc. 7 μ;
persicinus	45, 161	308, 750	226, 364	6/2	
persicolor	134	667	332	6/3	
personatus	3	5	9	8/4	S. 6·6—8/4·5—5 μ; Sacc. 8 bis 11/5—6 μ;
Pes Caprae	36	265	121, 181	6/4	Sacc. 6/4 μ;
pessundatus	159	745	363	5—6/3	Wi. 5/2·5 Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 5/2·5 μ;
polioleucus	44	305	191	8/4—5	
portentifer Br.	35	262	120, Rev. I. 4	9—12/6—7	
portentosus	132	661	331	6—8/4	S. 6—7/3—4; Qu. ovoid. 6 μ; Sacc. 4—5/3—4 μ;
pravus	77, 26	427, 159	83, 180, 209	4—6/2—3	
putidus	23, 126	174, 648	84, 181, 249	6—7/3, 8—10/3—4	Sacc. 8—10/3—4 μ;
quinquepartitus	30	139	82	5—6/3—4	Sacc. 5—6/3—4 μ;
rasilis	95, 162	500, 755	226, 364	6—8/3—4	
resplendens	32	141	82	7—8/4	S. 5½—6½/4, H. 6—7/4 bis 4½; Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 7—8/4 μ;
*Russula	27, 159	143, 746	82, 363	10—11/6, 10/6	S. 6—7/4—4½ μ; Sacc. 7/4 μ;
rutilans	28	144	6	6—8/6	S. 6—7/4½—5½ μ; Qu. sph. 4 μ; Sacc. 5—6/4—5 μ;
sanguineo-albus Br.	133	662	331, Rev. I. 4	6/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

saponaceus	24, 25	153, 161	83, 181, 7	4—5/2—3, 4—6/3—4	S. 5/4 μ; Sacc. 5/4 μ;
— F. minor	77	425	209	5—6/3—4	
— stipite squamoso	25	154	83	4—6/2—3	
scalpturatus	28, 147	148, 711	82, 209, 347	6—9/4—6, 8—10/5—6, 8/5—6	Sacc. 6—8/4—5 μ;
Schumacheri	135	668 a	332	10'5	
sejunctus	54	337		6	S. 5—6/4; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 6 μ. diam;
— F. leucoxantha	131	660	331	8/6—8	
selectus Br.	56, 68	342, 400	181, Rev. I. 9	10—12/6	
sordidus	22, 161	173, 753	84, 364	8—10/4, 8/4	S. 5—6/3·5—4; Berl. 6—9/6 bis 7 μ; Sacc. 7—9/3·5—4 μ;
— F. minor	162	754	364	8/4	
spermaticus	58	345	180	6—7/4	Qu. sph. 5 μ;
stans	42, 43	298, 300		6/4	Qu. ovoid. sph. 5 μ: Sacc. 5 bis 6/4 μ;
strictipes	123, 149	639, 716	248, 347	8—10/3—4, 8—9/4	Sacc. 6—9/4—5 μ;
subaequalis Br.	115	582	225, Rev. I. 7	5/3	
subalpinus Br.	85	457	210, Rev. I. 7	10—12/4—5	
subimmundus Br.	92, 112	483, 574	225, Rev. I. 5	6—7/3	
subpulverulentus Fr.	160	751	364	8/4—5	
subrancidus Br.	114	579	225, Rev. I. 7	10/4—5	
subsulphureus Br.	26, 77	156, 426	83, 181, 209, Rev. I. 6	8—12/6	
suevicus Br.	36, 92	267, 493	121, 181, 226, Rev. I. 9	8/4—6, 6—8/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tenuisporus Br.	113	577	225, Rev. I. 6	10—12/4—5	
terreus	2	3	7, 209	5—6/3- -4	S. 6—7/3½—4½; Qu. prunif. 7 μ; V. 5—6/3—4 μ; Sacc. 6—7/4 μ;
— var. argyraceus	25	151	83, 181	6/4	
— var. chrysites	29, 148	152, 712	181, 347	6—7/4, 4-6/2-3	
— F. asperospora	77	424	209	6/4	
testatus Br.	25	170	84, Rev. I. 9	4—6	
tigrinus	67	392	180	4	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 μ. diam.;
transformis Br.	104	546	225, Rev. I. 9	8/6	
tristis	178, 92	94, 484, 485	31, 225	8/4—5, 9/4—4½	Qu. prunif. 7 μ; Sacc. 8/4·5 μ; Guill. 5 6 7—8 μ;
tumefactus Br.	23, 150	164, 720	83, 181, 348 Rev. I. 7	6—7/4	
turritus	44, 78, 160	304, 429, 749	181, 210, 364	8—9/4—5	
ustalis	27	142	7, 82, 180	8/6	S. 5·5—7/3—4; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 7—8/5 μ;
vaccinus	28	150	7, 31, 83	6—7/4	K. 6 μ; Qu. ellips. sph. 6 μ;
variegatus	27	145	6, 82	5—7/4—5	Sacc. 5—7/4—5 μ;
vepallidus Br.	75	419	209, 225, Rev. I. 5	8—10/5—6	
virgatus	133	664	331	8/5—6	S. 6—8/5—6 μ; Sacc. 6—8/5 bis 6 μ; 6 μ. diam;
Clitocybe.					
aggregatus	38	278	183	6—8/3—4	Sacc. 8—9/6·5—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

albidogilvus Br.	106	553	226, Rev. I. 10	8—9/4—5	
alpestris Br.	81	442	210, Rev. I. 11	3—4	
amarus	137	673	232, 332	4—5/3—4	Sacc. 4 μ;
ambifarius Br.	119	615	227, Rev. I. 14	8/4	
ambiformis Br.	99	519	227, Rev. I. 14	7—8/3½—4	
angustissimus	15	213	182	2—3	Sacc. 4/2—3; Bäuml. 4/2—3 μ;
applanatus	40, 142	280, 682 a	121, 333	6—7/3—4	Sacc. 6—7/3—4 μ;
— F. umbonata	142	682 b	333	6—7/3—4	
appositus Br.	19	192	85, 183, Rev. I. 12	8/4	
atractus Br.	15, 98	204, 509	86, 184, 227 Rev. I. 13	8/4—5	
bellus	37	281	121, 184	8—10/5—6	
brumalis	7, 15, 164	4, 205, 760	11, 86, 182, 365	4—5/3, 4—5/2—4	Qu. ovoid. prunif. 7—8 μ; Sacc. 4—5/3—4 μ;
brumosus Br.	60	359	183, Rev. I. 14	6—8/3—4	
calathus	60	357	183	6/2—3	
candicans	22	187	9, 85, 182	4—6/4	S. 4—6/4; Qu. ovoid. 6—7 μ; Sacc. 4—6/4 μ;
cantharellioides	130	657	249	7—8/4	
Catinus	98	510	227	8—10/4—5	
ceraceolamellatus Br.	136	672	332, Rev. I. 10	4/2—3	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cerussatus	20	185	182, 9	4/3	S. 4/3; Qu. ovoid. 5 μ; V. 4/3 μ; Sacc. 4/3 μ;
cervinus	117	596	227	8/4	
cinerescens	140	680	332	10/8	
clavipes Pers.	22	176	84, 183	6—8/4	S. 6½—7/4—4½: Qu. ellips.; Sacc. 5—7/3—4 μ;
comitialis	26, 152	177, 722	84, 184, 348	6—8/3—5, 8/4	Sacc. 6—8/3—5 μ;
concavus	21, 155	207, 730	86, 183, 348	7—13/5—9, 8—10/4—6	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 8—12/6 bis 8 μ;
confertifolius Br.	99	514	227, Rev. I. 13	12/6	
conatus F. Micheliana	40	276	121	8/3—4	Sacc. 6—7/2—3 μ;
curtipes	80	439	210	6—8/3—4	
cyanophaeus Fr.	21	181	84, 183	8/4—5	Sacc. 8/4—5 μ;
cyathiformis	19, 41, 46, 59	202, 203, 313, 355	11, 86, 184, 210	10—12/5—7, 10—12/5—6, 8—10/4—5	S. 8—9/4—5; Qu. ellips. prunif. 10 μ; Sacc. 8—8·5/4—5 μ;
— F. lignicola	81	440	210, 227	10—12/6—8	
dealbatus	45, 68	307, 396	182	4/2	S. 4/2; Qu. ovoid. all. 5—6 μ; Sacc. 4/1¾—2 μ;
decastes	17	190	85, 183	6—7/2—3	Sacc. 6—7/2—3 μ;
diatretus	20, 24	211, 214	86, 183	6/3—4	Sacc. 6/3—4 μ;
difformis	39	277	121, 182	5—6/4—5	Sacc. 4—5/3 μ;
ditopus	117	592, 593	227	5—7½/3—3½	Sacc. 2—3 μ. diam;
dulcidulus Br.	60	356	184, Rev. I. 14	8/4	
echinospermus Br.	98, 99	512, 518	228	6—8	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

evulgatus Br.	18, 155	199, 729	85, 184, 348, Rev. I. 13	8—10/3—4	
expallens	59, 116	354, 586, 587	184, 227	6—8/3–5	Sacc. 10/6—7; Qu. ellips. 10 μ;
farctus Br.	67	394	182, Rev. I. 11	4/2	
flaccidus	7, 59	2, 353	182	4—5/3—4	S. 4—5/3—5; Qu. ovoid. sph. 4 μ; Sacc. 4·5—5 μ;
— F. asperospora	98	508	227	5/4—4½	
— F. cremeospora	139	679	232		
flavidifolius Br.	164	759	364, Rev. I. 12	8—9/4	
flavofuscus Br.	81	441	210, Rev. I. 11	8/5	
fragrans	20	212	183	8/3—4	S. 6—7½/3—4; Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6—7/3–4 μ;
frittilliformis	55	340	184	10—12/6—7	
frustratorius Br.	46	314	183, Rev. I. 14	6/4	
fumosus	154	726	10, 348	6; 8/6	S. 5—6; Sacc. 6 μ. diam;
fusco-alutaceus Br.	139	676	332, Rev. I. 12	10/5—6	
gallinacea	25	188	85, 182	4—6/4	Qu. ovoid. prunif. 6 μ; Sacc. 4—6/4 μ;
gangraenosus	79	433, 434, 435	210	6—8	
geotropus	18, 116	198, 585	85, 183, 226	6/4, 7/5, 8—10/6—8	S. 6—7/4—5; Qu. pyrif. sph. 8 μ; Sacc. 6—7/4—5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

giganteus	140	677	332	6—7/3—3½	
gilvus	80	436, 437	182, 210	4—5	K. 4—5 μ; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 5—6/4 μ;
guttato-marmoratus Br.	58, 121	347, 629	249, Rev. I. 13	6—8/4	
hirneolus	106	554	226	6/4	S. 4½—5/3—3½; Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 5/3 μ;
incilis	58	351	183	4—5/2—3	
incorporatus Br.	99	515	227, Rev. I. 14	8—10/3—4	
indigulus Br.	21, 95	179, 501	84, 226, Rev. I. 10	4—6	
infundibuliformis	8	1	10, 183	5—6/3—4	S. 6—7½/4—4½; Qu. ovoid. sph. 7 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
— F. membranacea	17	194	85	6/4	
inversus	15	200	85, 182	3—5	S. 4½—5/3—4; Qu. ovoid. sph. 4 μ;
— F. minor	95, 96	499, 502	226	4½/3	
F. umbonata	96	503	226	10—12/6—6½	
isabellus	59	361	182	4—5/2—3	Sacc. 4—5 μ; Barb. 4 μ;
laccatus	127	652	11	8—10	S. 9—11 μ; Sacc. 9—10 μ. diam;
— var. farinaceus	4	3	11	8—10	
latelamellatus	66	386	182	4/2—3	
lentatus Br.	117	595	226, Rev. I. 12	8/4	
lobatus	19	201	86, 182	4—5	
luridipes Br.	99	513	226, Rev. I. 11	6/3	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

luscinus	57	348	182	4—5/2—3	
luteorubescens Br.	52	335	183, Rev. I. 15	8/4	
maximus	7, 138	1, 675	10, 183, 332	8—10/6, 8/4	S. 6—7/6; Qu. pyrif. sph. 8 μ; Sacc. 4—6/3—4 μ;
metachrous	19, 22, 105	209, 208, 552	86, 183, 227	6—8/4, 6—8/3—4	S. 6—8/3—5; Qu ovoid. prunif. 7 μ; V. 5—6/3 μ; Sacc. 6 bis 8/3—4 μ;
modestus	121	628	249	8—10	
molybdinus	163	758	364	6—8	
mortuosus	61	362	184	8/4	Sacc. 4—5/2—3 μ;
nebularis Batsch.	21, 136, 137	175, 671, 671 a	9, 183, 332, 348, 364	3—5/3, 6—8/4, 6—8/3—4	S. 7—9/4—4½; Qu. prunif. 8 μ: Sacc. 4—5/2·5—3 μ;
nimbatus	22	180	84, 183	6—8/3—4	
nubilus	61	263	183	6—8/3—4	
obbatus	46	312	183	6/3—4	
obolus	60	360	184	8—10/4	Sacc. 7 μ; Qu. 7—8 μ:
obsoletus	46	317	183	6—7/3—4	Qu. prunif. 7 μ; Barb. 7/4 μ;
odorabilis Br.	117	597	226, Rev. I. 12	6—7/3—4	
odorulus	116	588	227	4—5/3—3½	Sacc. 2—3 μ. diam.;
— F. minor	116	589	227	4—5/3—3½	
odorus	10	2	9, 183	8/4	S. 6½—7/3½—4½; Qu. ovoid. sph. 8 μ;
— F. roseolosperma	153	724	348	8—4	
opacus	19	193	85, 182	5—6/3	S. 5—6/3 μ; Sacc. 5—6/3 μ;
opiparus F. major	20	182	84, 183	6—8/3—4	
— F. minor	163	757	364	6—7/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

orbiformis	121	633	249	6—8/3	Qu. ovoid. 5 μ; Barb. 7/4 μ;
orbisporus Br.	66	388	182, Rev. I. 15	8—10	
pallidosporus Br.	117	590	227, Rev. I. 13	5—6/2—3	
parilis	59	352	182	4—6/2—3	Qu. ovoid. 7 μ; Sacc. ovoid. 7 μ;
Pelletieri	224	65	11		
pervisus Br.	19, 96	195, 505	85, 227, Rev. I. 13	6—7/3—4, 6/4	
phyllophilus	9	5	9, 182	4—8/3—5	S. 6/3 μ; Sacc. ellips. 6/3 usque 8/5 μ;
pithyophilus	7, 67, 121	3, 393, 631	9, 182, 249	6—7/4½	S. 6—7/4; Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 6—7/4 μ; Barb. 6/5 μ;
— F. minor	66	395	182	4/2	
— F. rufescens	126	650	249	5/2½—3	
planiusculus Br.	151	721	348, Rev. I. 10	8—10/4—5	
polius	22	178	84, 183	6 - 8/3—4	Sacc. 6—8/3—4 μ;
pruinosus	46, 98	315, 511	227	6—8/2—4	
Prunulus	167	18	187	12—14/4—6	
pullus	141	681	333	8—9/4—5	
rivulosus	57, 138	349, 674	182, 332	5—6/2—3, 4/2—3	Qu. ovoid. sph. 4—5 μ;
sevocatus Br.	117	549	227, Rev. I. 15	5—7	
simplarius Br.	42, 99	299, 517	182, 227, Rev. I. 15	4/2—2½	
sinopicus	18	196	85, 184	8—11/5—7	S. 7—9/5—6; Qu. ovoid. 8 μ; Sacc. 8—10/5—6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

situatus Br.	97	507	226, Rev. I. 12		
socialis	21	183	11, 85, 182	4—5/3—4	
spinulosus	141	678	332	8/6	Sacc. 9 μ;
splendens	153	731	348	4—5/3—4	Qu. ovoid. sph. 3—5 μ; Sacc. 4—5 μ diam. μ;
squamulosus	59	350	183	8/4	Qu. ovoid. 7—8 μ;
suaveolens	6	3	11, 183	6—8/3—4	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6—8/3 bis 4 μ;
subalutaceus	20, 152	184, 723	85, 183, 348	6—8/4	S. 6—8/4; Qu. ovoid. sph. 4 bis 5 μ; Sacc. 6—8/4 μ;
subflexuosus Br.	142	683	333, Rev. I. 15	8/3	
subgilvus Br.	18	197	85, 210, 250, Rev. I. 13	8—10/3—4	
tornatus	20, 65	186, 387	85, 182	5-6/3—4	Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 5—6/3 bis 4 μ;
totmodus Br.	118	598	227, Rev. I. 14	8—10/4	
Trogii	153	725	348	8—10/4	
trullaeformis F. minor	123	640	249	6/4	
tumidosus Br.	19, 45, 99	189, 309, 516	10, 183, 226, Rev. I. 11	6; 5—7/4	
tumulosus	6, 17	1, 191	10, 226	6—7/4	Sacc. 6—7/4 μ;
turmarius Br.	97	506	226, Rev. I. 12	6/4—5	
umbrino-marginatus Br.	96, 102	504, 538	226, Rev. I. 11	8—12/4—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

venustissimus	120	630	249	4½—5/3	
vernicosus	80	438	210		
vernifer Br.	87, 154	465, 728	210, 348, Rev. I. 12	8—10/4—5, 8/4	
verrucipileus Br.	126	649	249, Rev. I. 11	4/3	
vibecinus	60, 121	358, 632	183, 249	4—5/3, 6—8/3	Sacc. 5—7/3—4 μ;
— F. odora	15	206	86, 183	5—7/3—4	
vicinalis Br.	22, 117	210, 591	86, 227, Rev. I. 14	5—6/3—4, 6—7/3—4	
Collybia.					
acervatus	11	97	32	4—6/2—4	S. 6—8/2½—3; Qu. ovoid. all. 6—8 μ; Sacc. 6—9/2·5—3 μ;
admissus Br.	11, 83, 104, 107	99, 446, 548, 556	32, 210, 228, Rev. I. 17	8—10/4—4½	
ambustus	30	225	87, 179	6/5	S. 4—4½ μ: Sacc. 5—6 μ;
anthracophilus	65	369	179	8/4	
aquosipes Br.	103, 104	545, 547	228, Rev. I. 17	4—6, 6/4	
aquosus	8	3	13	5—7/4	Sacc. 5—7/3—4 μ;
atratus	143	691	333	8/4	S. 6/4; Qu. ovoid. sph. 5 μ;
auroreus	68	398		8—10/4	
butyraceus F. albosperma	8, 142	5, 684	12, 333	6—10/3—5, 7—9/3—4	S. 6½—7/3—3½; Qu. virgule 8 μ;
— F. cremeosperma	143	685	333	7—9/3—4	
— F. incarnatosperma	143	686	333, 349	7—9/3—4, 8/3	
— F. trichopus	157	736	349	8/3—4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

cessans	65	372	179	4—5/2 - 3	Sacc. 7—9/5—6 μ;
cirrhatus Schum.	2	4	12	3—6/2—3	S. 4—4½/2—2½; Sacc. 4 bis 6/2—3 μ;
clusilis	65	370		4—6/2—3	Qu. 8 μ; S. 7—8/5;
collinus	54	338		5—6/2 - 3	Qu. prunif. 10 μ;
confluens	9	4	13	6—10/2—3	Sacc. 7—9 μ;
conigenus	1	4	12	4—6/2—3	S. 3—4/1½—2: Qu. ovoid. all. 5 μ; Sacc. 3—4/2—3 μ;
coracinus	143	690	333	8/4	Qu. 7 μ ovoid. sph.; Sacc. 6 - 7 μ;
dryophilus Bull.	16, 124	223, 642	87, 250	5—7/2—4, 6—7/3—4	S. 5½—7/2½—3; Qu. prunif. 7 μ; V. 5—6/3—4 μ; Beck. 5—7·4/3—3·5 μ: Sacc. 6 bis 7/3—4 μ; Bres. 5—6/3·5—4 μ;
— F. peronata	100	522	228	6—7/3—3½	Sacc. 5—6 μ;
ephippium	61	364	180	8/4	Qu. ovoid. 8—9 μ; Sacc. 8—9 μ;
erosus	65	371	180	8/4	Qu. ovoid. prunif. 6—7 μ;
esculentus	82	445	210	6—7/3—4	Qu. prunif. all. 6—7 μ;
exsculptus	118	602	228	4/2	Qu. prunif. 7 μ;
extuberans	47	320	178	4/3—4	Qu. prunif. all. 7 μ; Barb. 7 bis 8/3—4 μ;
floridulus	143	689	333	6—7/3—3½	
fodiens	82	444	210	6—8/4—5	
— F. incarnatosperma	156	733	349	6/4—5	
fusipes	107	560	228	8/3	S. 6/3; Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 4—6/3—4 μ;
— F. albida	16	49	87	3—4/2—3, 4—5/2—3	
— var. repens	9	1	12, 32	4—6/3—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

gaudialis Br.	16	215	86, Rev. I. 16	10/3	
hariolorum	8	2	12	6—7/3—3½	Sacc. 6—7/3—3·5 μ;
ingratus	122	635	250	8—10/4	
inolens F. umbonata	47	319	178	6—8/3—4	Qu. ovoid. 7 μ;
longipes	47	318		14—16/12—14	S. 9—10/6—7; Bäuml. 7—9 μ diam; V. 8—10 μ; diam.; Sacc. 12 μ; K. 7—8 μ;
ludius	30	224	87	8—10/6	Sacc. 8—10/6 μ;
lupuletorum Weinm.	31	220	87	3—4/2	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 3—4/2 μ;
macidus Br.	118	601	228, Rev. I. 17	4/2	
macilentus	65	367	228	8/3	Qu. ovoid. prunif. 5 - 6 μ;
maculatus	13	217	12, 87	3—6	K. 3—5; Qu. ovoid. sph. 6 μ;
— F. incarnatosperma	156	732	349	6/4	
Michelianus	45	311	178	3—4/2	
miserandus Br.	100	524	228, Rev. I. 17	7—8/3—4	
myosurus	45, 107, 118	310, 557 bis 559, 599	179, 228	3—4/1½—2, 3—4/2	Qu. prunif. all. 6—7 μ;
nitellinus	100	525	228	8—10/4	Qu. ellips. 8 μ;
— F. minor	118	600	228	8—9/4	
— F. vernalis	143	688	333	6—8/3—4	
nummularius	28, 100	222, 521	228	6—7/3—4	Qu. prunif. all. 7 μ;
obstans Br.	11	100	32, Rev. I. 17	6—7/4	
ocellatus	61	368	178	5—6/2—3	
orbicularis	143	687	333	4—5/2—3	Qu. prunif. 8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ozes	47	321	178	8/3—4	
phaeopodius	122	634	250	6—8/3	
pseudoplatyphyllus Br.	16	216	86, 210, Rev. I. 16	8—10/5—6	
— — F. fuscomarginata	82	443	210	8—10/5—6	
pullus	61, 157	365, 734	178, 349	6—8/3, 10/8	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
radicatus Relh.	10	1	12, 179	16—17/10—11	S. 12—17/9—11; Qu. ovoid. 20 μ; St. 17·5/10·5 μ; Sacc. 15—17/10 μ;
rancidus	11	98	32	7—10/3—4	Qu. prunif. all. 11 μ; Bäuml. 8—10/4 μ; Sacc. 7—10/3 bis 5 μ;
repens Bull.	9	1	178, 12	4—6/3—5	Qu. ovoid. prunif. 6—8 μ;
scorzonereus	156	735	349	5—6/3—4	
stereocephalus	122	636	249	8—9/4	
stolonifer Jungh.	86	460	210	6/2—2½	Qu. prunif. all. 6—7 μ; Sacc. 6—8/3—4 μ;
stridulus	16	218	87	8—10/4	Qu. ovoid. 7 μ; Sacc. 8—10/4 μ;
subbutyraceus Br.	100	530 a	228, Rev. I. 16	3—4/2	
succineus	61	366	178	4—5/2—3	Qu. 8 μ; prunif.;
tenacellus Pers.	12, 86	96, 459	210	6—8/3—4	S. 7—8/3—4 u, Sacc. 5/3¼ μ;
trabeus Br.	164	761	365, Rev. I. 17	10/4	Qu. prunif. all. 6—7 μ;
tuberosus	32	221	87	5—6/2—3	S. 4—4½/2—2½; Qu. ovoid. prunif. 5 μ; Sacc. 4—6/2 bis 3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

velutipes	16	219	12	6/4	S. 9 - 11/3—4 μ; Sacc. 6—9/4 bis 5 μ;
ventricosus	100	523	228	8/3—4	
xanthopus	124	641	250	6—8/4	
— — F. incrassata	124	643	250	6/3	
Mycena.					
acicula Schaeff.	7, 87, 118	6, 468, 608	14, 211, 229	8—10/2—4, 10—12/3—4	S. 8—10/2—4 μ; Qu. virgulif. 10—12 μ; Sacc. 8—10/2 bis 4 μ; Barb. 10—11/3 μ;
aetites	12	106	33	10/6	Bres. 6—7/3—4; Qu. Sp. ellips. 6 μ; Sacc. 10/6 μ;
alcalinus	13	235	14, 88, 180	10—12/4—6	S. 8—9/4—5, Qu. 6 μ; H. 6 bis 8/3—4 μ; Sacc. 8—10/5 bis 7 μ;
amictus Fr.	12	108	33, 179	8/4	W. 8/4; Qu. prunif. 8 μ; Berl. 7—9/4—5 μ; Sacc. 8/4 μ;
ammoniacus	12	104	33, 80	10—13/4—6	Qu. prunif. ellips. 12 μ; Sacc. 10—13/4—6 μ;
atro-alboides Peck	144	694	333	9/5	Sacc. 8 μ;
atro-albus	118	605	228	12—14/7—8	
atro-cyaneus	87	467	211	10—12/5—6	Qu. ellips. 8—9 μ; Sacc. 8—9 μ;
atro-marginatus	13	226	87, 170	8—10/6—7	Sacc. 8—10/6—7 μ;
aurantio-marginatus	118	603, 604	228	10/5—6	S. 8—9/4½—5½; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Barb. 9 μ;
canescens	101	530, 532	228	7½—8/5—6 8—9/4½—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

capillaris	13	245	88, 179	6—8/4	S. 6—8/4; Qu. ovoid. all. 7 μ; Oud. 8—10/3—4 μ; Sacc. 6 bis 8/4 μ;
cinerellus	40, 144	287, 696	122, 334	8—10/4—6, 8/4—5	
citrinellus	13	243	88, 178	6—8/4	Sacc. 8—8½/7 μ;
cladophyllus	118	610	229	8—10/4—5	
cohaerens	13	231	88	10—11/8	Sacc. 10—11/8 μ;
collariatus	12	110	33, 180	8—10/4—6	Sacc. 8—10/4—6 μ;
corticolus	101	535	229	10—12	S. 9—11/4—5; Qu. ovoid. sph. 10—12 μ; Sacc. 9—10 μ; Guill. 10—12 μ;
cruentus	9	2	14	6—8/4	Sacc. 6—9/5—7 μ;
debilis	13	237	88, 180	9—10/6—7	Sacc. 9 10/6—7 μ;
dissiliens	84, 157	448, 738	211, 349	10—11/6—7, 10/6	Qu. ovoid. ellips. 10 μ; Berl. 8—10/5—7 μ; Sacc. 8—10/5 bis 7 μ;
dissimulabilis Br.	101	528	228, Rev. I. 18	14—15/6	
elegans	11	101	32, 180	8—10/4—5	S. 8—9/4—4½ μ; Sacc. 8 bis 10/4—5 μ; Barb. 7—8 μ;
epipterygius	5	2	14, 180	6—10/4—5	S. 9—11/4½—6; Bäuml. 10/5 μ; Sacc. 8—10/4—5 μ;
— F. flavidosperma	157	739	349	10—11/5—6	
excisus	13, 144	233, 693	88, 179, 333	12—14/8, 10/5	Bres. 12—15/8—9; Qu. ellips. 7—9 μ; Sacc. 7—9 μ;
— F. fuliginea	62	374	179	10—12/6—8	
fagetorum	104	549	228	10—12/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

filopes	2	5	14, 179	8/4	S. 6—8/3½—4½;
flavo-albus	25	229	14, 87	6—8/3—4	W. 6—8/3—4; Qu. ovoid 8 μ; Sacc. 6—8/3—4 μ;
fusco-purpureus	534	3	117	8—10/4	
fusco-umbonatus Br.	144	698	334, Rev. I. 20	10/6—7	
galericulata	3	3	14, 180	8—11/4—6	S. 8—10/5—6; Qu. ellips. prunif 10 μ; V. 8/5—6 μ; Sacc. 9—10/4—6 μ;
— var. spadicea	11, 101	102, 533	32, 228	10—12/6—7	
galopus	3	6	14, 179	10/4—5	S. 9—11/4½—5; V. 6/4; Qu. ovoid. 10 μ;
griseofulvus Br.	144	697	334, Rev. I. 19	5/2½	
gypseus	21	230	87, 197	8—10/4	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 bis 10/4 μ;
haematopus	15	240	88, 180	10—11/6	K. 6—9/5—6; Qu. ellips. 10 μ;
hiemalis	3, 13	1, 244	15, 178, 229	6—8/4, 8/4	Sacc. 6—7/2—3; Qu.ovoid.10 μ;
impromiscuus Br.	118	607	229, Rev. I. 19	6—7/4	
inclinatus	41	286	122, 180	8/4	Sacc. 8/4; Qu. prunif. 10 μ; Bäuml. 8—10/4—6 μ;
incongruens Br.	11	109	33, 179, Rev. I. 19	10/4	
lacteus Pers.	6	2	14, 179	6—8/3—4	Sacc. 4—5/3—4 μ; 8—9/3—4μ;
lacticularius Br.	101	531	229, Rev. I. 19	12—13/6—7½	
levidensis Br.	84	447	211, Rev. I. 18	8—9/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

luteo-alba	87	462	211	12—14/4—5	S. 6—8/3 ½—4 ½; Qu. ellips. all. 12 μ; Bäuml. 6—6/4 μ;
marasmioides Br.	124, 125	644a, 644b	250, Rev I. 18	8/4	
metatus	13	236	14, 88, 180	8—10/4—6	S.8—10/4—5; Qu. prunif. ellips; 10 μ; Sacc. 8—10/4—6 μ;
modestissimus Br.	62	337	184, 333, Rev. I. 19	8—10, 6—8	S. 8—9/3—4;
parabolicus	11	103	33	12/6	W. 12/6; Qu. prunif. all. 10 μ; Sacc. 12/6 μ;
pelianthinus Fr.	10	3	13	5—6/3—4	S. 7—8/3 ½—4; Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
peltatus	68	399	181	6/4	
permixtus Br.	12, 101	105, 526	33, 179, 228, Rev. I. 19	10—13/5—8, 12/7—8	
pithyus	68	390	180	10—12/4	
plicosus	144	695	334	10/6—8	Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
polygrammus	13	234	14, 88, 179	10—12/6—8	Qu. ellips. prunif. 13 μ; Bäuml. 10—11/8 μ; Sacc. 9—12/6 bis 8 μ;
proliferus	41	285	122, 179	8—10/4—5	Sacc. 8—10/5—7 μ;
pseudopurus	29	228	87	8/4	Sacc. 5—7 μ;
pulcherrimus	101	534	229	10—12/3—4	
punicans Br.	41, 157	283, 737	121, 349, Rev. I. 18	10—12/3—4, 10—11/4	
purus	7	5	13	6—10/4	S. 7—9/3—3 ½; Qu. prunif. 6 μ; Sacc. 6—8/3 ¼ μ;
— var. alba	16	227	87	8—9/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

receptibilis Br.	40	284	122, Rev. I. 18	8–9/6–7	
rhaeborhizus	34	232 a, b	88	6–7	Sacc. 6–7 μ;
rosellus	2	2	13	8–10/4	S. 8–9/4 μ; Sacc. 6–8 4 μ; 8–10/4 μ;
rubromarginatus	37	282	121	10/8	Sacc. 10/8 μ;
rugosus	62, 164	375, 762	365, 180	10/6–7, 10–12/8	Qu. prunif. 12 μ;
sanguinolentus	14, 118	241, 606	14, 88, 229	7–9/5–6, 10–11/4½–5	S. 8–11/4½–5 μ; Sacc. 8 bis 9/6–7 μ;
stanneus	12, 101	107, 527	33, 228	8–10/4, 11–12/4–5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 bis 10/4 μ;
stylobates	4	4	15	8–10/4	S. 6–7/3; Qu. prunif. 10; Sacc. 3/2 μ;
superincurvatus Br.	118	609	229, Rev. I. 19	8–10/4	
supinus	13	239	88		Qu. ovoid. 8 μ;
tintinnabulum	46	316	179	10/4–6	S. 5–6½/2½–3; Bres. 4 bis 5/2½–3½;
ventricosa-lamellatus Br.	144	692	333, Rev. I. 18	8/6	
vitilis	13	238	88, 180	10–12/4–5	Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/4–5 μ;
vitreatus Br.	83	449	211, Rev. I. 18	10–12/5	
vulgatus Br.	15, 84, 164	242, 450, 763	179, 211, 365, Rev. I. 19	6/3, 8/3, 8–10/4	
zephirus	62	373	180	10–11/4	S. 9–11 3½–4; Qu. prunif. all. 8 μ; Barb. 10–11/5–6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Omphalia.

albinus Br.	18, 102	257, 536	89, 183, 229, Rev. I. 15	8—10/3—4	
anthodius	84	453 a	211, 229	10—12/6—8	
arenicola	145	701	334	10—13/5 7	
caespitosus Bolt.	145	700	334	6/4	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6/5 μ;
campanella	5	3, 4	16, 17, 34	6—9/3—4	S. 6—7/3; Qu. prunif. all. 10 μ; Sacc. 6—7/3—4 μ:
camptophyllus	41, 87	200, 466	122, 184, 211	8—10/6—8	Sacc. 8—10/6—8 μ;
cauticinalis	9	3	16	4—5/2—3	
chrysoleucus	24	246	88, 184	8—10/3—4	Sacc. 8—10/3—4 μ;
chrysophyllus Fr.	41, 102	289, 537	122, 229	8—10/4—5, 8/4	Sacc. 8/4 μ; Berl. 11—12/5—6 μ;
cyanophyllus	21	249	17, 87	5—7/3—4	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 5 bis 7/3—4 μ;
epichysium	16, 102	247, 539	88, 229	8—10/4—5, 10/6	Qu. prunif. all. 10 μ; Sacc. 8—10/4—5 μ;
fibula	3	4	17	4—5/2	S. 5—6/2 3; Qu. ovoid. all. 10 μ; Sacc. 4/2 μ;
fulgineo-nigrescens Br.	118	611, 612	229, Rev. I. 15	10/6	
gracilipes Br.	42	296	184, 334, Rev. I. 16	6—8, 8/6	
gracilis	119	624, 625	229	8—10/2—3	Qu. virgulif. 8 μ; Sacc. 8/2 μ;
gracillimus	12, 86	Fr. Wein. 116, 461	34, 184, 211	6—8/3	Qu. virgulif. 8 μ; et Qu. prunif. all. 12 μ; Bäuml. 7—8/3 bis 4 μ; Sacc. 6—7/3 μ;
griseopallidus	145	703	334	10—12/6—8	Qu. ovoid. 6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

griseus	62, 101	378, 529	184, 229	9 - 10/4—5, 8/6	Sacc. 6—9/4 μ; Barb. 8—9 μ:
hepaticus Batsch	1, 87	5. 464	16, 83. 211	5—8/2—4	Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Bäuml. 6—8/4—5 μ; Sacc. 5—8/2 bis 4 μ;
integrellus	12	117	34, 184	6 7/4	V. 6—10/3—4; Qu. en amande 9 μ; Sacc. 6—7/4 μ;
maurus	144	699	334	5—6/4	Bres. 5—6/4—4 ½; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
muralis	84	451 a	211	8 - 10/4—5	Sacc. 10/5 μ:
notabilis Br.	145	705	334, Rev. I. 16	6—8/3—4	
oniscus	12	111	34, 184	12/7—8	Qu. prunif. 8 μ: Sacc. 6 bis 6·5/5·5 μ:
peculiaris Br.	15, 84	248, 451	88. 184, 211 Rev I. 16	11—14/4	
philonotis	43	302	184	8/4—6	Qu. ovoid. prunif. 6 μ; Sacc. 5—7/3—5 μ;
pictus	14, 32	250	89, 184	8 - 10/4	Qu. prunif. ovoid. 6—7 μ; Sacc. 7—10/4 μ;
pseudoandrosaceus Fr.	12	113	34, 183	6—7/3—4	Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Sacc. 6—7/3—4 μ;
pyxidatus	6, 48	4, 324	15. 183	6—9/4—5, 6/4	K. 5—8/5—6; Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Sacc. 7—8/5—6 μ;
rusticus	145	702	334	8—9 4 5	S. 8—10/5—6; Qu. ovoid. virgulif. 8 μ; Barb. 7 - 8/3—4 π;
scyphoides	62, 119	376, 614	184, 229	10—11/5—6, 8/4	Qu. prunif. 6 μ; Sacc. 6/2 μ;
setipes	37	251	89, 183	6—7/2—3	S. 5—6/$2^1/_2$—3 μ; Sacc. 6 bis 7/2—3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

squalidofuscus Br.	145	704	334, Rev. I. 16	8/4	
stellatus	12	114	34, 183	7—8/2	S. 5—7/4—5 μ; Sacc. 4/3 μ diam.; 6—8/3—5 μ;
Swartzii	145	706	334	5—6 2—2½	
tricolor A. et S	102	541	229	5—6/3—3½	S. 10—11/4½—5½ μ;
umbelliferus L.	10, 12	4, 112	15, 34, 88, 184	8—12/4—6, 8—10/6	S. 10—11/6—7; Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Sacc. 3/2·5 μ;
umbilicatus	6, 41	5, 288	15, 183, 122	6—8/4	Sacc. 6—8/4 μ;
umbratilis	12	115	34, 183	6—7/4—5	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6—7/4 bis 5 μ:
Pleurotus.					
acerosus	102, 119	542, 613	229	8—10/4	Qu. prunif. obl. 10 μ; Sacc. 5 bis 6 μ; 6/4 μ;
caesiozonatus	84	455	211	8/4	
chioneus	119	622	230	8—9/3	Sacc. 10 μ;
corticatus Fr.	10, 63, 108	5, 379, 561	17, 229	14—16/4—5	Bres. 12—14/4—4½; S. 13 bis 15/4—5; Qu. arquée 12 bis 15 μ; Sacc. 9—14/4—6 μ;
cuosmus Berk.	14	253	89, 184	12—14/4	Bres. 8—11/3—3½; Qu. ellips. all. 10—12 μ; Sacc. 12 bis 14/4 μ;
fulgineo-cinereus Br.	64	383	184, Rev. I. 20	12—14/3—4	
hypnophyllus	12	118	34	3/2—3	Sacc. 3/2—3 μ;
leucochrius Br.	48, 104, 119	323, 550, 621	229, Rev. I. 20	6—7	Bres. 10—13/3—4½ μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

mitis	14, 119	258, 616	89, 229	4—6/1½, 5/1	Schröt. 4/1; Qu. prunif. 6—7 μ;
ornatus	102	540	229	4—7/4—5	Sacc. 6 μ;
ostreatus Jacq.	14	252	89, 183	7—8/3—4	Qu. ellips. 12—14 μ; Sacc. 8 bis 12/3—4 μ;
petaloides	48, 84	322, 456	183, 211	8/4, 6/4	S. 7—9/3—4; Qu. ovoid. 7 bis 10 μ; V. 6—7/4 μ; Sacc. 8 bis 9/4 μ;
planus Fr.	14, 119	256, 617	89, 229	4—5/3—4	
populeti Br.	64	382	184, Rev. I. 20	10/3—4	
porrigens	127	651	250	5—7	W. 7—8/6 μ; Sacc. 7—8/6 μ; 6/4 μ;
pulmonarius	14	255	17, 184	8—10/2—3	Bres. 10—12/3—4 μ; Sacc. 8 bis 10/2—3 μ;
salignus	14	254	17	8—10/3—4	S. 10—12/3½—4 μ; 6—7/2½—3; Sacc. 8—11/3—4·5 μ;
serotinus	102, 119, 157	543, 623, 740	184, 229, 349	4—6/1—2, 6/2	Bres. 5—6/1—1½; Qu. 6 μ;
striatulus	8, 145	4, 709	334	10/5—6	
subrufulus	119	618	229	10/4	
tephrotrichus	62	380	184	12—14/4	
tremulus	41, 63, 119	292, 384, 619	229	6—7/5—6, 8/6	Bres. 7/4—5; Qu. ovoid. 8 μ; Sacc. 6—8/5—7 μ;
trutinatus	41	291	229	6/3—4	
ulmarius	127, 165	653, 764	250, 365	5—6/4, 4—5, 4—6/4	S. 3—5; Bres. 7/6 μ; 5—6 μ. diam.;
unguicularis	145	708	334	5—6/1½	Sacc. 4—6/1·5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

violacco-fulvus	165	765	202, 365	8—11/2—3, 7½—9/3	
violaceo-spermus Br.	129, 130, 146	656, 707	250, 334, Rev. I. 20	8—9/3—4, 10—12/3—4;	
Volvaria.					
hypopithys Fr.	174	43	21, 92, 184	6—8/4	Qu. ellips. 6—9 μ; Sacc. 6 bis 8/4 μ;
murinellus	181	62	122. 185	6—8/3—4	Qu. ellips. 6—8 μ; Sacc. 6 bis 8/3—4 μ;
parvulus Weinm.	168	2	21, 92, 185	6—8/4	S. 5—6/4—4½; Qu. ovoid. 6—8 μ; Sacc. 5—8/3—4 μ;
volvaceus Bull.	166	1	21, 92, 185	6—8/4	S. 6—8/3½—4; Qu. ellips. oblongue 15 μ; Sacc. 6—8/3·5 bis 4 μ; Barb. 7 μ;
Pluteus.					
cervinus	168	3 a	21, 92, 185	6—8/4—5	Sacc. 7—8/5—6 μ; S. 6½ bis 7½/4—5½; Qu. ellips 8 bis 9 μ; St. 5/3·5 μ;
— β. rigens	166	3 b	185	6—8/4	Sacc. 7—9/6—7 μ;
hispidulus	200	156	230	6/4	Qu. ellips. sph. 6—7 μ;
—F.flavidofuscescens	190	115	211	6—7 4—5	
leoninus	187, 204	107, 171	205, 251	6—7/4—5, 8/6	S. 5—7/4—5; Qu. ellips. sph. 8 μ;
necessarius Br. (Hypomnema).	180	56	89, 92, Rev. II. 1	8—10/5—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

occultus Br.	184	86	185, Rev. II. 1	6–8/4—5	
opponendus Br.	166	5	22, 92, 185 Rev. II. 2	8–9/4	
phlebophorus	170	6	22, 92, 185	6—8/5—6	Qu. ellips. sph. 8 μ; Sacc. 7 bis 8/5 μ;
praestabilis Br.	180	55	89, 92, 185 Rev. II. 1	6/4—5	
prunuloides	169	9	23, 186	8 μ	
rigens	201	158	230	6—8/4	Sacc. 7—9/6—7 μ; 5—7 μ. diam. μ;
Romellii Br.	189	113	211, 349, Rev. II. 1	6, 6—7, 8/6	S. $6^1/_2$—8/5—6;
salicinus	180	61	89, 92	6—8/4—6	Qu. ellips. 6 μ; Barb. 8/6 μ;
umbrosus	173, 211	4, 190	21, 92, 185, 365	6—8/5, 8/4	Qu. ellips. 6—7 μ; Sacc. 6 bis 7/5—6 μ; 4—6 μ. diam;

Entoloma.

acclinis Br.	174, 190, 211	44, 116, 191	Rev. II. 2 22, 92, 187, 211, 365	12—13/8—10, 12—14/8—9	
accola Br.	175, 180, 209	45, 59, 180	24, 91, 92, 235, 335, Rev. II. 3	10—11/6—8, 10/5—6	
appositivus Br.	181	64	123, 187, Rev. II. 2	10—11/6—7	
aprilis Br.	181, 190	63, 117	123, 187, 211, Rev. II. 3	8—10/8—9, 10/8	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ardosiacus Bull.	197	144	92, 230	8—9/7½	Sacc. 6—8 μ diam;
Batschiana	181	67	123, 187	7—9	Sacc. 7—9 μ diam;
Bloxami F. ochraceo-umbrina	197	143	230	8—10	
— F. rugosa	197	141, 142	230	8—10	
clypeatus	182	77	123, 187	8—10	S. 8—10; Qu. arrondie angul. 10 μ; Sacc. 8—10 μ;
Cordae	201, 206	159, 177	230, 251	5—7, 6—8	Sacc. 5—6 μ diam;
costatus	175	46	24, 92, 187	12—14, 8—10	Qu. 12 μ; Sacc. 12—15/8—10 μ;
dichrous	170	14	24, 92, 187	10—12/6—8	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/5—8 μ;
elaphinus	181	71	187	10/6	Qu. polyg. oblong. 10 μ; Sacc. 10/6 μ; Barb. 9—10/8 μ;
griseocyaneus	186	104	187	10/6—7	K. 8—10; Qu. ovoid. 12 μ; Sacc. 8—10 μ diam;
— F. tenuis	184	87	187	10/6—7	
griseo-olivaceus Br.	208	179	335, Rev. II. 3	8—10/6—7	
holophaeus	206	176	251	8/6	Sacc. 8—10 μ;
illicibilis Br.	181, 197	65, 140	123, 186, 230, Rev. II. 2	10—11/6—8, 9—11/7—8	
jubatus	204	172, 173	251	10—12/6—7	Qu. oblong. 10—12 μ; Sacc. 10—12/7 μ; Barb. 8 μ;
lividus	192	123	211	8—10	S. 7—9; Qu. globul. 10 μ; Sacc. 8—9/7—8 μ;
majalis var. aestivalis	182	72	123, 187	7—10	
mammosus	174	53	27, 92, 186	12—14/8	S. 7—10 μ;
mediocris Br.	198	146	230, Rev. II. 3	10—11/8	
nidorosus	171, 175	17, 48	24, 92, 187	8—10/7—8	Qu. ovoid. pentag. 10 μ; Sacc. 8—10/7—8 μ; Barb. 8—9 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

nitidus	181	68	123, 187	6—8	Qu. globul. 8 μ; Sacc. 8 μ diam.;
placenta Batsch.	181	66	123, 187	8	Qu. polyg. 10 μ; Sacc. 8 μ diam;
pleropicus Br.	170, 183	13, 81	24, 123, 187, Rev. II. 3	6—8	
praticolus Br.	201	160	230, Rev. II. 3	8—10	
principalis Br.	172, 196	10, 139	Rev. II. 2, 23, 187, 211, 251, 349	8—10, 6—8	
prunuloides	169	9	23, 92	8	Qu. polyg. 8 μ; Sacc. 8—9 μ diam.;
rhodopolius	171, 197	15, 145	24, 92, 187, 230	8—10/6—8	S. 7—9/6—7; Qu. ellips. polyg. 10—12 μ; Sacc. 8—10/6 bis 8 μ;
Saundersii	207	178	335	8—10	
sericatus Br.	201	161	230, Rev. II. 4	8—10	
sericellus	180, 186	57, 103	90, 92, 186	10—12/6—7	S. 9—12/6—8 μ; Sacc. 8—10 μ diam.; 10—11/8 μ;
sericeus	171	16	24, 92, 187	10/7—8	Qu. ovoid. polyg. 10 μ; Sacc. 10/7—8 μ; Guill. 10 μ;
sinuatus	201	162	230	8—10	Qu. 12 μ; V. 10 μ; Sacc. 8 bis 9 μ diam.;
— F. minor	201	163	230	8—10	
speculum	187	108	205	12/8	Qu. ovoid. polyg. 11—13 μ; Sacc. 12—14/7—8 μ;
sublividus Br.	190	114	211, Rev. II. 2	11—12/7—8	
turbidatus Br.	191	119	211, Rev. II. 3	12—14/8—10	
turbidus	167, 174	7, 8, 47	24, 92, 187	8—11/7—8	Qu. polyg. 10 μ; Sacc. 8—11/7 bis 8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Clitopilus.					
carneo-albus	181	70	124, 188	10/6	Qu. globul. angul. 12 μ; Sacc. 7 μ diam.; 10/6 μ;
carnoso-tenax Br.	202	165	230, Rev. II. 4	5—6/4	
cinereofolius Br.	205	174	251, Rev. II. 4	6/4—5	
cretaceus	185	96	187	8—10/4	Qu. ellips. prunif. 7—8 μ; Pat. 13—15/8—10 μ;
ignitus Br.	182, 191	79, 121	Rev. II. 5, 125, 186, 211, 252	8—10/4—5, 8/4	
mirificus Br.	200, 203	155, 169	230, 251, Rev. II. 4	6/4	
mundulus	167	19	25, 92, 187	8—11/4—5	S. 4—5/2½—3 μ; Sacc. 8 bis 11/4—5 μ;
nidusavis	184	89	187	8—9/6—7	
Orcella Bull.	187, 190	106, 118	211	10/4	S. 9—11/4—5; Qu. ellips. lanc. 13 μ; V. 9—10/4—4½ μ; Sacc. 8—10/4·5 μ;
popinalis Fr.	185, 191	95, 120	211	6 4	Bres. 4½—5/4—4½; Qu. 6 bis 7 μ; Sacc. 4—5 μ diam.;
Prunulus	167	18	25, 92	12—14/4—6	Qu. ellips. lanc. 13 μ; Sacc. 10 bis 16/6 μ;
recollectus Br.	202	164	230, Rev. II. 4	6—7/3	
rhodosporus Br.	185, 205	97, 175	187, 251, Rev. II. 4	6- -7/4—5, 8/10—4	
subignitus Br.	192	122	212, Rev. II. 5	10/7½	
Leptonia.					
aethiops	172	20	25, 92	10—13/8	Sacc. 10—13/8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

anatinus	182, 193	73, 125	25, 92, 124, 186, 212	10—12/7—8, 13—16/8—10	W. 10—12/7—8 μ; Sacc. 10 bis 12/7—8 μ;
— F. fuscescens	185, 193	98, 127	186, 212	13—16/8—10	
— F. glabra	193	128	212	11—14/8	
asprellus	182	76	186	10—12/6—8	S. 7—9/5—6; Qu. oblong. 10 μ; Sacc. 10—12/6—8 μ;
chalypaeus	182	74	124, 186	10/6	S. 10—12/6—7; V. 10/6 μ; Sacc. 10/6 μ;
chloropolius	177, 186	24, 105	25, 92, 186	12—14/6—8	Qu. ovoide. polygone 12 μ; Sacc. 12—14/6—8 μ;
ejuncidus Br.	186	100	186, Rev. II. 5	10—14/9—10	
euchlorus	182	80	124, 186	10—14/6—8	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 10 bis 14/6—8 μ;
euchrous	175	51	25, 92, 186	10/6—8	S. 9—11/5—7; Qu. ellips. polyg. 12 μ; Sacc. 10/6—8 μ;
formosus F. suavis	175	49, 82	124, 186	10—12/8	Sacc. 10—12/8 μ;
griseipes Br.			Rev. II. 5	8—10	
incarnato fuscescens Br.	195	137	212, Rev. II. 5	10—12/6—8	
lampropus	195	134	92, 212	10—14/6—8	Qu. oblong. 10 μ; Barb. 12/6·5 μ;
— F. chalybaea	176, 195	21, 135	212	10—14/6—8	
— F. cyanula	184	90	186, 212	10—14/6—8, 12/6—7	
— F. fuscescens	186, 195	99, 138	212	10—14/6—8	
— F. violacea	195	136	212	10—14/6—8	
lazulinus	182, 193	75, 126	124, 186, 212	10—12/6—7, 10—11/6	S. 6—7 μ; Sacc. 10—11/6 μ;
nefrens	184	88	186	10—12/8—10	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

proludens Br.	175, 180	50, 60	25, 91, 92, 187, Rev. II. 5	12—14/8	
sarcitus	175	52	26, 92, 186	10—12/8	Qu. polyg. 12 μ;
serrulatus	176	23	25, 92, 186	10—12/6—8	S. 9—11/6—7 μ; Sacc. 10 bis 12/6—8 μ;
solstitialis	172	22	92, 187	12—18/6—8	Qu. 14 μ; Sacc. 12—18/6—8 μ;
transnumeratus Br.	202	166	230, Rev. II. 6	8—9/6	
Nolanea.					
acceptandus Br.	179, 188	26 b, 112	Rev. II. 6, 26, 92, 186	10—14/6—8	
cetratus	177	35	29, 92, 185	10—12/10	S. 11—12/6½—7; Qu. 12 μ: Sacc. 10—12/10 μ;
clandestinus	174, 194	54, 129	28, 92, 186, 212	8—10, 10—11	Qu. ovoid. 6—8 μ; Sacc. 8 bis 10 μ diam.;
conferendus Br.	179, 188	26 a, 111	26, 91, 92 Rev. II. 6	8—10	
dissentiens Br.	179, 210	34, 182	29, 92, 186, 349, Rev. II. 6	9—11/6—8, 10/6—8	
dissidens Br.	176, 188	27, 109	26, 92, Rev. II. 7	8—10/8	
hirtipes	173	36	29, 92, 185	7—9	Sacc. 7—9 μ diam.;
icterinus	168	39	30, 92, 186	10—12/8	S. 9—11/6—6·6 μ; Sacc. 10 bis 12/8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

inflatus Br.	183, 194	83, 130	124, 186, 212, Rev. II. 6	10—13/6—8, 10—14/7—8	
infula	184	92	186	10/6	
intersitus Br.	173	31	Rev. II. 8, 28, 92. 186	8—10/6—8	
inutilis Br.	185, 209	101, 181	186, 212, 335, Rev. II. 7	10 - 12/6—8, 10/6	
junceus	169, 199	29, 151, 154	92, 231	10 - 12/8	Qu. 11—13 μ; Sacc. 10—12 μ;
— F. cuspidata	173, 198	30, 150	27, 92, 186, 231	10—12/8—10	
macer Br.	181, 194	69, 133	124, 186, 212, Rev. II. 7	9—12/6—8, 10/6	
monachella	183	85	125, 186	10—12/6—8	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/6—8 μ;
paludicola Br.	184, 210	91, 183	186, 349, Rev. II. 7	10/8	
pascuus	177, 188	25, 110	26, 91, 92	8—12	S. 7—11/6—8 μ; Sacc. 7—11 μ diam.; vel. 12—13/7—8 μ; Barb. 12 μ;
pellucidulus Br.	198	147	231, Rev. II. 8	10—12/6—8	
piceus (Hypomnema)	180	58	90, 92, 186	10—12/4	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/4 μ;
placendus Br.	182, 198	71, 149	Rev. II. 7, 124, 187, 231	7—10/6	
pleopodius (Hypomnema)	176	33	28, 92, 185	10—12/4	Qu. ellips. 12—13 μ; Sacc. 10 bis 12/4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

postumus Br.	173, 210	37, 184	Rev. II. 8, 29, 92, 187, 349	10—12/8—10, 8—12/8—10	
proletarius	169	28	27, 92, 186	10—12/6	Sacc. 10—12/6 μ;
promiscuus Br.	176, 199	32, 152	Rev. II. 8, 28, 92, 186, 231	10—12/10	
rufocarneus	184	94	186	10—12/8—10	
staurosporus Bres.	198	148	231	9—11	Sacc. 10—12 μ;
subacceptandus Br.	193	124	212, Rev. II. 6	9—10/6—7½	
subpostumus Br.	173	38	Rev. II. 8, 29, 92, 185	8—10	
summissus Br.	186, 194	102, 131	Rev. II. 7, 185, 212	8—10/7—8	
verecundus	183	84	124, 186	10—12/6—8	Sacc. 10—12/6—8 μ;
vinaceus	194	132	212	12/8	
Eccilia.					
griseo-rubellus Fr.	178	40	30, 92	10—12/6—8	Sacc. 10—12/6—8 μ;
— F. fuscomarginata	211	189	365	10/6—8	
parkensis	203	170	252	10/6—8	Sacc. 7—10 μ diam.;
Claudopus.					
byssisedus	177, 178, 210	42, 42b, 187	91, 350, 92	8—10/5—6, 10—11/8	Qu. globul. polyg. 8 μ; Sacc. 8—9/5—6 μ;
depluens	184	93	185	10/6	S. 7–8/4–4½; Qu. oblong. angul. 10 μ; Sacc. 9—11/6—8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

odorativus Br.	178, 199	41, 153	30, 91, 231 Rev. II. 8	6—7/2 - 3	
reptans Br.	200	157	231, Rev. II. 8	10/6	
terricola Br.	210	186	349, 366, Rev. II. 8	10—11/6	
translucens	182, 203	78, 168	125, 252	4—6	Sacc. 4—6 μ;
truncorum Br.	211	188	366, Rev. II. 9	8—10/6—8	
variabilis	210	185	92, 349	8/4	Sacc. 6—7/2½—4 μ;
Pholiota.					
arcuatifolius Br.	284	411	252, Rev. II. 10	6/3	
aurantio - ferrugineus Br.	287	422	335, Rev. II. 10	6—7/3	
aurivellus	216	20	49, 188	8—10/4—5	S. 8—9/4—5; Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 8—9/4 - 5 μ;
blattarius Fr.	243, 280	198a, 385	188, 252	10—12/6	S. 9—11/4½—5½; Qu. prunif. 10 μ;
Britzelmayri	234, 245 303	159, 199, 52	48, 188, Rev. II. 9	8—11/4—6	
caperatus Pers.	212	1	37, 47, 188	11—14/6 - 9	S. 11—13/6—7; Qu. prunif. lanc. 15—20 μ; Beck. 9·9—12·3/7·4 bis 8·5 μ; Sacc. 11—12/6—8 μ;
confoederans Br.	212, 265	6, 308, 309	Rev. II. 9, 48, 188, 212	10—12/8, 10/6	
destruens	244	200	37, 49, 188	8—11/4—6	S. 7—9/4½—5½ μ; Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 8—9/5—6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

durus Bolt.	213	8	47, 188	8—10/4—7	Qu. ellips. prunif. 11—13 μ; Sacc. 8—9/5—6 μ;
erebius Fr.	243, 264	198, 302	188, 212	10—12/4—6	S. 10—13/5—6·6: Bres. 9 bis 11/5—7 μ;
exsequens Br.	213, 270	12, 322	Rev. II. 10,37, 48, 188, 231	10/6	
filamentosus	229	114	37, 49, 188	8—9/4—5	Sacc. 6/3—4 μ;
flammans	243	201	188	4/2	K 4/2; Qu. ellips. 5 μ; et Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 4/2 μ;
heteroclitus	286	420	252	12/6	S. 8–10/5–6 μ; Sacc. 8–10/5–6 μ;
junonius	233	146	127, 188	8—9/5—6	Sacc. 7—9/4·5—5 μ;
magnus	214	14	37, 49	8–11/4—6	Sacc. 8—11/4—6 μ;
marginatus	212, 635	7, 147	38, 49, 188	10—14/4—6	S. 6—7/3—4; Ou. prunif. 10 μ; Bres. 8—9/4·5—6 μ; Sacc. 6—7/3—4 μ;
mustelinus	240	185	188	10/4	
mutabilis Schaeff.	213	11	38, 49, 188	6—7/4	S. 6—7/4–5; Qu. prunif. ovoid. 7·5 μ; Sacc. 7—12/4—6 μ;
mycenoides	251	243	205	12/6	Jaap. 13·5—6 μ; Sacc. 8 bis 10/5—6 μ;
ombrophilus Fr.	233, 294	145, 451	127, 212, 366	10—14/6–7, 12/6	Qu. 9 μ; prunif; Sacc. 13 bis 14/6—7 μ;
— α togularis	264	301	212, 231	9—10/5—6	
praecavendus Br.	214, 265, **299**	15, 305 bis 307, **19**	37, 48, 212, Rev. II. 9	8—10/4—6	
praecox Pers.	230	117	37, 47, 188	12—13/8	Guill. 8—10/6 μ; S. 9—11/5 bis 6·6; Qu. prunif. 9 μ; V. 10 bis 13/6—7 μ; Sacc. 8—13/6—7 μ;
— F. minor	212	3	37, 47, 188	8—10/5—7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

propinquatus Br.	213, 266	9, 311	37, 48, 212, Rev. II. 9	10—12/8, 10—12/6	
pumilus Fr.	231, 275	128, 356	49, 188, 231	8—9/5—6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 bis 10/5—6 μ;
radicosus	215	17	37, 49, 188	8—9/4—5	S. 7—9/4—5; Qu. en amande 10 μ; Sacc. 8—9/4 μ; Barb. 7 7·5/4—4·5 μ;
rufidulus	231, 275	127, 357	50, 188, 231	8—10/4—6	
spectabilis	215, 252	18, 242	39, 49, 188	9—11/4—6	Qu. prunif. 8—9 μ; Sacc. 8 bis 9 5 μ;
sphaleromorphus Bull.	266	310	212	10/5—6	Qu prunif. 9 μ;
squarrosus Fr.	230	118	37, 49, 188	6—8/4	S. 6—8/3½—5; Qu. ellips. 10 μ;
— F. Mülleri	213	10	37, 49	6/4	St. 5/3 μ;
— F. verruculosa	275	355	231	7½/3½	
suberebius Br.	270	321	231, Rev. II. 9	6—7/4	
subluteus	245	202	188	8/4	
subsquarrosus	212	2	188	10/6	Qu. Sp. ellipsoïde;
terrigenus	214, 275	16, 353, 354	37, 47, 231	10—11/4—6	Sacc. 10/4—6 μ;
togularis	212	5	37, 47, 188	8/4	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 8 bis 10/4 - 6 μ;
— F. filaris	212	4	37, 47, 188	8/4	
unicolor	213	13	38, 49, 188	8—10/4—5	S. 9 10/5; Qu. 7—9; prunif.; Sacc. 9—10/5 μ;
Inocybe.					
abjectus	285	414	253	10—11/6	Sacc. 10—13/5—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

absistens Br.	216, 264	23, 304	51, 213, Rev. II. 12	10—14/6—8, 14—16/6—8, 15—17/8	
adaequatus Br.	216, 218, 219, 231, 249, 276, 294	25, 29, 35, 130, 256, 360, 453	Rev. II. 11, 38, 50, 189, 231, 366	10—12/5—6, 12—14/6—8, 12—16/6—8, 14—15/8	
aemulus Br.	217, 255, 264	28, 263, 303	39, 54, 129, 193, 213, Rev. II. 14	8—11/4—6, 10—12/4—6	
albidoincarnatus Br.	253	245	232, Rev. II. 16	3—4	
albidulus Br.	237, 271	164, 329	Rev. II. 15, 127, 192, 231	10—14/6, 10/6	
albocrenatus Jungh.	291	442	350	14/7—8	Qu. prunif. 13 μ;
alienellus Br.	215, 255	19, 260	Rev. II. 10, 38, 50, 127, 189, 213	10—12/6	
asininus	244, 252	209, 244	189	10/4—5	
auricomos	218, 281	31, 389	53, 189, 253	8—10/6, 10—11/5—6	
Bongardi Weinm.	217, 218	26, 32	38, 50, 127, 192	10—12/6	S. 10—12/6—7; Qu. prunif. 13 μ; Sacc. 10—12/6 μ;
brunneus	288	424	335	12—13/6	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. ovoid. 12 μ;
caesariatus	220	44	39, 51, 190	14—15/6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/6 μ;
caesariatus F. pineti	269	320	213	14—16/6—8	
— — F. tenuis	247, 268	217, 313, 314	190, 213	12—15/6—8	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Curreyi Berk.	229, 237	116, 151	38, 52, 128	9—11/5—6	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 11/6 μ;
deductus Br.	218	30	Rev. II. 13, 39, 52, 189	10—16/6	
deflectens Br.	218	33	Rev. II. 13, 39, 54, 192	14—16/4—5	
deglubens	216	24	38, 51	10/6	S. 7—9/4—5 μ; Sacc. 10/6 μ;
— F. trivialis	268	312, 315a	213	10/4—6	Sacc. 10—12/4—5 μ;
delectus	295	454	366	10—12/5—6	
descissus	234, 276	149, 366	129, 189, 213, 232	9—11/4—5, 8/4—5	S. 10—15/5—6; Qu. prunif. 10 μ; Cke. 8/4—5 μ;
destrictus	220, 246	43, 211	39, 52, 191	10/6—8	Qu. prunif. 10—12 μ; Sacc. 7—10/5—6 μ;
eutheles	249	255b	205	12—14/8	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 7—10 μ;
explanatus Br.	247	215, 216	189, 335, Rev. II. 15	6—8/4, 8/4—5	
fallaciosus Br.	231	137	51, 190, Rev. II. 12	14/6—8	
farctus Br.	278	377	232, Rev. II. 16	4	
favorabilis Br.	276	361	232, Rev. II. 12	10/5—6	
fibroso-laceratus Br.	291	440	350, Rev. II. 11	8—10/4—5	
flavido-lilacinus Br.	220, 268	40, 317	Rev. II. 15, 51, 190, 213	10—11/4—5	
fraudans Br.	219, 239, 271	36, 165 328	Rev. II. 13, 39, 53, 129, 232	10—12/6—8, 10/6—7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

geophyllus	218	34	54, 189	8–10/4—6	S. 8—11/4—6; Qu. prunif. 10 bis 12 μ; Sacc. 8/5 μ;
— F. violacea	285	413	253	10/5	Sacc. 10/5 μ;
hettematicus Br.	240	177	189, 335, Rev. II. 11	8—10/4	
heterogeneus Br.	240	182	189, 335, Rev. II. 11	10/4—5	
hiulcus Fr.	230, 255	122, 261	51, 189, 213	8—9/4—5, 8—10/4—6, 8/4	Sacc. 8—10/5 μ;
ignobilis Br.	240	183	193, 335, Rev. II. 14	8/4	
incarnatus	247	213	190	10–12/6	Cke. 10/4 μ; Sacc. 9—11/6 bis 7 μ;
indissimilis Br.	231	131	53, 192, Rev. II. 13	8—10/4—6	
injunctus Br.	220	41	Rev. II. 13, 39, 52, 189	10—14/5—9	
inscriptus Br.	247, 269	214, 319	190, 213, Rev. II. 15	10—11/6	
insequens Br.	221	50	53, 189, Rev. II. 14	8—10/4	
lacerus	231, 280	132, 133, 386	51, 189, 252	10—12/4—6, 14/7	S. 8—10/5—6 μ; Sacc. 12 bis 15/6—7 μ;
lucifugus	240	184	189	10/6	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 10/6 μ;
Merletii	240	178	192, 232	10–12/6—7	Qu. prunif. all. 11—14 μ; Sacc. 11—14 μ;
mutatorius Br.	270	325	231, Rev. II. 11	10/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

nitidiusculus Br.	269	316	213, Rev. II. 14	8—10/5—6	
obesus	292	443	350	8—10/4	
oblongosporus Br.	287	423	335, Rev. II. 12	14—16/4—6	
obscurus	276	362, 363, 364	232	10/6, 10—11/6—7, 8—9/5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 6 bis 9/4—6 μ; Barb. 10 μ;
observabilis Br.	240	181	189, 335, Rev. II. 11	10/4	
ochraceo-violascens Br.	294	452	366, Rev. II. 11	10—11/5—6	
perbrevis Weinm.	230, 276	119, 365	53, 189, 232	12—14/5, 8/4	Qu. ellips. 8 μ; Sacc. 10 bis 12/5 μ;
plumosus	231, 270, 275	129, 323, 324, 358	50, 189, 231	8—9/4—5, 9—10/5—6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc 8 bis 9/4—5 μ;
posterulus Br.	230, 246	123, 210	Rev. II. 13, 39, 52, 189	8—9/4—5	
praeposterus Br.	220, 246	42, 212	Rev. II. 13, 39, 52, 189	10—14/6	
pseudoscabellus Br.	269, 276, 281	318, 367, 391	Rev. II. 15, 213, 232, 253	10—12/4—6	
pyriodorus	234	163	127, 192	8/4	S. 10—12/5—6; Qu. prunif. 10 μ; Barb. 11—12 μ;
— F major	246	208	192	10—12/6	
rimosus	236	170	129, 189	12/6—7	S. 8—10/4—5; Beck. 7·4 bis 8·6/3·7—5 μ;
sambucinus	221	47	39, 53, 190	12—14/6—7	S. 10—12/6—7; Qu. prunif. 10 bis 12 μ; Sacc. 10—12/6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

sanguilentus Br.	291	441	350, Rev. II. 12	10/6	
scabellus Fr.		28	54	8—11/4—6	S. 6—9/4—5; Qu. ellips. 8 μ; Beck. 7 ½—10/4·9—6 μ; V. 7—8/4 μ; Barb. 8—10/6 bis 7 μ;
scaber	244, 275	207, 359	189, 231	8—10/4—5, 8/4	S. 11/6;
servatus Br.	219, 236, 249	37, 152, 255 a	Rev, II. 12, 39, 52, 128, 213	10—16/5—7	
sindonius Fr.	232	141	54, 190	10—14/4—5	Sacc. 10/5 μ;
squamiger Br.	233	173	127, 191, Rev. II. 10	8/4	
subaemulus Br.	255	264	213, Rev. II. 14	10/6	
subignobilis Br.	255	265	213, Rev. II. 15	12—14/6—8	
subinsequens Br.	221, 281	49, 390	Rev. II. 14, 39, 53, 192, 253	12—14/7—8	
trechisporus	250	257		10/6	Sacc. 14—15/6—7 μ;
tricholoma	247	218	193	4, 3—5	S. 3—4 ½ μ; Sacc. 4 μ; diam.;
Clypeus.					
adunans Br.	229, 280	124, 388	Rev. III. 1, 38, 45, 253	10/6	
albido-lamellatus Br.	258	275	213, Rev. III. 2	9/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

albido-ochraceus Br.	250	258	Rev. III. 4	8—9/5	
analogicus Br.	235, 256	148, 266	Rev. III. 2, 126, 192, 213	8—10/6—7, 8—11/6	
assimilatus Br.	166, 257	12, 276, 278	Rev. III. 4, 23, 191, 213	8—10/4—6, 8/4—6	
asterosporus Quel.	257	269, 270	212	10—11/5—7	Sacc. 7—10/5—8 μ;
aureolamellatus Br.	282	400	253, Rev. III. 5	10/8	
calosporus Quel.	294	455	366	10—11	Qu. sph. 10 μ; Sacc. 10 μ diam;
capucinus Fr.	235	162	126, 191, 212	8—10/6—7	Qu. prunif. 13—15; Sacc. 10 μ diam;
castaneo lamellatus Br.	256	267, 268	213, Rev. III. 2	$7^1/_2$—9/5—6	
cavipes Br.	245	204	190, 336, Rev. III. 2	10/6	
— F. minor Br.	245	205	212, 336, Rev. III. 2	10/6	
confusulus Br.	231, 258	125, 272	45, 213, Rev. III. 4	8—9/5, 8—10/4—5	
devulgatus Br.	232	140	45, 190, Rev. III. 3	10—12/6—8	
duellus Br.	277	369	232, Rev. III. 1	8/6	
gramatus Quel.	235	147	191, 126	10/6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
impensibilis Br.	231	126	46, 192, Rev III. 3	10/6	
ineditus Br.	217, 232, 249	27, 143, 254	Rev. III. 2, 38, 46, 125, 193	8—10/6—7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

insuavis Br.	240	186	190, 336, Rev. III. 4	8—10/4—6, 8—10/4	
invenustus Br.	244	203	Rev. III. 2, 191, 336	8—10/6	
iteratus Br.	232	142	Rev. III. 5, 46, 127, 191	8/4—5	
lilacino-lamellatus Br.	277	370	232, Rev. III, 2	10/6—8	
maritimus Fr.	287	425	336	10/7—8	Sacc. 10 μ;
mixtilis Br.	216, 281	21, 392 bis 394	Rev. III. 2, 38, 46, 126, 191, 253	10/4	
oblectabilis Br.	240, 250	176, 259	193, Rev. III. 3	10/6	
praetervisus Quel.	235, 282	160, 397	126, 191, 253	10—12/6—8	Qu. ellips. angul. 11 μ; Sacc. 10—11/5—6 μ;
— F. minor	257, 282	271, 398, 399	213, 253	8—12/5—6, 8/6	
pseudomixtilis Br.	281	395, 396	253, Rev. III. 2	10—12/7—8	
Rennyi	277	371	232	10—12/8	
scabellus Fr.	280	383	254	11—12/7—8	Sacc. 10—12/6—7 μ:
specialis Br.	244	206	Rev. III. 5 191, 336	8/5—6	
subornatus Br.	277	368	232, Rev III. 1	10/6	
tenuimarginatus Br.	235, 280	161, 384	126, 253, Rev. III. 4	10—14/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

transitorius Br.	166, 257	11, 277	Rev. III. 4, 23, 190, 213	10—11/6—8, 10/8	
trechisporus Berk.	216	22	38, 46, 193	10/6	Sacc. 14—15/6—7 μ;
Hebeloma.					
albido-cortinatus Br.	288	428	336, Rev. III. 5	6—7/3—4	
angustifolius Br.	283	406	254, Rev. III. 6	8—10/4—5	
apolectus Br.	239	174	Rev. III. 6, 130, 193	8—10/6	
birrus	277	372	233	8/4	
capnoicephalus Bull.	282	401	55, 254	10—12/5—6	Sacc. 12—14/7—8 μ;
crustuliniformis	229, 239	113, 171	55, 130, 190	10—12/5—6	S. 10—13/5—7; Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 10—12/5—7 μ; Barb. 12/6 μ;
— F. inodora	292	444	350	12/6	
diffractus	219	38	40, 55, 193	10—11/4—5	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 10 bis 11/4—5 μ;
elatus	223	61	55, 190	12—14/6—7	Qu. prunif. 13 μ; Berl. 11—14/7 bis 9 μ; Sacc. 11—14/6—7 μ;
exalbidus Br.	221, 241, 278	51, 187, 375	Rev. III. 6, 39, 55, 233	10—11/5—7	
— F. vernalis Br.	289	431	337, Rev. III. 6	10—11/5—7	
fastibilis	243	172	39, 193	10—12/5	S. 10—11/7—8; Qu. prunif. 12 μ; V. 7—9/4—6 μ; Sacc. 10/7 bis 8 vel. 10—12/5—6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fastibilis var. alba	224	64	54, 129, 193	10—12/5—6	
firmus Pers.	222, 288, 295	58, 427, 457	39, 54, 190, 336, 366	10—12/5—6, 14/7	S. 10—12/5—6 μ; Sacc. 10 bis 12/5-6 μ; Guill. 7/4 μ;
fusiformi-radicatus Br.	289	429	336, Rev. III. 6	10—12/6	
glutinosus	223, 288	62, 426	39, 54, 193, 336	10—12/5—6	Sacc 10—12/5—6 μ;
holophaeus Fr.	289	430	336	8—10/4—5	Qu. prunif. 7 μ;
laevatus Br.	279	382	233, Rev. III. 7	9—11/5	
longicaudus	222, 284	56, 405	40, 55, 193, 254	9—11/4—6, 8—9/4-5	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 9 bis 10/5—6 μ;
— F. radicatus	241	189	179, 193	10/5	Sacc. 10/5 μ;
lugens	222	57	40, 55, 190	10/6	Sacc. 10/6 μ;
magnimamma	244	221	191	10/6	
medianus Br.	219, 272	39, 337	Rev. III. 6, 40, 54, 190, 233	8—10/5—6	
mesophaeus Pers.	224, 227, 230, 240	66, 88, 121, 179	39, 55, 59, 130, 193	8—9/4—5, 8—11/4-5, 10/5—6	
mitratus	222	59	39, 55, 190	10/4—6	
mussivus	238	150	129, 193	10—12/4—6	Sacc. 10—12/4—6 μ;
nudipes	221, 244	52, 55, 220	55, 193	10—14/5—7, 10/4—6	Sacc. 8—10/4—5 μ;
odoratissimus Br.	267, 363	312, 137	105, 214, Rev. III. 5	15/7—8	
petiginosus Fr.	221, 282	48, 402	40, 55, 190, 254	6—7/3, 10—12/5—8	Qu. ovoid. 7 μ; Sacc. 8—10/6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

praefinitus Br.	277	373	233, Rev. III. 7	6–8/3—4	
punctatus	259	279	214	10—12/6	Sacc. 7—11/5—6 μ;
senescens Batsch.	283	403, 404	254	10/6	Qu. prunif. 13 μ;
sinapizans	238	154	130, 193	12/6	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 12/6 μ;
sinuosus Fr.	223, 258	60, 281	54, 193, 214	10/6	Qu. prunif. 13 μ;
spiloleucus	248, 295	219, 456	366	12/6—8	
spoliatus	231, 246	138, 222	55, 190	10/6	Sacc. 10/6 μ;
strophosus	241	188	233	10/6	
subcollariatus	239	168	130, 193	12/6	Sacc. 12·5 μ;
testaceus	238, 272	153, 338	129, 190, 232	8—10—12/4 bis 6—7	Qu. prunif. 10 μ; Berl. 8 bis 10/4—5 μ; Sacc. 8—10/4 bis 5 μ;
truncatus	221, 242	54, 196	40, 55, 190, 196	12—13/5—7	Sacc. 10/13/5—7 μ;
— F. minor	259	274	214	10—12/5—6	
tumidulus Br.	272	339	233, Rev. III. 7	8—10/4—5	
versipellis	272	340	233	10—12/4—6	S. 7—9/5—6; Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 12 μ; Guill. 10—12/6 μ;
Flammula.					
alnicola	251	246	205	8—10/4	S. 8—9/4½—5½; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8/5 μ;
apicreus	279	379	233	6—8/3—4	Sacc. 6—7 μ;
carbonarius	224, 253, 259	247, 280, 282	214, 233	8/3—4	S. 7—9/4½—5; Qu. ellips. prunif. 10 μ; Sacc. 10—11/5 bis 6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

connisans	231	134	57, 191	8/4	Qu. prunif. 7—9 μ; St. 7/3·5 μ; Sacc. 8/4 μ;
decussatus	278	378	233	8—10/4—6	
delimis Br.	224, 273	68, 345	Rev. III. 8, 40, 57, 193, 233	10/5—6	
deludens Br.	225	75	40, 57, Rev. III. 8	10—13/6	
evagabundus Br.	293	446	350, Rev. III. 7	6—8/3—4	
ferruginascens Br.	231	135	Rev. III. 8 58, 193, 233	6/2—3	
filius	248	224	192, 233	10—11/6	
flavidus	226, 273	83, 343	40, 57, 233	6—10/4—5, 8/4	S. 6—8/3—5; Qu. prunif. 10 μ; V. 6—8/3—4 μ; Sacc. 6 bis 8/4—5 μ;
fusus	226	77	40, 57, 193	8—12/5—6	Sacc. 8—12/5—6 μ;
gummosus Lasch.	224	68 b, unt. rechts	57, 233	10—11/5—6	Qu. 7 μ ellips.; Barb. 7/4 μ;
gymnopodius	285	415	254	8—10/4—5	
helomorphus	223, 241	63, 191	58, 193, 233	8—10/4—6	
hybridus Fr.	286	417	254	7/4—5	Sacc. 7—9/4—5 μ;
immutabilis Br.	273	344	233, Rev. III. 8	6—8/4	
inopus Fr.	225	69	40, 57, 191	6—7/4	
lentus	224	67	40, 56, 191	6—7/3—4	S. 7—9/4—5; Qu. prunif. 7 μ; Berl. 7—10/4—5 μ;
Liquiritiae	248	225	191	6/4	Qu. prunif. 6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

lubricus	225	70, 71, 376	40, 56, 233	8—9/4—5, 8/4	K. 6—7/3—4; Qu. prunif. 9 μ;
paradoxus Kalchbr.	24, 254	65, 248	40, 56, 193, 205	10—12/4	Qu. 13 μ; — 1—4 guttulée; Sacc. 9—10/4 μ; vel. 16 bis 17/6—7 μ;
penetrans	226, 285	78, 416	57, 191, 254	8—10/4—6, 8—9/4—4½	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 6 bis 7/4 μ;
— β. fusiforme	225	73	57, 191	6—7/4	
picreus	230, 241	120, 190	57, 191, 233	8—10/4—6, 8/4	S. 8—10/5—6; Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 8—10/5—6 μ;
— F. pileo-campanulata	273	346	233	10/6	
rotundifolius Br.	296	458	366, Rev. III. 8	8/4	
sapineus	241, 242, 245	192, 226	191	10/5	S. 8—11/5—6 μ; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8/5 μ;
scambus Fr.	259	273	214, 233	8—10/4—5	Sacc. 10 12/5—6 μ;
seductus Br.	229, 292	115, 445	Rev. III. 7, 40, 56, 191, 350	10/4—6	
spumosus	248	223	191	8—9/4	Qu. amande 9 μ; Sacc. 7—8/4 vel 5/4 μ;
Naucoria.					
abstrusus	290	433	337	10/5—6	Sacc. 10/5 μ;
amoenus Weinm.	226, 280	76, 387	41, 59, 192, 255	8—9/4—5	Sacc. 8—9/4—5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

antipus Lasch.	228, 234	98, 158	42, 61, 130, 190	10—12/4—6	
arborius Br.	239	169	130, 191, Rev. III. 9	8/4	
arvalis	236	156	130, 190	12/6	Qu. 20 μ:
badipes	243	233	192	12—14/6	Qu. prunif; 10—12 μ; Sacc. 10 bis 12 μ;
breviatus Br.	285	412	254, Rev. III. 10	6/4	
camerinus	225, 271, 293	72, 332, 333, 448	59, 191, 234, 350	6—8/4, 8/4	Qu. prunif. 15 μ; Sacc. 6 bis 8/4 μ;
centunculus	251, 252	250		12—14/6	Qu. prunif. 7—10 μ;
cerodes Fr.	246, 290	229, 434	191, 337	8—11/4—5, 7/8—4, 10—12/5—6	S. 8—10/5½—7; Qu. prunif. 10—13 μ; Sacc. 12—16/6 bis 8 μ;
cidaris F. minor	246	228	189	12/6	Qu. prunif. 10 μ;
conciliascens Br.	227	93	60, 192, Rev. III. 11	10—12/6	
conferciens Br.	227	89	60, 192, Rev. III. 11	12/6	
confertifolius Br.	286	418	254, Rev. III. 8	8/4	
disclusus Br.	244	227	189, 337, Rev. III. 9	6—8/4	
erinaceus Fr.	220	46	61, 192	10—11/6—7	S. 9—12/7—8;
escharoides	243, 246	239	190	12—14/6	Qu. navicularie 20 μ; Sacc. 7—9/5 vel. 16/15 μ; Barb. 15/11/6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fulvidus Br.	290	435	337, Rev. III. 9	9—11/4—5	
improspicuus Br.	284	407	254, Rev. III. 8	6/3	
inattenuatus Br.	272	341	233, Rev. III. 10	6—7/4	
innocuus	225	74	58	10/4—6	Sacc. 10/4—6 μ;
inserendus Br.	248, 290	238, 439	192, 337, Rev. III. 10	9—11/4-6, 10—11/6	
interceptus Br.	226, 271	85, 334, 336	58, 233, Rev. III. 10	9—10/4—5	
lugubris	253	249	205	9—10/4—5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8/5 vel. 7 μ diam.;
melinoides	226	79	58, 191	8—10/4—5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/4—5 μ;
micans	270	326, 327	233	4—5/2—3	
nimbifer Br.	262	290, 291	214, Rev III. 9	10—12/5—6	
nimbosus	232, 263	144, 299	58, 190, 214	10—11/6	Sacc. 10—11/6 μ;
pediades Fr.	220, 247, 248, 295	45, 234, 235, 460	41, 59, 190, 366	10—11/5, 10/6	Qu. ellips. 15 μ; Sacc. 10 bis 12/4—5 μ; Pat. 14 á 16 μ; 9 á 11 μ;
populicola Br.	290	432	337, Rev. III. 11	8/4	
pusiolus	226, 290	82, 436	58, 191, 337	8/4	Qu. prunif. 10—12 μ; Sacc. 8/4 μ;
pygmaeus	254	251	205	6/3	
reductus	254	252	205	10—11/6	Qu. prunif. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

rimulincola Rab.	239	155	130		Qu. prunif. 15 μ; Sacc. 12 bis 15/7 μ;
scabrisporus Br.	290	437	337, Rev. III. 10	4	
scolecinus	226	81	58, 192	8—12/6	Sacc. 9—12/5—6 μ;
— var. minor	231	136	192	8—12/6	
semiorbicularis	290	438	337	10—12/5—6	Guill. 8—10/6 μ; Barb. 8 bis 8 5/6—6·5 μ; S. 11—15/6 bis 8; Qu. ellips. 15 μ; Sacc. 10/5—6 vel. 12 - 14/6—8;
sideroides	226, 244, 262	80, 232, 292	58, 193, 213	10—11/5—6, 10 - 14/4—6	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6—10/4 bis 6 μ;
sticticus	226, 292	87, 447	59, 192, 350	12—14/6—7	Sacc. 12—14/6 μ;
subglobulosus Br.	224, 262, 296	68 a, 289, 459	Rev. III. 9, 41, 58, 214, 337, 366	6—8/3—4, 8/4	S. 8/4;
sublimbatus	242	193	190	10—12/6	
subtemulentus Br.	274	351	234, Rev. III. 11	8 - 9/4 - 5	
suspiciosus Br.	227, 261, 273	94, 288, 347	Rev. III. 11, 41, 60, 214, 234	10 —14/6	
tabacinus	240, 271, 293	180, 335, 449	191, 234, 350	8—10/4—5, 9/4—5	Sacc. 8—9/4—5 μ;
temulentus	244, 272, 274	237, 342, 352	191, 234	12—13/6—8	Qu. oculif. 12 μ;
tenax	237	167	131, 191	8/4	Sacc. 5/4 μ;
triscopus Fr.	226, 262, 271	86, 293, 330, 331	59, 191, 214, 234	6—8/3—4	Qu. prunif. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

uncialis Br.	248	231	Rev. III. 9, 191, 337	8/6	
vervacti	226, 248, 293	84, 236, 450	41, 59, 193, 350	12—16/8—10, 12/6—8	Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 12 bis 16/8—10 μ;
vexabilis Br.	227, 260, 261	92, 283 bis 287	Rev. III. 10, 41, 60, 192, 214	16—20/8—9	
Galera.					
apalus var. sphaerobasis	306	88	61	14—15/8—10	
aquatilis	229	109	42, 61, 192	10—14/5—6	Sacc. 10 - 14/6 μ;
aquigenus Br.	262, 263	294, 300	61, 214, Rev. III. 12	10—11/6	
Bryorum	228	99	61, 192	8—9/4—5	Sacc 10/6 μ;
confertus	262, 277	295, 374	214, 234	9—12/6—7, 9—10/6	Qu. prunif. 10 μ;
griseo-isabellinus Br.	282	408	255, Rev. III. 11	10 12/6—8	
Hypnorum	227	90	42, 61, 192	10—11/6—8	S. 8—11/6; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 9—12/6 7 μ;
lateritius	307	95	61, 190	12—15/8—10	S. 8—11/4—5; Qu. ellips. prunif. 12—15 μ; Sacc. 12 bis 14/8—10 μ;
mniophilus	228	102	42, 61, 192	12—16/6	Sacc. 12—16/6 μ;
ovalis	227, 238	91, 157	61, 190	10—12/6	Sacc. 10—12/6 μ;
pygmaeo-affinis	242	194	189	10/4	Qu. en amande 12 μ;
ravidus Fr.	228	103	42, 62, 189	8—10/4	Sacc. 8—10/4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

rubiginosus	228	101	42, 61, 192	10 12/5—6	
Sahleri	221	53	42, 62, 189	8—10/4—6	Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 8 bis 10/4—5 μ;
siligineus Fr.	279	380	234	10--12/5—6	Sacc. 11—13/5—7 μ;
sparteus	284	410	255	8/5—6	Qu. prunif. 8 μ;
sphagnorum	228	100	42, 61	10/6	
spiculus Lasch.	284	409	255	8/4	Qu. prunif. 10 μ;
tenera Schaeff.	228	97	41, 61, 192	12—14/6 - 8	S. 11—16/6—9; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 11—15/6—10 μ;
vestitus	228	104	42, 62, 188	10/4—5	Qu. ellips. oblong. 10 μ; Sacc. 10/4—5 μ;
vittaeformis	227	96	61, 192	12/6—8	Qu. prunif. 12—13 μ; Sacc. 12/6 - 8 μ;
Tubaria.					
autochthonus	228	105	62, 193	7—8/4	Qu. prunif. 6—8 μ; Sacc. 7 bis 8/4 μ;
crobolus	232	139	62, 193	10—11/5--6	Sacc. 9--10 μ;
furfuraceus Pers.	228	106	62, 193	8—10/4 6	S. 8 - 9/4½—5; Qu. prunif. 8 bis 10 μ; Sacc. 7—9/3--5 μ;
inconversus Br.	229, 274	107, 350	Rev. III. 12, 42, 62, 234	8—10/4—5	
heterostichus	227	95	62, 193	8—10/4--6	
inquilinus	242	195	193	10—12/6	S. 8—11/5—6; Qu. 7 μ; H. 6 bis 8/4—4½ μ:
muscorum Hoffm.	229	108	42, 62, 193	6—8/4	Qu. ellips. 8—9 μ; Sacc. 6 bis 8/4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

paludosus Fr.	229, 263	110, 297	42, 62, 193, 214	8—10/4—5, 10/6	Qu. en amande 12 μ; Sacc. 8 bis 10/4—5 μ;
pellucidus Bull.	263	298	214	8/6	Qu. prunif. 8—10 μ;
stagnicola Br.	229	111	Rev. III. 12, 62, 190, 234	14 --16/6 - 8	
stagninus	274, 252	349, 253	234	10—14/6	Qu. en amande 15 μ; Sacc. 14 bis 16/6—8 μ;
Crepidotus.					
alveolus	233	166	131, 189	8—10/4 - 6	Bäuml. 9 10/5—7 μ; Sacc. 7 bis 8 μ;
applanatus	296	461	367	8—10/4—5	Qu. prunif. 8—9 μ; Bäuml. 5 bis 6/4—5 μ; K 5—6 μ diam.;
Berberidis Br.	279	381	234, Rev. III. 12	8—12/4—6	
inhonestus	286	421	255	8—9/6—7	Sacc. 6—8/5—6 μ;
mollis	229	112	63	6—9/4—6	Guill. 10/6 μ; S. 8—9/4 1/8 bis 5 1/2; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8—9/5—6 μ;
pezizoides Nees.	243	241	282		Qu. ellips. oblong. 8—9 μ; Sacc. Sp. ignotae;
sessilis Br.	286	419	255, Rev. III. 12	6/3	S. 5—6/3—3 1/2.
subscalaris Br.	263	296	214, Rev. III. 12	6/2—3	
Chitonia.					
haemorrhoidarius Kalchbr.	300	24	63, 194	5—6/2—4	Qu. ellips. prunif. 9 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Psalliota.

arvensis	297	1	63, 194	8--9/4	S. 9/6; Qu. ellips. 7 μ; Sacc. 9 bis 11/7 μ;
— F. ochracea	340	286	367	8/6	
campestris Linn.	300	22	63, 194	6—8/4—6	S. 8—9/6—6·5; Qu. ellips 7 μ;
— F. alba	298	9	63, 194	6/4	
— F. exannulata	331	254	255	7/4	
— F. purpurascens	339	283	367	7/4	
— v. rufescens	297	2	63, 194	6/4	
— v. silvicola	310	106	63	6—8/4	
— v. villaticus	299	18	63, 194	10—11/5—6	Qu. ellips. 7 μ;
comptulus Fr.	312	135	131, 294	4—5/2—3	Qu ellips. prunif. 7 μ; V. 4/2·5 bis 3 μ; Sacc. 4—5/2—3 μ;
flavescens	300	23	64, 194	8/4	Sacc. 8/4 μ;
haematospermus Bull.	297	3	64, 194	4—5/3	Sacc. 4—5/3 μ;
pratensis	298	8	63, 194	4—6/4	Qu. ellips. 6—7 μ; Sacc. 7 bis 8/4 μ;
— F. griseolilacinus	319	182	215	6/3—4	
rusiophyllus	328	240	234	5/3	S. 4—6/3—4;
segregatus Br.	313	141	Rev. III. 12, 194, 338	6/2—3	
semotus	298	10	64, 194	4—5/2 - 3	Qu. ellips. prunif. 7 μ; Sacc. 4 bis 5/2—3 μ;
silvaticus	301	30	64, 194	7—8/4	S. 6—7/3—4;
silvicola	310	106	194	6—8/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Stropharia.

accessitans Br.	306, 324	84, 206	Rev. III. 13, 65, 195	10—12/6	
aeruginosus	297	4	64, 194	8—9/4—5	S. 6—7/4—5; Qu. prunif. 10 μ; Bäuml. 7—9/4—5 μ;
albonitens	312	136	131, 194	8—10/4	Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 8—10/4 bis 5 μ;
capitosus Br.	339	284	367, Rev. III. 13	14/8	
caryophyllaceus Br.	334	266	338, Rev. III. 13	10/4	
coronillus	298	11	64, 168, 195	6—8/4—5	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 10/5 μ; Guill. 8—9/4 μ;
hypsipus	318	176	203	10/4	
indictivus Br.	311, 320	118, 184, 185	Rev. III. 13, 65, 195, 215	13—15/8—9, 12—14/7—8	
melanospermus	310, 312	107, 137	64, 131, 394	8—10/4—6	S. 3—7/4—4·5; Qu. prunif. 12—14 μ;
— v. brevipes	298	12	64	8—10/4	
obturatus Fr.	314	150	194	7/5	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 7/4 μ;
punctulatus	318	181	205	8—10/4—5	
semiglobatus F. robusta	320	187	215	12—14/6—8	Qu. prunif. 16 μ;
stercorarius	300, 311	25, 125	65, 194	17—22/8—11	K. 17—21/13—16; W. 16 bis 17/13—13·5; Qu. oblong. 22 μ; Sacc. 18—20/10—13 μ;
— F. flexuosa	301	31	65, 194	20/10	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

submerdarius Br.	298	13	Rev. III. 13, 65, 215	12 - 14/6—8	
umbonescens	320	186	215	15—18/10	Sacc. 15 - 18/10 μ;
Hypholoma.					
appendiculatus	303	49	68, 195	6--8/3 -4	S. 7—8/4—4 5 Qu. 10 μ; ellips.; V. 7—8/3—4 μ; Sacc. 6 bis 8/3—4 μ;
arridens Br.	310	108	66, 194, Rev. III. 14	6—8/3	
assimulans Br.	310, 324	109, 207	Rev. III. 14, 66, 194, 234	8/3—4	
Candolleanus Fr.	309	111	68, 194	8/4	Qu. ellips. prunif. 10 μ; Sacc. 8/4 μ;
capnoides Fr.	301	32	65, 194	8/4	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 7/5 μ;
cascus	324	208	234	8/4	Qu. ellips. prunif. 11 μ;
coronatus	303	50	68, 195	8/4	
dispersus Fr.	311, 332	126, 255, 256	66, 194, 255	8—9/4—4½, 8—10/4—5	S. 7—9/4—4·5; Qu. ovoid. oblong. 9 μ; Sacc. 12—14/6 μ; Guill. 8/4 μ;
elaeodes Paul.	302	42	66, 194	5—6/3—4	V. 5—6/3—4 μ; Sacc. 5 6/3 bis 4 μ;
epixanthus Paul.	302, 314, 331	41, 151, 253	66, 194, 255	6—7—8/4	Sacc. 6—7/4 μ;
— F. vernalis	311	113	66, 194	6—7/3—4	
fascicularis Huds.	298	15	66, 194	6—8/4—5	S. 5—7/3½ 4½; Qu. prunif. 8 μ; St. 7/3·5 μ; Sacc. 6 bis 7/4 μ; Guill. 8/4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fascicularis F. incrassata	334	267	338	6—7/3	
hydrophilus	314, 335	156, 269, 270	338	6/3—4	Qu. ellips. 6 μ; Sacc. 7—8/3 bis 4 μ;
instratus Br.	310	110	Rev. III. 14, 67, 194, 255	8/4	
lacrymabundus Fr.	312	139	131, 195	7—9/4—5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 bis 10/5 μ;
marcessibilis Br.	324	209	234, Rev. III. 14	14/6	
melantinus	312	138	131, 194	6—7/3—4	Sacc. 6—7/3—4 μ;
populinus Br.	302	43, 140	Rev. III. 14, 66, 131, 194	7—9/4	
pyrotrichus	303	48	67, 195	11—12/6	Sacc. 11/6 μ;
silaceus Pers.	320	188	215	8/3—4	Qu. prunif. 7 μ; 1 - 2 guttulée;
sublateritius Fr.	302	40	65, 194	6—8/3—4	S. 6—7/3—4 μ; Sacc. 6—7/3 bis 4 μ;
velutinus Pers.	302, 334	44, 268	67, 195, 338	10—12/6, 10/6	Qu. Mandelf. 12 μ; Sacc. 9 bis 10/5 μ:
Psilocybe.					
atrobrunneus	313	142	195	10—12/6	Sacc. 9—12/5—6 μ;
atrorufus Schaeff.	299, 300, 332	21, 26, 257	69, 197, 256	6—9/4—5	Qu. prunif. 10—13 μ; K. 6 bis 8/4—5·5 μ; Cke. 10—12/6 μ; Barb. 10 μ;
bullaceus	314	154	196	8/4	Qu. prunif. 11 μ; Sacc. 6 bis 10/4—7 μ; Barb. 10—11/3·5 bis 4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

canobrunneus Batsch.	315	157	195	12/6	Qu. ellips. prunif. 10 μ;
cernuus Vahl.	319	183	215	8/4	Berl. 10—12/6—7 μ; Sacc. 7 bis 10/5—7 μ;
coprophilus	298, 301, 311	16, 17, 34, 119, 120	69, 73, 197	14—16/8	Qu. prunif. all. 20 μ; Sacc. 13 bis 14/8 μ;
corneipes	332	264	256	8/5	Sacc. 10—13 μ;
delitus Br.	299, 301	20, 33	Rev. III. 14, 68, 195	12—14/6—8	
discordabilis Br.	321	189	215, Rev. III. 16	8/5—6	
discordans Br.	301, 321	36, 190	Rev. III. 16, 69, 196, 215	12/7—8, 14/8	
ericaeus Pers.	324	210	234	8—10/4	Qu. Mandelf. 20 μ; Sacc. 8 bis 10/5 μ;
Gilletii Karst.	328	244	235	10—12/6	Sacc. 10—13/5—6 μ;
insiliens Br.	303	51	Rev. III. 15, 69, 197	8/4	
nothus Br.	311	117	Rev. III. 15, 69, 197	6/3—4	
nucisedes	297	6	70, 196	12—14/7—8	Sacc. 10—12/6 μ;
parabilis Br.	300	27	70, 197, Rev. III. 15	6—8/4	
particularis	305, 322	72, 195	70, 195, 215	16—18/8—9	
parviductus Br.	324, 325	211, 216	235, Rev. III. 16	8/6	
physaloides	311, 321	115, 192	69, 197, 215	8—9/4—5, 8/4	Qu. ovoid. losangique 9 μ; Sacc. 8—12/5—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

recognitus Br.	314	155	338, Rev. III. 15	12/8—9	
rhombisporus Br.	325, 326	221—224	235, Rev. III. 16	5—8/4—5	
sarcocephalus Fr.	328	241, 242	234	10/4—5	Qu. prunif. 11 μ; Sacc. 10 μ;
semilanceolatus	313	144	195	12—14/6—8	
simulans	324, 327	212–215, 239	235	6/4	Sacc. 4—6/3 μ;
squalens	315	158	197	8/4	
subcoprophilus Br.	311, 324	114, 191	69, 215, Rev. III. 16	18—20/10—11	
subudus Br.	321, 328	193, 243	215, 235, Rev. III. 15	8/4	
testaceo-fulvus Br.	311	116	69, 196, Rev. III. 15	8—10/4	
udus Pers.	313, 321	143, 194	195, 215	15—18/7½, 16—18/8	Qu. navicularie 20 μ; K. 16—20/7—9 μ; Cke. 10/5 μ;
— F. elongatus	314	152	195	18/8	Qu. 20 μ;
— F. politricha	314, 304	153, 56	195	18—20/10	Qu. 20 μ;
Psathyra.					
bifrons	315	167	195	10—12/6	
conopileus	306	78	71	13—16/7—8, 16/8	S. 7—9/4—5; Qu. prunif. all. 15 μ; Sacc. 14/7—8 μ;
corrugis	333	262	77, 256	12/6—7	Qu. prunif. 15 μ; Sacc. 13 bis 14/7 μ;
— F. vinosus	317	177	205	8—10/4—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

dendrophillus	311	127	72, 77, 196	10/4	
examinatus Br.	313	145	196	14—16/6—8	
exerrans Br.	297	7	70, 77, 195, Rev. III. 17	8—10/4	
Falkii	313	147	195	6/2—3	
fatuus Fr.	303, 326	53, 226	72, 77, 196, 235	12—13/6—7	Qu. ellips. prunif. 8—9 μ; Sacc. 12—13/6—7 μ; Bres. 8—9/4 bis 4·5 μ;
frustulentus	305	70	72, 78, 196	12—14/6	K. 5—7/3—4 μ;
gracilipes	326	228	235	10/4	
gyroflexus	312	134	73, 195	8—10/4—5	Qu. 7—8; ovoid. prunif.;
mastiger	315, 322	166, 197	195, 215	14—16/6—8, 12/6	
microrhizus	326	227	235	12—14/6—8	
Noli-tangere Fr.	302	45	72, 77, 196	8—9/4	Qu. ovoid. prunif. 9 μ; Sacc. 12/5 μ;
obtusatus	326	225	235	6—8/3—5	Sacc. 7—9/4—6 μ;
-- F. major	329	247	235	6—8/3—5	
pennatus Fr.	318	178	205	6—8/3—4	Qu. prunif. 10—12 μ; Sacc. 12 μ;
persimplex Br.	313, 335	146, 272	195, 338, Rev. III. 17	10—12/5—6	
spadiceo-griseus	304, 325	63, 220	71, 195, 235	10—12/6—8	Qu. 10 μ; M. 8—10 μ; Sacc. 8—10 μ;
subobtusatus Br.	322	200	215, Rev. III. 17	12—14/8—10	
supernulus Br.	307	89	Rev. III. 17, 72, 78, 195	10—11/4—5	
torpens	325	218, 219	235	15/7	Qu. prunif. 12—15 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Panaeolus.

acuminatus Schaeff.	317	179	205	8—10/4—5	Qu. ellips. lanc. 18 μ;
caliginosus	305	75	73, 78, 195	16—18/10	Sacc. 16 - 18/10 μ;
campanulatus	305, 314	73, 160	73, 75, 78, 196, 339	15/9	Qu. Mandelf. 18 μ; Sacc. 15 bis 18/9—13 μ;
cinctulus	311, 332	121, 258	74, 77, 196, 256	14/8	Sacc. 14/8 μ;
cinereofuscus Br.	316	169	196, 339, Rev. III. 18	18/10	
deviellus Br.	306, 315	79, 161	Rev. III. 18, 73, 78, 196	8—9/6	
expromtus Br.	314, 316	159	196, Rev. III. 18	8—10/6	
exsignatus Br.	327	231	235, Rev. III. 19	10—12/6—8	
fimicola	301	35	74, 77, 196	16/8—10	S. 13/6—7; Qu. prunif. oblong. 17 μ; Sacc. 16/8—10 μ;
fimiputris	311	122, 123	73, 195	8—9/7, 12—15/6—7	Qu. prunif. 12—15/6—8 μ; Sacc. 8—9/7 μ;
obtusisporus Br.	332	259	257, Rev. III. 19	8/5	
refellens Br.	306, 311, 333	80, 130, 265	Rev. III. 18, 74, 78, 196	8—10/4	
separatus Linn.	305, 313	71, 148	73, 78, 194, 256	18/9—10, 20/10—12	Qu. prunif. 20 μ; Sacc. 16 bis 22/10—15 μ;
sphinctrinus	308, 337	101, 273	75, 77, 339	16/9—12	Sacc. 15—19/9—12 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

sphinctrinus F. minor	337	274	339	16/9—12	
subditus Br.	301	38	Rev. III. 18, 73, 78, 196	12—14/8—10	
Psathyrella.					
albido-cinereus Br.	314, 322	165, 199	Rev. III. 20, 196, 216	14/6—8	
atomatus	333	263	256	12/6	S. 13—15/6—8; Qu. prunif. oblong. 13 μ; Sacc. 13—15/6 bis 8 μ;
biformis	303, 304	55, 62	71,76,77,132	12—14/6—8	Sacc. 11—14/6 μ;
deparculus Br.	309	112	Rev. III. 19, 75, 78, 195	12/5—6	
devergescens Br.	297	5	Rev. III. 20, 76, 78, 195	10—14/6	
dissectus Br.	301, 338	37, 279	Rev. III. 19, 76, 77, 196, 351	12—14/6—8, 14—15/8	
disseminatus Pers.	300	29	77, 196	8—10/4—5	S. 7—8/4—5; Sacc. 6—10/3 bis 5 μ; Barb. 10/5 μ;
expolitus	311, 314, 317, 331	128, 164, 180, 252	76, 77, 196, 257	12—14/6—8, 14—16/8	Sacc. 12—14/6 μ;
gracilis	305, 314, 315	162, 168, 74	74, 78, 196	14/6—8	S. 12—14/6·5—7.5; Qu. Mandelf. 13 μ; Sacc. 12—14/6—8 μ;
hydrophorus Bull.	340	285	367	12—13/6	Qu. Mandelf. 14 μ; Sacc. 11 bis 18/7—8 μ;
impatiens Fr.	305, 338	76, 282	75, 77, 196, 351	14—16/8	M. 12—15/6—8; Sacc. 12 bis 15/6—8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ligans Br.	301, 338	39, 380	Rev. III. 20, 76, 77, 197, 351	8—10/4—6, 8—9/4—6	
perscrutatus Br.	326	229, 230	235	14—18/8—10	
pronus	300, 315	28, 163	Rev. III. 20, 76, 77, 196	12—14/6—8	Qu. ellips. oblong. 16 μ; Sacc. 12—18/8—9 μ;
subatratus F. media	306	83	74, 78, 196	10—14/6	Qu. prunif. 12—15 μ;
F. typica	306	82	74, 78, 196	12—13/6	
subligans Br.	323	202	215, Rev. III. 20	8—10/6	
subtilis Fr.	305, 338	77, 281	77, 196, 351	12—15/6—8, 12—16/5—8	Qu. prunif. 10—12 μ; Bäuml. 10—12/6—8 μ; Sacc. 12 bis 16/5—8 μ;
trepidulus Br.	323	203	216, Rev. III. 19	12—14/6	
valentior Br.	306, 330	81, 248	76, 78, 196, 235, Rev. III. 19	14/8	
Coprinus.					
aratus	331	251	257	10/5	
atramentarius Bull.	308	96	78	6—10/4—6	S. 8—11/4 $^1/_2$—6 $^1/_2$; Qu. prunif. 10 μ; St. 7/4 μ; Sacc. 9—10/6 μ; Barb. 8/7/4 μ;
Boudieri	311	124 a, b, c	80	10—11/7—8	S. 8—10/6—7; Qu. ovoid.—mitrif. 10—12 μ; Sacc. 7—12/6 bis 10 μ;
Britzelmayri	311	129	79	20/10—12	Sacc. 20/10—12 μ;
clavatus	312	131	78	10—12/6—8	Sacc. 10—12/6—8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

comatus	307	91	78	12—14/6—8	S. 11—13/6—8; Qu. ellips. prunif. 12—15 μ; K. 11—13/6 bis 8 μ; Worth. Sm. 18/11 μ;
congregatus	327	232	235	16—18/9	
deliquescens	323, 332	201, 260	216, 257	10—12/8—9, 12/6	Sacc. 12—8 μ;
diaphanus	304	65	79	10/4	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 12 μ;
digitalis	315, 323	174, 205	176, 216	12—14/8, 10/6	Qu. Mandelf. 14 μ;
dilectus Fr.	327	234	235	12—14/8—10	Qu. Mandelf. 10 μ;
divergens Br.	304	64	79, Rev. III. 21	10—11/6—7	
domesticus Pers.	336	278	339	8—9/4—5	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 8—9/5 bis 6 μ;
ephemerus Fr.	304	66	79, 340	11—16/7—9	S. 7—9/4—5 ½; Qu. prunif. larm. 20 μ; Sacc. 11—15/7 bis 8 μ; Barb. 8/5/4 μ;
— F. major	316	171	340	10—14/6—8	
extinctorius	308	99	78, 176	9—11/6—7	Qu. Mandelf. 10 μ; Sacc. 9 bis 10/5—7 μ;
— F. ochracea	308	98	78, 176	9—11/6—7	
fimetarius	312	147	78, 339	10—12/6—8	S. 15—18/9—12; Qu. Mandelf. 11—13 μ; Sacc. 12—15/8 μ bis 10 μ; Barb. 14—15/8 bis 8·5 μ;
floccoso-farinaceus Br.	316	170	339, Rev. III. 21	18/10	
fuscellus Br.	336	275 a	339, Rev. III. 20	6—8/5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fuscescens	308	97	78	8—10/4–6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8 bis 10/5—6 μ;
hemerobius	306	85	80	12—14/8—9	Qu. prunif. 15 μ; Sacc. 12 bis 14/8 –9 μ;
incrassatus Br.	337	276	339, Rev. III. 21	16/8—14	
lagopus	309	103	79	10—12/4—7	S. 10 - 13/6—7; Qu. prunif. 13 μ; Sacc. 12—13/6—8 μ;
lanatofurfuraceus Br.	336	277	339, Rev. III. 21	16/10	
marculentus Br.	327	237, 238	235, Rev. III. 21	10--12/8	
micaceus	309	102	79	6--10/4—6	S. 8--10/4—4½; Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 7—8/5—6 μ; Guill. 10/6 μ;
narcoticus	307	92	79	10—12/5—6	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 10 bis 12/5—6 μ;
niveus	323	204	216	12–14/6—8	S. 9—17/6—14; Qu. citriforme 12 μ; Sacc. 16/11 bis 12 μ;
nycthemerus	316	172	176	10—11/6	Qu. prunif. ovoid. 10 μ; Sacc. 12--15/6—8 μ;
plicatilis	309, 316	105, 175	79, 177	8—10/5–8	S. 11—13/7—9; Qu. ovoid. sph. 13 μ; Sacc. 8—11/5—9 μ; Barb. 11 μ;
pseudonycthemerus Br.	330	250	235, Rev. III. 21	14/10	
pulverulento-floccosus Br.	337	275	339, Rev. III. 21	12/10	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

rapidus	307	93	80	12—14/6—8	Qu. citriforme 12 μ; Sacc. 12 bis 14/6 8 μ;
superiusculus Br.	312, 316	132, 173	79, Rev. III. 22	10/8	S. 9—11/7—11;
tardus Karst.	327	233	235	14—16/8—10	Sacc. 12—15/7—9 μ;
tergiversans	308	100	79	10/4	Sacc. 10/4 μ;
tomentosus	307, 309, 327	90, 104, 235, 236	78, 176, 235	10—12/6—7	Qu. ellips. oblong. 12 μ; Sacc. 10—12/6—7 μ; Barb. 13/7 μ;
truncorum	302	47	79	12—16/6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 bis 14/5—6 μ;
viarum Br.	313	149	176, 339, Rev. III. 20	14—16/10—12	
Homophron.					
agnatus Br.	305, 322	68, 198	Rev. III. 16, 71, 77, 197, 215	10—12/6	
clivensis	304	61	71, 77, 197	7—8/3—5	
conopileus	305	67, 69, 78	70, 78, 195	14—16/7—8	Qu. prunif. all. 15 μ; Sacc. 14/7 bis 8 μ;
foenisecii Pers.	302	46	70, 78, 196	12—16/6—10	Qu. Mandelf. 14 μ; Sacc. 10 bis 12/6—7 μ;
interjungens Br.	304, 322, 325, 335	60, 196, 217, 271	Rev. III. 17, 71, 78, 235, 338	8/4, 10/5	
murcidus	329	246	235	8—10/4—5	
particularis Br.	305, 322	72, 195	70, 78, 195, Rev. III. 17	16/10	
spadiceo-griseus	304	63	71, 78, 195	10—12/6—8	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 8—10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

spadiceus	304, 329	58, 245	70, 78, 195, 235	6—7/3—4	Qu. ellips. allong. 13 μ;
— v. polycephala	304	57, 59	70, 195	8—9/4	Qu. ellips. allong. 13 μ;
Bolbitius.					
Boltonii	332	261	257	12/8	Sacc. 14/8 μ;
contribulans Br.	307, 337	94, 5	Rev. III. 22, 80, 190, 340	20—22/10—11, 20/10	
marcidulus Br.	337	6, unt. fig. 276	340, Rev. III. 22	16/8	
tener	306	86	80, 190	10—12/6—8	Sacc. 10—12/6—8 μ;
titubans Bull.	306	87	80, 190	10—11/6—8	Qu. 14 μ; prunif. 1—2 guttulée; Sacc. 8—9/4—5 μ;
vitellinus Pers.	330	249	236, 340	12—14/8, 12/6—8	Qu. prunif. 12 μ; Sacc. 13 bis 14/8 μ;
Phlegmacium.					
anfractus Fr.	347, 381	43, 227	315	6—8/5—6	Sacc. 6/4; Qu. ovoid. prunif. 8—9 μ;
arquatus	373	183	199, 316	10—12/6	S. 10—12; Sacc. 10—12;
balteatus	382	230	205, 314	10—12/6	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10—12 μ;
caesio-cyaneus Br.	414, 421	339, 362	340, 351, Rev. IV. 2	8—10/4—5, 10/4	
calochrous	343	21	96, 316	12—14/6—8, 10—13/6—7	Sacc. 12—13/7; Qu. ovoid. 11 μ;
canolilacinus Br.	414	340	340, Rev. IV. 3	8/6	
centrifugus	403	254	315	8—10/4—6	Sacc. 10 μ; Qu. prunif. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

claricolor	383	229	205, 313	8—10/4—5	S. 11—12/5 ½—6 ½; Sacc. 11 bis 12/6—8; Qu. prunif. 10 μ;
cliduchus	391	297	236	8—10/6—8	S. 6½—7/6-6·6; Qu. prunif. 10 μ;
coerulescens	402, 414	253, 338	316, 340	9—12/5—6, 10/6—8	S. 9—10/5—6;
coloratus	404	258	315	14/8	
consobrinus Karst.	390	296	236	12/6—8	Sacc. 9—10/4—5 μ;
corrosus	391	299	236	8—9/4	Qu. prunif. 10 μ;
corruscans Fr.	405	261	317	8—10/4—5	
crassus	373	181	199, 314	10—12/6, 10—14/6—8	
croceocoeruleus	368, 392	163, 302	236, 317	6—8/6, 10/6—7	S. 7—9/6—7; Qu. prunif. 6 bis 8 μ;
cumatilis	368	161	197, 317	10/6	Qu. ovoid. prunif. 10 μ;
cyanopus	373, 424	182, 367	199, 367	8—10/4—6, 12/6	Qu. prunif. ovoid. 10 μ;
decolorans	347	42	97, 317	10—12/5—6	Qu. prunif. 8—9 μ;
decoloratus	345	30	97, 317	10/8	S. 6—8/5—7, Sacc. 6—7/5—6; Qu. prunif. 10 μ;
dibaphus	403	256	316	10—11/6	Qu. prunif. 14 μ; Sacc. 10/7 bis 8 μ; Barb. 12/7—8 μ;
disputabilis Br.	365, 402	148, 251	95, 315, Rev. IV. 1	8—9/6—7	
elegantior	392	301	236	12—14/7½—8	Sacc. 11—14/7—8 μ;
elotus Fr.	343, 365	22, 151	96, 315	10—14/6—8	
emollitus	347	41	97, 317	6—8/2—4	
extricabilis Br.	343	15	96, 316, Rev. IV. 3	8—10/6—7	
fibrosipes Br.	413	336	340, Rev. IV. 2	8/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fraudulosus Br.	343	18	96, 316 Rev. IV. 3	12—14/6	
Friesii	405	266	316	16/8	Sacc. 12—16/6 μ;
fulgens	345	33	97, 316	12/6	Schröt. 9—13/6—7, Sacc. 9/5, Cke. 10/5; Qu. ovoid. pr. 12 μ;
fulmineus	346	34	97, 316	10—13/6—8	Cke. 10/5—6;
glaucopus Schaeff.	344	23	96, 315	10—13/5—6	S. 8—11/5 6, Sacc. 8—9/5—6; Qu. prunif. 8 μ;
herpeticus	368	162	198, 317	8—10, 8—10/8, 10/6	
infractus	376, 386	192, 241	199, 216, 315	8—10/6—8	Qu. prunif. 8—9 μ;
intentus	369	165	198, 317	8/4	
jasmineus	391	298	236	8/6	Qu. prunif. 8—9 μ;
largiusculus Br.	366	155	198, 314, Rev. IV. 1	8—9/7—8, 7—9	
largus	398	323	257	10—12/5—6	S. 9—11/5—7; Qu. prunif. 11 μ; Barb. 12 μ;
latus F. major	342	9	96, 315	8—10/4, 8/4	Qu. prunif. 9 μ;
— F. minor	342	8	96, 315	8—10/4, 10/4	
legitimus	344	26	97, 316, Rev. IV. 2	12—14/8—9	Sacc. 12—14/8—9 μ;
lilacinopes Br.	413	337	340	12—14/7—9	
liratus	368	164	199, 317	10—12/6—7	
lustratus	341	3	95, 314	8—9/4—5	
multiformis	343	17	96, 315	8—10/4—6	S. 7—9/4$^{1}/_{2}$—5$^{1}/_{2}$, Sacc. 8—9/5 bis 6; Qu. prunif. 8—10 μ;
Napus	356	87	96, 315	14/8	
odorativus Br.	426	371	367, Rev. IV. 2	8/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

odorifer Br.	347, 365, 415	40, 149, 342	Rev. IV. 3, 97, 316, 341, 351	10—14/6—8, 12/8	
olivascens	393	304	236	10/4—5	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10—12 μ;
orichalceus	346, 352	36, 64	97, 316	10—12/6, 12—14/6	Qu. prunif. 12 μ;
pansa	343, 425	16, 370	96, 316, 367	10—12/6, 10/5—6	Sacc. 8—9/5 μ;
percognitus Br.	402	252	315, Rev. IV. 2	14/8	
percomis	366	154	199, 315	10 6	Sacc. 11—12/7—8 μ; Qu. prunif. 10 μ;
pertinens Br.	398	322	257. Rev. IV. 1	8—9/3—4	
porphyropus	392	300	236	10—11/6	Qu. Mandelf. 10 μ;
purpurascens	382, 398, 404	231, 260, 324	205, 258, 316, 340	10—12/5—6	S. 8/5, M. 10—12/5—6; Qu. prunif. 10—11 μ; Sacc. 8/5 μ;
rapaceus Fr.	367	157	199, 315	6—8/3—4	Qu. prunif. 8—10 μ;
Riederi	342, 365	10, 13	95, 315	8—10/4—6	
saginus	385, 424	239, 368	216, 367	14/8, 16/8	
saporatus Br.	425	369	367, Rev. IV. 2	12—13/6—7	
scaurus	403	255	317	8—10/4—6	Sacc. 10/4; V. 9/4 μ;
sebaceus	341	1	95, 314	14—15/8	M. 9/7, Qu. 8 μ, Sacc. 10/7—8;
sororius	390	294	236	10—12/6—7	Sacc. 8—10/5—6 μ;
spadiceus Fr.	390	295	236	12—14/8	Qu. ellips. all. 13 μ;
subpurpurascens	415	341	340	10/4—5	
subtortus	367	158	198, 315	8/6	S. 8—9/6—7, Sacc. 8/9/6—7;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

talus	356, 367	89, 160	96, 198, 315	8—10/5—6	Qu. prunif. 8—10 μ;
triumphans	366, 412	152, 333	199, 340	8—10/4—6, 10/6	Sacc. 12—16/5—6; Qu. prunif. 12—13 μ;
truncigenus Br.	413	335	340, Rev. IV. 1	8/5	
turbinatus	345	28	97, 316	12/6	S. 8—10/5½—6, Sacc. 10 bis 11/5—6: Qu. prunif. 10 μ;
turmalis	381, 402	228, 250	199, 313	8—10/6	Sacc. 8—9/5, 10—12/6;
variicolor	357	93	314	16/8	Qu. prunif. 10 μ;
varius	341	5	95, 314	10—12/4—6	Sacc. 10—13/6; Qu. prunif. 10 μ;
— F. elata	412	334	340	12/6—7	
vespertinus	369	167	199, 317	10—12/6, 10—14/6	
vesperus	344	24	97, 317	8/6	
Myxacium.					
arvinaceus Fr.	415	343	341	9—10/8	Qu. prunif. lanceolée 15 μ; 3—4 guttulée;
collinitus	394	307	236	14—16/8	S. 10—14/6—7; Qu. prunif. 18 μ; V. 11—12/4—6 μ; Barb. 12/8 μ;
delibutus	374	186	199, 317	14—16/4—6	S. 7—9/6—7; Qu. ovoid 10 bis 12 μ;
egerminatus Br.	346	39	97, Rev. IV. 4	12/8	
electrinus Br.	400	329	258, Rev. IV. 4	12—14/7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

emunctus	369, 370	168, 170	198, 317	8—9/6—7, 6—9	Sacc. 7—8;
epipoleus F. lilaceo-lamellatus	399	325	258	11—13/10	
fulvo-luteus Br.	417	348	341, Rev. IV. 4	9/8	
grallipes	348	45	317	8—10/6	
griseolilacinus Br.	415	344	341, Rev. IV. 3	8/6	
liquidus	374	185	198, 317	6—9/6—8	
livido-ochraceus F. major	426	373	368	14/7—8	
mucifluus Fr.	373, 384	184, 233	199, 205, 317	12—14/6—7, 10/6	Qu. prunif. 18 μ;
politulus Br.	404	257	317, Rev. IV. 4	8/4	
salor	348, 356, 409	46, 91, 280	98, 317	8—10/6—8	Sacc. 10 μ; Qu. ovoid. 10—12 μ;
sphaerosporus Peck.	417	347	341	8—9/7—8	Sacc. 8 μ;
splendidus	382, 386	234, 240	205, 216, 318	10—12/8, 10—16/8	Sacc. 13—14;
stillaticius	393	306	236	8—10/6—7	Qu. prunif. 14 μ;
subflexuosus Br.	415, 416, 426	345,345a, 372	341, 368, Rev. IV. 3	9 10/7—8, 10/8	
subluteolus Br.	416	346	341, Rev. IV. 4	8/4	
suratus	427	374	368	9/8	
vibratilis	393	305	236	10/8	S. 11—13/6—6·6; Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 6—8/4—5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Inoloma.

aimatochelis	268	243	216, 319	6–7/4–6	
albidocyaneus Br.	367	159	Rev. IV. 4, 199, 318	10–12/4–6	
albo-violaceus	394, 405	308, 263	236, 318	10/6, 10/4–6	S. 7–9/4–5, Sacc. 6–9/4–5;
arenatus	342	12	99, 319	8/6	Sacc. 6–7/4–5;
argentatus F. pinetorum	411	291	318	8–10/4–6	S. 10–11; Qu. ovoid. prunif. 10–11 μ;
argutus	349	49	98	10/4	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 9 μ;
bolaris	370	172	198, 319	6–7/4–5	S. 5–7/4–5½, Sacc. 10/4; Qu. ovoid. 6–8 μ;
Bulliardi	406	267	319	13–14/6–8, 14/6	Sacc. 13/8, Qu. 10 μ; Mandelf.;
cinereo-violaceus	374, 399	188, 326	199, 258, 318	10–12/6	
collocandus Br.	375, 424	190, 375	Rev. IV. 5, 198, 318, 368	8–9/6–7, 6–9	
effictus Br.	346	37	98, 319, Rev. IV. 5	5 8/4	
floccoso-fibrillosus Br.	417	350	341, Rev. IV. 6	8/6	
fusco-violaceus Br.	347, 348, 375	44, 47, 189	98, 318, Rev. IV. 5	7–10/4–5, 9–12/4–6	
hircosus Br.	348	48	98, 318, Rev. IV. 5	8–10/4–5, 10/4–5	
interspersellus Br.	341, 365	6, 150	98, 318, Rev. IV. 5	10/8	
malachius	370, 399	169, 327	199, 258	8–12/5½–6, 10–12/5–6, 12/6	Sacc. 8–12/5½–6; Qu. prunif. 10–15 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

mellinus Br.	417	351	341, Rev. IV. 6	10/8	
muricinus	376	193	198, 318	10—11/4—6	
opimatus Br.	404	259	318, Rev. IV. 4	8/6	
opimus	374	187	199, 318	10—12/6	Sacc. 10 μ; Qu. Mandelf. 10 μ;
— F. fulvo-brunneus	349	50	98, 318	12—14/7—8	
perrarus Br.	416, 417	349, 349 a	341, Rev. IV. 5	10—11/6	
pholideus	372	178	199, 319	8/4—6, 7—8/4—5	S. 7—9/4½—5½; Sacc. 6 bis 7/5—6; Qu. prunif. 8 μ;
recensitus Br.	351	59	99, 319, Rev. IV. 5	6—9/4—5, 9/4—5	
redimitus	356	90	99, 319	9/4—5	
suillus	375	191	198, 319	8—10/4—6, 8—12/4—6	Sacc. 10—12/6—7;
tophaceus F. subfibrosa	351	60	99, 319	10—12/5—6	S. 6·5—8/5·5—7, Sacc. 6—8/5, Qu. 8—9 μ ovoide;
traganus Fr.	349, 350	52, 54	98, 198, 319	8—10/4—6	Sacc. 8—10/5—6; Qu. prunif. 9 μ;
turgidus	386	242	216	12/6	Qu. prunif. 10 μ;
violaceus Linn.	346	38	98, 318	10—12/8, 14—16/8—10	S. 11—13/6—8, Sacc. 12 bis 13/7—8; Qu. prunif. 13 μ;
Dermocybe.					
albocyaneus	406	266	320	12—13/6—7	Quel. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
anomalus	350, 377, 394, 407	55, 197, 309, 274	99, 198, 236, 320	8—11/5—6, 8—10/6—7	Sacc. 8—9/6—7; Qu. ovoid. 10 μ:

©Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

apparens Br.	351, 376	62, 198	100, 198, 321, Rev. IV. 6	8–10/4–6, 8–9/4–5, 10/4–6	
arduus Br.	422	365	351, Rev. IV. 7	10/8	
aureifolius	407	271	320	10–12/6	Sacc. 11–13/4–5 μ;
azureus	375	196	199, 320	10/8, 8–10/4–6	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 10/8 μ;
camurus	383	230	205, 320	8–9/4–5	
caninus	406	264	320	10–12/8	Sacc. 8–10/7–8 μ;
— F. curta	421	363	351	10/8	
cinnabarinus	351	61	99, 320	8–9/4–5	S. 8–9/4–5; Qu. Mandelf. 12 μ;
cinnamomeus	352	66	99, 320	6–9/4–5	S. 7–9/4–6; Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 7–8/5–6 μ;
colymbadinus	408	276	321	11–12/6	
concinnus Karst.	407	272	321	10–12/6–8	Sacc. 9–12/6 μ; Barb. 7–7·5 μ;
constantissimus Br.	422	364	351, Rev. IV. 6	8/6	
cotoneus Fr.	423	366	351	8/4–6	Qu. ovoid. 8–9 μ;
croceus Fr.	350	56	100, 320	6–9/4–6	Sacc. 7–8/5–6 μ;
decumbens Pers.	342	11	99, 319	8/4	Qu. ovoid. prunif. 8 μ;
depexus	352	68	100	7–8/5–6	
diabolicus	418	352	198, 341	7–8/4–6	
evestigiatus Br.	345	32	Rev. IV. 6, 319	6–8/4	
fucatophyllus Lasch.	399	330	258	8/4	Sacc. 8–10 μ;
fucilis Br.	352, 377	65, 199	100, 321 Rev. IV. 7	12–16/6–8, 12–14/8	
fucosus Br.	353	74	Rev. IV. 7, 100, 321	9–10/8	
lepidopus	399, 400	323a, 328	259	10–11/5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

malicorius Fr.	345	29	100, 321	7—10/4—5, 8/4	Sacc. 8–10; Qu. prunif. 8 bis 10 μ;
melleifolius Br.	407	273	320, Rev. IV. 7	6	
myrtillinus	375	195	198, 320	8/4	Qu. ellips. 10 μ;
ochroleucus	395	310	236		H. 6—9/4—5; Qu. prunif.;
orellanus	352, 407	63, 270	100, 321	8—9/6	Qu. ellips. prunif. 8 μ;
riculatus	349	51	99, 319	12—14/8	Sacc. 9—10/7—9;
sanguineus Wulf.	343	20	99, 320	6—8/4	Qu. prunif. 6—9 μ; Sacc. 6/4 μ;
semisanguineus Fr.	344	25	99, 320	6—8/4	
spilomeus Fr.	384	235	205, 320	8/6	Sacc. 8—9/7—8; Qu. ovoid. 10 μ;
subinfucatus Br.	352	67	100, 321, Rev. IV. 7	6	
submyrtillinus Br.	406	265	320 Rev. IV. 6	6	
subnotatus	353	75	100, 321	6—8/4—5	
tabularis	351, 427	58, 376	99, 319, 368	8—10/4	Sacc. 10—16/7—9 μ;
uliginosus Berk.	361	122	100, 320	10/6	
valgus Fr.	376	194	198, 321	8/6	Sacc. 8 μ; Qu. ovoid. 8 μ;
venetus Fr.	427	377	368	6—8/3—4	Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 10 μ;
Telamonia.					
abiegnus Br.	371, 395	175, 311	Rev. IV. 7, 198,236,322	6—8/4—6, 8/6—7	
alutaceo-fulvus Br.	400	331	259, Rev. IV. 9	6—8/5—6	
annexus Br.	355, 357, 388	84, 95, 247	Rev. IV. 8, 102,216,323	10—12/5—7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

armillatus A. et. S.	371	174	101, 197, 323	10—12/6	S. 10—12/5½—6·6, Sacc. 12/6 bis 7 μ;
assumptus Br.	366	156	Rev. IV. 9, 199, 324	10/4	
bivelus	406	268	100, 322	8—10/5—6	S. 8—10/5—6, Sacc. 8—10/5 bis 7; Qu. prunif. 9 μ;
bovinus	372	180	198, 323	8—10/4—5	
brunneo-fulvus	358	101	102, 324	8—10/4—6	Qu. Mandelf. 10 μ;
brunneus	359, 389, 410	109, 248, 284	102, 216, 323	10/6, 8—10/6 - 7, 12—14/6—8	S. 8 10/6—7; Qu. ovoid. 10 μ; Sacc. 8—10/6—7 μ;
bulbosus Sow.	353	73	101, 322	8/4—5	
definiendus Br.	418	354	341, Rev. IV. 10	8—9/6—7	
evernius	376, 380	201, 200	198, 322	10—11/6	Sacc. 8—12/5—7;
fagineti Br.	381	226	198, 324, Rev. IV. 9	8—10, 10/8	
flexipes	379, 381	211, 222	198	6—8/4	S. 6—8/4—5; Qu. ovoid. 8 μ; Sacc. 8—9/5 μ;
fulvocinnamomeus Br.	377	203	199, 323, Rev. IV. 8	10/6	
fundatus Br.	354, 395	78, 313	Rev. IV. 8, 101, 236, 322	12—14/6—7	
gentilis	378	207	199, 323	8/4—6	S. 8—9/5—6; Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Sacc. 8—9/5—6 μ;
— β depressus.	378	208	199	8/4—6	
glandicolor	358	102	102, 324	10—12/4—6	Sacc. 10; Qu. ovoid. prunif. 10 μ;
haematochelis Bull.	409	281	323	6—8/4—5	Qu prunif. 12 μ;
helvolus Fr.	357, 377	94, 204	102, 199, 323	6—8/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

hinnuleus	357, 378, 379	98, 205, 206, 209	102, 198, 291, 323	8–10/4—6	S. 8—10/6—7, Sacc. 8—10/6 bis 7; Qu. ovoid. 8 μ;
hiulcus	353	69	100, 197, 291, 322	8—10/6	Sacc. 8—10/5 μ;
impennis	355, 408	82, 275	101, 322	8—10/4—6	Qu. ovoid. 10 μ;
incisus	341, 379	4, 213	103, 198, 324	8—10/4—5	S. 9—12/6, Sacc. 9—12/6; Qu. prunif. 10 μ;
inconsequens Br.	356	88	Rev. IV. 9, 103, 324	14/7—8	
injucundus	355, 388	86, 246	102, 216, 323	10—12/5—6	
inurbanus Br.	358, 396	103, 315	Rev. IV. 8, 102, 236, 323	10—12/6—7, 10—11/6	
laniger	428	378	368	10—11/5—6	Qu. prunif. 10—11 μ; Sacc. 11 bis 12/6—7 μ;
licinipes	355	83	101, 322	10—12/6	
limonius Fr.			323	8—10/4	
Lindgrenii	370	173	197, 324	8—9/6	
lucorum Fr.	384, 418	237, 353	322, 341	8—10/4—6, 10/6	
melleo-pallens	379	210	198, 324	8—10/6—7	
nexuosus Br.	356	92	101, 324, Rev. IV. 9	6—8/5—6	
paleaceus	370	171	198, 325	10/5—6	Qu. prunif. all. 8 μ;
paragandis	359	106	102, 323	8/4—6	
periscelis	341, 366	2, 153	103, 198, 324	8/4	Qu. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
plumiger	353	71	101, 322	10—12/5—6	Qu. Mandelf. 13—15 μ;
praesignis Br.	401	332	259, Rev. IV. 7	11—12/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

quadricolor	353	70	101, 322	8—10/6—8	
quaesitus Br.	358	104	101, 324, Rev. IV. 9	8—10/4—5	
refectus Br.	353, 377, 388	72, 202, 245	Rev. IV. 8, 101, 199, 216, 322	8—9/5—6	
rigidus	342	14	103, 325	8—10/4—5	S. 5—11/4—6; Sacc. 6—11/4 bis 6; Qu. ovoid. prunif. 8 μ;
rubellus Cke.	409	283	323	10/6—8	
separabilis Br.	354, 360	81, 116	Rev. IV. 8. 103, 122, 323	8/4	
sporadicus Br.	359	108	102, Rev. IV. 9	6—8/5—6	
stemmatus	379	212	198, 324	8.4	
subcarnosus Br.	379	214	198, 324, Rev. IV. 9	6/4	
testaceo-canescens Weinm.	354	76	100, 321	8—10/6—7	Qu. prunif. 8 μ;
torvus Fr.	371	177	197, 322	8—10/4	Qu. prunif. fusif. 15 μ; Bäuml. 9—10/6—7 μ;
triformis	360	111	103, 324	10/8	
urbicus	345, 407	31, 269	101, 322	10—12/5—7	Qu. prunif. 8 μ;
Hydrocybe.					
acutus	344, 346, 377, 411	27, 35, 224, 295	106, 328	8—10/4—6, 10/4—6	Qu. prunif. all. 10 μ;
angulosus	364	140	104, 326	10—12/4—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

armeniacus	360, 395	113, 314	103, 236, 325	8—11/4—6	Qu. prunif. 10 μ;
balaustinus	362	127	104, 326	8/4—5	
benevalens Br.	362, 419	126, 359	Rev. IV. 10, 104, 326, 342	10/6	
blaudulus Br.	357	96	106, 327, Rev. IV. 11	10/4—5	
Bresadolae	341	7	103, 325	6—8/4—5	Sacc. 6—8/4;
candelaris	380	215	199, 325	8—10/4—6, 8/4	
castaneus	361, 397	119, 320, 321	104, 236, 326	10—14/5—7, 8—10/4—5	S. 8—10/6—7; Sacc. 10/3—5; Qu. ovoid. 8 μ;
cohabitans	411	292	326	8—9/5, 10/8	Sacc. 8—9/5 μ;
colus	384, 428	232, 380	205, 326, 368	8—10/6—8, 8/5—6	Sacc. 8—9; Qu. prunif. 8—9 μ;
cypriacus	362	128	104, 326	10—12/6—7	Qu. prunif. 10—12 μ;
damascenus	360, 396	115, 316	103, 236, 325	6—7—8/4, 6—10/4—6, 8/4	Sacc. 8—13/4—7; Qu. Mandelf. 10 μ;
decipiens	360, 429	114, 384	106, 369	8—10/5—6, 10—12/6	Qu. prunif. 8—9 μ;
depressus	354, 379	80, 225	106, 198, 328	8—9/4—5, 8/5	
detonsus	359	105	106, 327	8—10/5—6	Sacc. 6 - 9/5—6;
dilatus Pers.	361	118	104, 325	8—9/5—7	S. 7—9/5—6; Sacc. 6—8/4—5;
divulgatus Br.	361	117	Rev. IV. 10, 103, 325	8—10/6	
dolabratus	364	138	105, 327	8—10/4—6	
dubitabilis Br.	420	360	342, Rev. IV. 11	9—10/3	
duracinus	354, 418	77, 356	103, 325, 342	8—10/4—6, 8/4—5, 6—8/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

erugatus (Weinm.) Fr.	361, 428	121, 379	104, 325, 368	8—10/4—5, 10/4—5, 10/5	Sacc. 10 μ; Qu. prunif. 9 μ;
erythrinus Fr.	365	147	106, 327	12—14/6—7, 10—14/5—7	Qu. prunif. 8 μ;
fasciatus	343, 410, 411	19, 286, 289	106, 328	10—14/5—7, 14/6—7	
finitimus Br.	360, 409	110, 282	106, 328, Rev. IV. 11	6—7/2—3	
firmus	359, 372	107, 179	103, 325	10—12/4—5	Qu. prunif. larmeuse 9 μ;
fistularis Br.	358	99	Rev. IV. 11, 106, 327	9—10/5—6	
fulvescens	364, 420, 429	141, 361, 383	105, 327, 342, 368	8—10/4—6, 8-10/4, 10/4-5	Qu. Mandelf. 12 μ;
germanus	363, 378, 408	136, 223, 279	106, 197, 327	8—10/5—6	Qu. 6—8 μ; ovoid. prunif.
Hoeftii	361	123	104, 325	10/6	
illepidus Br.	380	216	326, Rev. IV. 10	10/4	
illuminus	354	79	103, 325	10—12/5—6	
imbutus Fr.	362, 419	125, 358	104, 326, 342	10/4—5	Qu. 10 μ; Cke. 7—9/4—5;
insignis Br.	460	144	Rev. IV. 11, 106, 327	8—9/6	
irregularis Fr.	365	145	105, 327	6—7/4—5	
isabellinus	362, 380, 397	130, 217, 319	104, 198, 236 326	8—10/4—5, 10-11/6, 8/4	Qu. ovoid. prunif. 10 μ;
jubarinus	363	132	105, 236	7½—9/4, 8—10/6	
Junghuhnii	351	57	106, 328	6—8/5—6	Sacc. 8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

laetior	397	318	236	10/6—7	Sacc. 7—9/4—6 μ;
leucopus	360, 380	112, 220	105, 197, 327	7—8/3—4, 8/4	Qu prunif. 8—9 μ;
livor	383	238	205	8/4	
luxuriatus Br.	347, 389	143, 249	Rev. IV. 10, 105, 216, 326	9—12/4—6	
milvinus Br.	369	166	198, 328	8—10/4—6, 10—12/4—6	Qu. prunif. 8—9 μ;
multivagus Br.	363, 392, 427	135, 303, 381	Rev. IV. 11, 105, 236, 368	6—8/6, 8/6	
obtusus Fr.	355	85	106, 328	10—14/4—6, 10—11/4—6	
— F. gracilis	408	278	328	8—10/4—5	
pateriformis	363, 429	134, 382	105, 368	8—10/4—6, 10/5	Qu. prunif. 8—9 μ;
privignus	418	355	342	9/6—7	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 8 μ;
redactus Br.	361	120	Rev. IV. 10, 104, 325	9—10/6	
Reedii	410	287	327	12—13/7—8	
renidens Fr.	378. 381, 387	206, 218, 244	197, 216, 342	6—8/4—5, 8/4—5	
rigens	364, 411	142, 290	105, 327	6—8/5—6, 8—10/4—5	Qu. pruni. 8—9 μ; Sacc. 8 bis 9 μ;
rubricosus	363, 380	133, 219	105, 198, 326	8—9/4, 8—10/4—6	
saniosus	365	146	106, 327	8—10/4—6	S. 8—12/5—6; Sacc. 8—12/5 bis 6;
saturninus Fr.	350, 419	53, 357	197, 325, 342	8—10/6—8, 10/6—7	Barb. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

scandens	364, 380	139, 221	105, 198, 327	8—10/4—5	Qu. prunif. 8 μ;
scyophyllus	371	176	198, 326	8—10/6—8, 8—10	
subcandelaris Br.	328	317	236, Rev. IV. 10	5—6/2½—4	
subferrugineus	358, 410	100, 285	103, 325	8—10/4—6	S. 10—11/5—6 μ; Qu. prunif. 10 μ;
tortuosus	361	124	104, 325	10—11/4—6, 8—11/5—6	
unimodus Br.	363	131	Rev. IV. 11, 105, 328	10—12/6—8, 10—12/8	
uraceus	362	129	105, 326	10/4—6	Sacc. 9 μ; Qu. prunif. 8—9 μ;
— F. Bresadolae	411	288	326	8/4	
zinziberatus	357	97	104, 326	8—9/6	
Gomphidius.					
glutinosus	430, 433	1, 14	107, 197, 236	18—20/6, 22—23/7½	Qu. fusif. 22 μ; Sacc. 16—23/6 bis 8 μ;
gracilis Berk.	431, 433	9, 11	216, 237	18—20/6—8	Qu. lancéolée 15—20 μ; Beck. 16—19/6—7·4 μ;
litigiosus Br.	433	13	236, Rev. IV. 11	18—20/6—8	
maculatus	433	12	237	18/6	Qu. lancéolée 15—20 μ; Sacc. 23/8 μ;
roseus	430	3	107, 197	18—20/6	S. 20—23/6—7: Qu. lancéolée 18—25 μ; Sacc. 20—23/6 bis 7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

testaceus Fr.	430	2	197, 197	18—20/5—6	
viscidus	430, 433	4, 10	107, 197, 237	16—20/6—7, 20/6	S. 16—20/5—6; Qu. subfusif. 20—25 μ; Sacc. 16—23/6 bis bis 8; Guill. 16—18/6—7 μ;
Paxillus.					
atrotomentosus	430	7	107, 194	6/3—4	S. 5—6/3—4; Qu. ellips.—rénif. 6—9 μ; Sacc. 6/3—4 μ;
involutus	430	5	193	6—10/4—5	S. 7—9/4½—5½; Qu. ellips. 8 μ; Sacc. 8—12/5—6 μ;
— F. truncigena	432	10	216	10/5—6	
leptopus	434	15	259	8/4—5	Qu ellips. 10 μ;
panuoides Fr.	442	8	194	6/4	S. 4½—6/3—4; Qu. ellips. 6 μ; 1—2 ocellée; Bäuml. 5—6/3 bis 4 μ; V. 4/3 μ; Sacc. 4 bis 5/3—4 μ;
prostibilis Br.	430	6	107, 194, Rev. IV. 12	9—11/5—6	
Limacium.					
agathosmus	437	15	108	8—10/4—5	K. 8—9/5; Qu. ovoid. 12 μ; Beck. 6—8·5/3·7 μ; Cke. 10/5 μ; W. 8/5 μ; Sacc. 8—10/4 bis 5 μ;
alboroseus Br.	443	53	200, Rev. IV. 12	10—12	
arbustivus Fr.	442	47	200	10/4—5	Qu. ellips. prunif. 6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

aureus	438, 451	19, 82	108, 200	8/4	Qu. ovoid. oblong. 8 μ; Sacc. 8/4 μ;
capreolarius	444	55	200	8/4	
chrysodon	435	3	107	8—10/4—5	S. 8—9/4—4½; Qu. prunif. all. 10 μ; Sacc. 8—9/4—4·5 μ;
discoideus	439, 441, 443, 451	25, 45, 57, 81 a, b	108, 237	8—10/4—6, 10—11/6, 6—8/3—4	K. 5—6/4—5; Qu. prunif. guttulée; Sacc. 5—6/4—5; vel. 6—8/3—4 μ;
eburneolus Br.	435, 448, 450	6, 68, 79	Rev. IV. 12, 107, 216, 237	9—11/4—5, 10—11/5	
erubescens Fr.	442, 444	50, 54	200	8—10/3—4	Qu. ovoid. prunif. 7—8 μ; Sacc. 8—10/4—5 μ;
Friesii	438	17	108	8/4—5	Sacc. 8/4—5 μ;
fusco-albus	436	13	108	6—8/4	Sacc. 7—10/5—6 μ;
hypothejus Fr.	436, 454	11, 99	108, 237	8—10/4—5	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 8—10/4·5 bis 5 μ; Barb. 9/4—5 μ;
latitabundus Br.	437	14	108, Rev. IV. 12	10—12/6—8	
leucophaeus	436	7	108	8/4	Sacc. 8/4 μ:
— F. minor	441	43	108	6—8/4	Sacc. 6—8/4 μ;
ligatus Fr.	435, 450, 456	1, 78, 102	107, 200, 342	8—10/4—5, 8/5	Sacc. 8—10/4—5 μ;
limacinus Fr.	436, 445	8, 56	108	12—14/8—9	Sacc. 12—14/8—9 μ;
livido-albus	441, 452	41, 84, 86	108, 237	10—12/6—7, 10/6	Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 10—12/6 bis 7 μ;
— F. flavipes	452	85	237	10/6	
mesotephrus	441	42	108	8—9/4	Qu. ellips prunif. 10—12 μ; Sacc. 9—12/4 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

olivaceo-albus	451	83	237	10/6	W. 7—4½; Qu. ovoid. all. 12 bis 14 μ; Sacc. 7/4·5 vel 10/5 μ;
penarius	435, 443, 450	2, 52, 80	108, 200, 237	6/3—4, 6—7/4, 7—8/3—5	Qu. ovoid. 4 μ; Sacc. 7—8/3 bis 4 μ;
ponderatus Br.	435	4	107, Rev. IV. 12	8—9/4—5	
pudorinus	436	9	108	8/4	Qu. 13—16 μ; ellips. allong.; Sacc. 8/4 μ;
pustulatus	436	12	108	8—10/4—6	W. 8—9/4·5 Qu. ovoid. prunif. 9 μ; Sacc. 8—10/4—5 μ;
rubro-fibrillosus Br.	455	101	259, Rev, IV. 12	10/6	
tephroleucus	442	48	201	10/6	Qu. ovoid. sph. 8 μ;
terebratus	436	10	108	8—12/4—7	
Camarophyllus.					
acutisporus Br.	438	20	342, Rev. IV. 13	8—10/4	
cinereus	441, 446	44, 62 a	109	6—10/4—5	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 8 bis 10/4 6 μ;
clivalis	439	31	109	6—7/4	Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Sacc. 6 bis 7/4 μ;
coibilis Br.	437, 454	16, 100	109, 237 Rev. IV. 13	5—6/3—4	
ericeti Br.	457	107	342, Rev. IV. 13	10/6—8	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

facessitus Br.	438	18	109, Rev. IV. 13	6–7/5—6	
flavellus Br.	458	111	342, Rev. IV. 14	10/4—5	
flavipes Br.	448	69	216, Rev. IV. 13	6–8/6	
gentilitius Br.	439	32	109, 200, Rev. IV. 14	8—10/5	
glaucus	457	109	342	8/5	Sacc. 6—8 μ diam.;
irrigatus	447	64 a	217	8—9/4—5	Qu. ovoid. 7 μ;
irrigatus F. pallescens	447	64 b	217		
lectus Br.	446	63 a, b	200, 342, Rev. IV. 14	8—10/4—5	
nemoreus	438	21	109	6—7/3—4	Qu. ovoid. pyrif. 6 μ; Sacc. 6 bis 7/3—4 μ;
nitidus B. et. C.	478	112	343	10/5—6	
niveus	439, 444	23, 59	109, 200	8/4, 6—9	Qu. ovoid. 8 μ; Sacc. 6—8/4 bis 5 μ;
— F. grisea	449	72, 73	237	6—9/3—4	
ovinus	453	90	237	10/8	Qu. prunif. ellips. 8—10 μ;
parvipes Br.	457	108	342, Rev. IV. 13	10—12/6	
pratensis	438, 456	22, 103	109, 200, 342	6/4, 6—8/4	Qu. ovoid. prunif. 5—8 μ; Sacc. 7—10/4 μ;
— F. cinerea	446	62 b	200	10/4—6	Sacc. 8—10/4—6 μ;
pratensis F. minor	445, 457	58 a, 104	200, 342	8—10/6, 8/6	
— F. pallida	457	105	342	6—8/4, 6/4	
streptopus	458	110	342	8—10/6	Qu. ellips. ovoid. 7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

subradiatus	439	22	109	6--8/5—6	Qu. ovoid. sph. 6--8 μ; Sacc. 6—8/5—6 μ;
velutinus Borsz.	439	30	109	8/4	
virgineus Wulf.	435	5	109	8—10/4—5	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Berl. 10—12/6 bis 7 μ; Sacc. 8--11/5—6 μ;
— F. clavaeformis	457	106	342	10/6	
— F. fuscata	449	71	237	10/6	
— F. ochroleuca	452	87	237	10/5	
— F. umbrino-marginata	449	70	237	10—12/6	
Hygrocybe.					
cantharelliformis Br.	453	89	237, Rev. IV. 14	8/6	
ceraceus (Wulf) Fr.	449, 453	37, 88, 98	110, 237	6—8/4—5	S. 9—10/5--6; Qu. ellips. prunif. 10 μ; Sacc. 7—8/4—5 μ; Bres. 12/8 μ;
chlorophanus	449, 454	74, 96, 97	238	8/4—6, 8—10/6	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 8 μ;
coccineus	439	29	110	8/4	S. 6--8/4—5; Qu. ellips. 8 μ; Sacc. 6—8/4—5 μ;
Colemannianus	439	26	109	8—10/4	Berkel. 6--8 μ;
conicus	440	35, 40	200	12—14/6—8	S. 9—11/6—7; Qu. 6 μ prunif.; Sacc. 10—11/6—8 μ;
glauconitens	440	38	110	6--8/6—7	Sacc. 6—8/6--7 μ;
glossatus Br.	439	28	109, Rev. IV. 13	6/4	
hyacinthinus Quel.	443	51	237	8—10/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

laetus Pers.	447, 453	65, 94	217, 237	8—10/5—7, 8—10/3—4	Qu. ovoid. prunif. 5 μ; Sacc. 9—10/6—8 μ;
miniatus	445, 453	60 a, 95	237	8—10/6	Qu. prunif. 8 μ; Sacc 8·5/6 μ;
mucronellus	439	27	200, 210	10/6	
— F. depressus	447	66, 67	217	10—12/6 - 8	
nitratus	442	49	200	10 11/5—6	Qu. ovoid. lanceol. 8 μ; Sacc. 7—8/5—6 μ;
obrusseus	440	33 a, b, 36	110	10—12/6—9	Qu. prunif. 7 μ; Bäuml. 8 - 10/4 bis 5 μ; K. 7/3 μ; Barb. 8/4 μ;
persistens Br.	446, 449	64, 75 bis 77	200, 237, Rev. IV. 14	10—16/6—10	
pertractus Br.	440	39	110, Rev. IV. 14	5—6/2—3	
psittacinus	440	34 a	110	10—12/4 6	S. 7—8/5 6; Qu. ellips. 9 μ; Sacc. 7—9/5—6 μ;
puniceus	441	46	110	10/4—5	S. 8—10/5—6; Qu. prunif. all. 13 μ; Sacc. 10/4—5 μ;
sciophanus	452	92, 93	237	10/6—8, 10/6	Qu. prunif. all. 9 μ;
spectandus Br.	453	91	237, Rev. IV. 14	10—11/5—6	
subvirens Br.	440, 446	34 b, 61	110, 200, Rev. IV. 15	8/4	
vitellinus	439	24	109	6/3—4	Qu. ellips. prunif. 10 μ; Sacc. 6/3—4 μ;
Lactarius.					
acerrimus Br.	473	55	238, Rev. IV. 15	12—14/9—10	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

acris Bolt.	463	18	111	6 10/5—8	S. 7—9/6 - 7; Qu. 10 μ; Sacc. 8—9/6—8 μ;
adscitus Br.	467	33 b	111, Rev. IV. 15	8—10/8	
albo-carneus Br.	478	73	343, Rev. IV. 16	10—12/8—10	
azonus Br.	471, 475	45, 61	200, 238, Rev. IV. 16	10—11/8	
blennius	460	8	110	8—10/6	Qu. 6—7 μ; Sacc. 7—9/5—6 μ;
camphoratus	477, 481	69, 81	260, 369	9—10/8—9, 10/8	Qu. 9 μ; Sacc. 6—7 μ diam.;
carneo-isabellinus Br.	479	74	351, Rev. IV. 16	8/6	
chrysorrheus Fr.	474, 480	58, 78	238, 369	8/6	S. 7—9/6—7; Qu. Sp. citrine; Sacc. 7 μ diam.;
cilicioides	459	2	110	10/6—7	Sacc. 8—10/6—7 μ;
conditus Br.	463, 471	20, 47	112, 200, 343, 388	8—9/7—8	
controversus P.	477	70	259	6/4	Qu 6 μ; Sacc. 7—8/6·5 μ: Barb. 6 μ;
curtus Br.	461, 480	12, 77	111, 369, Rev. IV. 15	6—8/6, 8/6	
cyathula Fr.	461	11	112	6—8/6—8	Qu. 8 μ; Sacc. 6—8/6—8 μ:
deliciosus	463	17	112	9—10/6—8	S. 8—9/6½—7; Qu. 10 μ; St. 8/6·5 μ; V. 7 - 8 μ; Sacc. 7—8 μ diam.; vel. 9—10/6—8 μ;
fuligineus Fr.	467, 468, 476	33 a, 40, 66	113, 238	10—11/10	S. 7—9; Qu. 12 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

glyciosmus	466	29	112	8—10/6—8	S. 6—8; Qu. 9 μ;
helvinus Br.	472	53	217, Rev. IV. 17	8/6	
homaemus Br.	462, 477	14, 67	111, 259, Rev. IV. 15	8/6	
hysginus	462, 466, 468	15, 30, 41	111, 112	8—10/6—8	Qu. 8—9 μ; Sacc. 10/7—8 μ;
ichoratus	467	36	113	8—10/6—7	Qu. 10 μ; Sacc. 8—10/6—7 μ;
insulsus Fr.	472	51	217	10/8	Qu. 11—12 μ; Sacc. 7—8/6—8 μ;
lignyotus	459	4	112, 199	8—10/8—10	S. 7—9; Qu. 10 μ;
luridus	462	13	111	8/6	Sacc. 8/6 μ;
mammosus	476	65	238	8/5—6	
mitissimus	467	35	113	6—8/4—6	S. 6·6—8; Qu. grenelée 10 μ; Sacc. 6—8/4—6 μ;
mititicus Br.	481	80	369, Rev. IV. 17	8/6	
musteus	460	7	110	6—9/6—7	Sacc. 6—9/6—7 μ;
nominabilis	476	63	238, Rev. IV. 16	10/6	
oedematopus Scop.	467	34	113	8/6	Qu. 10 μ;
pallidus	466, 468	28, 39	112	8—10/4—6	Qu. 10 μ; Sacc. 7 - 8 μ diam. vel. 8—10/6—8 μ;
paludestris Br.	477	71	260, Rev. IV. 16	10/8	
pargamenus	461	10	111	8/6	V. 6—7 μ diam.;
picinus	466	32	113	8—10/8—10	Qu. 10 μ; Sacc. 5—6 μ diam.;
piperatus	465	24	112		S. 6/5; Qu. 10 μ; Sacc. 6—7/5 μ;
platicus Br.	470	44	238, Rev. IV. 16	8/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

plumbeus	464	22	111	6—8/4—6	Qu. 8—9 μ; Sacc. 6—8/4—6 μ;
proportionalis Br.	475	62	238, Rev. IV. 16	8/6	
pubescens	470	50	199	8—9/6	
repraesentaneus Br.	459, 478	3, 72	110, 343 Rev. IV. 15	10—11/6—8	
roseozonatus	469	42	199	8/6—7	
rubescens Schrad.	465, 469	27, 43	112, 199	6—8/6—8	Sacc. 6—8 μ diam.;
rubrofuscus	471	49	199	8/6	
rufus	465	25	112	10/6—8	S. 6·6—8·8/5—6·6; Qu. 10 μ; Sacc. 6—8 μ diam.;
scrobiculatus	459	1	110	9—10/7—8	S. 6—8; Qu. 11 μ; Beck. 6·1 bis 9·9 μ; St. 8/6 μ; Sacc. 10 μ diam. vel. 11—12/8—9 μ;
serifluus	468, 471	37, 48	113, 200	10/8	S. 6·6—8/6—7;
subdulcis	466	31	113, 260	8—10/6—7	S. 6½—7/5·5—6·6; Qu. 10 μ; St. 9/7 μ; Sacc. 7 μ;
subumbonatus Lindg.	472	52	217	10/8	Qu. 9 μ; Sacc. 9 μ diam.;
tabidus	468	38	113	8/4—5	Qu. 10 μ; Sacc. 8/4—5 μ;
thejogalus Bull.	477, 481	68, 79	259, 369	9/7, 10/8	Qu. citrine; Sacc. 7—9 μ diam.; Barb. 8 μ;
tithymalinus	479	75	351	8—9/6	Qu. 9 μ;
torminosus Schaeff.	460	5	110	10—12/8	S. 6·6—8/5—6; Qu. 8 μ; V. 6 bis 8 μ diam.; Sacc. 9/6 vel. 10—12/8 μ;
— F. albida	474	57	238	8—9/6	
trivialis	461, 480	9, 76	111, 369	8—10/6, 8/6	Qu. 8—9 μ; Sacc. 8 10/8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

turpis Fr.	473	54	238	6—7/4—5	S. 6—8/5—6 μ; Sacc. 6 - 8 μ diam.;
— F. stipiti longo	474	56	238	8/6	
umbrinus	463	19	111	8—10/8	Beck. 6—8·6 μ; Sacc. 8—10/8 μ;
utilis Weinm.	475	60	233	8/6	Qu. 10 μ;
uvidus	463	16	111		S. 7—9/6—8; Qu. 10 μ; Beck. 6—7 μ;
vellereus Fr.	465	26	112	9—12/8—10	S. 8—9/6·5—7 5; Qu. 10—11 μ; St. 7 μ; Barb. 7—8 μ; Sacc. 8—9/4·5—5 μ;
vietus Fr.	463, 476	21, 64	112, 238	6—8/6—8	S. 8—9/6—7; Qu. 10 μ; Sacc. 6—8/6—8 μ;
violascens	470	46	200	10/8	S. 8—9/6—7; Qu. 10 μ;
viridis Fr.	464	23	111	8/5—6	Sacc. 8/5—6 μ;
volemus Fr.	460	6	113	8—10/8—10	S. 7—8; Qu. 10 μ; Sacc. 8 bis 10 μ diam.;
zonarius Bull.	474	59	238	8/6	S. 7 μ; Qu. 11—12 μ; Sacc. 7 μ diam.;
Russula.					
adulterina	493	46	201	8—9/6—8	
adusta	483, 518	5, 117 a	113, 343	8—10/6—8, 10/6—8	S. 7—9/6—7; Qu. 7—9 μ; Sacc. 7—9 μ diam.; vel. 10/7—8 μ;
— F. gigantea	518	117b	343		
aeruginea Fr.	516	111	239	10/6—8	S. 7—9/5·5—6·5 μ; Sacc. 8 bis 10 μ;
albonigra	499	55	217	8/6—7	Qu. 8—10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

alutacea Pers.	489	34	116	11—14/8—10	V. 6—8 μ; Sacc. 11—14/8 bis 10 μ;
amoenata Br.	486, 507	21, 84	116, 240, Rev. IV. 18	10/8	
atropurpurea	508	87	239	10/8	
— F. peracris	514	104	239	8—9/6—7	
aurata	491	40	115	10	Qu. 10 μ; Sacc. 10 μ;
Britzelmayri	498	54	218	10—12/10	
cavipes Br.	512	98	239, Rev. IV. 18	10/6—8	
chamaeleontina	507, 511	81, 95	240	8—10/6—8	Qu. 8 μ;
— F. latelamellata	512	97	240	10/8	
citrina	486, 513	22, 102	239	8—10/8	Barb. 8·5/7 μ;
— F. umbonata	513	100	239	10/8	
Clusii	487	27	115, 201	10—12/8	Qu. 10 μ; Sacc. 10/8 μ;
coerulea	482	3	114	8—10/8	
constans Br.	496, 503	52, 66	218, Rev. IV. 18	9—10/5—7½	
cyanoxantha Schaef.	484	12	114	8—10/6—8	Qu. 8 μ; Sacc. 8—10/6—8 μ; Barb. 8—9 μ;
— F. lilacina	522	126	352	8/6—8	
decolorans	497	53	218	10—12/8—10	Qu. 9 μ;
delica	483, 519	7, 118	113, 343	8—10/6—8, 10—11/8—9	Qu. ellips. 10 μ;
densifolia	517	113	260	8/6	Sacc. 7—8 μ diam.; Guill. 8 μ diam.;
depallens Fr.	501, 517, 521	61, 115, 133	217, 260, 352	8—9/6—7, 10—12/8—10, 10/8	Barb. 8/5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

elephantina Bolt.	490	36	113	14/10	Sacc. 14/10 μ;
emetica	487, 514	23, 107	115, 239	10—12/6—8, 10/8	S. 6—8/5—6; Qu. 8 μ; Sacc. 8 bis 10 μ diam.;
esculenta Pers.	489, 500	35, 59	115, 218	10/8	Qu. 10 μ; Sacc. 10/8 μ;
expallens	516	108, 112	239	8—10/8	
fallax	487, 493, 593	24, 45, 68, 69	114, 201, 218	9—10/7—8, 8/6	Sacc. 8/6 μ;
farinipes	515	106	239	8—9/6—7	
fellea	493, 521	44, 128	352	10/8	Qu. 9 μ;
fingibilis Br.	488	32	114, Rev. IV. 18	8—10/6—8	
foetens	485, 523	18, 127	114, 352	9—12/7—9, 10 μ	S. 7—8/6—7; Qu. 9 μ; Sacc. 8 μ diam. vel. 9—10/7 - 8 μ;
fragilis	486	20	114	8—10/8	S. 6—8/5—7; Qu. 7—9 μ; Sacc. 8—10/8 μ;
— F. griseo	512	99	240	10/8	
— F. griseo-violacea	524	130	352	10/8—9	
— F. nivea	508	86, 88	239	8—10/6—8	
— F. violacea	513	101	239	8—10/6—8	Qu. 8—9 μ;
— F. violascens	487	25	115	9/8	
furcata	482, 505	4, 74	114, 238	10/8—9	Qu. ellips. 8 μ; Sacc. 7—8 μ diam.;
galochroa	504	72	217	10/8	
grata Br.	510, 520	92, 120	Rev. IV. 17, 239, 343	12/10, 10	
graveolens	508	85	239	8/6	
— F. rubra	515, 517	105, 116	239, 260, 352	10—12/8	
grisea Pers.	504	70	218	10/8	Qu. 8 μ; Sacc. 10—11/6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

heterophylla	492, 500	41, 58	201, 217	10/6, 8/6	S. 6·6—8/6—6·6; Qu. 8 μ; Sacc. 6—7/5—6 μ;
incarnata	490, 523	39, 134	115, 238, 352	10—11/8	Qu. 9 μ; Sacc. 9 μ diam.;
integra	488	31	115	10—11/8—9	S. 8—10/7—8; Qu. 10 μ; Sacc. 8—10/8—9 μ;
lepida	484, 506, 523	11, 78, 123	114, 239, 352	8—10/8, 8—10/6—8	Qu. 10 μ; Sacc. 8—10/6—8 μ;
— F. rubra	509	91	239	10/8—9	Sacc. 8—10 μ diam.;
Linnaei	486, 522	19, 124	114, 201, 352	8—10/8, 10—12/8—10	Sacc. 8—11/8 μ;
lutea	482, 484, 490	2, 14, 37, 38	116	8—11/6—9	Qu. 9 μ;
— F. luteo-rosella	525	132	353	9/7½	
luteolo-alba Br.	520	121	343, Rev. IV. 19	10/8	
minutalis Br.	483, 506, 509	6, 77, 90	Rev. IV. 17, 114, 239	8—10/6, 8/6	
mustelina Fr.	514	103	238	8—9/6	Qu. ellips. 8—9 μ; Barb. 10 μ; Roll. 6 μ;
nauseosa F. albida	510	93	240	8—10/6—8	Qu. 11 μ;
nigricans	482	1	201	8—10/6—7	S. 8—9/6·5—7; Qu. 10 μ; Sacc. 6—7 μ diam.; vel. 8—9/6—7 μ;
nitida	488, 509	28, 89	116, 240	8—10/6—8	Qu. 10 μ;
ochraceo-alba Br.	524	131	352, Rev. IV. 18	9—10/7—8	
ochroleuca	487, 494, 495, 524	26, 51a, b, 129	115, 201, 352	10/8	S. 7 μ; Qu. 10 μ; Sacc. 7 μ diam.;
olivaecolor Br.	503	65	217, Rev. IV. 17	9/7	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

olivascens	485, 519	16, 119	114, 343	8—10/6—8, 8/6	Qu. 8—9 μ; Sacc 8—10/6—8 μ;
paludosa Br.	488, 501, 511	33, 60, 96	Rev. IV. 17, 115, 217, 239	10/8	
pectinata	485, 495, 527	17, 50, 138	115, 201, 369	8—10/6—8, 8—10/7	Qu 8 μ; Sacc. 8—10/6—8 μ;
puellaris	494, 507	48, 83	201, 240	10/7—8	Qu. 8 μ; Barb. 8—9/7 μ;
pulchralis Br.	484, 505	13, 73	Rev. IV. 17, 114, 238	8—9/7—8	
purpurea Gill.	517	114	260	10/8	
Queletii	499	57	217	10/8	Qu. 9 μ;
rosacea Fr.	484	9	114	8—9/6—7	S. 6—7;
— F. alutacea-maculata	506	76	238	10/8	
— F. infundibuli-formis	511	94	238	10/8	
— F. subcarnea	505	75	238	8/6	
rubra D C.	485, 502, 507	15, 63, 79, 80	114, 217, 239	10/8, 10/8—10	S. 8—10/6—8; Qu. 8—9 μ;
sanguinea	494	49	201	10/8	Qu. 10 μ; V. 6 μ diam.;
— F. griseipes	502	62	217	8—9/7	
— F. umbonata	527	137	369	10/8	
Sardonia	484	10	114	8—10/4	
semicrema	483	8	113, 201	10/6—8	Sacc. 10/6—8 μ;
subcompacta Br.	494, 504	47, 71	201, 218, Rev. IV. 19	10/6	
* **truncigena Br.**	515	109	240, Rev. IV. 18	8/6	
vesca Fr.	492, 499 526	43, 56, 125	201, 217, 352	8/6	Qu. 8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

vesca F. pectinata	521	122	352	7—8/6	
veternosa	515, 525	110, 135	240, 352	10—12/8—10, 10/8	Qu. 10 μ;
virescens	488	30	114	8—10/4	S. 6·6—7/6—6·6 μ; Qu. 10 μ; Sacc. 6—7 μ diam.; vel. 8 bis 9/8 μ;
vitellina	526	136	353	10/8	
xerampelina	488, 492, 507	29, 42, 82	115, 201, 239	10—12/8—10, 8—10/6—8	Qu. 10 μ;
Cantharellus.					
aurantiacus	528	3	116	6—8/4	S. 5—7/4—4½; Qu. ovoid. prunif. 5 μ; Sacc. 5—7/3—4 μ;
cibarius Fr.	528	1	116	8—10/4—6	S. 7—9/4½—5; Qu. ovoid. prunif. 11 μ; Henn. 8—10/5 μ; Sacc. 8—10/5—6 μ;
cinereus Fr.	529, 531	14, 17	205, 353	10/6, 10/8	S. 7—9/4½—5; Qu. prunif. 10 μ; Berk. 15/8 μ; Cobelli 9/5 μ;
Friesii	528	2	116, 201	5—7/2—3	Qu. 10 μ ellips.; Sacc. 5—7/2 bis 3 μ;
infundibuliformis Scop.	528, 532	4, 5, 20	260, 369	9—12/7—8, 10—11/8—9	Qu. ellips. 10—12 μ; Sacc. 9 bis 11/7—8 μ;
— F. subramosa	531	16	353	12/8—10	
leucophaeus	529	11	205	10—12/8—11	
lobatus Pers.	528, 531	6, 18	116, 353	8—9/4—6	Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 10 μ;
lutescens	529	13 b	202, 260	10—12/6—9, 10—14/8—9	Qu. ovoid. ellips. 10 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

muscigenus Bull.	528	8	116	10—12/6—8	S. 4—5; Qu. ovoid. acuminée 10 μ; Sacc. 10—12/6—8 μ;
muscorum Roth.	528	7	116, 202	3—4/2—3	Sacc. 3—4/2—3 μ;
roseolus Br.	532	19	369, Rev. IV. 19	12/8	
rufescens	529	12	205	12/8—10	
tubaeformis Fr.	529	13 a	260, 116	10—14/8—10 10—12/8	S. 9—12 7—8; Qu. prunif. 10 μ; Worth. 7—8/4·5 μ;
umbonatus	37, 65, 530	279, 385, 15	121, 184, 218	10—12/3—4	S. 9 11/3—3½; Qu. subfusiforme 10 μ;
Nyctalis.					
asteropha	528	9	117		Cke. 3/2; Qu. ovoid. prunif. 4 bis 6 μ; Sacc. 3—2 μ;
parasitica	528	10	117, 202	25—30/8—10	S. 14—17/8; K. 8/1—1·5; Qu. ellips. fusif. 22 μ; Sacc. 25 bis 30/10 μ;
Marasmius.					
alliaceus Jacq.	533, 539	16, 38	118, 240	10—12/8	S. 6·5—7/3; Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 10—12/8 μ;
amadelphus	536	27	202, 240	10/2—3	Sacc. 10—14/6—8 μ;
androsaceus L.	533	12	118	8/4	S. 6—9/3; Qu. prunif. 9 μ; Sacc. 6—9/3 μ;
archyropus Pers.	533, 540	7, 42	117, 240	8—10/3—4	Qu. prunif.; Sacc. 8—10/3—4 μ;
arenivagus Br.	541	49	261, Rev. IV. 20	16/6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

calopus Pers.	536, 540	26, 43	202, 240	8/4	
candidus	533	9	118, 240	10—14/6—8	Qu. larmeuse subfusif. 16 μ;
cauticinalis	533	18	16, 118		Qu. prunif. 8—9 μ; Barb. 8/6 μ;
erythropus	534, 535	5, 23, 24	117, 202	8—10/4—6	S. 9—10/4·5—5 μ; Sacc. 8 bis 10/4—6 μ;
foeniculaceus	540	41	240	10—12/4—5	Qu. prunif. 10 μ;
foetidus (Sow.) Fr.	537	30	218	10/4	Qu. prunif. 9 μ; Bres. 7—8/3 bis 4 μ;
fuscopurpureus	534, 538, 544	3, 36, 54	117, 240, 370	8—10/4—4½, 10/4	Qu. Mandelf. 7—8 μ; Sacc. 8 bis 10/4 μ;
globularis	469, 540	21, 46	202, 240	7—8/3—4	Qu. ovoid. prunif. 8—9 μ;
graminum	533	15	118		Qu. ovoid. lanceol. 8 μ; Sacc. 5—6 μ;
languidus	533	11	117, 202, 240	6/4	Qu. ovoid. all. 8 μ; Sacc. 6/4 μ;
molyoides	539	40	240	10/7—8	
nisus Br.	491, 534	6	117, Rev. IV. 19	8/4	
oreades	534	4	117	6—9/4—6	S. 9—11/5—6; Qu. ovoid. 6 bis 7 μ; Sacc. 7—9/4—6 μ;
perforans Fr.	533	14	118	6—8/2—3	Qu. ovoid. lanceol. 10 μ; Sacc. 6—8/2—3 μ;
peronatus Bolt.	534, 543	2, 51	117, 370	10—12/4—5, 10—11/4	Qu. ovoid. larmeuse 10 μ; Sacc. 6—8/3—5 μ;
porreus	538	33	240	6/4	Qu. prunif. 6—7 μ; Sacc. 6/4 μ;
prasiosmus	538, 543	35, 52	240, 370	10—12/4—6, 10/4	Qu. prunif.; Bäuml. 8—10/4 μ; Barb. 8/5 μ;
— F. fagetorum	544	53	370	10—11/4	
querceus Br.	542	50	353, Rev. IV. 19	10—12/4 - 6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ramealis Bull.	533, 537	10, 17, 31	118, 218, 240	10—12/3—4, 9—10/3,6—8/3	Qu. prunif. all. 10 μ; Bres. 6 bis 8/3—4 μ; Sacc. 10/3—4 μ;
rarus Br.	536	28 b	205, Rev. IV. 20	6—7	
Rotula	533	13	118	6—8/3—4	S. 8—9/3·5—4·5 μ; Qu. ovoid. lanc. 10 μ; Sacc. 6—8/3—4 μ;
rugulosus	469, 534, 536, 539	20, 1, 29, 37, 39	240	9—11/4—5	
saccharinus	540	45	240	10/4	Qu. ovoid. lanceolée 12 μ;
schoenopus Kalchb.	491, 536	19, 28 a	118, 202	8—9/5—6	Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 8—10/5—6 μ;
scorodonius Fr.	533	8	117, 202	6—10/3—4	S. 7—8/2—3; Qu. ovoid. larmeuse 9 μ; Sacc. 6—10/3 bis 4 μ;
splachnoides	538	34	240	9/4	
subrufescens Br.	541	47	261, Rev. IV. 19	10—12/4	
subsplachnoides Br.	537	32	28, 218, Rev. IV. 20	6—7/2—3	
tenuatus Br.	541	48	261, Rev. IV. 19	10—12/5—6	
torquescens	535	25	202	8/6	Qu. ovoid. all. 10 μ;
varicosus Fr.	535	22	202	8/4	Qu. Mandelf. 7—8 μ;
Lentinus.					
adhaerens A et S.	548, 552	21, 2	118, 261	8—10/3	Qu. ellips. all. 10 μ;
adhaesus Br.	552	8	118, 302, Rev. IV. 20	6—8/4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

castoreus Fr.	552	6, 19	119, 202, 240	4/2–3	Qu. ovoid. sph. 5–6 μ; Sacc. 3—4 μ diam ;
cochleatus	552	5, 16	202, 240	5—6/4—5, 6/4	S. 4 - 6/4; Qu. sph. 8 μ; Sacc. 4—6 μ diam.;
— F. occidentalis	547	18	240	4 –5	Bres. 4 –5;
flabelliformis	537	13	218	5—6/3—4	
hornotinus	549, 552	22, 3	118, 370	10—12/3	Sacc. 10—12/3 μ;
lepideus Fr.	545, 552	15, 14, 1	118, 202, 240	10—12/3—4	Qu. ellips. cylindr. 8—13 μ; 1 bis 3 ocellée; Sacc. 10—14 6 μ;
omphalodes Fr.	546	17	240	6/3—4	Qu. ovoide-sph. 5 μ;
pulverulentus Scop.	552	4	118		
tigrinus	553	10	203	6/2—3	S. 7—9; 2·5—3; Qu. prunif. all. 8—10 μ; Sacc. 6·5/3 μ;
undulatellus Br.	556	links oben	241, Rev. IV. 20	6—7/2	
ursinus	550	23	370	4—5	Qu. ovoid. sph. 4—5 μ; Sacc. 4 μ diam.;
Panus.					
conchatus Fr.	63, 553	381, 12	202, 241	6—8/2—3, 8/3	Qu. ellips. cylindr. 8 μ; Oud. $9^1/_2/2^1/_2$ μ;
cyathiformis Schaeff.	553	11	202, 302	3–4/2—3	Qu. ellips. all. 7 μ;
rudis Fr.	555	18	353	6/3	Qu. ellips. cylindr. 7—8 μ;
stipticus	552	7	119, 202	5—6/3	S. 2—3/1—2; Qu. ellips. all. 6 μ; Sacc. 2—3/1—2 μ;
torulosus Fr.	554	16, 17	241	6—8/2—3	S. 5/3 μ; Sacc. 5—6/3 μ;
violaceo-fulvus	552	9 a, b	119, 202, 365	8—11/2—3	Qu. ellips. cylind. 10 μ; Bäuml. 6—8/2—3 μ; Sacc. 8—11/2 bis 3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Trogia.					
crispa Pers.	551	20	241	3—4/¾—1	S. 4/1—1½ μ; Sacc. 6—7/2 μ;
Schizophyllum.					
commune	556	rechts oben	118, 202	4—6/2—3	Qu. en saucisson 7 μ; Bäuml. 6—7/2—2½ μ; Guill. 6 bis 7/2 μ;
Lenzites.					
abietina	556, 557	3 a, b, 5	119, 354	12—14/4	S. 11—13/3½—4; Qu. prunif. all. 10 μ;
betulina	550, 556	8, 1	119, 371	5—6/1½—2	
flaccida Bull.	557	6	205, 241	5—7/4—6, 7/5	Qu. 12 μ;
saepiaria	556	2	119		S. 6·5—7·5/2·5—3; Qu. virgulif. 10 μ;
tricolor	557	4	203, 302		Qu. 9 μ;
variegata Fr.	558	7	344	6—7/2	Qu. 10 μ;
Boletus.					
aereus Bull.	571	41	203	12/3—4	S. 12/4; Qu. 15—20 μ; Sacc. 10—13/5 μ;
alutarius	567	28	134	14/4	Sacc. 14/4 μ;
appenticulatus Schaeff.	562	13	133		Qu. 12 μ;
badius	570	38	203	16—18/4—5	S. 12—15/3—4 μ; Sacc. 15 bis 20/5—6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

bovinus Linn.	559, 569, 574	5. 36, 47 bis 50	132, 218	8—10/2—4	S. 8—10/3; Qu. 8—9 μ; Sacc. 8—10/3 μ;
bullatus Br.	561	12, 30	133	12—14/4—5	
buxeus Rostk.	588	80	354		Qu. 11—12 μ;
calopus Fr.	563, 571	14, 40	133	12/4	S. 7—8/3—4; Qu. 16 μ; 3—4 guttulée; Sacc. 7—8/3—4 vel. 12/4 μ;
chrysenteron Fr.	582	64, 65	241	14—16/5—6	S. 11—13/4½—5½; Bäuml. 12 bis 13/4—5 μ; Guill. 12 bis 14/4—5 μ; Sacc. 12/4·5 μ;
collinitus Fr.	582	63	241	8—10/2—4	Guill. 8—10/4 μ;
edulis Bull.	563	17	133	10—14/3—4	S. 15—17/5—6; Qu. 15—17 μ;
elegans Schum.	559	2	132	6—8/2½—3	
exannulatus Br.	569	35	203	8/3—4	
extractus Br.	581	61, 70	241	9—11/3—3½	
felleus Bull.	563	27	134	12—14/4	S. 11—14/3½—5; Qu. 10—15 μ; Sacc. 12—16/4—5 μ;
flavidus	581	62	241	8—10/2—3	Qu. 11 μ; Sacc. 8—10/3·5—4 μ;
flavus	560, 578	3, 57	132, 241	8—10/2—3, 8/3	Qu. 10 μ; Bäuml. 8/4 μ; Sacc. 8—10/3—4 μ;
fragrans Vitt.	568	33	203	12/4—5	Qu. 16—18 μ; Sacc. 11—11·5/4 bis 5 μ;
fuligineospermus Br.	586	75	344	8—10/3—4	
fuligineus	564	24	134	12—14/6	Sacc. 12—14/6 μ;
granulatus Linn.	559	4	132	7—8/2—3	S. 6—10/3; Qu. 8 μ; Sacc. 8 bis 10/2—3 μ;
guttatus	562, 579	8, 59	132, 241	8—10/3—4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

immutabilis Br.	572	44	203		
indecisus Br.	583	68	241	10—12/4	
laricinus Berk.	578	56	241	10/4	Qu. 13 μ; Sacc. 10·5/5 μ;
larignus Br.	561, 577	22, 55	133, 219, 241	10—13/4	
lividus Bull.	573, 580	45, 60	203, 241, 334	6/3—4, 6/4	Qu. ovoid. 6—7 μ;
Lorinseri	579	58	241	10—12/4	B. et G. 13·2—14·7/5·9 μ; Sacc. 13—14/6 μ;
lupinus Fr.	575	52	219	10—12/4	Qu. 13 μ;
luridiformis	566	20	133, 241	18—20/4—6	Sacc. 18—20/4—6 μ;
luridus	566, 571	19, 42	133, 203	14—16/6	S. 14—17/4—5; Qu. 12 μ; Sacc. 15/9 μ;
luteobadius Br.	575	51	218	10—11/4	
luteus Linn.	559	1	132	8—10/2—3	S. 8—9/3—4; Qu. 11 μ; Sacc. 6—8/3 μ vel. 8—10/2-3 μ;
macroporus Rostk.	588	79	354	12/4	Sacc. 8—10/3 μ;
macrosporus Br.	589	83	354	18/8—10	Qu. 8—9 μ;
mitis	559, 569, 570	6, 37, 37 a	132, 203	13—14/4	Sacc. 13—14/4 μ;
pachypus Fr.	562, 583	15, 67	133, 241	14/4—5	S. 11—13/4—5·6; Qu. 16—18 μ; Sacc. 12—14/5—6 μ;
pascuus Pers.	560, 583	10, 66	132, 241	10—12/5, 10—13/4—5	Qu. 12—13 μ; 3—4 guttulée; Sacc. 12/4·5 μ;
picrodes	590	82	354	12—14/4—5	
piperatus	559, 586	7, 74	132, 344	8—10/3-4	S. 7—9/3—4; Qu. 10—12 μ; Sacc. 8—9/3—4 μ;
porphyrosporus Fr.	565	23	133	16—18/6	Qu. violett-purpurine 12 μ; 3 guttulée; Sacc.16—18/6 μ;
purpureus Fr.	585	72	261	16/6	Qu. 13 μ; Sacc. 10/5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

radicans Pers.	570	39	203	12/4—5	Qu. 12—14 μ; Bäuml. 10 bis 11/4—5 μ;
recedens Br.	568, 573, 587	34, 46, 78	203, 344	8/2—3	
regius	564	16	133	16—19/4—6	Sacc. 16/5 μ;
rutilus	584	71	261	14/6	
Satanas Lenz.	576, 584	53, 73	219, 261	12—16/6—8, 12/4	S. 12—15/6—6·5; Qu. 13 μ; Sacc. 12/5—6 vel. 16/5—8 μ;
scaber Bull.	567	26	134	16—18/4—6	S. 16—18/5·5—6·6; Qu. 16 bis 18 μ; Bäuml. 15—18/5—6 μ; Sacc. 14—18/5—6 μ;
— F. holopoda	583	69	241	14—16/6	
sericeus Krombh.	589	81	354	10/4	
spadiceus Schaeff.	562	29	133	12/4	Qu. 10—12 μ; 2—4 guttulée; Sacc. 12—4 μ;
striaepes Secr.	560	9	132	10—12/4	
strobilaceus Scop.	565, 590	21, 84	133, 354	10—12/8—10	Qu. ovoid. sph. 15 μ; Bäuml. 10—13/8—10 μ;
subaequalis Br.	587	77	344	12/4—5	
subtumentosus	560	11	132	14—16/4—6	S. 11—14/3—4; Qu. 12 μ; Sacc. 11—13/4—5 μ;
sulphureus Fr.	568	32	203	8—10/2—3	Qu. 8 μ;
vaccinus Fr.	565	18	133		
variegatus Sw.	568, 586	31, 76	203, 344	8—9/3—4, 9/3	S. 8—11/3—4; Qu. 12 μ; Sacc. 8—11/3—4;
versipellis Fr.	566, 572	25, 43	134, 203	14—16/4	S. 17—20/6—7½; B. et G. 8·8/4·4 μ; Sacc. 14—20/5—7·5 μ;
viscidus F. aeruginascens	577	54	219	10—12/4	S. 11—12/4—4½; Qu. 13 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Fistulina.					
hepatica	567	1	134		S. 4½—5/3; Qu. ovoid. 6 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
Polyporus.					
abietinus Fr.	623	116	219	5—6/3	
acanthoides	616, 617	90, 93	203	6/3	
aduslus Willd.	631, 645	133, 174	242, 344	3—5/2—3, 6/3	S. 4—5/2½—3; Qu. ellips. 5 μ;
albidus Trog.	609	58	143		
albo-griseus Br.	657	217, 218	372	6—9/2—3½	
albus Huds.	602	32	141		Qu. ovoid. 6 μ;
alutaceus Fr.	650	187	355	10/4	
alveolarius	640	159	262	8/2	
amorphus Fr.	600, 624	119, 27	141, 219		Qu. ovoid. 4—5 μ;
aneirinus	653	197	356	4—5/1	Str. 5—7/4—4·5 μ;
annosus Fr.	608, 619, 652	54, 98, 193	203, 356	6—8/4, 4—5	S. 5/4; Qu. ovoid. sph. 6—7 μ;
applanatus Pers.	604, 629	42, 128	142, 242, 356	8—10/5—6, 10/5—6	S. 6½—7/4—5; Qu. ovoid. prunif. 8 μ; Pat. 11—12/7—8 μ; Barb. 8—9/5—6 μ;
arcularius (Batsch) Fr.	634, 638	143, 157	242	7—8/2—3	Qu. oblong. prunif. 9 μ;
aurantiacus Rostk.	645	180	345		
benzoinus Wahlb.	651	191	356	7—8/5—6	Qu. ovoid. 7—8 μ; Sacc. 4—6/3 bis 4 μ;
betulinus Bull.	604, 660	41, 233	141, 371	4—6/1½—2, 4½/¾—1¼	Qu. prunif. 9 μ; Barb. 5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

borealis Wahlb.	603, 626	38, 123	141, 219	6/4	S. 4—5/3; Qu. ovoid. 5 μ; Sacc. 4—5/3 μ;
brumalis Pers.	592, 594, 621, 634	7, 12, 108, 142	138, 219, 242	6—7/2, 8/2	S. 6—6·6/2—2½; Qu. prunif. all. 13—15 μ; Sacc. 6/2 μ;
— F. alveolarius	621	109	219, 262	8/2	
— F. trachypus	621	110	219		
caesiocoloratus Br.	635, 642	145, 171	242, 262, 355	3—4/¾, 4—6/1, 5—6/¾—1	
caesius	595	22	141		S. 4½—5/2—2½; Qu. ellips. cylind. 5 μ; Sacc. 13/2·5 μ;
calceolus Bull.	627	125	242	10—12/6—7	Qu. ovoid. all. 7 μ;
callosus	624	121	219, 356	5—6/2—3½	Qu. prunif. 6—8 μ; Sacc. 6 μ;
Capreae Br.	652	194	356	10—12/2—2½	
carneo-lilaceus Br.	656	211	371	3/1¾—2	
castaneus Rostk.	610	62	143		
chinoeus	633	137	242	3/1½	Qu. ellips. 5 μ; Sacc. 3–5/1·5–2 μ;
Clusianus Br.	640	158	262	14—16/4	
chonchatus	607	52	142		S. 5—6/4—4½; Qu. 5 μ;
confluens A. et S.	594	14	139	4/2—3	Qu. ovoid. 6 - 7 μ; Sacc. 6—7 μ;
conspicabilis Br.	611, 621	69, 106	138, 219	5—6/3—4, 4—5/2—3	
crispus Pers.	645	176	345	4/2½—3	
cristatus Pers.	611	68	139	4—6/2—3	S. 5—7/4·5—5·5; Qu. ovoid. 6 μ;
cryptarum	647	179	345	8/4	
Cytisi Br.	606	51	142		
dapsilis Br.	591	3	138		
destructor	601, 650	30, 188	355	6/3	
— F. alutaceus	601	31	141		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

elegans Bull.	595	11	139	8—10/3—4	Qu. 7 μ;
epileucus	598	21	140		Qu. ovoid. prunif. 4—5 μ;
erubescens	603, 622	40, 113	141, 219	8—10/4—5	
esculentus Br.	644	172	344	7—8/2½—3	
Evonymi Kalchbr.	606	49 b	142		Qu. ovoid. 3—4 μ;
ferruginosus	610	64	143	8—10	S. 4—5/3;
fomentarrius L.	605, 618, 642	44, 105, 167	142, 203, 263	10/6	Qu. ellips. cylind. 18 μ;
formatus Br.	592	5	137		
fragilis	600	26	140	6—8/4	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 8 μ;
fraxineus Bull.	618	97	203		Qu. ovoid. sph. 6—8 μ; Sacc. 6—7 μ;
fulvus Scop.	605, 619	46, 96	142, 203	8/6	
fumosus	600, 602, 618	29, 34, 35, 104	141, 242, 304	6—8/3	Qu. ellips. prunif. 6—7 μ;
fuscidulus	635	144	242	6—8/2—2½	
giganteus	612	71	139	5/3	H. 5—6/5—5½ μ; Barb. 5 á 6 μ;
helveolus	628	127	242		
hirsutus	609, 619, 636	59, 103, 150	143, 243	6—8/2	Berl. 6—7/2·5—3 μ;
hispidus Bull.	603, 651	37, 189	141, 355	8—10/8, 6/4	S. 7—9/6—7; Qu. sph. 10 μ; St. 5/3·5 μ; Sacc. 5—6/3 μ;
igniarius Br.	605, 636, 651	45, 148, 192	242, 356	6—8/4—6, 7/5	S. 5—6/4—4½;
imbricatus	596	18	140	6	
incarnatus Pers.	602	36	143		
intybaceus Fr.	612	70	139	4/2—3	Qu. ovoid. 7 μ; Sacc. 4—5/2 bis 3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

involutus Br.	648	183	354	6/4	
lacteus Fr.	615, 624	88, 120	140, 219	6/4—6	Bres. 4—5/1—1·5; Qu. ovoid. 5—6 μ;
latisporus Br.	627	124	242	14/4	
leucomelas	592, 641, 642	6, 163	137, 262	6—8/4—5	Qu. sph. 6 μ;
lobatus	595	16	139		
lucidus Leys.	648	185	355	12/6—8	S. 10—12/6—6·5; Qu. ovoid. obl. 12—14 μ; Pat. 10—12/6 bis 8 μ;
luteo-cinereus Br.	659	230	371	10/4	
lutescens	618	99	203		
macrosporus Br.	642	166	262	10/6—7	
makraulus	604	42a	144	6/4	
marginatus Pers.	635	147	242, 345	6/4	Qu. prunif. 10 μ;
— F. maxima Br.	646	177	345	6/4	
medulla-panis	610, 657, 658	65, 215, 226	144, 243, 372	4—6/3—4, 4—6/2—3	S. 4—5/3—4;
melanopus	594, 595	13, 15	138, 139		Bres. 6—8/3—4; Qu. ellips. all. 8 μ;
minimus	593	10	139		
mollicomus Br.	656	209	371	5—6/2	
mollis Pers.	622	114	219	4—6/1½	Qu. ovoid. sph. 6 μ;
molluscus Fr.	612, 647, 659	73, 182, 229	144, 345, 372	4—5/3	
mucidus Fr.	612, 647, 658	72, 181, 216	345, 372	3—4/1½—2	
nigricans Fr.	630, 640	130, 162	242, 263	16—18/6—8	Qu. ovoid. sph. 8 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

nodulosus Fr.	635	146	242	5 6/3—4	
— F. effusa Br.	632	136	242		
— F. lobata Br.	618	95	242		
nummularius	631	132	242	8—10/3—4	Qu. ellips. all. 7—8 μ;
obducens Pers.	660	214	372		Qu. ovoid. oblong. 5 μ;
ochraceo-cinereus Br.	645	175	344	3—4/1½—2	
ovinus Schaeff.	591	2	137	4/3	S. 3½—4/3—3½; Qu. ovoid. sph. 5—6 μ;
pallescens Fr.	599, 643	24, 170	140, 262	6—8/4	Qu. ellips. 6—7 μ;
pallidomicans Br.	658	232	371	7·5—8/2·5—3	
perennis Linn.	591, 640	4, 160	138, 262	8—10/4—5	S. 7—9/4½—5; Qu. prunif. 8 bis 9 μ;
pescaprae Pers	616	89	203	8—10/6	Qu. ovoid sph. 10 μ;
picipes	641	164	262	8—10/4	S. 7—8½/2½—3; Qu. Mandelf. 9 μ;
pictus (Schultz) Fr.	621	107	219	8/6	Qu. ovoid. 5 μ;
pinicola	607, 629	53, 129	142, 242	10/4	S. 4½—5/3; Qu. prunif. 10 μ;
placenta	620	100	203		Qu. prunif. 8 μ;
pomaceus	606	47	142		
pubescens Schum.	651	190	355	6—8/1	Qu. ellips. oblong. 6—7 μ;
punctisporus Br.	634	140	242	4	
radiatus	608, 653	56, 195	143, 356	4—6/3—4, 6/4—4½	Qu. ellips. 4—5 μ; Sacc. 4—6/3 bis 4 μ;
Radula Pers.	653, 659	198, 231	356, 373	8—9/5—6, 6—8/4—5	Qu. ovoid prunif. 6 μ;
resinosus Schrad.	652	190 a	355	4—5	Qu. ovoid. 10—12 μ;
rhodellus	653	196	356	4—5	Qu. ovoid. sph. 6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Ribis Schum	606, 623	48, 115	142, 219	4—5/2—3	S. 4—5/3—4½; Qu. ovoid. 3 bis 4 μ;
rubro-maculatus Br.	624	118	219	4½/1—1½	
rufopallidus Trog.	608	55	143		Qu. ovoid. 6 μ;
rutrosus	617	91	203	3 -4/2—3	
salicinus	606, 631	49 a, 50, 131	142, 242	4—6, 4—5	
salignus	602	33	140, 184	8—10/3—4	
sanguinolentus A. et Schw.	637, 659	152, 219	243, 372	5—7/4—6, 4—5	Qu. prunif. 6 μ; Henn. 5—6 μ;
saxatilis Br.	649	184	355	10—11/6—8	
semiovatus	609, 650	57, 210	143, 241, 371	4—6/4, 5/4	
sinuosus Fr.	612	75	144	6/2—3	
spongia Fr.	597	19	140	6/4	Qu. ellips. 8 - 9 μ;
squamosus Huds.	593, 622	8, 112	138, 219	15—18/6	Qu. ellips. all. 12—15 μ 1—2 ocellée; Sacc. 12/5 μ;
stillativus Br.	628	124	242	10—12/2—3	
stipticus	599, 644	25, 173	140, 344	4/2	Qu. ellips. 5—7 μ;
subfusco-flavidus	657	221, 223	371	5—6/3	
subromaculatus	624	118	219		
subsquamosus	591	1	137		Qu. sph. 6—9 μ;
sulphureus Bull.	596, 650	17, 186	139, 355	6—7/4—5	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 7 bis 8/4—5 μ;
tephroleucus Fr.	598, 643	20, 169	140, 262	6—8/3	Qu. ellips. 6—7 μ; Bull. myc. VIII 6—7/3 μ;
terrestris Fr.	657	225	372	5—6	
testaceus Fr.	599, 640	23, 165	140, 262	4—5	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tomentosus Fr.	611, 634	66, 141	138, 242	7—8/2—3	Qu. prunif. all. 9—10 μ;
trabeus	600	28	141	6 μ	Qu. ellips. 6—7 μ;
umbellatus	617	92	203	10–11/3	Qu. ellips. cylind. 10 μ;
Vaillantii	623, 659	117, 220	219, 373	4/3	S. 5—6/3; Qu. 5 μ;
vaporarius	653	200	356	4—6	S. 5—6/3—3½;
varius Pers.	593, 621	9, 111	9, 139, 219	6—8/1½—2	Qu. Mandelf. 9 μ;
velutinus Pers.	609, 636	60, 149	143, 243	4/2	
versicolor Linn.	610	63	143		S. 6—8/2—2½; Qu. ellips. cylind. 6—7 μ;
violaceus Fr.	612	74	143		Sacc. 7 μ;
viridans	653	199	356	8/3—4	
vitreus	620, 658	102, 227	203, 372	4	
vulgaris Fr.	659	213	372	4/2—3	Qu. ovoid. prunif. 6 μ; Bäuml. 3½—4/1½ μ;
vulpinus Fr.	645	178	345	5/3—4	Qu. ellips. 6 μ;
Weinmanni Fr.	603, 605, 640	39, 43, 161	141, 262	6—8/4	
zonatus Fr.	609, 637	61, 151	143, 203, 243	7—8/2½—3	S. 6—9/3—4; Qu. ellips. cylind. 10 μ; Sacc. 6—9/3—4 μ;

Trametes.

Bulliardi Fr.	614	81	144		Qu. cylindrique 10 μ;
*cinnabarina Jacq.	611, 632	67, 134	144, 243	4—6/2–3, 6—8/2—3	S. 8½—9/3½—4; Qu. ovoid. sph. 6 μ; Bäuml. 3·5—5/2·5 bis 3 μ;
gibbosa	614	79	144		S. 2½—4/2—2½; Qu. ellips. cylindr. 6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

odora	614	82	144		Qu. ovoid. 7—8 μ; Sacc. 5 bis 6/3 μ;
odorata	613, 660	77, 222	144, 373	7 ½—9/2½—3	Qu. ellips.;
Pini	613	76	144		S. 5—6/3½—4½; Qu. ovoid. sph. 4 μ;
rubescens A.et Schw.	654	201	356	4	Qu. cylindrique 10 μ;
serpens	654, 660	202, 228	357, 373	13–15/4–6, 14/5	Sacc. 14/6 μ;
suaveolens Linn.	614, 633	80, 138	144, 243	10—12/4	S. 8—9/3½—4; Qu. 12 μ; Sacc. 9/4·5 μ;
suberosa Quel.	613, 632	78, 135	144, 243	6/4	
Daedalea.					
cinerea Fr.	620, 625	101, 122	220	6	
quercina Linn.	614, 637	83, 153	145, 243	7—8/3	Qu. 12 μ;
Schulzeri Poetsch.	654	203	357	8—9/1½	Sacc. 7—10/1—2 μ;
unicolor Bull.	615	84	145		Qu. prunif. 6—7 μ;
Merulius.					
Corium Fr.	655	205	357, 243	8/3	Qu. prunif. all. 8 μ; Bäuml. 6 bis 7/3—4 μ; Sacc. 4—7/2·5 bis 3·5 μ;
lacrymans Wulf.	615, 637	85, 156	145, 243	10—11/6	S. 10—11/5—6; Qu. ellips. 5 bis 6 μ; Sacc. 10—12/5—6 μ;
petropolitanus	633	139	243	6—8/2—3	
pinorum Br.	642	168	263	6—7/4	
rufus	651	204	357	6/2	Qu. ellips. 6 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

serpens	615, 655	87, 208	145, 357	4/1·5	Qu. subsph. 6—7 μ; Sacc. 4/2 μ;
tremellosus	615, 638	86, 155	145, 243	4/1—1·5	S. 4/1—1·5; Qu. en saucisson 6 μ; B. et G. $2^1/_2$—$3^1/_2$/1—1·2 μ; Sacc. 4/1 μ;
Porothelium.					
fimbriatum	655	206	357	5—6/2—$2^1/_2$	Qu. 5 μ;
Solenia.					
anomala Pers.	655, 660	207, 224	357, 373	6—8/3, 8—9/3	Qu. prunif. all. 14 μ; Sacc. 8/2 μ; Fuck. 6/4 μ;
Caldesiella.					
ferruginosa Sacc.	693	88	374	8—10	K. 4—5/3—4 μ;
Hydnum.					
alutaceum Fr.	693	84	373	6/$2^1/_2$—3	
auratile Br.	681	40	220	5—6/3—4	
auriscalpium L.	666	10	146	4	S. 5—$5^1/_2$/4—$4^1/_2$; Qu. 6—7 μ: Sacc. 4—5/4 μ;
compactum P.	665, 670, 673, 689	7, 20, 28, 68	146, 220, 264	6/4	S. $4^1/_2$—6/4—$4^1/_2$ μ; Sacc. 6 μ diam.;
cyathiforme Schaef.	666, 688	9, 65, 66	146, 266	$2^1/_4$—4, 3—4	S. 3 μ; Qu. 3—4 μ; Sacc. 2—3 μ diam.; Barb. 3—4 μ;
decolorosum Br.	675	34	220	3—4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

denticulatum P.	693	85	373	7—8/3—3½	
farinaceum P.	691	74	357	10—11/4	
ferrugineo-album Br.	687	63	265	4—6	
ferrugineum Fr.	670, 681	19, 41	203, 220	6—8/4	Sacc. 4 μ diam.;
fragile	676	35	220	4—5/2—3	
fragrans Br.	685	54, 55	264	6/4	
fulgineo-violaceum	664, 672, 683	6, 26, 44, 51	203, 264	6/4	Qu. 6 μ;
fuligineum Br.	686	59	265	6—8/4—5	
fulvo-coeruleum Br.	674, 679, 684, 685	28 b, 38, 52, 53	220, 264	5—6/4—5, 6/4	
fusipes Pers.	671, 678, 684	24 a, b, 37, 48, 49	203, 220, 263	4—5/3—4, 4½/3, 4	
geogenium Fr.	666	11	146		Qu. 4 μ; Sacc. 3—4 μ diam.;
imbricatum L.	661	1	145	6—8	Qu. 6 μ; Sacc. 6—7/5 μ;
inaequale Br.	671, 684	24 c, 50	263	6/3—4	
inodorum Br.	683, 689	46, 70	264	6—7/4—5	
luteo-carneum Secr.	691	73	357	6/3	Qu. ovoid. 7 μ;
macrosporum Br.	683	45	264	8/4	
melaleucum	670, 673	23, 31	203	3—4	S. 3—4 μ; Sacc. 2—3 μ;
nigrum Fr.	670, 673	23, 30	203	3—4	S. 4—5; Qu. 4—5 μ; Sacc. 4—5 μ diam.;
— F. lignicola Br.	690	72	345	3—4	
niveum	693	87	374	3½—4	
nodulosum	693	86	373	8—10/6—8	
occultum Br.	677	36	220	3—4	
ochraceo-fulvum Br.	692	81	357	10—11/5—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

radiato-rugosum Br.	673, 687	29, 64	203, 266	5/4, 6/4	
repandum	663	4	146	8/6—7	S. 9—11/5½—7; Qu. 7 μ; Sacc. 5—8 μ diam.;
rufescens	663	5	146	8/6—7	S. 6—8; Qu. 8 μ; Sacc. 6—8/6 bis 7 μ;
sanguineo-fulvum Br.	682, 685, 686	42, 43, 56—58	220, 265	6—7/4	
scrobiculatum Fr.	665, 687	8, 62	146, 265	6	Sacc. 3 μ diam.;
sordidum Weinm.	693	107	373	4½/3	
sparso-aculeatum Br.	683	47	263	4—5/3	
squamosum	661	2	146	5—6	Qu. 7 μ; Sacc. 5—6 μ diam.;
stalacticium	674	32	203	6	
strigosum	667	12	146	6/4	K. 3—5 μ diam.;
suaveolens Scop.	671, 680	27, 39	203, 220	4/3	S. 6—7/4—5; Qu. 6—7 μ;
suberosa-coriaceum Br.	688	67	266	6/4	
subsquamosum	670	17	203	6/4	Qu. 7 μ;
testaceo-fulvum Br.	670, 686, 687	21, 60, 61	203, 220, 265	5/4	
tuberculosum Br.	689	69	264	6—8/4—5	
versipelle Fr.	662	3	146	4—5	Qu. 5 μ; Sacc. 4—5 μ diam.;
violascens	672	25	203	6/4	Qu. 4 μ; Sacc. 4 μ;
zonatum Batsch.	690	71	345	5—6/4—5	Qu. 5—6 μ; Sacc. 3¾ – 4 μ diam.;
Tremellodon.					
gelatinosum Scop.	754	4	155	6	Qu. 6—7 μ; Sacc. 7 μ diam. vel.; 7—8/5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Sistotrema.					
confluens	694	89	374	4/2	S. 3—4/2—3; Qu. ovoid. 4—5 μ; Sacc. 3—4/2—3 μ;
Irpex.					
candidus	694	92	374	8/2—3	
canescens	691	77	358	6—7/2	Qu. ovoid. 6—7 μ;
conjunctus Br.	694	108	374	8/2—3	
deformis	692	79	358	6/4	Qu. ovoid. 10 μ;
fusco-violaceus Schrad.	668, 691	13, 75	358	7—8/3	
lacteus	668, 691	14, 76	146, 358	4—6/2	Qu. ovoid. sph. 5 μ; Sacc. 4 bis 6/2 μ;
obliquus	674, 694	33, 91	374	4/2	
paradoxus Schrad.	692	78	358	9—10/4	S. 10—12/2 $\frac{1}{2}$—3; Qu. ovoid. prunif. 5—6 μ;
Persooniana.					
albocana Br.	694	90	374	3—4/1—1 $\frac{1}{2}$	
Radulum.					
irregulare Br.	694	109	375	8—9/3 $\frac{1}{2}$	
orbiculare	692	80	358	2/ $\frac{3}{4}$	S. 1—1 $\frac{1}{2}$/ $\frac{1}{2}$; Qu. 12 μ; R. 9 bis 10/3 μ; K. 2 3/ $\frac{1}{2}$—1 μ;
orbiculatus Br.	669, 694	15, 94	375	10/3 4	
quercinum	694	93	374	4 $\frac{1}{2}$/3 $\frac{1}{2}$	S. 11—12/6—7; Qu. 8—9 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Phlebia.					
contorta Br.	695	95	375	5—6 / 1¾—2	
radiata	695	96	375	4½—5 / 1½—1¾	S. 4—5 / 1—2; Qu. cylindrique 6—8 μ; Sacc. 4—5 / 1—1·5 μ;
Lopharia.					
lirellosa	695	97	375	4—5 / 3	
Grandinia.					
Agardhii	692	82	358	6 / 3	
crustosa Pers.	695	100	375	6 - 7 / 2½—3	S. 5—6 / 2—5; Qu. ovoid. 5—6 μ;
granulosa Pers.	695	98	147, 375	4½ / 3	Sacc. 2—2·5 μ diam.;
papillosa Fr.	695	99	375	6—7½ / 4 - 5	
Odontia.					
ambigua	696	102	376	5—6 / 3½—5	Sacc. 3—5 μ diam.;
calcata Br.	696	104	376	6 / 3	
hirta Fuck.	692	83	358	4 / 3	Bäuml. 10—13 / 7—8 μ;
incisa Br.	696	101	375	3	
jonquillea Quel.	696	106	376	5—6 / 3	Sacc. 7 μ;
lactea Karst.	696	103	376	7½ / 2½—3	
melleo-alba Br.	696	105	376	6—7 / 3	
Mucronella.					
fascicularis	669	16	147	8 / 4	Qu. 6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Craterellus.

clavatus	698	3	147	10—12/4—5	Qu. ellips. fusif. 10 μ; Sacc. 10 bis 12/4—5 μ;
cornucopioides	697	1	147	10—12/8	Qu. ovoid. all. 10—13 μ; Sacc. 12—14/7—8 μ;
crispus	707, 709	23, 35	203, 266	10—12/8, 10/6	Qu. ellips. prunif. 10 μ;
lutescens	711	45	266	10—12/6—8	Qu. ovoid. ellips. 10 μ; Sacc. 4 bis 5/2—2·5 μ; Peck. 10 bis 12/6—7 μ;
— F. crocata	711	46	266	10—12/8	
sinuosus	697, 707, 709	2, 28, 36	147, 205, 266	8—10/6	Qu. ellips. prunif. 10—13 μ; Sacc. 9/5 μ;

Telephora.

antocephala	707	25	203	10—11/6	Qu. 6 μ; K. 7—9/6—7 μ;
caesio-carnea Br.	716	68	376	18—20/6—8	
caryophllea Schaeff.	700	6	147		Qu. 7 μ; Sacc 8 μ diam.;
clavularis	699	5	148	10/6	
coralloides	707	24	203	8—10/6	
cristata	702, 714	11, 55	148, 358	10—12/9—10	Qu. ovoid. prunif. 12—13 μ; Sacc. 6—7/4—5 μ; K. 8—9/6 μ;
diffusa Fr.	707, 712	26, 48	205, 345	8—10/6—8	Qu. 7—8 μ; Sacc. 8 μ diam.;
fastidiosa	704	13	148	6—7/3—4	Qu. ovoid. 6—7 μ;
intybacea	702	9	148	6—8/4—5	Qu. 6 μ; Sacc. 6—8 μ diam.; vel. 7/6 μ;
laciniata Pers.	702, 708	10, 29	148, 243	10—12/8, 10/6—8	Qu. 10—12 μ; Sacc. 6—9 μ diam.;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

multizonata B. et Br.	699	4	147	6—9/4—6	Qu. 6 μ;
palmata	712, 713	47	148, 345	10—11/8, 8—10/5—8	Qu. 7—8 μ; Sacc. 8—12 μ diam; vel. 8—10/7—8 μ;
pinicola Br.	716	67	376	7—8/2½—3	
radiata	709	37	266	7—8/5—6	Qu. 7—8 μ; Jaap. 6·5—7·5/5 bis 6 μ; Sacc. 7—8 μ;
sebacea	703, 708	12, 33	148, 243	10—12/6—7, 10—16/6—8	Sacc. 10—12/6—7 μ;
terrestris	701, 708	8, 30	143, 148, 243	10/6—7	Qu. 10—12 μ;

Stereum.

aurantiacum Karst.	714	56	358	10/3½—4	
avellanum	714	57	358	4—6/2—2½	Qu. ellips. cylind. 10—11 μ;
carbonarium Br.	717	69	376	6—7/2—3	
conchatum Fr.	709	41	266	8/4	
disciforme	715	65	358	16—18 12—14	Qu. ovoid. 12 μ; Pat. 15—18/12 bis 14 μ;
ferrugineum	709	38	266	6/3	
fuscum Br.	717	70	376	8/4	
hirsutum Willd.	706	20	148	8/2—3	Qu. ellips. all. 7 μ; Sacc. 6—8/2 bis 3 μ;
— F. alba Br.	717	71	377	6/3	
nigrum Br.	710	42	266	6—7/3	
ochroleucum	712	49	346	6—7/2—3	Qu. sph. 4—5 μ; Sacc. 8 μ;
Persoonianum Br.	716	72	377	6—7	
Pini Fr.	709	39	266	6/3	Qu. ellips. cylind. 8 μ; K. 6 bis 7/2 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

purpureum	704, 709, 712	14, 34, 50	148, 243, 266, 346	6/2½—3, 8—9/4	Qu. ellips. oblong. 6—8 μ; Sacc. 7—8/3—4 μ;
rubiginosum Schrad.	705, 710	16, 44	149, 267	6/3	Sacc. 5—6 μ;
sanguinolentum	704	15	149	6—7/2—2½	Qu. Sp. ellips.; Sacc. 6—8/2 bis 3 μ; Barb. 8/4 μ;
spadiceum	708	31, 32	243	10—11/4	Qu. ovoid. oblong. 12 μ;
tabacinum	709	40	267	4/1	Qu. ellips. 8 μ;
Auricularia.					
sambucina Mart.	757	10	156, 381	18/6	Bref. 20—25/7—9 μ; S. 11 bis 15/5—7 μ;
Karstenia.					
faginea Br.	721	104	380	7½—9/6—6½	
pinophila Br.	721	105	380	8/6	
Coniophora.					
areolata	720	102	379	12—15/7½—8	
centrifuga Weinm.	720	103	379	3—3½	
puteana Schum.	719	101	379	10—12/7—8	Qu. ellips. prunif. 10 μ; K. 12 bis 16/8—9 μ;
Hymenochaete.					
fuscolilacina Br.	716	73	377	7/2½	
Mougeotii Fr.	716	74	377	6—7/3	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Peniophora.					
cinerea Fr.	719	96—98	379	9/3	Qu. ellips. cylind. 10—12 μ; Bäuml. 5—6/2–2·5 μ; K. 3 bis 5/1 μ; Pat. 12/3—4 μ;
— F. picea Karst.	719	99	379	7½—8/2½	Sacc. 5—6/2 μ;
pubera	719	100	379	9—10/5—6	Qu. ovoid. prunif. 8—9 μ; Pat. 4/2 μ;
quercina Fr.	719	95, 110	379	11/3·—4	K. 7—9/2—3 μ; S. 11—14/3 bis 3·5 μ;
Corticium.					
album Br.	717	78	377	6—7½/1½—2	
amorphum Pers.	714	59	359	14/10, 30/20	Qu. ovoid. sph. 25—30 μ;
angulatum Br.	719	91	378	10—12/8—9	
arachnoideum Berk.	717	79	377	3½—4½/3	Qu. ovoid. prunif. 7—8 μ;
calceum Fr.	713, 717	52, 83	346, 378	6/4, 8/4	Qu. en saucisson 11 μ; Bäuml. 4—6/3—4 μ; Sacc. 6/4 μ; K. 3/1 μ;
chalybaeum Pers.	706	21	149		Qu. sph. 6 μ;
comedens	714	62	359	11—13/4—5	Qu. ellips. cylind. 20 μ;
contiguum	718	84	378	3½—4/2–3	
cremorinus Br.	715, 718	61, 80	359, 377	6	
evolvens Fr.	714, 717	58, 75	359, 367	8/3, 8/4	Qu. ellips. 10 μ;
giganteum Fr.	710	43	267	6—7/3	Qu. prunif. cylind. 8–9 μ; Bäuml. 5/3 μ; Sacc. 4—5/3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

incarnatum Pers.	706	19	149, 243	12/4	Qu. en saucisson 12 μ; Bäuml. 10—12/3—4 μ; K. 9—12/5 μ; S. 8—9/3—4; Sacc. 7—8 μ; diam.; W. 4 μ;
— F. isabellina Br.	718	88	378	7½—8/4—4½	
— F. lignatilis Br.	718	87	378	8—9/3—3½	
lacteum	714, 717	60, 77	359, 377	5—6/2½	Qu. ovoid. prunif. 7—8 μ; Sacc. 5—6/3—4 μ;
latum Br.	717	76	377	8/3—3½	
leve	718	81	377	7½—8/3—3½	Qu. ovoid. prunif. 10—12 μ; Pat. 6/3 μ;
livido-coerulerum	718	85	378	8—10/5—7	Sacc. 7—10/5—6 μ vel. 6 bis 10/3—5 μ;
lividum	713	53	346	6/3	Qu. ellips. 8—9 μ; Sacc. 3 bis 6/1—2 μ;
maculaeformis Fr.	719	92	378	6—8/3—4½	Qu. ellips. oblong. 10—14 μ;
myxosporum	717	82	378	8—10/3—3½	Sacc. 8—9/3—4 μ;
Pellicula Karst.	719	93	379	7—9/6	Sacc. 6—8 μ diam. vel. 8/6 μ;
pinicolum Tul.	718	89	378	9/6—7	
— F. lignatilis Br.	718	90	378	8—9/6—8	
puberum	713	54	346	10—12/5—6	Qu. ovoid. prunif. 8—9 μ;
putaneum	715	66	359	10—12/6—8	Qu. ovoid. prunif. 8—9 μ;
quercinum Fr.	715	64	359	7—8/3	
— F. castaneae	715	63	359	10/4	
roseum Pers.	705	17	149, 378	10—12/6—8	Qu. ovoid. 20—22 μ; K. 12/8 bis 10 μ; S. 11—12 6—7 μ;
subsulphureum	719	94	379	6—7/2½	Sacc. 4—6/1—3 μ;
sulphureum Fr.	705	18	149		Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 2—3 μ diam.;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tomentoso-marginatum Br.	713	51	346	10/6—8	
Hypochnus.					
centrifugus Lév.	720	107	380	6—7½/2½—3	Sacc. 5—7/3·5 μ;
cinnamomeus Bon.	720	113	380	6/4—4½	
coronatus Schröt.	720	106	380	4½, 4/3	Sacc. 3-4 μ diam.;
effusus Bon.	720	108	380	4—6/3—4	
filamentosus Wallr.	721	114	381	7½—8/3—4	
floccidus Br.	720	112	380	6/2—2½	
niveus Br.	720	109	380	7½—8/3	
Pellicula Fr.	720	116	380	6/4	
Sambuci Pers.	720	111	380	6/4	Qu. ovoid. 6—7 μ; Bäuml. 5/3 μ; S. 4—5/3·5—4·5 μ;
tenuis Bon.	720	115	380	7½—8/4½—5	
Cyphella.					
erucaeformis Batsch.	706	22	149		
Clavaria.					
abietina Pers.	728	15	152	8—9/4	S. 6·6—8/3—4; Qu. prunif.-virgulif. 6 μ; Sacc. 7—10/4—6 μ; Guill. 6/3 μ;
amethystina Holmsk.	740, 750	40, 88	150, 346	10—12/8	S. 10/7—8; Sacc. 10—12/7—8 μ;
anomala	743	53	204	8—10/5—6	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

arctata Br.	724, 744	6, 66	150, 220	10—12/6—8	
argillacea	736, 746	32, 75	153, 221	6—8/3—4, 10 12/6—8	S. 6—9/4—5; Qu. oblong. 12 μ; K. 6—9/4—5 μ;
— F. flavipes	735	30	153	10/8	
aurea Schaeff.	728	14	151	14/4—5	S. 8—11/4—5; Qu. prunif. oblong. 10 μ; Sacc. 9—12/4—6 μ;
austera Br.	733	27	153	4—6	
Botrytes Pers.	722	2	150	10—12/4—6	S. 12—15/4—6; Qu. ellips. cylind. 12 μ; K. 12—15/6 μ; Fuck. 8/4—5 μ;
cinerea	742	47	203	10/8	S. 8—10/7—8; Qu. ovoid. sph. 11—12 μ; Sacc. 8—10/5—6 μ; Barb. 8 μ;
clavaeformis Br.	744	67	220	10/7—8	
coralloides Bull.	742	48	203	10—12/8—10	Qu. prunif. 10 μ;
corrugata Karst.	729, 747	17, 80, 81	152, 243	6—8/3—4	Sacc. 6 8/3—4 μ;
crassa Br.	740, 750	39, 89	150, 346	8—10/8	
crispula	742, 746	52, 73	204, 221	6—8/3	Sacc. 5/3 μ;
cristata	724	7	150	8—10/6—8	S. 8—10; Qu. ovoid. sph. 8 μ; Henn. 8—10 μ; K. 5—7/3 bis 4 μ; Barb. 8 μ;
crocea	732	24	152	6—7/2—3	Sacc. 6—7/2—3 μ;
curta	742, 744	46, 65	203, 220	10—12/6, 8/4	
dissipabilis Br.	734, 743	28, 55	153, 204	4—6	
distinctus Br.	735	31	153	4—6	
elongata	742	50	304	3—4	
extans Br.	747	79	243	6/3—4	
fistulosa	751	95	359	10—12/5—7	R. 15—18/6—7; Qu. subfusif. 15 μ; Sacc. 14—16/6—7 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

flaccida	731, 747	21, 82	152, 244	4—5/2—3	S. 4—5/3; Qu. prumif.-virgulif. 6 μ; Sacc. 4—5/2—3 μ;
flava Schaeff.	722	1	149	10—14/4	S. 8—10/4; Qu. ellips. cylind. 12 μ; 2—3 gutt.; Sacc. 8—10/4 μ;
flavipes Pers.	743	57	204	10/8	Qu. prunif. alb. 12 μ; K. 8—9/4 bis 5 μ;
formusula Br.	730, 743, 745	18, 51, 71	151, 221	9—11/4—5, 8—10/4	S. 9—11/2½—3;
fragilis	736, 743	33, 58	153, 204	8—10/6, 10—12/4	Qu. ovoid. sph. 9 μ; Sacc. 10 bis 12/4—5 μ;
fumosa Pers.	737, 746	34, 76	153, 221	6/8—3	Qu ovoid. prunif. 6 μ; Sacc. 6 bis 8/3 μ;
fusiforme Sow.	733	26	153	6/8—6	Qu. ovoid. sph. 6—7 μ; Sacc. 6—8/6 μ; Barb. 6—7 μ;
gigantula Br.	752	98	381	10—12/9—10	
gracilior Br.	746, 747	74, 84	221, 240	6—8/3—4, 6/3—4	
gregalis Br.	724	5	150	12/8—9	
grisea Pers.	731	22	152	10—12/4	Qu. ellips. 15 μ; Guill. 14/6 μ;
inaequalis	743	54	204	10/5	S. 5—7/4; Qu. ovoid. sph. 7 μ; Sacc. 10-12/5½ μ; vel. 8 μ diam.;
juncea	743	59	204	8—10/4	Qu. prunif. 8 μ; Wint. 4 μ; S. 8—9/4—5 μ;
Krombholzii Fr.	726	11	151	9—11/8	Qu. ellips. 12 μ; Sacc. 9—11/8 μ;
Kunzei	727, 749	12, 86	151, 267	9—12/8	S. 7—8;
ligata Br.	739	37	154	6—8/6	
Ligula	737	35	154	14—16/3—4	S. 10—11/4—5; Qu. ellips. 10 μ; Sacc. 14—16/3—4 μ; vel. 10 bis 11/4—5 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

macrospora Br.	725	9	151	12—14/8—10	
muscoides Linn.	741, 742	41, 44	150, 203	6	Qu. sph. 6 μ; Bäuml. 5—6 μ; Sacc. 6 μ diam.;
— F. obtusata	742	45	203	4—6	
oblecta Br.	730, 750, 751	19, 91, 95	152, 346, 359	6—8/3—4, 8/4	
oblectanea Br.	749	87	267		
obtusiuscula Br.	752	97	381	10—11/8	
pellucidulus Br.	739	38	154	4—5	
pistillaris	738	36	154	10—14/5—8	S. 10—12/6—6·5; Qu. amygdalif. 12 μ; K. 10—11/5—6 μ;
praetervisa Br.	734	29	153	5—7	
pseudoflava Br.	744	62	220	8—10/8	
rivalis Br.	742	49	203	16—18/8—10	
rubella Schaeff.	746	72	221	8—10/4	Qu. ovoid. prunif. 10 μ; Sacc. 9 μ;
rufescens Schaeff.	729	16	151	10—11/4	Sacc. 10—11/4 μ;
— F. frondosarum	745	70	220	12/4	
rufoviolacea	750	93	346	10/8	Qu. oblong., rouillée;
rugosa Bull.	725	8	151, 220	10/8	S. 9—11/8—9; Qu. ellips. sph. 13 μ; Sacc. 8—10 μ diam.;
— F. fuliginea	745	68	220	10—12/8—9	
Schaefferi	723, 744	3, 4, 63	220	9/7½	Sacc. 8—10/6—8 μ;
spinulosa	730, 750	20, 92	152, 346	10—12/4, 11—14/4—5	Qu. prunif. 11—12 μ; Sacc. 11 bis 14/4—5 μ;
stricta	732, 747	25, 83	152, 244	6/3, 8/4	S. 8—9/4—4½ μ; Sacc. 6 bis 8/3·5—4·5 μ;
subfastigiata Br.	742, 744, 747	43, 64, 78	203, 220, 243	10/8	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

subflava Br.	744	61	220	6—8/4	
subtilis	727, 745	13, 69	151, 220	4—6/3	Sacc. 4—6/3 μ;
suecica	731	23	152	8—10/4—5	Sacc. 8—10/4—5 μ;
umbrinella	750	90	346	10/8	
unistirpis Br.	726	10	151	10—12/6—8	
vermicularis	743	56	204	8/6	Qu. ovoid. prunif. 7 μ;
vivipara	743	60	204	8—10/4	
Calocera.					
cornea	753	3	155	10—12/3—4	Qu. ellips. virgulif. 10 μ; Bäuml. 10—12/4 μ; Pat. 5—7/2·5 bis 3 μ; S. 12/5 μ;
furcata	753	2	155	8/4	Qu. ellips. oblong. 10 μ; Sacc. 8—10/4—5 μ;
subsimplex Bres.	759	22	267	8—10/4—5	Sacc. 12—18/4—5 μ;
viscosa Pers.	753	1	155	10—11/4	Qu. virgulif. 12 μ; Sacc. 9 bis 11/4—4·5 μ;
Pterula.					
multifida	748, 751	85, 96	244, 359	6—8/2—3	Qu. 6 μ;
Typhula.					
subplacorrhiza Br.	746	77, 78	221	13—16/4½—6	
variabilis	741	42	154	10—13/4—6	S. 6—7/2·5—3 μ;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Tremella.					
albida Huds.	755, 761	7, 30	155, 381	14—18/6, 14—16/4	Qu. cylindr. arquée 11—12 μ;
conglobata Br.	748	15	244	7½—8/3½—4	
faginea Br.	760	29	346	14—16/4	
— F. populina Br.	761	32	381	12—15/4½	
foliacea	754, 759	5, 26	155, 267	9—12/8, 8—12/6—8	Qu. ovoid. 5—6 μ;
indecorata Somm.	759	23	267	12/6	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 7 bis 9 μ;
intumescens	755	6	155	12—14/3—4	
lutescens	760, 761	27, 31	346, 381	9—11/7—9, 12/8—9	Qu. ovoid. 7 μ; Sacc. 12—15 μ diam.;
mesenterica Retz.	748, 759	17, 25	244, 267	12—14/8, 11—15/9—10	Qu. ovoid. sph. 6 μ; Sacc. 12 bis 15/8—12 μ; Barb. 8—10 μ;
olivaceo-nigra Br.	760	28	346	6—8	
pinicola Br.	748	19	244	11—15/9—10, 12—14/8	
rubro-violacea Br.	748	20	244	6—7/2	
viscosa	756	8	155	10—12/6	S. 7—9/6—7 μ;
Exidia.					
papillata	756	9	155, 381	10—12/3—4, 12—13/4	
plicata	759	24	267	18/4	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Guepinia.					
helvelloides D. C.	757	11	156	8/4	
Dacrymyces.					
caesius Sommerf.	758	13	156	14—16/4—6	
chrysocomus Bull.	758	14	156	24 - 28/10—12	Qu. prunif. 8 μ; Sacc. 20—28/9 bis 11 μ;
deliquescens	748	21	244	14/6—8	Qu. ellips. larmif. 16 μ; Sacc. 15—16/6—7 μ;
fragiformis	748	18, 19	244	5—6/1½--2	Qu. cylindr. 4—6 μ;
multiseptata	748	16	244	20/6	
stillatus Nees.	758	12	156	24/8	Qu. ovoid. oblong. 20—25 μ; K. 18—22/8 μ; S. 20—30/9 bis 12 μ.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

IV. Teil des Index.

abiegnus, Telamonia
abietina, Clavaria
abietina, Lenzites
abietinus, Polyporus
abjectus, Inocybe
absistens, Inocybe
abstrusus, Naucoria
acanthoides, Polyporus
acceptandus, Nolanea
accessitans, Stropharia
acclinis, Entoloma
accola, Entoloma
acerosus, Pleurotus
acerrimus, Lactarius
acervatus, Collybia
acicula, Mycena
acris, Lactarius
acuminatus, Panaeolus
acutesquamosus, Lepiota
acutisporus, Camarophyllus
acutus, Hydrocybe
adaequatus, Inocybe
adhaerens, Lentinus
adhaesus, Lentinus
admissus, Collybia
adorativus, Claudopus
adscitus, Lactarius
adscriptus, Tricholoma
adstringens, Tricholoma
adulterina, Russula
adunans, Clypeus
adusta, Russula
—, F. gigantea, Russula
adustus, Polyporus
aemulus, Inocybe
aereus, Boletus
aeruginea, Russula
aeruginosus, Stropharia
aestuans, Tricholoma
aethiops, Leptonia
aetites, Mycena
Agardhii, Grandinia
agathosmus, Limacium
aggregatus, Clitocybe
agnatus, Homophron
—, Psilocybe
aimatochelis, Cortinarius
albellospermus, Tricholoma
albida, Tremella
albidocinereus, Psathyrella
albidocortinatus, Hebeloma
albidocyaneus, Inoloma
albidogilvus, Clitocybe
albidoincarnatus, Inocybe
albidolamellatus, Clypeus
albidoochraceus, Clypeus
albidulus, Inocybe
albidus, Polyporus
albobrunneus, Tricholoma
albocana, Persooniana

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

albocarneus, Lactarius
albocrenatus, Inocybe
albocyaneus, Dermocybe
albogriseus, Polyporus
albonigra, Russula
albonitens, Stropharia
alboroseus, Limacium
alboviolascens, Inoloma
album, Corticium
albus, Lepiota
albus, Polyporus
alcalinus, Mycena
alienellus, Inocybe
Allescheri, Tricholoma
alliaceus, Marasmius
alnicola, Flammula
alpestris, Clitocybe
alpinus, Omphalia
alutacea, Russula
alutaceo-fulvus, Telamonia
alutaceum, Hydnum
alutaceus, Polyporus
alutarius, Boletus
alveolarius, Polyporus
alveolus, Crepidotus
—, Marasmius
amarus, Clitocybe
ambifarius, Clitocybe
ambiformis, Clitocybe
ambigua, Odontia
ambustus, Collybia
amethystina, Clavaria
amianthinus, Lepiota
amictus, Mycena
amicus, Tricholoma
amoenata, Russula
amoenus, Naucoria
ammoniacus, Mycena
amorphum, Corticium
amorphus, Polyporus
analogicus, Clypeus
anatinus, Leptonia
androsaceus, Marasmius
aneirinus, Polyporus
anfractus, Phlegmacium
angulatum, Corticium
angulosus, Hydrocybe
angustifolius, Hebeloma
—, Tricholoma
angustissimus, Clitocybe
annexus, Telamonia
annosus, Polyporus
anomala, Clavaria
—, Solenia
anomalus, Dermocybe
anthocephala, Telephora
anthodius, Omphalia
anthracophilus, Collybia
antipus, Naucoria
apicreus, Flammula
apolectus, Hebeloma
apparens, Dermocybe
appendiculatus, Boletus
—, Hypholoma
applanatus, Clitocybe
—, Crepidotus
—, Polyporus
appositivus, Entoloma
appositus, Clitocybe
aprilis, Entoloma
aquatilis, Galera
aquigenus, Galera
aquosipes, Collybia
aquosus, Collybia
arachnoideum, Corticium
aratus, Coprinus
arborius, Naucoria
arbustivus, Limacium

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

archyropus, Marasmius
arctata, Clavaria
arcuatifolius, Pholiota
arcuatus, Tricholoma
arcularius, Polyporus
ardosiacus, Entoloma
arduus, Dermocybe
arenatus, Inoloma
arenicola, Omphalia
arenivagus, Marasmius
areolata, Coniophora
argentatus, Inoloma
argillacea, Clavaria
argutus, Inoloma
armeniacus, Hydrocybe
armillatus, Telamonia
arquatus, Phlegmacium
arridens, Hypholoma
arvalis, Naucoria
arvensis, Psalliota
arvinaceus, Myxacium
asininus, Inocybe
asprellus, Leptonia
assimillatus, Clypeus
assimulans, Hypholoma
assumptus, Telamonia
asterropha, Nyctalis
asterosporus, Clypeus
atomatus, Psathyrella
atractus, Clitocybe
atramentarius, Coprinus
atratus, Collybia
atro-alboides, Mycena
atro-albus, Mycena
atrobrunneus, Psilocybe
atrocyaneus, Mycena
atromarginatus, Mycena
atropurpurea, Russula
atrorufus, Psilocybe
atrosquamosus, Tricholoma
atrotomentosum, Paxillus
augustanus, Lepiota
aurantiacum, Stereum
aurantiacus, Cantharellus
—, Polyporus
aurantio-ferrugineus, Pholiota
aurantiomarginatus, Mycena
aurantius, Armillaria
aurata, Russula
auratile, Hydnum
aurea, Clavaria
aureifolius, Dermocybe
aureolamellatus, Clypeus
aureus, Limacium
auricomus, Inocybe
auriscalpium, Hydnum
aurivellus, Pholiota
auroreus, Collybia
austera, Clavaria
autochthonus, Tubaria
avellanum, Stereum
azonus, Lactarius
azureus, Dermocybe
badipes, Naucoria
badius, Boletus
balaustinus, Hydrocybe
balteatus, Phlegmacium
Batschiana, Entoloma
bellulus, Amanita
bellus, Clitocybe
benevalens, Hydrocybe
benzoinus, Polyporus
Berberidis, Crepidotus
betulina, Lenzites
betulinus, Polyporus
biformis, Psathyrella
bifrons, Psathyra
birrus, Hebeloma

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

bivelus, Telamonia
blandulus, Hydrocybe
blattarius, Pholiota
blennius, Lactarius
Bloxami, Entoloma
bolaris, Inoloma
Boltoni, Bolbitius
Bongardi, Inocybe
borealis, Polyporus
Botrytes, Clavaria
Boudieri, Coprinus
bovinus, Boletus
—, Telamonia
Bresadolae, Hydrocybe
breviatus, Naucoria
brevipes, Tricholoma
Britzelmayri, Coprinus
—, Pholiota
—, Russula
brumalis, Clitocybe
—, Polyporus
brumosus, Clitocybe
brunneo-fulvus, Telamonia
brunneus, Inocybe
—, Telamonia
Bryorum, Galera
bufonius, Tricholoma
bulbiger, Armillaria
bulbosus, Telamonia
bullaceus, Psilocybe
bullatus, Boletus
Bulliardi, Inoloma
butyraceus, Collybia
buxeus, Boletus
byssisedus, Claudopus
caelatus, Tricholoma
caesariatus, Inocybe
—, Tricholoma
caesiocarnea, Thelephora
caesiocoloratus, Polyporus
caesiocyaneus, Phlegmacium
caesiozonatus, Pleurotus
caesius, Dacrymyces
—, Polyporus
caespitosus, Omphalia
calathus, Clitocybe
calcata, Odontia
calceolus, Polyporus
calceum, Corticium
caliginosus, Panaeolus
callosus, Polyporus
calochrous, Phlegmacium
calopus, Boletus
—, Marasmius
calosporus, Clypeus
camerinus, Naucoria
campanella, Omphalia
campanulatus, Panaeolus
campestris, Psalliota
camphoratus, Lactarius
camptophyllus, Omphalia
camurus, Dermocybe
cancrinus, Clitopilus
candelaris, Hydrocybe
candicans, Clitocybe
candidus, Irpex
—, Marasmius
Candolleanus, Hypholoma
canescens, Irpex
—, Mycena
caninus, Dermocybe
canobruneus, Psilocybe
canolilacinus, Phlegmacium
cantharelliformis, Hygrocybe
cantharellioides, Clitocybe
caperatus, Pholiota
capillaris, Mycena
capitosus, Stropharia

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

capniocephalus, Hebeloma
capnoides, Hypholoma
Capreae, Polyporus
capreolarius, Limacium
capucinus, Clypeus
carbonarium, Stereum
carbonarius, Flammula
Carcharias, Lepiota
carecti, Lepiota
carneo-albus, Clitopilus
carneo-isabellina, Lactarius
carneo-lilaceus, Polyporus
carnoso-tenax, Clitopilus
caryophyllaceus, Stropharia
caryophyllea, Thelephora
cascus, Hypholoma
castaneolamellatus, Clypeus
castaneus, Hydrocybe
—, Polyporus
castoreus, Lentinus
catinus, Clitocybe
cauticinalis, Omphalia
—, Marasmius
cavipes, Clypeus
—, Russula
centrifuga, Coniophora
centrifugus, Hypochnus
—, Phlegmacium
centunculus, Naucoria
cepaestipes, Lepiota
ceraceolamellatus, Clitocybe
ceraceus, Hygrocybe
cernuus, Psilocybe
cerodes, Naucoria
cerrusatus, Clitocybe
cervinus, Clitocybe
—, Pluteus
cessans, Collybia
cetratus, Nolanea
chalybeum, Corticium
chalybeus, Leptonia
chamaeleontina, Russula
chioneus, Pleurotus
—, Polyporus
chlorophanus, Hygrocybe
chloropolius, Leptonia
chrysenteron, Boletus
chrysenterus, Tricholoma
chrysocomus, Dacrymyces
chrysodon, Limacium
chrysoleucus, Omphalia
chrysophyllus, Omphalia
chrysorrheus, Lactarius
cibarius, Cantharellus
cidaris, Naucoria
cilicioides, Lactarius
cinctulus, Panaeolus
cinerea, Clavaria
—, Daedalea
—, Peniophora
cinerellus, Mycena
cinereofolius, Clitopilus
cinereofuscus, Panaeolus
cinereoviolaceus, Inoloma
cinerescens, Clitocybe
cinereus, Cantharellus
—, Camarophyllus
cinnabarina, Trametes
cinnabarinus, Dermocybe
—, Lepiota
cinnamomeus, Dermocybe
—, Hypochnus
cirrhatus, Collybia
citrina, Russula
citrinellus, Mycena
citrinus, Amanita
civilis, Tricholoma
cladopyllus, Mycena

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

clandestinus, Nolanea
claricolor, Phlegmacium
clavaeformis, Clavaria
clavatus, Coprinus
—, Craterellus
clavipes, Clitocybe
clavularis, Thelephora
cliduchus, Phlegmacium
clivalis, Camarophyllus
clivensis, Homophron
Clusianus, Polyphorus
Clusii, Russula
clusilis, Collybia
clypeatus, Entoloma
clypeolarius, Lepiota
coccineus, Hygrocybe
coccola, Amanita
cochleatus, Lentinus
coerulea, Russula
coerulescens, Phlegmacium
cognatus, Tricholoma
cohabitans, Hydrocybe
cohaerens, Mycena
coibilis, Camarophyllus
Colemannianus, Hygrocybe
collariatus, Mycena
collinis, Collybia
collinitus, Boletus
—, Myxacium
collocandus, Inoloma
coloratus, Phlegmacium
Columbetta, Tricholoma
colus, Hydrocybe
colymbadinus, Dermocybe
comatus, Coprinus
comedens, Corticium
comitialis, Clitocybe
commune, Schizophyllum
compactum, Hydnum
comptulus, Psalliota
concavus, Clitocybe
conchatum, Stereum
conchatus, Panus
—, Polyporus
conciliascens, Naucoria
concinnus, Dermocybe
conditus, Lactarius
conferciens, Naucoria
conferendus, Nolanea
confertifolius, Clitocybe
—, Naucoria
confertus, Galera
confluens, Collybia
—, Sistotrema
—, Polyporus
confoederans, Pholiota
confusulus, Clypeus
conglobata, Tremella
congregabilis, Tricholoma
congregatus, Coprinus
conicus, Hygrocybe
conigenus, Collybia
conjunctus, Irpex
connatus, Clitocybe
connisans, Flammula
conopileus, Homophron
—, Psathyra
consequens, Tricholoma
consobrinus, Phlegmacium
conspicabilis, Polyporus
constans, Russula
constantissimus, Dermocybe
contiguum, Corticium
contorta, Phlebia
contribulans, Bolbitius
controversus, Lactarius
convexoplanus, Tricholoma
coprophilus, Psilocybe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

coracinus, Collybia
coralloides, Clavaria
—, Hydnum
—, Thelephora
Cordae, Entoloma
Corium, Merulius
cornea, Calocera
corneipes, Psilocybe
cornucopioides, Craterellus
coronatus, Hypholoma
—, Hypochnus
coronillus, Stropharia
corrosus, Phlegmacium
corrugata, Clavaria
corrugis, Psathyra
corruscans, Phlegmacium
corticatus, Pleurotus
corticola, Mycena
coryphaeus, Tricholoma
costatus, Entoloma
cotoneus, Dermocybe
crassa, Clavaria
crassifolius, Tricholoma
crassus, Phlegmacium
cremeo-griseus, Tricholoma
cremorinus, Corticium
cretaceus, Clitopilus
crispa, Trogia
crispula, Clavaria
crispus, Craterellus
—, Polyporus
—, Thelephora
cristata, Clavaria
—, Thelephora
cristatus, Lepiota
—, Polyporus
crobolus, Tubaria
crocea, Clavaria
croceo-coeruleus, Phlegmacium
croceus, Dermocybe
cruentus, Mycena
crustosa, Grandinia
crustuliniformis, Hebeloma
cryptarum, Polyporus
cumatilis, Phlegmacium
cuneifolius, Tricholoma
cuneiformis, Tricholoma
Curreyi, Inocybe
curta, Clavaria
curtipes, Clitocybe
curtus, Lactarius
cyanopheus; Clitocybe
cyanophyllus, Omphalia
cyanopus, Phlegmacium
cyanoxantha, Russula
cyathiforme, Hydnum
cyathiformis, Clitocybe
—, Panus
cyathula, Lactarius
cypriacus, Hydrocybe
Cytisi, Polyporus
damascenus, Hydrocybe
dapsilis, Polyporus
dealbatus, Clitocybe
debilis, Mycena
decastes, Clitocybe
decipiens, Hydrocybe
decolorans, Phlegmacium
—, Russula
decoloratus, Phlegmacium
decolorosum, Hydnum
decumbens, Dermocybe
decussatus, Flammula
deductus, Inocybe
definiendus, Telamonia
deflectens, Inocybe
deformis, Irpex
deglubens, Inocybe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

delectus, Inocybe
deliberatus, Tricholoma
delibutus, Myxacium
delica, Russula
deliciosus, Lactarius
delimis, Flammula
delitus, Psilocybe
deliquescens, Coprinus
—, Dacrymyces
deludens, Flammula
dendrophilus, Psathyra
densifolia, Russula
densilamellatus, Tricholoma
denticulatum, Hydnum
depallens, Russula
deparculus, Psathyrella
depexus, Dermocybe
depluens, Claudopus
depressus, Hydrocybe
descissus, Inocybe
destinatus, Lepiota
destrictus, Inocybe
destructor, Polyporus
destruens, Pholiota
detonsus, Hydrocybe
devergescens, Psathyrella
deviellus, Paneolus
devulgatus, Clypeus
diabolicus, Dermocybe
diaphanus, Coprinus
diatretus, Clitocybe
dibaphus, Phlegmacium
dichrous, Entoloma
difformis, Clitocybe
diffractus, Hebeloma
diffusa, Thelephora
digitalis, Coprinus
dilectus, Coprinus
dilatus, Hydrocybe
disciforme, Stereum
disclusus, Naucoria
discoideus, Limacium
discordabilis, Psilocybe
discordans, Psilocybe
dispersus, Hypholoma
disputabilis, Phlegmacium
dissectus, Psathyrella
disseminatus, Psathyrella
dissentiens, Nolanea
dissidens, Nolanea
dissiliens, Mycena
dissimulabilis, Mycena
dissipabilis, Clavaria
distinctus, Clavaria
ditopus, Clitocybe
divergens, Coprinus
divulgatus, Hydrocybe
dolabratus, Hydrocybe
domesticus, Coprinus
dryophilus, Collybia
dubitabilis, Hydrocybe
duellus, Clypeus
dulcidulus, Clitocybe
duracinus, Hydrocybe
durus, Pholiota
eburneolus, Limacium
echinospermus, Clitocybe
edulis, Boletus
effictus, Inoloma
effusus, Hypochnus
egerminatus, Myxacium
ejuncidus, Leptonia
elaeodes, Hypholoma
elaphinus, Entoloma
elatus, Hebeloma
electrinus, Myxacium
elegans, Boletus
—, Mycena

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

elegans, Polyporus
elegantior, Phlegmacium
elephantina, Russula
elongata, Clavaria
elotus, Phlegmacium
emetica, Russula
emollitus, Phlegmatium
emunctus, Myxacium
enudatus, Tricholoma
ephebeus, Pluteus
ephemerus, Coprinus
ephippium, Collybia
epichysium, Omphalia
epileucus, Polyporus
epipoleus, Myxacium
epipterigius, Mycena
epixanthus, Hypholoma
equestris, Tricholoma
erebius, Pholiota
ericaeus, Psilocybe
ericeti, Camarophyllus
erinaceus, Naucoria
ermineus, Lepiota
erosus, Collybia
erubescens, Limacium
—, Polyporus
erucaeformis, Cyphella
erugatus, Hydrocybe
erythrinus, Hydrocybe
erythropus, Marasmius
escharoides, Naucoria
esculenta, Russula
esculentus, Collybia
—, Polyporus
euchlorus, Leptonia
euchrous, Leptonia
euosmus, Pleurotus
eutheles, Inocybe
evagabundus, Flammula
evernius, Telamonia
evestigiatus, Dermocybe
Evonymi, Polyporus
evolvens, Corticium
evulgatus, Clitocybe
exalbidus, Hebeloma
examinatus, Psathyra
exannulatus, Boletus
excelsus, Amanita
excissus, Mycena
—, Tricholoma
excoriatus, Lepiota
exerrans, Psathyra
expallens, Clitocybe
—, Russula
explanatus, Inocybe
expolitus, Psathyrella
expromtus, Panaeolus
exsculptus, Collybia
exsequens, Pholiota
exsignatus, Panaeolus
extans, Clavaria
extinctorius, Coprinus
extractus, Boletus
extricabilis, Phlegmacium
extuberans, Collybia
facessitus, Camarophyllus
fagetorum, Mycena
faginea, Karstenia
—, Tremella
fagineti, Telamonia
fallaciosus, Inocybe
fallax, Russula
Falkii, Psathyra
farctus, Clitocybe
—, Inocybe
farinaceum, Hydnum
farinipes, Russula
fasciatus, Hydrocybe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

fascicularis, Hypholoma
—, Mucronella
fastibilis, Hebeloma
fastidiosa, Thelephora
fatuus, Psathyra
favillaris, Tricholoma
favorabilis, Inocybe
fellea, Russula
felleus, Boletus
ferruginascens, Flammula
ferrugineo-album, Hydnum
ferrugineum, Hydnum
—, Stereum
ferruginosa, Caldesiella
ferruginosus, Polyporus
fibrosipes, Phlegmacium
fibroso-laceratus, Inocybe
fibula, Omphalia
filamentosus, Hypochnus
—, Pholiota
Filius, Flammula
filopes, Mycena
fimbriatum, Porothelium
fimetarius, Coprinus
fimicola, Panaeolus
fimiputris, Panaeolus
fingibilis, Russula
finitimus, Hydrocybe
firmus, Hebeloma
—, Hydrocybe
fistularis, Hydrocybe
fistulosa, Clavaria
flabelliformis, Lentinus
flaccida, Clavaria
—, Lenzites
flaccidus, Clitocybe
flammans, Pholiota
flava, Clavaria
flavellus, Camarophyllus
flavescens, Psalliota
flavidifolius, Clitocybe
flavido-lilacinus, Inocybe
flavidus, Boletus
—, Flammula
flavipes, Clavaria
—, Camarophyllus
flavo-albus, Mycena
flavo-brunneus, Tricholoma
flavo-fuscus, Clitocybe
flavus, Boletus
flexipes, Telamonia
floccidus, Hypochnus
floccoso-farinaceus, Coprinus
floccoso-fibrillosus, Inoloma
floridulus, Collybia
focalis, Armillaria
fodiens, Collybia
foeniculaceus, Marasmius
foenisecii, Homophron
foetens, Russula
foetidus, Marasmius
foliacea, Tremella
fomentarius, Polyporus
formatus, Polyporus
formosula, Clavaria
formosus, Leptonia
fracticius, Armillaria
fragiformis, Dacrymyces
fragile, Hydnum
fragilis, Clavaria
—, Polyporus
—, Russula
fragrans, Boletus
—, Clitocybe
—, Hydnum
fraudans, Inocybe
fraudulosus, Phlegmacium
fraxinus, Polyporus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Friesii, Cantharellus
—, Limacium
—, Phlegmacium
fritilliformis, Clitocybe
frumentaceus, Tricholoma
frustratorius, Clitocybe
frustulentus, Psathyra
fucatophyllus, Dermocybe
fucilis, Dermocybe
fucosus, Dermocybe
fulgens, Phlegmacium
fuligineo-cinereus, Pleurotus
fuligineo-nigrescens, Omphalia
fuligineo-spermus, Boletus
fuligineo-violaceum, Hydnum
fuligineum, Hydnum
fuligineus, Boletus
fuliginosus, Lactarius
fulmineus, Phlegmacium
fulvescens, Hydrocybe
fulvidus, Naucoria
fulvo-cinnamomeus, Telamonia
fulvo-coeruleum, Hydnum
fulvo-luteus, Myxacium
fulvus, Polyporus
fumosa, Clavaria
fumosus, Clitocybe
—, Polyporus
fundatus, Telamonia
furcata, Calocera
—, Russula
furfuraceus, Tubaria
furvus, Tricholoma
fuscellus, Coprinus
fuscescens, Coprinus
fuscidulus, Polyporus
fusco-albus, Limacium
fusco-alutaceus, Clitocybe
fusco-lilacina, Hymenochaete
fusco-purpureus, Marasmius
fusco-umbonatus, Mycena
fusco-violaceus, Inoloma
—, Irpex
fuscum, Stereum
fusiforme, Clavaria
fusiformi-radicatus, Hebeloma
fusipes, Collybia
—, Hydnum
fusus, Flammula
galericulata, Mycena
gallinaceus, Clitocybe
galochroa, Russula
galopus, Mycena
gangraenosus, Clitocybe
gaudialis, Collybia
gelatinosum, Tremellodon
gentilis, Telamonia
gentilitius, Camarophyllus
geogenium, Hydnum
geophyllus, Inocybe
geotropus, Clitocybe
germanus, Hydrocybe
gibbosa, Trametes
giganteum, Corticium
giganteus, Clitocybe
—, Polyporus
gigantula, Clavaria
gigantulus, Tricholoma
Gilletii, Psilocybe
gilvus, Clitocybe
glandicolor, Telamonia
glauconitens, Hygrocybe
glaucopus, Phlegmacium
glaucus, Camarophyllus
globularis, Marasmius
glossatus, Hygrocybe
glutinosus, Hebeloma
—, Gomphidius

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

glyciosmus, Lactarius
gracilentus, Lepiota
gracilior, Clavaria
gracilis, Clavaria
—, Gomphidius
—, Omphalia
—, Psathyrella
gracilipes, Omphalia
—, Psathyra
gracillimus, Omphalia
grallipes, Myxacium
gramata, Clypeus
graminum, Marasmius
grammopodius, Tricholoma
granulatus, Boletus
granulosa, Grandinia
—, Lepiota
grata, Russula
gravabilis, Tricholoma
graveolens, Russula
—, Tricholoma
gregalis, Clavaria
grisea, Clavaria
—, Russula
griseo-cyaneus, Entoloma
griseo-fulvus, Mycena
griseo-isabellinus, Galera
griseo-lilacinus, Myxacium
griseo-olivascens, Entoloma
griseo-pallidus, Omphalia
griseo-rubellus, Eccilia
griseus, Omphalia
gummosus, Flammula
guttato-marmoratus, Clitocybe
guttatus, Boletus
—, Tricholoma
gymnopodius, Flammula
gypseus, Mycena
gyroflexus, Psathyra
haematochelis, Telamonia
haematopus, Mycena
haematospermus, Psalliota
haemorrhoidarius, Chitonia
hariolorum, Collybia
helomorphus, Flammula
helvelloides, Guepinia
helveolus, Polyporus
helvinus, Lactarius
helvolus, Telamonia
hemerobius, Coprinus
hepatica, Fistulina
hepaticus, Omphalia
herpeticus, Phlegmacium
heteroclitus, Pholiota
heterogeneus, Inocybe
heterophylla, Russula
heterostichus, Tubaria
hettematicus, Inocybe
hiemalis, Mycena
hinnuleus, Telamonia
hircosus, Inolonia
hirneolus, Clitocybe
hirsutum, Stereum
hirsutus, Polyporus
hirta, Odontia
hirtipes, Nolanea
hispidulus, Pluteus
hispidus, Polyporus
hiulcus, Inocybe
—, Telamonia
Hoeftii, Hydrocybe
holopheus, Entoloma
—, Hebeloma
homaemus, Lactarius
hordus, Tricholoma
hornotinus, Lentinus
humilis, Tricholoma
hyacinthinus, Hygrocybe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

hybridus, Flammula
hydrophilus, Hypholoma
hydrophorus, Psathyrella
hynophyllus, Pleurotus
hypnorum, Galera
hypopithys, Volvaria
hypothejus, Limacium
hypsipus, Stropharia
hysiginus, Lactarius
ichoratus, Lactarius
icterinus, Nolanea
igniarius, Polyporus
ignitus, Clitopilus
ignobilis, Inocybe
ignorabilis, Tricholoma
illecebrosus, Tricholoma
illepidus, Hydrocybe
illicibilis, Entoloma
illuminus, Hydrocybe
imbricatum, Hydnum
imbricatus, Polyporus
—, Tricholoma
imbutus, Hydrocybe
immarcescens, Tricholoma
immundus, Tricholoma
immutabilis, Boletus
—, Flammula
impatiens, Psathyrella
impennis, Telamonia
impensibilis, Clypeus
impromiscuus, Mycena
improspicuus, Naucoria
inaequale, Hydnum
inaequalis, Clavaria
inamoenus, Tricholoma
inattenuatus, Naucoria
incarnata, Russula
incarnato-fuscescens, Leptonia
incarnatum, Corticium
incarnatus, Inocybe
—, Polyporus
incilis, Clitocybe
incisa, Odontia
incisus, Telamonia
inclinatus, Mycena
incongruens, Mycena
inconsequens, Telamonia
inconversus, Tubaria
incorporatus, Clitocybe
incrassatus, Coprinus
indecisus, Boletus
indecorata, Tremella
indeprensus, Tricholoma
indetritus, Tricholoma
indictivus, Stropharia
indigulus, Clitocybe
indissimilis, Inocybe
ineditus, Clypeus
inflatus, Nolanea
infractus, Phlegmacium
infula, Nolanea
infundibuliformis, Cantharellus
—, Clitocybe
ingratus, Collybia
inhonestus, Crepidotus
injucundus, Telamonia
injunctus, Inocybe
innocuus, Naucoria
inodorum, Hydnum
inolens, Collybia
inopus, Flammula
inquilinus, Tubaria
inscriptus, Inocybe
insequens, Inocybe
inserendus, Naucoria
insignis, Hydrocybe
insiliens, Psilocybe
instratus, Hypholoma

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

insuavis, Clypeus
insulsus, Lactarius
integra, Russula
integrellus, Omphalia
intentus, Phlegmacium
interceptus, Naucoria
interjungens, Homophron
intersitus, Nolanea
interspersellus, Inoloma
intumescens, Tremella
intybacea, Thelephora
intybaceus, Polyporus
inurbanus, Telamonia
inutilis, Nolanea
invenustus, Clypeus
inversus, Clitocybe
involutus, Paxillus
—, Polyporus
ionides, Tricholoma
irinus, Tricholoma
irregulare. Radulum
irregularis, Hydrocybe
irrigatus, Camarophyllus
isabella, Clitocybe
isabellinus, Hydrocybe
iteratus, Clypeus
jasmineus, Phlegmacium
jonquillea, Odontia
jonquilleus, Amanita
jubarinus, Hydrocybe
jubatus, Entoloma
juncea, Clavaria
junceus, Nolanea
Junghuhnii, Hydrocybe
junonius, Pholiota
Krombholzii, Clavaria
Kunzei, Clavaria
laccatus, Clitocybe
lacerus, Inocybe
laciniata, Thelephora
lacrymabundus, Hypholoma
lacrymans, Merulius
lactea, Odontia
lacteum, Corticium
lacteus, Irpex
—, Mycena
—, Polyporus
lacticularius, Mycena
laetior, Hydrocybe
laetus, Hygrocybe
laevatus, Hebeloma
laeve, Corticium
lagopus, Coprinus
lampropus, Leptonia
lanatofurfuraceus, Coprinus
languidus, Marasmius
lanicutis, Tricholoma
laniger, Telamonia
largiusculus, Phlegmacium
largus, Phlegmacium
laricinus, Boletus
larignus, Boletus
lascivus, Tricholoma
latelamellatus, Clitocybe
lateritius, Galera
latisporus, Polyporus
latitabundus, Limacium
latum, Corticium
latus, Phlegmacium
lautiusculus, Tricholoma
lazulinus, Leptonia
lectus, Camarophyllus
legitimus, Phlegmacium
lentatus, Clitocybe
lenticularis, Amanita
lentus, Flammula
leoninus, Pluteus
lepida, Russula

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

lepideus, Lentinus
lepidopus, Dermocybe
Lepista, Tricholoma
leptopus, Paxillus
leucocephalus, Tricholoma
leucochrius, Pleurotus
leucomelas, Polyporus
leucophaeus, Cantharellus
leucophaeus, Limacium
leucopus, Hydrocybe
levidensis, Mycena
licinipes, Telamonia
ligans, Psathyrella
ligata, Clavaria
ligatus, Limacium
lignyotus, Lactarius
Ligula, Clavaria
lilacino-lamellatus, Clypeus
lilacinopes, Phlegmacium
lilacinus, Tricholoma
limacinus, Limacium
Lindgrenii, Telamonia
Linnaei, Russula
liquidus, Myxacium
liquiritiae, Flammula
liratus, Phlegmacium
lirellosa, Lopharia
litigiosus, Gomphidius
livido-albus, Limacium
livido-coeruleum, Corticium
livido-ochraceus, Myxacium
lividum, Corticium
lividus, Boletus
—, Entoloma
livor, Hydrocybe
lobatus, Cantharellus
lobatus, Clitocybe
—, Polyporus
longicaudus, Hebeloma
longipes, Collybia
Lorinseri, Boletus
lubricus, Flammula
lucidus, Polyporus
lucifugus, Inocybe
lucorum, Telamonia
ludius, Collybia
lugens, Hebeloma
lugubris, Naucoria
lupinus, Boletus
lupuletorum, Collybia
luridatus, Tricholoma
luridiformis, Boletus
luridipes, Clitocybe
luridus, Boletus
—, Lactarius
—, Tricholoma
luscinus, Clitocybe
lustratus, Phlegmacium
lutea, Russula
luteo-albus, Mycena
luteo-badius, Boletus
luteo-carneum, Hydnum
luteo-cinereus, Polyporus
luteolo-albus, Russula
luteolospermus, Tricholoma
luteo-rubescens, Clitocybe
luteo-virens, Armillaria
lutescens, Cantharellus
—, Craterellus
—, Polyporus
—, Tremella
lutescenti-albus, Tricholoma
luteus, Boletus
luxuriatus, Hydrocybe
macer, Nolanea
macidus, Collybia
macilentus, Collybia
macroporus, Boletus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

macrospora, Clavaria
macrosporum, Hydnum
macrosporus, Boletus
—, Polyporus
maculaeformis, Corticium
maculata, Collybia
maculatus, Gomphidius
magnimamma, Hebeloma
magnus, Pholiota
majalis, Entoloma
makraulus, Polyporus
malachius, Inoloma
malicorius, Dermocybe
mammosus, Entoloma
— Lactarius
mappa, Ammanita
marasmioides, Mycena
marcescibilis, Bolbitius
marcessibilis, Hypholoma
marculentus, Coprinus
marginatus, Pholiota
—, Polyporus
maritimus, Clypeus
mastiger, Psathyra
maurus, Omphalia
maximus, Clitocybe
medianus, Hebeloma
mediocris, Entoloma
medullapanis, Polyporus
melaleucum, Hydnum
melaleucus, Tricholoma
melanopus, Polyporus
melanospermus, Stropharia
melantinus, Hypholoma
melinoides, Naucoria
melleifolius, Dermocybe
melleo-alba, Odontia
melleo-pallens, Hydrocybe
melleus, Armillaria
mellinus, Inoloma
Merletii, Inocybe
mesenterica, Tremella
mesopheus, Hebeloma
mesotephrus, Limacium
metachrous, Clitocybe
metatus, Mycena
micaceus, Coprinus
micans, Naucoria
Michelianus, Collybia
microrhizus, Psathyra
milvinus, Hydrocybe
miniatus, Hygrocybe
minimus, Polyporus
minutalis, Russula
mirificus, Clitopilus
miserandus, Collybia
mitis, Boletus
—, Pleurotus
mitissimus, Lactarius
mititicus, Lactarius
mitratus, Hebeloma
mixtilis, Clypeus
mniophilus, Galera
modestissimus, Mycena
modestus, Clitocybe
mollicellus, Tricholoma
mollicomus, Polyporus
mollis, Crepidotus
—, Polyporus
molluscus, Polyporus
molybdinus, Clitocybe
molyoides, Marasmius
monachella, Nolanea
montanus, Tricholoma
mortuosus, Clitocybe
Mougeotii, Hymenochaete
mucidus, Armillaria
—, Polyporus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

mucifluus, Myxacium
mucronellus, Hygrocybe
multifida, Pterula
multiformis, Phlegmacium
multiseptata, Dacrymyces
multivagus, Hydrocybe
multizonata, Thelephora
mundulus, Clitopilus
muralis, Omphalia
murcidus, Homophron
murcinus, Inoloma
murinellus, Volvaria
muscarius, Amanita
muscigenus, Cantharellus
muscoides, Clavaria
muscorum, Cantharellus
—, Tubaria
mussivus, Hebeloma
mustelina, Russula
mustelinus, Pholiota
musteus, Lactarius
mutabilis, Pholiota
mutatorius, Inocybe
mycenoides, Pholiota
myosurus, Collybia
myrtillinus, Dermocybe
myxosporum, Corticium
Napus, Phlegmacium
narcoticus, Coprinus
nauseosa, Russula
nebularis, Clitocybe
necessarius, Pluteus (Hypomnema)
nefrens, Leptonia
nemoreus, Camarophyllus
nexuosus, Telamonia
nictitans, Tricholoma
nidorosus, Entoloma
nidusavis, Clitopilus
nigricans, Polyporus
nigricans, Russula
nigrum, Hydnum
—, Stereum
nimbatus, Clitocybe
nimbifer, Naucoria
nimbosus, Naucoria
nisus, Marasmius
nitellinus, Collybia
nitida, Russula
nitidiusculus, Inocybe
nitidus, Amanita
—, Camarophyllus
—, Entoloma
nitratus, Hygrocybe
niveum, Hydnum
niveus, Camarophyllus
—, Coprinus
—, Hypochnus
nodulosum, Hydnum
nodulosus, Polyporus
Nolitangere, Psathyra
nominabilis, Lactarius
noscitatus, Lepiota
notabilis, Omphalia
nothus, Psilocybe
nubilus, Clitocybe
nucisedes, Psilocybe
nudipes, Hebeloma
nudus, Tricholoma
nummularius, Collybia
—, Polyporus
nycthemerus, Coprinus
obbatus, Clitocybe
obducens, Polyporus
obesus, Inocybe
oblecta, Clavaria
oblectabilis, Clypeus
oblectana, Clavaria
obliquus, Irpex

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

oblongosporus, Inocybe
obolus, Clitocybe
obrusseus, Hygrocybe
obscurus, Inocybe
observabilis, Inocybe
obsoletus, Clitocybe
obstans, Collybia
obturatus, Stropharia
obtusatus, Psathyra
obtusisporus, Panaeolus
obtusiuscula, Clavaria
obtusus, Hydrocybe
occultum, Hydnum
occultus, Pluteus
ocellatus, Collybia
ochraceo-alba, Russula
ochraceo-cinereus, Polyporus
ochraceo-fulvum, Hydnum
ochraceo-violascens, Inocybe
ochraceum, Corticium
ochroleuca, Russula
ochroleucum, Stereum
ochroleucus, Dermocybe
odora, Trametes
odorabilis, Clitocybe
odorata, Trametes
odoratissimus, Hebeloma
odorativus, Claudopus
—, Phlegmacium
odorifer, Phlegmacium
odorulus, Clitocybe
odorus, Clitocybe
oedematopus, Lactarius
olens, Amanita
olivaceo-albus, Limacium
olivaceo-nigra, Tremmella
olivaecolor, Russula
olivascens, Phlegmacium
—, Russula
ombrophilus, Pholiota
omphalodes, Lentinus
oniscus, Omphalia
opacus, Clitocybe
opimatus, Inoloma
opimus, Inoloma
opiparus, Clitocybe
opponendus, Pluteus
orbiculare, Radulum
orbicularis, Collybia
orbiculatus, Radulum
orbiformis, Clitocybe
orbisporus, Clitocybe
orcella, Clitopilus
oreades, Marasmius
orellanus, Dermocybe
orichalceus, Phlegmacium
ornatus, Pleurotus
ostreatus, Pleurotus
ovalis, Galera
ovinus, Camarophyllus
—, Polyporus
ozes, Collybia
pachypus, Boletus
paleaceus, Telamonia
pallescens, Polyporus
pallidomicans, Polyporus
pallidosporus, Clitocybe
pallidus, Lactarius
palmata, Telephora
paludestris, Lactarius
paludicola, Nolanea
paludosa, Russula
paludosus, Tubaria
panaeolus, Tricholoma
pansa, Phlegmacium
pantherinus, Amanita
panuoides, Paxillus
papillata, Exidia

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

papillosa, Grandinia
parabilis, Psilocybe
parabolicus, Mycena
paradoxus, Flammula
—, Irpex
paragandis, Telamonia
parasitica, Nyctalis
pargamenus, Lactarius
parilis, Clitocybe
parkensis, Eccilia
parmatus, Lepiota
particularis, Homophron
—, Psilocybe
parvannulatus, Lepiota
parviductus, Psilocybe
parvipes, Camarophyllus
parvulus, Volvaria
pascuus, Boletus
—, Nolanea
pateriformis, Hydrocybe
patulus, Tricholoma
pectinata, Russula
peculiaris, Omphalia
pediades, Naucoria
pelianthinus, Mycena
Pelletieri, Clitocybe
Pellicula, Corticium
—, Hypochnus
peltatus, Mycena
pelucidulus, Clavaria
—, Nolanea
pelucidus, Tubaria
penarius, Limacium
penetrans, Flammula
pennatus, Psathyra
perbrevis, Inocybe
percognitus, Phlegmacium
percomis, Phlegmacium
perennis, Polyporus
perforans, Marasmius
periscelis, Telamonia
permixtus, Mycena
permundus, Amanita
peronatus, Marasmius
perrarus, Inoloma
perscrutatus, Psathyrella
persicinus, Tricholoma
persicolor, Tricholoma
persimplex, Psathyra
persistens, Hygrocybe
personatus, Tricholoma
Persoonianum, Stereum
pertinens, Phlegmacium
pertractatus, Hygrocybe
pervisus, Clitocybe
Pes-Caprae, Polyporus
—, Tricholoma
pessundatus, Tricholoma
petaloides, Pleurotus
petiginosus, Hebeloma
petropolitans, Merculius
pezizoideus, Crepidotus
phaeopodius, Collybia
phalloides, Amanita
philonotis, Omphalia
phlebophorus, Pluteus
pholideus, Inoloma
phyllophilus, Clitocybe
physaloides, Psilocybe
piceus, Nolanea (Hypomnema)
picinus, Lactarius
picipes, Polyporus
picreus, Flammula
picrodes, Boletus
pictus, Omphalia
—, Polyporus
Pini, Stereum
—, Trametes

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

pinicola, Polyporus
—, Thelephora
—, Tremella
pinicolum, Corticium
pinguis, Lepiota
pinophila, Karstenia
pinorum, Merulius
piperatus, Boletus
—, Lactarius
pistillaris, Clavaria
pithiophilus, Clitocybe
pithyus, Mycena
placendus, Nolanea
placenta, Entoloma
—, Polyporus
planiusculus, Clitocybe
planus, Pleurotus
platicus, Lactarius
pleopodius, Nolanea (Hypomnema)
pleropicus, Entoloma
plicata, Exidia
plicatilis, Coprinus
plicosus, Mycena
plumbeus, Lactarius
plumiger, Telamonia
plumosus, Inocybe
polioleucus, Tricholoma
politulus, Myxacium
polius, Clitocybe
polygrammus, Mycena
polystictus, Lepiota
pomaceus, Polyporus
ponderatus, Limacium
popinalis, Clitopilus
populeti, Pleurotus
populicola, Naucoria
populinus, Hypholoma
porphyrius, Amanita
porphyropus, Phlegmacium
porphyrosporus, Boletus
porreus, Marasmius
porrigens, Pleurotus
portentifer, Tricholoma
portentosus, Tricholoma
posterulus, Inocybe
postumus, Nolanea
praecavendus, Pholiota
praecox, Pholiota
praefinitus, Hebeloma
praeposterus, Inocybe
praesignis, Telamonia
praestabilis, Pluteus
praetervisa, Clavaria
praetervisus, Clypeus
prasiosmus, Marasmius
pratensis, Camerophyllus
—, Psalliota
praticolus, Entoloma
pravus, Tricholoma
principalis, Entoloma
privignus, Hydrocybe
procerus, Lepiota
proletarius, Nolanea
proliferus, Mycena
proludens, Leptonia
promiscuus, Nolanea
pronus, Psathyrella
propinquatus, Pholiota
proportionalis, Lactarius
prostibilis, Paxillus
pruinosus, Clitocybe
prunuloides, Entoloma
Prunulus, Clitopilus
pseudo-androsaceus, Omphalia
pseudo-flava, Clavaria
pseudo-mixtilis, Clypeus
pseudo-nycthemerus, Coprinus
pseudo-platyphyllus, Collybia

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

pseudo-purus, Mycena
pseudo-scabellus, Inocybe
psittacinus, Hygrocybe
puberum, Corticium
pubescens, Lactarius
—, Polyporus
pudorinus, Limacium
puellaris, Russula
pulcherrimus, Mycena
pulchralis, Russula
pullus, Clitocybe
—, Collybia
pulmonarius, Pleurotus
pulverulento-floccosus, Coprinus
pulverulentus, Lentinus
pumilus, Pholiota
punctatus, Hebeloma
punctisporus, Polyporus
punctulatus, Stropharia
punicans, Mycena
puniceus, Hygrocybe
purpurascens, Phlegmacium
purpurea, Russula
purpureum, Stereum
purpureus, Boletus
purus, Mycena
pusiolus, Naucoria
pustulatus, Limacium
puteana, Coniophora
putidus, Tricholoma
pygmaeo-affinis, Galera
pygmaeus, Naucoria
pyridorus, Inocybe
pyrotrichus, Hypholoma
pyxidatus, Omphalia
quadricolor, Telamonia
quaesitus, Telamonia
Queletii, Russula
querceus, Marasmius
quercina, Daedalea
—, Peniophora
quercinum, Corticium
—, Radulum
quinquepartitus, Tricholoma
radiata, Phlebia
—, Thelephora
radiato-rugosum, Hydnum
radiatus, Polyporus
radicans, Boletus
radicatus, Collybia
radicosus, Pholiota
Radula, Polyporus
raeborhizus, Mycena
ramealis, Marasmius
ramentaceus, Armillaria
rancidus, Collybia
rapaceus, Phlegmacium
rapidus, Coprinus
rarus, Marasmius
rasilis, Tricholoma
ravidus, Galera
recendus, Boletus
recensitus, Inoloma
receptibilis, Mycena
recognitus, Psilocybe
recollectus, Clitopilus
recutitiformis, Amanita
recutitus, Amanita
redactus, Hydrocybe
redimitus, Inoloma
reductus, Naucoria
Reedii, Hydrocybe
refectus, Telamonia
refellens, Paneolus
regius, Boletus
renidens, Hydrocybe
Rennyi, Clypeus
repandum, Hydnum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

repens, Collybia
repraesentaneus, Lactarius
reptans, Claudopus
resinosus, Polyporus
resplendens, Tricholoma
rhacodes, Lepiota
rhacborhizus, Mycena
rhodellus, Polyporus
rhodopolius, Entoloma
rhodosporus, Clitopilus
rhombisporus, Psilocybe
Ribis, Polyporus
riculatus, Dermocybe
Riederi, Phlegmacium
rigens, Hydrocybe
rigens, Pluteus
rigidus, Telamonia
rimosus, Inocybe
rimulincola, Naucoria
rivalis, Clavaria
rivulosus, Clitocybe
roborosus, Armillaria
robustus, Armillaria
rogosa, Clavaria
Romellii, Pluteus
rorulentus, Lepiota
rosacea, Russula
rosellus, Mycena
roseolus, Cantharellus
roseo-zonatus, Lactarius
roseum, Corticium
roseus, Gomphidius
Rotula, Marasmius
rotundifolius, Flammula
rubella, Clavaria
rubellus, Telamonia
rubescens, Amanita
—, Lactarius
—, Trametes
rubiginosum, Stereum
rubiginosus, Galera
rubra, Russula
rubricosus, Hydrocybe
rubro-fibrollosus, Limacium
rubro-fuscus, Lactarius
rubro-maculatus, Polyporus
rubro-marginatus, Mycena
rubro-violacea, Tremella
rudis, Panus
rufescens, Cantharellus
—, Clavaria
—, Hydnum
rufidulus, Pholiota
rufocarneus, Nolanea
rufopallidus, Polyporus
rufoviolacea, Clavaria
rufus, Lactarius
—, Merulius
rugosa, Clavaria
rugosus, Mycena
rugulosus, Marasmius
rusiophyllus, Psalliota
Russula, Tricholoma
russuloides, Amanita
rusticus, Omphalia
rutilans, Tricholoma
rutilus, Boletus
rutrosus, Polyporus
saccharinus, Marasmius
sacpiaria, Lenzites
saginus, Phlegmacium
Sahleri, Galera
salicinus, Pluteus
—, Polyporus
salignus, Pleurotus
—, Polyporus
salor, Myxacium
Sambuci, Hypochnus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

sambucina, Auricularia
sambucinus, Inocybe
sanguilentus, Inocybe
sanguinea, Russula
sanguineo-albus, Tricholoma
sanguineo-fulvum, Hydnum
sanguineus, Dermocybe
sanguinolentum, Stereum
sanguinolentus, Mycena
—, Polyporus
saniosus, Hydrocybe
sapineus, Flammula
saponaceus, Tricholoma
saporatus, Phlegmacium
sarcitus, Leptonia
sarcocephalus, Psilocybe
Sardonia, Russula
Satanas, Boletus
saturninus, Hydrocybe
Saundersii, Entoloma
saxatilis, Polyporus
scabellus, Inocybe
scabellus, Clypeus
scaber, Boletus
—, Inocybe
scabrisporus, Naucoria
scalpturatus, Tricholoma
scambus, Flammula
scandens, Hydrocybe
scaurus, Phlegmacium
Schaefferi, Clavaria
schoenopus, Marasmius
Schulzeri, Daedalea
Schumacheri, Tricholoma
sciophanus, Hygrocybe
scolecinus, Naucoria
scorodonius, Marasmius
scorzonereus, Collybia
scrobiculatum, Hydnum
scrobiculatus, Lactarius
scyophyllus, Hydrocybe
scyphoides, Omphalia
sebacea, Thelephora
sebaceus, Phlegmacium
seductus, Flammula
segregatus, Psalliota
sejunctus, Tricholoma
selectus, Tricholoma
semicrema, Russula
semiglobatus, Stropharia
semilanceolatus, Psilocybe
semiorbicularis, Naucoria
semiovatus, Polyporus
semisanguineus, Dermocybe
semotus, Psalliota
senescens, Hebeloma
separabilis, Telamonia
separatus, Panaeolus
sericatus, Entoloma
sericellus, Entoloma
sericeus, Boletus
—, Entoloma
serifluus, Lactarius
serotinus, Pleurotus
serpens, Merulius
—, Trametes
serrulatus, Leptonia
servatus, Inocybe
sessilis, Crepidotus
setipes, Omphalia
sevocatus, Clitocybe
sideroides, Naucoria
silaceus, Hypholoma
siligineus, Galera
silvaticus, Psalliota
silvicola, Psalliota
simplarius, Clitocybe
simulans, Psilocybe

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

sinapizans, Hebeloma
sindonius, Inocybe
sinopicus, Clitocybe
sinuatus, Entoloma
sinuosus, Craterellus
—, Hebeloma
—, Polyporus
situatus, Clitocybe
sociabilis, Lepiota
socialis, Clitocybe
solstitialis, Leptonia
sordidum, Hydnum
sordidus, Tricholoma
sororius, Phlegmacium
spadiceo-griseus, Homophron
spadiceo-griseus, Psathyra
spadiceum, Stereum
spadiceus, Boletus
—, Homophron
—, Phlegmacium
sparso-aculeatum, Hydnum
sparteus, Galera
specialis, Clypeus
spectabilis, Pholiota
spectandus, Hygrocybe
speculum, Entoloma
spermaticus, Tricholoma
sphaerobasis, Galera
sphaerosporus, Myxacium
sphagnorum, Galera
sphaleromorphus, Pholiota
sphinctrinus. Panaeolus
spiculus, Galera
spiloleucus, Hebeloma
spilomeus, Dermocybe
spinulosa, Clavaria
spinulosus, Clitocybe
splachnoides, Marasmius
splendens, Clitocybe
splendidus, Myxacium
spoliatus, Hebeloma
spongia, Polyporus
sporadicus, Telamonia
spumosus, Flammula
squalens, Psilocybe
squalidofuscus, Omphalia
squamiger, Inocybe
squamosum, Hydnum
squamosus, Polyporus
squamulosus, Clitocybe
squarrosus, Pholiota
stagnicola, Tubaria
stagninus, Tubaria
stalacticium, Hydnum
stanneus, Mycena
stans, Tricholoma
status, Lepiota
staurosporus, Nolanea
stellatus, Omphalia
stemmatus, Telamonia
stercorarius, Stropharia
stereocephalus, Collybia
sticticus, Naucoria
stillaticius, Myxacium
stillativus, Polyporus
stillatus, Dacrymyces
stipticus, Panus
—, Polyporus
stolonifer, Collybia
streptopus, Camarophyllus
striaepes, Boletus
striatulus, Pleurotus
stricta, Clavaria
strictipes, Tricholoma
stridulus, Collybia
strigosum, Hydnum
strobilaceus, Boletus
strobiliformis, Amanita

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

strophosus, Hebeloma
stylobatus, Mycena
suaveolens, Clitocybe
—, Hydnum
—, Trametns
subacceptandes, Nolanea
subaemulus, Inocybe
subaequalis, Boletus
—, Tricholoma
subalpinus, Tricholoma
subalutaceus, Clitocybe
subatratus, Psathyrella
subbutyraceus, Collybia
subcandelaris, Hydrocybe
subcarnosus, Telamonia
subcavus, Armillaria
subcollariatus, Hebeloma
subcompacta, Russula
subcoprophilus, Psilocybe
subdehiscens, Armillaria
subditus, Paneolus
subdulcis, Lactarius
suberebius, Pholiota
suberosa, Trametes
suberosa-coriaceum, Hydnum
subfastigiata, Clavaria
subferrugineus, Hydrocybe
subflava, Clavaria
subflexuosus, Clitocybe
subflexuosus, Myxacium
subfusco-flavidus, Polyporus
subgilvus, Clitocybe
subglobosus, Naucoria
subignitus, Clitopilus
subignobilis, Inocybe
subimmundus, Tricholoma
subimperialis, Armillaria
subinfucatus, Dermocybe
subinsequens. Inocybe
sublateritius, Hypholoma
subligans, Psathyrella
sublimbatus, Naucoria
sublividus, Entoloma
subluteolus, Myxacium
subluteus, Pholiota
submerdarius, Stropharia
submyrtillinus, Dermocybe
subnotatus, Dermocybe
subobtusatus, Psathyra
subornatus, Clypeus
subplacorrhiza, Typhula
subpostumus, Nolanea
subpulverulentus, Tricholoma
subpurpurascens, Phlegmacium
subradiatus, Camarophyllus
subrancidus, Tricholoma
subromaculatus, Polyporus
subrufescens, Marasmius
subrufulus, Pleurotus
subscalaris, Crepidotus
subsimplex, Calocera
subsplachnoides, Marasmius
subsquamosum, Hydnum
subsquamosus, Polyporus
subsquarrosus, Pholiota
subsulphureum, Corticium
subsulphureus, Tricholoma
subtemulentus, Naucoria
subtilis, Clavaria
subtilis, Psathyrella
subtomentosus, Boletus
subtortus, Phlegmacium
subudus, Psilocybe
subumbonatus, Lactarius
subvirens, Hygrocybe
succineus, Collybia
suecica, Clavaria
suevicus, Tricholoma

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

suillus, Inoloma
sulphureum, Corticium
sulphureus, Boletus
—, Polyporus
summissus, Nolanea
superincurvatus, Mycena
superiusculus, Coprinus
supernulus, Psathyra
supinus, Mycena
suratus, Myxacium
suspiciosus, Naucoria
Swartzii, Omphalia
tabacinum, Stereum
tabacinus, Naucoria
tabidus, Lactarius
tabularis, Dermocybe
talus, Phlegmacium
tardus, Coprinus
temulentus, Naucoria
tenacellus, Collybia
tenax, Naucoria
tener, Bolbitius
—, Galera
tenuatus, Marasmius
tenuimarginatus, Clypeus
tenuis, Hypochnus
tenuisporus, Tricholoma
tephroleucus, Limacium
—, Polyporus
tephrotichus, Pleurotus
terebratus, Limacium
tergiversans, Coprinus
terrestris, Polyporus
—, Thelephora
tericus, Tricholoma
terricola, Claudopus
terrigenus, Pholiota
testaceo-canescens, Telamonia
testaceo-fulvum, Hydnum
testaceo-fulvus, Psilocybe
testaceus, Gomphidius
—, Hebeloma
—, Polyporus
testatus, Tricholoma
thejogalus, Lactarius
tigrinus, Lentinus
—, Tricholoma
tintinnabulum, Mycena
tithymalinus, Lactarius
titubans, Bolbitius
togularis, Pholiota
tomentoso-marginatus, Corticium
tomentosus, Coprinus
—, Polyporus
tophaceus, Inoloma
torminosus, Lactarius
tornatus, Clitocybe
torpens, Psathyra
torquescens, Marasmius
tortuosus, Hydrocybe
torulosus, Panus
torvus, Telamonia
totmodus, Clitocybe
trabeus, Collybia
—, Polyporus
traganus, Inoloma
transformis, Tricholoma
transitorius, Clypeus
translucens, Claudopus
transnumeratus, Leptonia
trechisporus, Clypeus
—, Inocybe
tremullosus, Merulius
tremulus, Pleurotus
trepidulus, Psathyrella
tricholoma, Inocybe
tricolor, Lenzites
—, Omphalia

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

triformis, Telamonia
triscopus, Naucoria
tristis, Tricholoma
triumphans, Phlegmacium
trivialis, Lactarius
Trogii, Clitocybe
trullaeformis, Clitocybe
truncatus, Hebeloma
truncigena, Russula
truncigenus, Phlegmacium
truncorum, Claudopus
—, Coprinus
trutinatus, Pleurotus
tubaeformis, Cantharellus
tuberculosum, Hydnum
tuberosus, Collybia
tumefactus, Tricholoma
tumidosus, Clitocybe
tumidulus, Hebeloma
tumulosus, Clitocybe
turbidatus, Entoloma
turbidus, Entoloma
turbinatus, Phlegmacium
turgidus, Inoloma
turmalis, Phlegmacium
turmarius, Clitocybe
turpis, Lactarius
turritus, Tricholoma
udus, Psilocybe
uliginosus, Dermocybe
ulmarius, Pleurotus
umbellatus, Polyporus
umbelliferus, Omphalia
umbilicatus, Omphalia
umbonatus, Cantharellus
umbonescens, Stropharia
umbratilis, Omphalia
umbrinella, Clavaria
umbrino-marginatus, Clitocybe
umbrinus, Lactarius
umbrosus, Pluteus
uncialis, Naucoria
undulatellus, Lentinus
unguicularis, Pleurotus
unicolor, Daedalea
—, Pholiota
unimodus, Hydrocybe
unistirpis, Clavaria
uraceus, Hydrocybe
urbicus, Telamonia
ursinus, Lentinus
ustalis, Tricholoma
utilis, Lactarius
uvidus, Lactarius
vaccinus, Boletus
—, Tricholoma
vaginatus, Amanita
Vaillantii, Polyporus
valentior, Psathyrella
valgus, Dermocybe
vaporarius, Polyporus
variabilis, Claudopus
—, Typhula
varicosus, Marasmius
variegata, Lenzites
variegatus, Boletus
—, Tricholoma
variicolor, Phlegmacium
varius, Phlegmacium
—, Polyporus
vellereus, Lactarius
velutinus, Camarophyllus
—, Hypholoma
—. Polyporus
velutipes, Collybia
venetus, Dermocybe
ventricoso-lamellatus, Mycena
ventricosus, Collybia

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

venustissimus. Clitocybe
vepallidus, Tricholoma
verecundus, Nolanea
vermicularis, Clavaria
vernalis, Amanita
vernicosus, Clitocybe
vernifer, Clitocybe
verrucipileus, Clitocybe
versicolor, Polyporus
versipelle, Hydnum
versipellis, Boletus
—, Hebeloma
vervacti, Naucoria
vesca, Russula
vespertinus, Phlegmacium
vesperus, Phlegmacium
vestitus, Galera
veternosa, Russula
vexabilis, Naucoria
viarium, Coprinus
vibecinus, Clitocybe
vibratilis, Myxacium
vicinalis, Clitocybe
vietus, Lactarius
vinaceus, Nolanea
violaceo-fulvus, Panus
violaceo-fulvus, Pleurotus
violaceo-spermus, Pleurotus
violaceus, Inoloma
—, Polyporus
violascens, Hydnum
—, Lactarius
virescens, Russula
virgatus, Tricholoma
virgineus, Camarophyllus
viridans, Polyporus
viridis, Lactarius
viscidus, Boletus
—, Gomphidius
viscosa, Calocera
—, Tremella
vitellina, Russula
vitellinus, Bolbitius
—, Hygrocybe
vitilis, Mycena
vitreatus, Mycena
vitreus, Polyporus
vittaeformis, Galera
vivipara, Clavaria
volemus, Lactarius
volvaceus, Volvaria
vulgaris, Polyporus
vulgatus, Mycena
vulpinus, Polyporus
Weinmannii, Polyporus
xanthopus, Collybia
xanthus, Polyporus
xerampelina, Russula
zephirus, Myzena
zinziberatus, Hydrocybe
zonarius, Lactarius
zonatum, Hydnum
zonatus, Polyporus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Gebrauchte Abkürzungen der Autoren-Namen.

Br. = Britzelmayr
Bres. = Bresadolae
Cke. = Cooke
H. = Höhnel
K. = Karst
M. = Massee
Qu. = Quelet
R. = Romell
S. = Schröter
Sacc. = Saccardo
V. = Voglino
W. = Winter
St. = Stockmayer
Bäuml. = Bäumler

B. et G. = Beck u. Günther
Beck = Beck
Berl. = Berlese
Henn. = Hennings
Jaap = Jaap
Oud. = Oudemans
Str. = Strasser
Barb. = Barbier
Boud. = Boudier
Guill. = Guillemot
Pat. = Patouillard
Roll. = Rolland
Rev. = Revision der Diagnosen I—IV.