Correspondenz-Blatt

des

naturwissenschaftlichen Vereines

in

Regensburg.

Nr. 7. 38. Jahrgang. 1884.

Inhalt. Kittel: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Schluss). — Literatur. — Dr. Kriechbaumer: Blattwespenstudien. — Vereinsangelegenheiten. —

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Schluss.)

883. *Micraspis* Redtenbacher.

micros klein, aspis Schild.

() ***sedecimpunctata*** *Linné.* 6087.

suturata Goeze. — München. — var. duodecimpunctata Linné. — octodecimpunctata Füessl. — undecimpunctata Gmel. — Im ganzen Gebiete h.

884. *Chilocorus* Leach.

cheilos Lippe, korys Helm.

) ***similis*** *Rossi.* 6088.

renipustulatus Scriba. — mediopustulatus Schrank. — Cacti Scopol. — bipustulatus Degeer. — abdominalis Thunb. — Larve Letzn. Arb. schles. Ges. 1853. p. 216. — Oliv. Encycl. méth. VI. p. 74. f. 21—24. — Im ganzen Gebiete n. s.

2) ***bipustulatus*** *Linné.* 6089.

exclamationis Eschsch. — fasciatus Müller. — frontalis Thunb. — Olivetorum Costa. — strigatus Fabr. — testudo Florenc. — transversepunctatus Börner. — Larve Muls. Sécur. p. 170. — Im ganzen Gebiete ziemlich h.

885. ***Exochomus*** *Redtenbacher.*

exochos vorstehend, omos Schulter.

1) ***nigromaculatus*** *Goeze.* 6090.

auritus Scriba. — humeralis Towns. — testudinaris Fourcr. — Im ganzen Gebiete n. s.

2) ***quadripustulatus*** *Linné.* 6091.

quadriverrucatus Fabr. — cassidoides Donov. — lunulatus Gmel. — varia var. γ. Schrank. — Im ganzen Gebiete verbreitet, s.

886. ***Hyperaspis*** *Redtenbacher.*

hyper über, aspis Schild.

1) ***campestris*** *Herbst.* 6092.

frontalis Schneid. — lateralis Panz. — München; Passau; Regensburg; Nürnberg s., Erlangen; Steigerwald s.; Frankfurt, von *Heyden*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*.

2) ***reppensis*** *Herbst.* 6093.

apicalis Dufour. — bipustulata Thunb. — Illigeri Gravenh. — nigra Gmel. — ♀ marginella Quens. — ♂ stigma Oliv. — ♂ xanthocephala Quens. — Im ganzen Gebiete verbreitet, überall s. — Hyperaspis quadrimaculata Redtenb. ist bei Passau angeblich gefunden worden.

887. ***Epilachna*** *Chevrolat.*

epi auf, oben, lachne Wolle.

1) ***chrysomelina*** *Fabr.* 6094.

Aschaffenburg s. s. (?)

2) ***Argus*** *Fourcroy.* 6095.

undecimmaculata Fabr. — undecimpunctata Brahm. — Larve Westw. Introd. Class. I. p. 396. t. 49. — f. 21—22. — Muls. Sécur. p. 192. f. 18. — Nürnberg; Erlangen *Schlemmer*; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt, Decan *Scriba*; Frankfurt und Bergen an Bryonia alba in Mehrzahl, von *Heyden*.

888. *Subcoccionella* Huber.

Lasia *Mulsant.*

1) ***vigintiquatuorpunctata*** *Linné.* 6096.

globosa Schneid. — gibbosa Dumeril. — vigintiquinquepunctata Linné. — Larve Muls. Sécur. p. 197. — Huber. Mém. soc. Genève. IX. p. 363. t. 3. f. 1—7. — Ueberall h. — var. immaculata Rossi. — impunctata Degeer. — livida Herbst. — Saponariae ♀ Huber. — Kommt mit globosa zugleich vor an manchen Orten sehr zahlreich z. B. in Freising und in Nürnberg.

Nach Kollar finden sich die überwinterten Käfer schon im ersten Frühjahre auf dem Luzerner-Klee (Medicago sativa) ein und benagen die zarten Blätter an ihren Rändern sowohl als auch stellenweise an ihrer Oberfläche. Die verletzten Blätter werden bleich und welk und das ganze Kleefeld gewährt, wenn die Beschädigungen durch andauernde trockene Witterung begünstigt werden, einen traurigen Anblick. Viel grösser wird der Schaden später, wenn nebst dem vollkommenen Insekt auch seine Larven, die sich schon im Juli einfinden, an der Verwüstung theilnehmen.

889. *Cynegetis* Chevrolat.

kynegetes Jäger.

1) ***impunctata*** *Linné.* 6097.

aptera Payk. — punctum Herbst. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München, Passau; Regensburg; Nürnberg; Fürth n. s., Professor Dr. *Langhans;* Falkenstein und Nauheim, von *Heyden;* Friedberg, Hauptmann *Fuhr.*

890. *Platynaspis* Redtenbacher.

platys breit, aspis Schild.

1) ***luteorubra*** *Goeze.* 6098.

villosa Fourcr. — bipustulata Dumér. — bisbipustulata Fabr. — bisbiverrucata Panz. — quadriguttata Brahm. — quadrinotata Megerl. — pubescens Oliv. — quadrimaculata Rossi. — rufimana Eschsch. — Augsburg; München; Freising s., Marzlinger Wiesen in Weidenmoder, September; Passau; Aschaffenburg h.; Hessen h., Decan *Scriba.*

891. *Scymnus* Kugellan.

Scymnos ein kleines Thierchen.

1) ***pulchellus*** *Herbst.* 6099.

quadrilunulatus Illig. — quadrimaculatus Kugel. — colon Steph. — Zusmarshausen; Augsburg; Moosburg, Notar von

Sonnenburg; Passau; Regensburg; Nürnberg n. h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Frankfurt und Giessen, von *Heyden*; Ober-Lais, und am Alsbacher Schlosse an Epheu, Decan *Scriba*.

2) ***Redtenbacheri*** *Muls.* 6100.

bisignatus Bohem. — femoralis Redtenb. — Frankfurt ein Stück, von *Heyden*.

3) ***bipunctatus*** *Kugel.* 6101.

biverrucatus Panz. — affinis Payk. — bipustulatus Thunbg. — Augsburg; München; Passau; Nürnberg s.; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg; Hessen s., Decan *Scriba*.

4) ***nigrinus*** *Kugel.* 6102.

ater Thunb. — morio Payk. — minimus Müller. — Im ganzen Gebiet n. s.

5) ***rubromaculatus*** *Goeze.* 6103.

pygmaeus Fourcr. — ♂ collaris Herbst. — ♀ flavilabris Oliv. — ♀ flavipes Panz. — ♂ parvulus Fabr. — ♀ pubescens Herbst. — ♀ sericeus Kugel. — Augsburg; München; Freising h., Pförrer Au, April, Wald bei der Wiesenkirche, August bis November, Plantagenwald, April; Nürnberg n. s.; Erlangen; Seligenstadt, Decan *Scriba*; Frankfurt, von *Heyden*.

6) ***rufipes*** *Fabr.* 6104.

marginalis Rossi. — Ahrensi Mulsant. — Nürnberg s.; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt und Ober-Lais, Decan *Scriba*; Frankfurt und Ems einzeln, von *Heyden*.

7) ***Apetzi*** *Muls.* 6105.

frontalis Rossi. — Zusmarshausen; Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonnenburg*; Nürnberg s.; Erlangen; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Ober-Lais, Decan *Scriba*; Ems einzeln, von *Heyden*.

8) ***frontalis*** *Fabr.* 6106.

♀ affinis Redtenb. — ♂ altica Schrank. — ♂ bilituratus Marsh. — ♂ bimaculatus Thunb. — bimaculatus Marsh. — binotatus Megerle in litt. — ♀ bipunctatus Thunb. — ♀ bipustulatus Panz. — ♀ humeralis Marsh. — ♂ didymus Herbst. — ♀ flavilabris Payk. — ♀ humeralis Panz. — Ueberall h.

9) ***Abietis*** *Payk.* 6107.

Im ganzen Gebiete n. s.

10) ***subvillosus*** *Goeze.* 6108.

fasciatus Fourcr. — dorsalis Waltl. — luridus Dej. — minutissimus Villers. — quadrillum Redtenb. — Augsburg s.; München; Aschaffenburg n. h.; bei Lorsch von Senator von *Heyden* häufig unter einer Blattlaus (Aphis Sambuci) gefunden.

11) ***arcuatus*** *Rossi.* 6109.

signatus Melsheim. — undatus Dahl. i. litt. — Aschaffenburg n. s. auf Epheu, Nilkheim; am Alsbacher Schlosse in der Bergstrasse auf Epheu, Decan *Scriba.*

12) ***suturalis*** *Thunb.* 6110.

discoideus Illig. — atriceps Steph. — discipennis Sturm. — pilosus Herbst. — Pini Marsh. — plagiatus Beck. — pusillus Müller. — Im ganzen Gebiete h.

13) ***ferrugatus*** *Moll.* 6111.

analis Oliv. — ruficollis Oliv. — parvulus var. ε. Illig. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Passau bei der Mauth, Mai, *Kittel*; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; Babenhausen, Decan *Scriba*; Frankfurt einzeln gesammelt, von *Heyden.*

14) ***haemorrhoidalis*** *Herbst.* 6112.

analis Rossi. — parvulus var. γ. Illig. — Ueberall h.

15) ***capitatus*** *Fabr.* 6113.

♂ auritus Thunb. — ♀ fulvifrons Marsh. — parvulus Steph. — parvulus var. α et δ Illig. — Im ganzen Gebiete n. s.

16) ***ater*** *Kugel.* 6114.

oblongus Dej. — Larve Heeger Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 467. — Augsburg; München; Regensburg; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einmal in Mehrzahl an einem alten Weidenstamme, Decan *Scriba*; Frankfurt und Soden, von *Heyden.*

17) ***minimus*** *Rossi.* 6115.

pusillus Herbst. — Im ganzen Gebiete h.

892. ***Rhizobius*** *Stephens.*

rhiza Wurzel, bioo leben.

1) ***litura*** *Fabr.* 6116.

Ueberall h., besonders in der Nähe von Teichen. — var. disimacula Muls. — Mit litura zusammen, aber seltener.

893. ***Coccidula*** *Kugelan.*

Coccus

1) ***scutellata*** *Herbst.* 6117.

bipunctata Gmel. — melanophthalma Gmel. — quinquepunctata Fabr. — Im ganzen Gebiete an Schilf n. s.

2) ***rufa*** *Herbst.* 6118.

pectoralis Fabr. — rosea Marsh. — testacea Thunb. — Ueberall h.

894. *Alexia* *Stephens.*

alexios, protegens.

1) ***globosa*** *Sturm.* 6119.

Augsburg s. h. in Moos bei Deuringen, März, April; Freising s. h. Attachinger Au, Wald bei Thalhausen und bei Wippenhausen November, März und April in Moos; Nürnberg; Aschaffenburg s. s., Professor *Oechner.*

2) ***pilifera*** *Müller.* 6120.

piligera Germ. — Quercus Steph. — München; Aschaffenburg s. s., bei trocknen Schwämmen; Frankfurt und Taunus an Baumschwämmen, von *Heyden.*

3) ***pilosa*** *Panz.* 6121.

Augsburg n. h., Deuringen in Moos; Freising ziemlich h., Weihenstephan, Wald bei Wippenhausen, Thalhausen und bei der Plantage in Moos; Wolfrathshausen, Dr. *Sturm*; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner.*

In Baiern finden sich 86 Arten und 7 Varietäten, 1454 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie LIX. CORYLOPHIDAE.

895. *Clypeaster* *Latreille.*

Sacium *Le Conte.*

1) ***obscurus*** *Sahlbg.* 6122.

pusillus Jacp. — ater Parreys i. litt. — corticinus Thoms. — Aschaffenburg s., bei trocknen Schwämmen; Frankfurt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

896. *Sericoderus* *Stephens.*

1) ***lateralis*** *Gyll.* 6123.

lividus Dej. — thoracicus Steph. — pubescens Schüppel i. litt. — München; Freising n. s., Weihenstephan in Moder, Juli; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Hessen n. s., auch in Nestern von Formica rufa beobachtet, Decan *Scriba.*

897. *Coryglophus* Stephens.

korys Helm, lophos Hals.

1) ***cassidoides*** *Marsh.* 6124.

Augsburg; München; Freising s. h. in Isargenist, April und September; Erlangen *Schlemmer*; Aschaffenburg s., bei trocknen Schwämmen; Seligenstadt n. s. in Anspülicht, Decan *Scriba*; Frankfurt unter Schilf, von *Heyden*.

898. *Orthoperus* Stephens.

Orthos gerade, pera.

1) ***brunnipes*** *Gyll.* 6125.

curvimanus Clarke. — Kluki Wankow. — piceus Steph. — Augsburg; München; Nürnberg h., beim Regensburger Hof unter Eichenrinde; Erlangen *Schlemmer*; Aschaffenburg, Professor *Oechsner*; Frankfurt, von *Heyden*.

2) ***corticalis*** *Redtenb.* 6126.

pilosiusculus Jacq. Duv. — Hessen n. s. unter Baumrinden, Decan *Scriba*.

3) ***picatus*** *Marsh.* 6127.

atomus Gyll. — atomos Steph. — nigrescens Steph. — truncatus Steph. — München; Frankfurt einmal bei Formica rufa gefunden, von *Heyden*; Giessen unter alten Brettern gefunden.

4) ***punctum*** *Marsh.* 6128.

atomarius Heer. — Seligenstadt häufig an alten Fässern in Kellern gesammelt, Decan *Scriba*.

In Baiern finden sich 7 Arten, 58 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Litteratur.

Von **Caflisch, Excursions-Flora für das Südöstliche Deutschland,** hat die Verlagshandlung von Lampart und Comp. in Augsburg soeben eine billige Schul-Ausgabe veranstaltet, welche völlig identisch ist mit der bisherigen. Der Preis ist nun aussergewöhnlich billig: Broschirt 3 Mark, cartonnirt mit Leinwand-Rücken M. 3. 50, so dass auch jeder Schüler das anerkannt vortreffliche Handbuch für botanische Excursionen anschaffen kann. Ein besonderer Vorzug des Werkes ist, dass darin u. A. die Flora der nördlichen Kalkalpen in grösster und genauester Vollständigkeit enthalten ist, wodurch es bei Gebirgsausflügen ein verlässiger botanischer Begleiter wird.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: 38

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung

vorkommen. (Schluss.) 97-103