C. lippincottianus, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, Rep. foss. Vertebr. Colorado. — Annual Report by Hayden. Washington. 1874.
C. osorum, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
C. hartshornianus, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
C. gregarius, Cope. Miocän von Colorado.
Cope, l. c. 1874.
C. saevus, Leidy. Pliocän von Niobrara und New-Mexico.
Leidy, Ext. mamm. f. Dak. Nebr. 1869. Pl. I. fig 9.
Cope, Säugeth. im Pliocän von New-Mexico. — Wheeler's Report. 1875.

(Fortsetzung folgt.)

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

711. *Rhytidosomus* Stephens.

rhytis Runzel, soma Leib, Körper.

1) ***globulus*** *Herbst.* 3394.
notatus Meg. — Augsburg s.; München; Passau; Aschaffenburg s. s.

712. *Poophagus* Schönherr.

poë Gras, phago ich esse.

1) ***Sisymbrii*** *Fabr.* 3395.

Allgäu, *Stark*; München; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Hanau, Notar *v. Sonn.*; Giessen, *Laubenheimer.*

713. *Tapinotus* Schönherr.

tapeinos niedrig, notos Rücken.

1) ***sellatus*** *Fabr.* 3396.
ephippiger Schönh. — Lysimachiae Oliv. — Augsburg ein Stück, Prof. *Kuhn*; Freising ein Stück, Attachinger Au am 21.

Mai; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; in den Blüten von Lysimachia vulgaris, Fasanerie-See; Giesen einzeln, *Laubenheimer.*

714. *Eubrychius* Thomson.

eubrychios untergetaucht.

Litodactylus *Redtenbacher.*

1) ***velutus*** *Beck.* 3397.

aquaticus Thomson. — Myriophylli Steph. — natator Kirby in litt. — Zusmarshausen; Nürnberg, am Weiher bei Unter-Burg ein Stück im Grase gekötschert, August; Frankfurt ein Stück, Dr. *M. Schmidt.*

715. *Litodactylus* *Redtenbacher.*

litos dünn, dactylos Finger.

1) ***leucogaster*** *Marsh.* 3398.

Myriophylli Gylh. — gonymelas Kirby in litt. — München; Regensburg n. s.; Marburg, Decan *Scr.*

716. *Phytobius* *Schönherr.*

phyton Pflanze, bioo ich lebe.

1) ***granatus*** *Gylh.* 3399.

Augsburg.

2) ***notula*** *Germ.* 3400.

canaliculatus Fährs. — Larve Perris. Mem. Ac. Lyon. 1851. p. 102. — Augsburg ein Stück, Schwimmschule, Juli; München; Freising; Regensburg n. s.

3) ***quadrinodosus*** *Gylh.* 3401

mucronulatus Germ. — Augsburg; München.

4) ***Comari*** *Herbst.* 3402.

sulcatus Sturm. — Nürnberg, Dutzendteich, August; Aschaffenburg s.

5) ***quadrituberculatus*** *Fabr.* 3403.

quadricornis Payk. — quadridentatus Steph. — Ribis Stroem. — Zusmarshausen; Augsburg h., Rosenauberg in Weidenmoder, Oktober; Leitershofen in Moos, November; München; Freising h. s., in Isargenist, März, April; Plantagenwald, April; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg, Herrenhütte, August; Aschaffenburg s.

6) ***quadricornis*** *Gylh.* 3404.

quadrituberculatus var. Herbst. — Augsburg ein Stück; München; Nürnberg, Dutzendteich, August. — Phytobius denticolis Schh. von *v. Heiden* bei Frankfurt zwei Stück gefunden.

717. *Rhinoncus* Schönherr.

rhin Nase, onkos Anschwellung.

1) ***topiarius*** *Germ.* 3405.

coarctatus Jacq. Duv. — tessellatus Sturm. — Um Heidelberg von Senator *v. Heyden* einmal gefunden.

2) ***Castor*** *Fabr.* 3406.

fructiculosus Herbst. — seniculus Grav. — pericarpius var. Linn. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Frankfurt n. s., Decan *Scr.*

3) ***bruchoides*** *Herbst.* 3407.

carinatus Sturm. — Augsburg ein Stück; Freising ein Stück auf den Wiesen bei Vötting gestreift am 20. August; in Isargenist, März; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiet, im Süden desselben häufiger.

4) ***inconspectus*** *Herbst.* 3408.

accipitrinus Reich. — canaliculatus Steph. — crassus Marsh. — suturalis Oliv. — Augsburg s., bei Leitershofen Juli; München; Freising n. s.; in Isargenist, November; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Salzhausen, Senator *v. Heyden.*

5) ***pericarpius*** *Linn.* 3409.

gramineus Fabr. — Persicariae Meg. — Spartii Steph. — Rumicium Kirby in litt. — Ueberall häufig, das ganze Jahr hindurch, überwintert in Moos.

6) ***perpendicularis*** *Reich.* 3410.

subfasciatus Gylh. — guttalis Grav. — erythrocneme Beck. — tibialis Steph. — Augsburg h., bei Lechhausen, Mai, Deuringen in Moos, April; München; Freising h., Weihenstephan, Wiesenwald, Wald bei Wippenhausen, Mai bis August, in Isargenist, November; Passau; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg, Dutzendteich, August; Erlangen; Aschaffenburg n. h.; Hessen, durch das ganze Gebiet verbreitet, aber nicht häufig.

7) ***albicinctus*** *Gyll.* 3411.

canescens Sturm. — tibialis Dej. — München; Nürnberg, ein Stück; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg, Professor *Oechsner.*

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: 36

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 94-96