von beigelegenen Steingeräthen, schliessen lasse. — Der in der unteren Schicht aufgefundene Schädel eines Ebers nähert sich dem des Pliocens, kann also mit dem jetzt lebenden nicht identisch sein; — vom Elephanten haben sich nur Fragmente von Milchzähnen vorgefunden; — die Hirsche sollen, wahrscheinlich aber nur der Edelhirsch, am Monte Argentario noch im Jahre 1544 gelebt, sowie auch sollen Fasanen zu dieser Zeit da gehaust haben; — von den hier aufgehäuften Knochenresten sollen wenigstens 90% dem *C. dama* angehören; — der Dammhirsch lebt noch in Sardinien; — der Rehbock lebte am Monte Argentario bis zum Jahre 1840; — heute findet er sich noch auf dem nächstliegenden Continent; — in Bezug auf die Meinung, der Monte Argentario wäre eine Insel im Postpliocän, bemerkt Forsith, dass an mehreren Orten dieses Vorgebirges er den *Phyllodactilus europaeus* gefunden habe, der nirgends am italienischen Continente sonst zu finden sei, aber in Sardinien noch lebt etc. etc.

Hr. Sordelli gibt (Soc. entomol. Firenze) Bemerkungen über einige fossile Insectenreste aus der Lombardie, so über *Libellula Eurymone* und *Lib. Doris* aus den Gypsbrüchen von Stradella; *Donacia discolor*, *Donacia lignita* aus den Kohlenwerken von Leffe, *Dytiscus Zerzii* aus den Umgebungen von Bergamo.

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

X. Cossonini.

723. *Dryophthorus Schönherr.*

drys Eiche, phtheiro ich zerstöre.

1) ***lymexylon*** *Fabr.* 3437.

corticalis Payk. — Larve Perris. Ann. Fr. 1856. p. 245. t. 5. f. 324—325. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München, bei Grünwald, Mai. Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan in Weidenmoder, Juli, Wald bei Wippenhausen, Juli; Passau; Nürnberg; Erlangen; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Aschaffenburg s. s.; Frankfurt, v. *Heyden*; Ober-Lais, Dec. *Scr.*

Der Käfer lebt in faulem Holze und findet sich zuweilen in grosser Menge beisammen; so fand ich ihn einmal in einem faulen Eichenstumpf zu Tausenden, Decan *Scr.*

724. *Cossonus* Clairville.

1) ***linearis*** *Fabr.* 3438.

punctellus Schönherr. — Augsburg, Schwimmschule, August; München, im englischen Garten, bei Nymphenburg, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg s.; Erlangen; Aschbach s. unter der Rinde von Buchenstöcken; Aschaffenburg h., Weidenanlage unter Pappelrinde; Hessen, durch das ganze Gebiet nicht selten.

2) ***ferrugineus*** *Clairville.* 3439.

parallelepipedus Herbst. — Larve Kirsch. Berl. Zeit. 1866. p. 283. — München; Passau; Aschaffenburg einzeln, Professor Dr. *Doebner*; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden.*

3) ***cylindricus*** *Sahlb.* 3440.

linearis Payk. — Mölleri Waltl in litt. — parallelepipedus var. Herbst. — München; Freising, Weihenstephan in Menge im Moder einer alten Weide, Juni, Juli; Achaffenburg s. s.; Seligenstadt einzeln; bei Ober-Lais in Mehrzahl in einem faulen Nussbaume aufgefunden, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden.*

725. *Phloeophagus* Schönherr.

phloios Rinde, phago verzehren.

1) ***spadix*** *Herbst.* 3441.

globulipennis Chevrolat. in litt. — velutinus Dej. — ventricosus Christofori in litt. — Erlangen, *Schlemmer.*

726. *Rhyncolus* Germar.

rhynchos Rüssel, kolos verstümmelt.

1) ***cylindricus*** *Bohem.* 3442.

Freising an den Planken des Sporrer Kellers 1 Stück, wahrscheinlich von Rosskastanien angeflogen, am 1. Juni 1871; Moosburg, Notar v. *Sonn.*

2) ***ater*** *Linn.* 3443.

chloropus Fabr. — exaratus Gmel. — incisus Fourer. — inusus Villers. — linearis Schrank. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, *Stark*; München, unterhalb der Georgenschweige durch Schütteln, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, in grosser Anzahl an Planken des Sporrerkellers, Juni; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg; Prof. Dr. *Doebner*; Heidelberg, *Jenison.*

3) ***porcatus*** *Germ.* 3444.

crassirostris Dufour. — puncticollis Ziegl. — Augsburg; München; Freising 1 Stück; Regensburg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt v. *Heyden.*

4) ***elongatus*** *Gyll.* 3445.

crassicornis Perris. — planirostris Panz. — Augsburg; München, bei Nymphenburg, Juni, Dr. *Kr.*

5) ***exiguus*** *Bohem.* 3446.

Allgäu, Obergeometer *Stark*; Regensburg s.; Soden, im Taunus, v. *Heyden.*

6) ***truncorum*** *Germ.* 3447.

culinaris Sturm. — sulcirostris Meg. — tenuirostris Creutz in litt. — Larve Heeger Sitzgsb. Wien. Ac. 34. p. 212. t. 4. — Augsburg; München; Freising ein Stück im Hause, Juli; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschbach s.; Aschaffenburg n. h.; Hessen im ganzen Gebiete nicht selten; Frankfurt, v. *Heyden.*

7) ***ligniarius*** *Marsh.* 3448.

cylindrirostris Oliv. — stlembus Schönh. in litt. — Augsburg; Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Nürnberg, bei Kibitzenhof unter Pappelrinde; Hessen im ganzen Gebiete ziemlich häufig; Frankfurt, v. *Heyden.*

8) ***reflexus*** *Bohem.* 3449.

Aschaffenburg ein Stück, Prof. Dr. *Doebner*; Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden.*

9) ***punctatulus*** *Bohem.* 3450.

Passau, an einer Rosskastanie, bei Eggendobel, ein Stück, *Kittel*; Nürnberg ein Stück; Hessen im ganzen Gebiete vorkommend, aber nicht häufig, Decan *Scr.*; Frankfurt v. *Heyden.*

10) ***ferrugineus*** *Waltl.* 3451.

Passau, Professor Dr. *Waltl.*

11) ***strangulatus*** *Perris.* 3452.

Heidelberg, *Jenison.*

V. Magdalinini.

727. ***Magdalis*** *Germar.*

Magdalinus Schönherr.

Thamnophilus *Schönherr.*

1) ***violacea*** *Linn.* 3453.

affinis Gmel. — assimilis Herbst. — Larve Ratzeb. Forstins. 1837. I. p. 102. t. 4. f. 3. B. G. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Maria Einsiedl, Juni, am Ammersee, Juli, Dr. *Kr.*;

Allgäu, *Stark*; Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor, *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; einige Stücke bei Seligenstadt, Decan *Scr.*

An Kiefern, Fichten, Weinstöcken (?), Birken, Weissdorn, und besonders an jungen Fichtentrieben schädlich, deren Mark (?) die Larve ausfressen soll.

var. ♀ frontalis Gylh. — München; Regensburg s.; Erlangen *Schlemmer*; Steigerwald s. s.

2) ***Heydeni*** *Desbr.* 3454.

Frankfurt, den jungen Fichtenpflanzen schädlich, bisher mit frontalis Gylh. vermengt, v. *Heyden.*

3) ***duplicata*** *Germ.* 3455.

punctipennis Küst. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Freising, Wiesenwald auf Rubus, Juni bis August; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s.; Hessen, im ganzen Gebiete n. s.

4) ***phlegmatica*** *Herbst.* 3456.

pinastri Dahl. — Augsburg; München; Passau; Regensburg s.; Steigerwald s.; Frankfurt einzeln auf Kiefern gesammelt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

5) ***nitida*** *Gylh.* 3457.

biseriata Germ. in litt. — Augsburg; Freising, am 22. Mai ein Stück im Wohnzimmer gefangen; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg s. s.; Nürnberg s.; Aschaffenburg s., bei Seligenstadt, Frankfurt, Ober-Lais, überall einzeln, Decan *Scr.*

6) ***linearis*** *Gylh.* 3458.

virescens Germ. — Augsburg: München; Nürnberg n. h.; Frankfurt ein Stück, Senator v. *Heyden*; Darmstadt Dr. *Nebel.*

7) ***Cerasi*** *Linn.* 3459.

Armeniacae Fabr. — nassata Germ. — nigrita Meg. — ♂ rhina Gylh. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, Weihenstephan, Juni; Moosburg; Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n s.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Hessen, im ganzen Gebiete n. s.

Der Käfer ist häufig im Mai auf Kirschen-, Aprikosen-, Zwetschgen- und Apfelbäumen, er schabt die Blätter ab und zerfrisst sie, wobei auffallende Flecke entstehen. Er soll sich 1750 in Schweden durch Zerstörung der Blätter ausgezeichnet haben. Die Larve lebt unter der Rinde der obenerwähnten Bäume.

8) ***memnonia*** *Gylh.* 3460.

carbonaria Fabr. — heros Küst. — Augsburg s.; München, Erlangen; Odenwald, *Wider*; Aschaffenburg s.; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

9) ***aterrima*** *Linné.* 3461.

♂ asphaltina Steph. — carbonaria Steph. — atramentaria Marsh. — Cerasi Herbst. — stygia Gylh. — Zusmarshausen;

Augsburg; München, oberhalb Maria Einsiedl auf Ulmus campestris, Juni, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Mai, Juni; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; in Rheinhessen (Mombach, Harxheim) sehr häufig an Rüstern (Ulmus).

var. asphaltina Bohem. — Cerasi Panz. — Augsburg, *Gscheidlen*; München; Erlangen; Odenwald, *Wider*.

10) ***carbonaria*** *Linn.* 3462.

atramentaria Germ. — ♂ aterrima Herbst. — ♂ atrata Gylh. — ♀ Cerasi Payk. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Schäftlarn, Juni, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Doebner*; Frankfurt ein Stück, Senator v. *Heyden*. — An Birken, Haselnuss und Maulbeerbaum.

11) ***rufa*** *Germ.* 3463.

Bei Eberstadt und Mombach auf Kiefern sehr einzeln, Senator v. *Heyden*.

12 ***barbicornis*** *Latr.* 3464.

bipunctata Meg. in litt. — erythrocera Ziegl. — rhina var. b. Gylh. — ♂ clavigera Küst. — ♀ trifoveolata Gylh. — München; Freising, Dr. *Kr.*; Passau; Erlangen; Hessen, im ganzen Gebiete einzeln.

Auf Weissdorn, selbst auf americanischen Arten, wie Crataegus crus Galli, auf Quitten und Mispeln (Mespilus germanica). Er schabt auf den Blättern oben und unten Blattgrünstreifen ab. Die Larven leben unter der Rinde der Mispel und Quitte. Daumendicke Zweige sind von ihnen am meisten besetzt. Die Larvengänge verlaufen sich gewöhnlich unter der Rinde und greifen wenig in den Splint. Der junge Käfer frisst sich im Juni durch ein wie von Buprestis gefertigtes Loch heraus.

13) ***Prunі*** *Linné.* 3465.

ruficornis Linn. — erythroceros Herbst. — incognita Herbst. — Ueberall häufig, Mai, Juni.

Dieser Käfer ist im Mai und Juni häufig auf Quitten-, Apfel-, Zwetschgen- und Aprikosenbäumen, selten auf Kirschen. Er schabt die Blätter ab und zerfrisst sie. Die Larve lebt in den holzigen Theilen dicht unter der Rinde. Ihre Gänge sind geschlängelt, mit dunkelbraunem Mehl erfüllt.

14) ***flavicornis*** *Gylh.* 3466.

Aschaffenburg; bei Seligenstadt, Frankfurt, Soden, Ober-Lais einzeln gefunden, Decan *Scr.*

15) ***nitidipennis*** *Bohem.* 3467.

♂ brevirostris Chevrolat in litt. — Aschaffenburg, Prof. Dr. *Doebner*; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden* und Dr. *M. Schmidt*, sehr einzeln vorkommend.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: 36

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 155-159