Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

616. *Hapalus Fabricius.*

hapalos weichhaarig, weich.

1) ***bimaculatus*** *Linné.* 2901.

Larve Géné. Ann. Sc. nat. XXIII. p. 138. — Moosburg h., Notar von *Sonn.*, im ersten Frühjahr auf *Allyssum calycinum.*

617. *Sitaris Latreille.*

Sitaris Name eines Vogels.

1) ***muralis*** *Forst.* 2902.

humeralis Fabr. — attenuata Fourcr. — Larve Muls. Vesic. p. 193. f. 27—28. — Mannheim in einem Bienenneste in Mehrzahl, 1829, *Vogt*; Speier in Hummelnestern *Linz*; Frankfurt ein Stück auf dem Götheplatz, Dr. *Moritz Schmidt*, Strasse nach Wiesbaden, Prof. Dr. *Kirschbaum.* Im Herbst 1874 wurden auf der Altgasse zu Frankfurt beim Abreissen eines alten Hauses 75 Männchen von Schuljungen gefangen, von denen 32 in meine Hände gelangten, von *Heyden. Vogt* fand in einem Bienennest hinter dem Fensterladen nur Weibchen, wenigstens gehören alle Exemplare, die mein Vater erhielt zu diesem Geschlecht, von *Heyden.*

Die Larven von *Sitaris* entwickeln sich gerade so wie die Larven von *Meloë.*

In Baiern finden sich 16 Arten. 3 Varietäten, 812 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLIX. OEDEMERIDAE.

618. *Calopus Fabricius.*

Kalos schön, puss. Fuss.

1) ***serraticornis*** *Linné.* 2903.

Larve Gyllh. Ins. Suec. II. p. 513. — Kawall. Stett. Zeitg. 1855 p. 228. — Zusmarshausen; Augsburg s., an den Mauern an der Bahnhofstrasse, *Schweiger*; München, Schleissheim, Notar von *Sonn.*; Dinkelsbühl n. s., Mai, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Wunsiedel, Rector *Buchner.*

Sparedrus testaceus Andersch kommt nicht bei Passau vor.

619. *Ditylus Fischer.*

ditylos zweihöckerig.

1) ***laevis** Fabr.* 2904.

helpodioides Fisch. — unicolor Eschsch. — Larve Kolenati. Bull. Mosc. 1847. I. p. 137. t. 4. f. 1—20. — Wunsiedel in grösserer Anzahl, *Lang*, Forstbediensteter. Kronach in Oberfranken, Oberförster *Lang*; Passau und München, Prof. Dr. *Rosenhauer*.

620. *Nacerdes Schmidt.*

1) ***melanura** Linné.* 2905.

♂ analis Oliv. — notata Fabr. — nigripes Fabr. — rufa Brulli. — praeusta Melsh. — testacea Fourcr. — acuta Marsh. — lepturoides Thunbg. — erminea Germ. — apicalis Say. — Zusmarshausen; München; Regensburg n. g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg g.

621. *Asclera Schmidt.*

a nicht skleros hart.

Ischnomera *Stephens.*

ischnos schlank, meros Schienbein.

1) ***sanguinicollis** Fabr.* 2906.

flavicolis Panz. — Augsburg n. s., Göggingen, Mai; München Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Wald bei Thalhausen, Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Aschbach und Ebrach s. auf Blüthen von Salix aurita und Spiraea Aruncus; Unken s. h., *Kösch*; Aschaffenburg s.; Frankfurter Wald von *Heyden*.

2) ***coerulea** Linné.* 2907.

coerulescens Fabr. — cyanea Fabr. — seladonia Fabr. — nigripes Oliv. — unicolor Melsh. — Larve Heeger. Stzgb. Wien Ac. XI. 1853. p. 932. t. 3. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München zwischen Harlaching und Grünwald durch Abklopfen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Passau; Regensburg n. s.; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; in Menge im ersten Frühjahr aus Frankfurter Waldholz gezogen, von *Heyden*.

622. *Dryops Fabricius.*

Oncomera *Stephens.*

onkos Geschwulst, meros Schiene.

1) ***femorata** Fabr.* 2908.

♀ calopoides Germ. — femoralis Oliv. — simplex Donov.

podagrariae Stev. — Streitberg, Ein ♀ am ersten Juli 1851 von Dr. *Weber* Nachts ein Uhr an der Wand im Hausplatze kriechend gefunden; Alsbacher Schloss in der Bergstrasse ein Stück, auf Epheu. (Decan *Scr.*)

623. *Oedemera Olivier.*

oideo anschwellen, meros Schiene.

1) ***Podagrariae*** *Linné.* **2909.**

flavescens Rossi. — fulva Fourcr. — ♀ melanocephala Panz, — simplex Donov. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München; zwischen Maisach und dem Ammersee durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan auf Galium verum, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald h. auf Blüthen: Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; Soden h., Decan *Scr.*

2) ***flavescens*** *Linné.* 2910.

femorata Scop. — ♀ simplex Fabr. — pratterana Schrank. — Augsburg g.; München, Pullach, Juni, zwischen Tölz, Wolfrathshausen und Schäftlarn, Juni Dr. *Kr.*; Freising g., Weihenstephan, Wald bei Wippenhausen Mai bis Juli; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

3) ***subulata*** *Oliv.* 2911.

♂ femorata Panz. — ♀ phthisica Scop. — marginata Fabr. — discoidalis Latr. — stenoptera Falderm. — Augsburg; München, Pullach, Juni, bei Harlaching auf Blüten, Juli, Geiselgasteig, Juni, Thalkirchen, Juni, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Frankfurt und Falkenstein im Taunus n. s., von *Heyden.*

4) ***coerulea*** *Linné.* 2912.

nobilis Scop. — ceramboides Forst. — Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Aschaffenburg s.

5) ***tristis*** *Schmidt.* 2913.

montana Heyden in litt. — Allgäu Obergeometer *Stark.* Im hohen Vogelsberg einige Stücke, Decan *Scr.*

6) ***flavipes*** *Fabr.* 2914.

♂ clavipes Panz. — nasuta Steph. — Augsburg; München; Passau, Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g.; Bamberg Professor *Hoffmann*; Frankfurt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; in der Bergstrasse Decan *Scr.*

7 ***virescens*** *Linné.* 2915.

concolor Sturm. — grisescens Meg. — lurida Mannerh. — striata Herbst. — Augsburg: München, Pullach, Juni, Hessellohe

auf *Caltha palustris*, Mai, Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juni, bei Bogenhausen durch Streifen, Juli, Thalkirchen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald, Aschaffenburg h.

8) ***turida*** *Marsh.* 2916.

splendens Ziegl. — Augsburg h; München, Bogenhausen durch Streifen, Juni, Nymphenburg durch Streifen, Juli, zwischen Ebenhausen und Wolfrathshausen durch Streifen, August, Dr. *Kr.*; Freising h., Wiesenwald, September; Landshut Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg g., auf niederen Pflanzen gekötschert; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

624. ***Anoncodes*** *Schmidt.*

1) ***adusta*** *Panz.* 2917.

♀ collaris Panz. — ♀ dorsalis Villa. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Teichenbeize durch Abklopfen, Juli, zwischen Nymphenburg und Hartmannshofen auf einer Dolde, Juli, Bogenhausen durch Streifen, Juni, an einer Bretterwand, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Mai bis Juli, Pförer Au, auf niederen Pflanzen gekötschert; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg n. s., an morschen Eichenpfählen.

2) ***rufiventris*** *Scop.* 2918.

melanocephala Fabr. — affinis Dej. — bipartita Schrank. — dorsalis Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg s.; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, Geiselgasteig durch Abstreifen, Juli, Pullach auf Blüthen, Juni, Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juni, Sendling, Juni, Nymphenburg Juli, zwischen Ebenhausen und Wohlfrathshausen geschöpft, August, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Erlangen; Frankfurt, zwei Männchen, Senator von *Heyden.*

3) ***ustulata*** *Fabr.* 2919.

♀ melanura Fabr. — ♀ rufa Fisch. — ♀ scutellaris Waltl. — Zusmarshausen; Augsburg h., Spickel; München, bei den Ueberfällen, Juni, zwischen Maisach und dem Ammersee durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Ammerland, Juni; Freising h., Wiesen an der münchner Strasse, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg h. auf Wiesen, am Weiher bei Unter-Bürg; Erlangen; Steigerwald n. s. auf Blüthen; Aschaffenburg s. s., bei der Bergmühle; Frankfurt, Senator v. *Heyden.* — var. opaca Gemminger. München.

4) ***fulvicollis*** *Scop.* 2920.

Augsburg ein Stück; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München;

Tegernsee, August, September, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Unken, *Gscheidlen.*

5) ***ruficollis*** *Fabr.* 2921.

♂ coerulescens Rossi. — München.

6) ***viridipes*** *Schmidt.* 2922.

dispar Sturm. — thoracica Dalm. — ruficollis Villa. — nigripes Ulrich. — sericea Falderm. — München.

625. ***Chrysanthia*** *Schmidt.*

chrysos Gold, anthos. Blüte.

1) ***viridissima*** *Linné.* 2923.

thalassina Fabr. — Larve Westw. Introd. I. 1839. p. 305. f. 35. nr. 8—11. — Augsburg n. h., Spickel, Juli; München, zwischen Hesselohe und Pullach, geschöpft, Juli, Dr. *Kr.*; Schleissheim, Notar von *Sonn.*; Freising; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s.

2) ***viridis*** *Schmidt.* 2924.

viridissima Fabr. — Zusmarshausen; Augsburg n. s, Spickel, Leitershofen, Juli; München; Grünwald, August, beim Lettinger auf Heracleum Sphondylium, Juli, Fürstenwald, Juli, Weg zur Königsalpe auf einer Dolde, September Dr. *Kr.*; Schleissheim, Notar von *Sonn.*; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, Wiesenwald auf Galium verum, Juli; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen, Steigerwald; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, Senator von *Heyden.*

3) ***varipes*** *Kiesw.* 2925.

Kissingen s. h., *Rösch.*

626. ***Mycterus*** *Clairville.*

mycter Nase.

1) ***curculionoides*** *Fabr.* 2926.

griseus Clairv. — rhinomacer Payk. — ♀ pulverulentus Chevrolat. — München; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald n. s., auf Blüthen; Aschaffenburg n. s., auf Spiraea, Decan *Scr.*

2) ***umbellatarum*** *Fabr.* 2927.

flavicornis Illig. — ruficornis Muls et God. — München.

In Baiern finden sich 25 Arten und eine Varietät, 203 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie L. CURCULIONIDAE.

A. Otiorhynchini.

627. *Mylacus* Schönherr.

mylax Mühlstein.

1) ***rotundatus*** *Fabr.* 2928.

ovatus Oliv. (Omius) — puberulus Steph. — München; Hessen im ganzen Gebiete an manchen Orten z. B. bei Harzheim in Rheinhessen n. s. Decan *Scr.*

628. *Otiorhynchus* Germar.

otion Oehrchen, rhinchos Rüssel, (wegen des an der Fühlerwurzel lappig erweiterten Rüssels).

Otiorhynchus *Germar.*

A. Dodecastichus *Stl.*

1) ***geniculatus*** *Germ.* 2929.

egenus Sturm. — irroratus Ziegl. — pustulosus Ulrich in litt. — Augsburg h., Spickel, Mai und Juni geköschtert, Februar daselbst in Moos gefunden; München, bei Pullach und Harlaching, Juni, zwischen Grünwald und der Menterschwaige durch Abklopfen von Föhren, August, Dr. *Kr.*; Freising n. s. Attachinger Au, Mai und Juni von Gesträuch geklopft; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg (?).

B. Otiorhynchus. *Germ.*

2) ***sensitivus*** *Scopoli.* 2930.

planatus Herbst. — Tegernsee, Juni bis Oktober, im schwarzen Tänner auf Fichten, August Dr. *Kr.*

3) ***fuscipes*** *Oliv.* 2931.

pedemontanus Dej. — tenebricosus Sturm. — haematopus Meg. in litt. — Augsburg s.; München; Allgäu h., Obergeometer *Stark.*

4) ***tenebricosus*** *Herbst.* 2932.

♂ ater Gylh. — ♂ niger Marsh — ♀ morio Payk. — clavipes Oliv. — maritimus var. Donov. — Augsburg s.; München, bei Harlaching, Mai, Tegernsee h., Juni bis August, Königsalpe, Juni, Gündelalpe August, Dr. *Kr.*; Allgäu h., Obergeometer *Stark;* Passau; Steingaden, *Schrank*; Fränkische Schweiz; Wimpfen einmal, Decan *Scr.*

5) ***armadillu*** *Rossi.* 2933.

nigrita Rossi. — orbicularis Oliv. — sulphurifer Herbst. — Augsburg s.; München, Passau.

6) ***scabripennis*** *Gylh.* 2934.

Augsburg ein Stück; Allgäu, Obergeometer *Stark*; auf dem Rochusberge bei Bingen vom Herrn Senator von *Heyden* ein Stück aufgefunden, Stein.

7) ***multipunctatus*** *Fabr.* 2935.

depressus Sturm. — ♀ silesiacus Meg. in litt. — Augsburg s.; München; bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, Juni, bei Maria Einsiedl durch Abklopfen, Juli, zwischen Grünwald und der Menterschwaige, August, im schwarzen Tänner auf Nadelholz, August, auf dem Pfliegeleck, Mai, Dr. *Kr.*; Passau; Erlangen. — var. irritans Herbst. — adspersus Dahl. — maculatus Dahl. — Augsburg s.; München bei Thalkirchen, Mai, durch Abklopfen der Föhren zwischen Grünwald und der Menterschwaige, August, Dr. *Kr.*

8) ***niger*** *Fabr.* 2936.

ater Herbst. — multipunctatus Oliv. — scrobiculatus Gyllh. Larve Ratzeburg Forstins. 1837. s. p. 116. t. 4. f. 8. — Augsburg n. s.; München; Allgäu; Passau; Regensburg n. s.; Burghausen und Gern *Schrank*; Nürnberg n. s.; Erlangen; Weiden h. an Fichtentrieben, *Schmidt*; von Herrn Professor *Döbner* auf der Rhön gefunden, auch wohl auf dem Vogelsberge vorkommend (Sc.). var. coecus Germ. — Allgäu, Obergeometer *Stark.* var. villosopunctatus Gyllh. — Argus Duft. — München; auf dem Gipfel des Schildsteines bei Kreuth, Juni; Tegernsee im schwarzen Tänner auf Fichten h. August auf der Neureuth und Gündelalpe h. August, Dr. *Kr.*

Die Larven leben in der Erde von Fichtenwurzeln, und verpuppen sich daneben in kleinen Erdhöhlen. Die Käfer fressen dicht über den Wurzelknoten und später überall an der Rinde der jungen Pflanzen. Man sammle die Käfer im Herbste und Frühjahre von den jungen Pflanzen.

9) ***morio*** *Fabr.* 2937.

unicolor Herbst. — tenebricosus Oliv. — pimelioides Ziegl. — Augsburg s.; München, Juli, Tegernsee im Lerchenwald, April

bis August, Dietramszell, August. Dr. *Kr*; Passau; Erlangen. var. ebeninus Gylh. — Augsburg s.; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Erlangen. — var. memnonius Gylh. — Erlangen.

10) ***orbicularis*** *Herbst.* 2938.

catenulatus Panz. — maurus Schrank. — tenebricosus Oliv. — Tegernsee, *Schranh*; Aschaffenburg s.

11) ***raucus*** *Fabr.* 2939.

arenarius Herbst. — luctuosus Latr. — tristis Bonsd. — Augsburg s.; München, Geiselgasteig, Juli, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Marzlinger Wiesen auf Gesträuch, April, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Hessen h. (Decan *Scr.*)

Der Käfer ist zuweilen verderblich für die Knospen der Obstbäume und des Weinstockes.

12) ***porcatus*** *Herbst.* 2940.

costatus Fabr. — sexcostatus Latr. — senex Oliv. — Augsburg h., Schwimmschule, Mai, Juni; München, Pullach, Juni, Ertlsgarten unter Steinen, Juni, Tegernsee, an der Weissach unter einem Brett, August Dr. *Kr.*; Freising h. Wald bei Thalhausen von Bäumen geklopft, Lohmühle, Mai, Juni, in Isargenist, April und November; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall h.; Allgäu *Stark.*

13) ***septentrionis*** *Herbst.* 2941.

raucus Herbst. — echinatus Herbst. — setosus Fabr. — gemellatus Beck. — griseopunctatus Degeer. — multicolor Gmel. — scaber Bonsd. — Zusmarshausen; Augsburg h., Deuringen, Mai; München, Geiselgasteig, Juli, Tegernsee im Lerchenwald, September, Dr. *Kr.*; Freising h. Wald bei Thalhausen in Moder, April, Wiesenwald, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s., Nürnberg n. s., Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald s. s., Aschaffenburg s. s. Allgäu, *Stark.*

14) ***uncinatus*** *Herm.* 2942.

Augsburg s., Wald bei Leitershofen in Moos ein Stück, November; Spickelwald in Moos 5 Stück Februar, zwei Stück Juni, an den Wänden des Wirthschaftsgebäudes; Allgäu, Obergeometer *Stark;* Fränkische Schweiz n. s. hinter Felsen in Moos; bei Ortenberg von Dr. *Bose* einige Stücke aufgefunden.

15) ***singularis*** *Linné.* 2943.

picipes Fabr. — granulatus Herbst. — squamiger Marsh — asper Marsh. — notatus Bonsd. — Zusmarshausen; Augsburg h.; Lechfeld bei Mering, Juni; München bei Maria Einsiedl, Juni, Tegernsee, Juni, im Lerchenwald, Juli, Dr. *Kr.*; Freising, Weihenstephan, Wiesenwald, Plantagenwald April bis August, im Früh-

jahr unter Moos im Sommer auf Bäumen; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Gern und Steingaden, *Schrank*; Eichstädt; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald ziemlich h.,; Würzburg: Aschaffenburg h.; Hessen allenthalben g.; var. Chevrolati Gylh. Einigemal bei Lorsch gefunden, Senator von *Heyden*.

Der Käfer frisst die Weinstockknospen aus, ist in Baumschulen den Pfropfreisern sehr schädlich.

16) ***pupillatus*** *Gylh.* 2944.

Allgäu, Obergeometer *Stark*. — var. centropunctatus Ziegl. — Passau.

17) ***gemmatus*** *Fabr.* 2945.

religiosus *Schrank*. — Zusmarshausen; Augsburg; Unken; *Gscheidlen*; München, bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, bei Grünwald und Pullach, Mai, Juni, bei Miesbach, August, Tegernsee, August, Neureuth und Gründelalpe, August, Dr. *Kr.* Beuerberg am Starnberger See; Passau; Regensburg (kaum hier II. Sch.).

Der Käfer kommt vielfältig auf der grossen Brennessel vor, *Schrank*.

var. chlorophanus Bohem. — München.

18) ***lepidopterus*** *Fabr.* 2946.

squamiger Fabr. — Augsburg am Lechablass ein Stück, Mai Allgäu h., Obergeometer *Stark*; München; auf der Neureut und Gründelalpe auf Nadelholz und Rubus-Blüthen, August, Dr. *Kr.*; Passau, Erlangen.

19) ***funicularis*** *Gylh.* 2947.

infaustus Gyllh. — asperatus Dej. — fagi Meg. — Fraxini Germ. — Augsburg s.

20) ***sulcatus*** *Fabr.* 2948.

strictus Gmel. — griseopunctatus Degeer. — apiculatus Say. — Larve Westwood. Introd. 1839. I. p. 334. f. 41. (9–11). — Lucas Ann. Fr. 1869. p. 50. — Augsburg s.; München, Regensburg s.; Erlangen; Frankfurt einzeln gesammelt, *Stern* und Senator von *Heyden*.

Seine Larve soll an den Wurzeln von Saxifragen und Primeln leben, welche sie bis auf den Stamm abfrisst und tödtet, nach Westwood soll sie dem Weinstocke schaden. Sie ist 9 Millim. lang, fusslos, fast elliptisch, hinten etwas verschmälert, gekrümmt, gelblichweiss und rot behaart, mit fast halbkugeligem gelbem zurückziehbarem Kopfe.

21) ***Ligustici*** *Linn.* 2949.

Levistici Müll. — Mülleri Gmel. — monopterus Fourer. —

Brucki Bach. — Zusmarshausen; Augsburg h., Lechfeld bei Mering, Juni; München; bei Nymphenburg, Mai, Tegernsee, Juni, Dr. *Kr.*; Ammerland am Starnberger See, Juni; Freising h., Weihenstephan, Wiesenwald, Wald bei Thalhausen, April bis Juni, meistens auf der Erde und und unter Steinen, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg h.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaffenburg s. h.; Hessen überall s. h.

Käfer und Larven sollen in Doldengewächsen leben und in deren Wurzeln so wie im Rosenmarke sehr schaden.

22) ***rugifrons*** *Gyll.* 2950.

Dillwyni Steph. — rugicollis Steph. — Augsburg s.; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Erlangen, *Schlemmer*; Fränkische Schweiz n. s. hinter Felsen in Moos.

23) ***pinastri*** *Herbst.* 2951.

pertusus Ziegl. — Augsburg s.; München, Geiselgasteig, Mai, bei den Kalköfen, oberhalb Thalkirchen, Juni, Dr. *Kr.*; Passau; Erlangen.

24) ***ovatus*** *Linn.* 2952.

Rosae Degeer. — Scopolii Gmel. — rufipes Scop. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München, im Isargenist von Bogenhausen, Mai, bei Pullach Juni, Nymphenburg Anfang September, Dr. *Kr.*; Freising s. h., Weihenstephan, April bis Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g., Wald bei der Herrnhütte in Moos August, in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.; Hessen, überall s. h.

C. Tournieria *Stierl.*

25) ***fullo*** *Schrank.* 2953.

zebra Fabr. — carinatus Payk. — Man findet ihn gewöhnlich an der Erde, *Schrank*; Nürnberg; Erlangen.

Otiorchynchus sulphurifer Fabr. bei Zusmarshausen nach Beck. Otiorchinchus rugosus Hummel kommt sicher bei Passau nicht vor.

629. *Peritelus* *Germar.*

peri um, herum, telos Ende.

1) ***hirticornis*** *Herbst.* (Otiorhynchus). 2954.

chrysoleucus Stenz. — simo Oliv. — variegatus Bohem. — ♀ depubes Boh. — Augsburg s.; München; Freising n. h., Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

2) ***griseus*** *Oliv.* 2955.

sphaeroides Germ. — hemisphaericus Sturm. — dissimilis Sturm. — inquinatus Ill. in litt. — Augsburg n. h. Wolfratshausen, Mai, Juni; München; Passau; Regensburg g.; Aschaffenburg n. h.; Hessen, im Süden des Gebietes häufig, im Norden ist mir kein Fundort bekannt (Decan *Scr.*)

Der Käfer frisst die Knospen von Acer (Ahorn), Vitis (Weinstock) und Cedrus (Ceder), von Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen. und Wallnussbäumen, zumal auch deren Pfropfreisern.

3) ***leucogrammus*** *Germ.* 2956.

albolineatus Dej. — albovittatus Dahl. — fuscipes Meg. — lanuginosus Creutz. — sublineatus Gyssel. — lithargyreus Gyssel. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien 1861. p. 169. — Augsburg s.

630. ***Omias*** *Schoenherr.*

omios mit breiten Schultern.

1) ***concinnus*** *Boh.* 2957.

oblongus Boh. — parvulus Boh. — sericeus Bohem. — mandibularis Chevvol. — Marqueti Gautier. — Raymondi Gautier. — Augsburg s.; Hexenagger bei Regensburg unter *Formica rufa*, von *Weidenbach*; Seligenstadt ein einzelnes Exemplar Decan *Scr.*

2) ***mollinus*** *Schh.* 2958.

Bohemanni Zett. — Frankfurt ein Exemplar, Dr. *M. Schmidt.*

3) ***forticornis*** *Bohem.* 2959.

gracilipes Bohem. — rugicollis Bohem. — validicornis Märkel. — Passau; Fränkische Schweiz h.; Seligenstadt s.; Ober Lais und Ortenberg n. s., Decan *Scr.*

631. ***Barypithes*** *Jacquelin Duval.*

barys schwer, peito ich bewege.

Barypeithes *Jacq. Duv.*

1) ***Chevrolati*** *Bohem.* 2960.

♀ ruficollis Bohem. — ♀ subnitidus Bohem. — München.

2) ***montanus*** *Chevrol.* 2961.

Darmstadt ein, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Rippoldsau im Schwarzwald, von *Heyden.*

3) ***araneiformis*** *Schrank.* 2962.

brunnipes Oliv. — ♂ ebeninus Boh. — gracilis Beck. — piceus Marsh. — Augsburg s., unter Ameisen; München; Passau; Aschaffenburg n. h.; Hessen im ganzen Gebiete n. s.

4) ***mollicomus*** *Ahrens.* 2963.

holosericeus Fabr. — ruficollis Fabr. — punctirostris Bohem. — Augsburg s.; München; Passau; Regensburg n. g.; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.

5) ***lenex*** *Boh.* 2964.

parvulus Ulrich in litt. — Seligenstadt, ein Exemplar Decan *Scr.*; im Frankfurter Wald und im Taunus n. s., von *Heyden.*

632. ***Platytarsus*** *Schoenherr.*

platys breit, tarsos Tarse.

Brachysomus *Schoenherr.*

brachys kurz, soma Leib, Körper.

1) ***setiger*** *Gyll.* 2965.

♀ pruinosus Bohem. — Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner.*

2) ***villosulus*** *Germ.* 2966.

München; Passau.

3) ***echinatus*** *Bonsdorff.* 2967.

hirsutulus Fabr. — hispidulus Herbst. — scabriculus Herbst. — scaber Müll. — Zusmarshausen; Augsburg h., Leitershofen, Spickel, in Moos, April; München, bei Pullach durch Streifen; Juni, Dr. *Kr.*; Freising g., Weihenstephan, Attachinger Au, Wald bei Wippenhausen und bei Thalhausen in Moos April, von Bäumen geklopft, Juni; Passau; Regensburg g.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Eichstädt; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Hessen, überall im Gebiete aber nicht h.

4) ***subnudus*** *Seidl.* 2968.

Freising n. s. Weihenstephan Mai unter abgefallenen Blättern und Steinen, im Juni von Gesträuch abgeklopft.

633. ***Trachyphloeus*** *Germar.*

trachys rauh, phloios Rinde.

1) ***alternans*** *Gyll.* 2969.

scaber Redt. — Augsburg am 12. Mai 1867 ein Stück bei

Deuringen; Saline Wisselsheim in Oberhessen zwei Stück, Frankfurt ein Exemplar, von *Heyden.*

2) ***spinimanus*** *Germ.* 2970.

lanuginosus Gylh. — echinatus Dej. — scabriculus Oliv. — simplex Sturm. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Friedberg von *Heyden.*

3) ***digitalis*** *Gylh.* 2971.

Regensburg s., bei Harxheim in Rheinhessen einmal in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr.*

4) ***scabriculus*** *Linné.* 2972.

♂ Erinaceus Reden. — maculatus Schönh. in litt. — scaber Schoenh. — Viverra Herbst. — occultus Chevrol. in litt. — digitalis Steph. — ♂ setarius Gylh. — ♀ spinimanus Gylh. — Larve Schilling Arb. schles. Ges. 1828 p 73. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München, bei Nymphenburg, Juni, bei Harlaching, Juni, aus Isargenist von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*; Freising, Giggenhausen in einem Kornfelde, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg n. s., Dutzendteich und Wäldchen bei der Herrenhütte in Sand, August; Eichstädt; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen im ganzen Gebiete n. s.

5) ***ventricosus*** *Germ.* 2973.

tigrinus Mag. — Aschaffenburg n. s. (?).

6) ***scaber*** *Linné.* 2974.

scabriculus Gylh. — squamosus Gylh. — tessellatus Marsh. — muralis Reich in litt. — bifoveolatus Beck. — septentrionis Thoms. — confinis Steph. — nigricans Steph. — Augsburg, München; Moosburg Notar von *Sonn.*: Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h., Dutzendteich auf Sand unter Moos, August; Manghofer Weiher, September; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt, Nauheim und Königstein n. s., von *Heyden.*

7) ***aristatus*** *Gylh.* 2975.

asphaltinus Gylh. — stipulatus Germ. — setosus Marsh. — hispidulus Steph. — Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen. August, Dr. *Kr.*; einige Stücke bei Seligenstadt; Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

8) ***squamulatus*** *Oliv.* 2976.

Augsburg; München; Freising n. h., Wiesenwald August, in Isargeniste, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg n. h.; Erlangen; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Offenbach, Frankfurt und Bingen, einzeln, von *Heyden.*

634. *Phyllobius* *Germar.*

phyllon Blatt, bioo ich lebe.

1) ***glaucus*** *Scopoli.* 2977.

calcaratus Fabr. — caesius Marsh. — aeruginosus Kirby in litt. — Augsburg n. s.; Allgäu, Obergeometer *Stark*: München, im Ertlsgarten, Mai, bei Thalkirchen, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete n. s. (Phyllobius glaucus, calcaratus und alneti sind nicht spezifisch zu trennen, ebenso pomaceus und verecundus, von *Heyden.*)

2) ***alneti*** *Fabr.* 2978.

Piri Gylh. — prasinus Oliv. — conides Marsh. — angustatus Kirby in litt. — Zusmarshausen; Augsburg, *Gscheidlen*; München Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Aschaffenburg; Frankfurt an Urtica häufig beobachtet, von *Heyden.*

Häufig auf Waldbäumen, namentlich auf Erlen; auch den Obstbäumen schädlich (Leunis.).

3) ***pomaceus*** *Gylh.* 2979.

verecundus Boh. — München.

4) ***psittacinus*** *Germ.* 2980.

Augsburg s.; München; Freising s., Marzlinger Wiesen Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. h.

5) ***pineti*** *Redtenb.* 2981.

Ein Exemplar bei Marburg gefunden (Decan *Scr.*) (Fragliche Art, von *Heyden*).

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 35-48