# Liste

## der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere,

zusammengestellt

von Dr. med. Otto Roger, prakt. Arzt in Schwandorf.

(Fortsetzung)

### 15. Ruminantia.

#### 15. a. *Ruminantia inermia.*

(Ohne Gehörn und mit oberen Incisiven).

*Gelocus Aymardi*, Kow. Unter-Miocän von Ronzon und Cahors.

Kowalevsky, Osteologie des Gelocus Aymardi. Paläontographica. Bd. 24. 1877. Taf. 21 und 22.

Kowalevsky, Ueber die Classification der Hufthiere. Paläontographica. Bd. 22. 1873. Taf. XVII. fig. 17. 18.

*Gel. curtus*, Gaudry, Phosphorite von Quercy.

Gaudry, Enchaîn. pag. 112. fig. 146.

*Anphitragulus communis*, Aym. Miocän des Schweizer Jura und der Auvergne.

Gervais, Zool. et Pal. fr. Pl. XXXIV. fig. 10. 11.

Rütimeyer, Eoc. Säugeth. pag. 72. Tab. V. fig. 69.

Syn: Tragulotherium, Croizet.

*Amph. elegans*, Pomel. Miocän der Limagne.

*Prodremotherium sp.* Filhol. Phosphorite von Quercy.

Gaudry, Enchaîn. pag. 110. fig. 143.

*Lophiomeryx Chalaniati*, Filhol. Phosphorite von Quercy.

Gaudry, Enchaîn. pag. 95. fig. 114.

*Dorcatherium Naui*, Kaup. Ober-Miocän von Eppelshein in Hessen.

Kaup, Descr. d'oss. foss. Darmstadt 5. Heft. 1835. Tab. XXIII A. B. C.

Gaudry, Enchaîn. pag. 95. fig. 115.

*Dorc. Guntianum*, Kaup. Ober-Miocän von Günzburg in Bayern.

*Dorc. Vindobonensis*, Kaup. Ober-Miocän des Wiener Beckens.

*Dorc.* (?) *majus*, Lydekker. Miocän von Indien. (Kushalgar bei Attok).

Lydekker, Mem. Geol. Surv. India. Ser. X. 2. Molar teeth and other remains of Mammalia. Calcutta 1876. p. 44. Pl. 7. fig. 9. 10. 11.

Medlicott und Blanford, Geology of India. Calcutta 1879. Pl. XVIII. fig. 3.

Syn: Merycopotamus nanus, Falc.

*Dorc.* (?) *minus*, Lyd. Ebendaher.

Lydekker. l. c. pag. 46. Pl. 7. fig. 3 u. 7.

*Orotherium liguris*, Aymard. Miocän von Ronzon.

Anmkg. Die Reste, auf welche Cope u. Leidy die amerikanischen Arten Orotherium vasacciense C. und O. sylvaticum begründeten, gehören nicht hieher.

*Amphimoschus sp.*

*Moschus aurelianensis*, Lart. Miocän von Lachauxdefonds.

*Leptomeryx Evansi*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres in Dakota und von Wyoming, Nord-Amerika.

Leidy, Extinct Mamm. fauna. 1869. pag. 165. Pl. XIV. fig. 1—8.

Leidy, Contributions ext. vert. fauna. 1873. pag. 216.

Syn: Dorcatherium Evansi, Leidy.

*Hyaemoschus crassus*, Lartet. Miocän von Sansan und Steinheim in Würtemberg.

Lartet, Notice sur la colline de Sansan.

Pomel, Ann. Acad. d. Sc.

Fraas, Fauna v. Steinheim. l. c. Taf. VII.

Gaudry, Enchaîn. p. 118. fig. 153.

Syn: Dicrocerus crassus, Lartet.
Hyaemoschus Larteti, Pomel.

*Tragulus Meyeri*, Goldf. Miocäne Braunkohle von Rott.

*Hypisodus sp.*, Cope. Miocän von Nord-Amerika.

*Hypertragulus sp.*, Cope. Ebendort.

Beide Genera erwähnt in: Cope, Proceed. Amer. Philos. Philadelph. 1876. Vol. XIV. pag. 110 und bei:

Wallace, Die geogr. Verbreitg. d. Thiere. Dresden. 1876. I. 166.

---

(Agriochöridae.)

*Agriochörus antiquus*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres in Dakota u. von Oregon (Nord-Amerika.)

Leidy, Proceed. Acad. Nat. Soc. Philadelphia. 1850. T. V. fig. 121.

Leidy, Ancient fauna of Nebraska. Washington. 1853. Pl. I, fig. 5. 6. 9. 10.

Leidy and Hayden, The Extinct Mammalian fauna of Dakota and Nebraska. Philadelphia 1869. Pl. XIII. fig. 4.

Leidy, Contributions to the extinct vertebrate fauna of the western territories. Washington 1873. pag. 216.

Syn: Eucrotaphus Jacksonii, Leidy.

*Agr. major*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.

Leidy, Ancient fauna etc. Pl. VII. fig. 1. 3.

Leidy, Extinct Mamm. fauna etc.

Syn: Eucrotaphus auritus, Leidy.

*Agr. latifrons*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres u. von Oregon.

Leidy, Extinct Mamm. f. Pl. XIII. fig. 1—3.

Leidy, Contributions pag. 216.

Gaudry, Enchaînements etc. fig. 112. 123.

---

(Oreodontidae.)

*Eporeodon sp.* Miocän von Nord-Amerika.

Notiz in Wallace, geogr. Verbr. d. Thiere. 1876. I. 166.

*Oreodon Culbertsonii*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres und von Oregon.

Leidy, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. 1848. IV. 47. fig. 1—5. 1851. V. 238.

Leidy, Ancient fauna. 1853. pag. 45. Pl. II. III. IV. fig. 1—5. VI. 8—11.

Leidy, Extinct Mamm. f. 1869. Pl. VI, 1. VII., 2. XIV, 11.

Leidy, Contributions. 1873. pag. 211.

Gaudry, Enchaîn. 1878. pag. 81 fig. 90.

Syn: Merycoidodon Culb. Leidy.

Oreodon priscum, Leidy.

Cotylops speciosa, Leidy.

*Or. superbus*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres und von Oregon.

Leidy, Contrib. 1873. pag. 211. Pl. I, 1. II, 16. VII, 7—11.

*Or. gracilis*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.

Leidy, Proc. Ac. Nat. Scienc. 1850. V. 239.

Leidy, Ancient fauna. 1853. pag. 53. Pl. V, 3. 4. VI, 1—7

Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. VI. fig. 2. 3.

Syn: Merycoidodon gr., Leidy.

*Or. major*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Ancient f. 1853. pag. 55. Pl. IV. fig. 6.
Leidy, Extinct m. f. 1868. Pl. VII., 1. VIII.

*Or. affinis*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Extinct m. f. 1869 Pl. IX. fig. 3.

*Or. hybridus*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. IX. fig. 4.

*Or. bullatus*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Extinct m. f. 1869.
Syn: Eucrotaphus bullatus, Leidy.

*Or. occidentalis*, Marsh.
Anmkg. Zu Oreodon gehören auch die als Merychyus elegans und medius (Leidy, Extinct etc. 1869. Pl. XI. fig. 1—11. und XI, 13—14.) beschriebenen Zähne und Kieferfragmente.
Bettany, On the Genus Merycochörus. Quart. Journ. Geol. Soc. 1876. vol. 32.

*Merycochörus proprius*, Leidy. Miocän von Niobrara (N. A.)
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. X.

*Mer. temporalis*, Bettany. Miocän von Oregon.
Bettany, l. c. Pl. XVII.

*Mer. Leidyi*, Bett. Miocän von Oregon.
Bettany, l. c. Pl. XVIII.

*Mer. rusticus*, Leidy. Pliocän von Wyoming und New-Mexico.
Leidy, Contributions. 1873. pag. 199. Pl. III, 1—3, VIII, 1—5. XX, 9—12.
Anmkg. Zu Merycochörus gehört nach Bettany (l. c.) auch:
Merychyus elegans, Leidy. (Ext. XI, 1—11.)
— medius, Leidy. (Ext. XI, 12—14.)
— major, Leidy. (Ext. XI, 15. 16.),
sämmtlich aus dem Pliocän von Nebraska, Niobrara und Colorado.

*Leptauchenia major*, Leidy, Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Extinct. 1869, Pl. XII. fig. 1—5.

*Lept. decora*, Leidy. Ebendaher.
Leidy, Ext. XII, 6—20.

*Lept. nitida*, Leidy. Ebendaher.
Leidy, Ext. XII, 21. 22.

(Camelidae.)

*Poëbrotherium Wilsoni*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1847. III. 322.
Leidy, Ancient f. 1853. pag. 19. Pl. I. fig. 1—4.
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. VIII. fig. 5—7.
Cope, Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. 1876. Vol. XIV. pag. 110.

*Protomeryx Halli*, Leidy. Miocän der Mauvaises Terres.
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. XV. fig. 8 und 9.

*Protolabis heterodontus*, Cope. Miocän von N. W. Colorado.
Cope, Annual Report U. S. Geol. Surv. Territ. 1873. p. 530.
Cope, On a new genus of Camelidae. Proc. Ac. Nat. Soc. Philad. 1876. pag. 144.
Syn: Procamelus heterodontus, Cope.

*Procamelus robustus*, Leidy Pliocän von Nebraska.
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. XV. fig. 1—4.

*Proc. occidentalis*, Leidy. Pliocän von Nebrasca, Texas und New-Mexico.
Leidy, Extinct m. f. 1869. pag. 155. Pl. XV. fig. 5—7.
Leidy, Contributions. 1873. Pl. 21. 22.
Cope, Annual Report. U. S. Geol. Surv. Terr. 1875. pag. 990. Pl. II.
Cope, Report Unit. States Geogr. Surv. Vol. VI. Washington 1877. pag. 329. Pl. LIII, fig. 2. LVI. LVII. 1—3. LVIII., 1—9. LXXIX.
Syn: Protocamelus occid. Leidy.

*Proc. gracilis*, Leidy. Pliocän von Nebraska und New-Mexico.
Leidy, Extinct m. f. Pl. XIV. fig. 15.
Cope, Annual Report. 1875.
Cope, Report Unit. St. Geogr. Surv. Vol. IV. Washington 1877. pag. 328.

*Proc. fissidens*, Cope. Pliocän von N. O. Colorado.
Cope, Annual Report U. S. Geol. Surv. Territories 1873. pag. 531.
Cope, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. 1876. pag. 141.
Syn: Proc. occidentalis, Leidy. (?).

*Proc. virginianus*, Leidy. Miocän (?) von Virginien.
Leidy, Contributions 1873. Pl. XXVII. fig. 26—29.

*Proc. niobrarensis*, Leidy. Pliocän von Niobrara.

Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. XIV. fig. 12—14.
Leidy, Contributions. 1873. Pl. XXVII. fig. 24. 25.
Syn: Megalomeryx niobr., Leidy.

*Homocamelus caninus*, Leidy. Pliocän von Nebraska.
Leidy, Extinct m. f. 1869. Pl. XIV. fig. 17.

*Camelops Kansanus*, Leidy. Quaternär von Kansas.
Leidy, Journ. Acad. Nat. Soc. 1856. III. 166. Pl. XVII. fig. 8—10.
Leidy, Proc. Acad. Nat. Soc. Philad. Vol. VII.
Leidy, Extinct. m. f. 1869. pag. 382.

*Pliauchenia humphresiana*, Cope. Pliocän von New-Mexico.
Cope, Wheelers Report. 1874. pag. 67.
Cope, Report U. St. Geogr. Surv. Vol. IV. Washington 1877. pag. 344. Pl. LXXVII. fig. 4.

*Pli. vulcanorum*, Cope, Pliocän von New-Mexico.
Cope, Wheelers Report 1875.
Cope, Rep. U. St. G. S. Vol. IV. 1877. p. 345. Pl. LXXVII. fig. 5.

*Palauchenia magna*, Owen. Quartär von Mexico.
Owen, Phil. Trans. Roy. Soc. London. Vol. 160. 1870. Pl. IV.

*Auchenia hesterna*, Leidy. Quartär von Californien.
Leidy, Contributions. 1873. Pl. XXXVII. fig. 1—3.

*Auch. californica*, Leidy. Quartär von Californien.

*Auch. lama fossilis* Quartär von Brasilien.
Burmeister, Anales del Museo Publico de Buenos-Ayres. I. 233.
Hieher gehörig sind wohl auch die von Gervais als Auchenia Weddellii, Castelnaudii und intermedium beschriebenen Llamareste von Tarija (Gervais, Rech. s. l. mammif. foss. l'Amérique mérid. 1855. pag. 41) zu stellen, für welche Bravard das Genus Camelotherium aufstellte.

*Merycotherium sibiricum*, Bojanus. Quartär von Sibirien.
Bojanus, Nov. Act. Acad. Leopold. Carol. Nat. Cur. XII. 1. Ser. 263. 233. Taf. 21. fig. 1—8.

*Camelus sivalensis*, Falc. & Cautl. Pliocän der Sivalikhügel
Falconer, Pal. Mem. Vol. I. pag. 231.
Falconer, fauna antiqua Sivalensis. Pl. 87. fig. 5.
Lydekker, Mem. Geol. Surv. India. Vol. I. 2. Ser. X. 2. Molar Teeth etc. Calcutta 1876. pag. 43.

Incertae sedis:

*Sicameryx* 2 *sp.*

*Hemimeryx sp.*

Beide Gattungen aus dem Miocän von Ostindien. Medlicott and Blanford, Geology of India. 1879. pag. 472 u. 574.

---

15 b. Ruminantia cornuta.

(Mit Geweih oder Hörnern, aber ohne obere Incisiven).

(Cervidae).

*Dremotherium Feignouxii*, Geoffr. Miocän der Auvergne und von Pikermi (Griechenland).

Gervais, Zool. et Pal. fr.

Gaudry, Animaux fossiles de l'Attique. Paris 1862. Pl. LVI. fig. 5. 6.

Gaudry, Enchaînements. pag. 119. fig. 154.

Syn: Dr. Pentelici, Gaudry.

*Drem. sp.* Gaudry. Miocän von Pikermi.

Gaudry, Anim. foss, d. l. Attique. Pl. LVI. fig. 7.

*Drem. nanum*, Geoffr. Miocän der Auvergne.

Gervais, Zool. et Pal. fr.

Anmkg. Dremotherium, von einigen Autoren für eine Antilope, von anderen aber für einen Hirsch gehalten, gilt allerdings bis jetzt für hornlos, trotzdem glaubte ich diese Gattung provisorisch an die Spitze der Cervidenreihe stellen zu dürfen, bis vollständigere Funde ihren Platz definitiv sichern.

*Elaphotherium sp.*, Bouillet. Miocän der Limagne.

Gaudry, Enchaîn. pag. 109. fig. 142.

*Elaphotherium Domenginei*, Delfortrie. Miocän von Süd-Frankreich.

Delfortrie, Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. T. XXXI. 1876. pag. 37.

*Procervulus aurelianensis*, Cuv. Miocän des Orléanais.

Cuvier, Rech. s. l. oss. foss. T. IV. 1823. Pl. Pl. VIII. fig. 3—6. (Chevreuil de Montabusard).

Gaudry, Enchaîn. pag. 87. fig. 100.

Rütimeyer, Die Rinder der Tertiärepoche. (Abhdlgn. der Schweiz. pal. Ges. Vol. III. 1876. pag. 68.

*Cervus* (*Dicrocerus*) *anocerus*, Kaup. Miocän von Eppelsheim in Hessen und von Anjou.

Kaup, Descr. d'oss. foss. Darmstadt. 5. Heft. 1835. Pl. XXIV. fig. 2.

Gaudry, Enchaîn. pag. 84. fig. 94. 95.

Boyd Dawkins, Contributions to the history of the Deer of the European Miocene und Pliocene Strata. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XXXIV. London 1878. pag. 402.

Boyd Dawkins stellt zu dieser Art auch Kaup's C. dicroceros, welcher jedoch eher zu der folgenden gehören dürfte.

*Cerv.* (*Dicr.*) *elegans*, Lartet. Miocän von Frankreich, Süd-Deutschland, der Schweiz und Spanien.

Lartet, Notice sur la colline de Sansan. pag. 34.

Lartet, Compt. Rendus. T. IV. pag. 88. T. V. pag. 131.

H. v. Meyer, fossile Zähne und Knochen von Georgensgmünd. Frankfurt 1834. pag. 92. Taf. IX, 75. X, 77—79.

Kaup, Descr. oss. foss. 1835. Pl. XXIV. fig. 2.

Gervais, Zool. et Pal. fr. pag. 78. Pl. XXIII. fig. 4.

Fraas, Fauna von Steinheim. Taf. III. fig. 1—14. 21. 23. Taf. IX. fig. 9. 10.

Calderon, On the fossil Vertebrata hitherto discovered in Spain. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XXXIII. 1877.

Gaudry, Enchaîn. pag. 84. fig. 93. pag. 93. fig. 110. pag. 97. fig. 120.

Boyd Dawkins, l. c.

Syn: Antilope dichotoma, Gervais.
Cervus dicrocerus, Gervais.
Dicrocerus dichotomus, Lartet.
Palëomeryx Bojani, v. Meyer.
Cervus Kaupii, v. M.
Cervus Scheuchzeri, v. M.
Cervus dicranoceros, Kaup.
Cervus nanus, Kaup.
Cervus Partschii, Kaup.
Cervus trigonocerus, Kaup.
Prox furcatus, Hensel.
Paläomeryx furcatus, Fraas.

*Cerv.* (*Dicr.*) *eminens*, v. Meyer. Miocän von Oeningen u. Steinheim.

v. Meyer, Paläontographica, II. Bd. 1852. pag. 78. Taf. 14. fig. 5.

Fraas, Steinheim. Taf. VIII. fig. 15—17. IX, 1—8.

Syn, Paläomeryx eminens, v. Meyer.

*Cerv. (Dicr.) flourensianus*, Lartet. Miocän von Sausan, Simorre, Steinheim und Eppelsheim.

Lartet, Notice s. l. coll. de Sausan. 1851.

Fraas, Steinheim. Taf. IX. fig. 18—20. 24.

Syn: Cervus pygmaeus, Pictet.

Cervus parvus, Giebel.

Cerv. gergovianus, Croiz. et Job.

Paläomeryx flourensianus, Lartet.

Micromeryx flour., Lart.

*Cerv. (Dicr.) furcatus*, Leidy. Pliocän von Nord-Amerika.

Leidy, Extinct m. f. 1869. pag. 162 u. 173. Pl. XIV, 9. 10. XXVIII, 8.

Cope, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1875. pag. 257.

Cope, Report U. St. Geogr. Surv. Wash. 1877. Vol. IV. p. 350. Pl. LXXX. LXXXI, 1. LXXXII.

Syn: Cosoryx furcatus, Leidy.

Cosoryx ramosus, p. p. Cope.

*Cerv. (Dicr.) necatus*, Leidy. Pliocän von Nord-America.

Leidy, Journ. Acad. Philad. 1869. p. 172. Pl. XXVII, fig. 12.

Cope, Proc. Acad. Philad. 1877. pag. 257.

Cope, Report U. St. G. S. 1877. Vol. IV. pag. 353. Pl. LXXXI, fig. 2—6. LXXXII, fig. 2. 3.

Syn: Merycodus necatus. Leidy.

Cervus Warrenii, Leidy.

*Cerv. (Dicr.) teres*, Cope. Pliocän v. Nord-Amerika.

Cope, Proc. Acad. Philad. 1875. pag. 257.

Cope, Report 1877. Vol. IV. pag. 356. Pl. LXXXI, fig. 7. LXXXII, fig. 6.

Syn: Cosoryx teres, Cope.

*Cerv. (Dicr.) trilateralis*, Cope. Pliocän von Nord-Amerika.

Cope, Report 1877. Vol. IV. pag. 357. Pl. LXXXI, fig. 8. LXXXII, 7—9.

*Cerv. (Dicr.) tehuanus*, Cope. Pliocän von Nord-Amerika.

Cope, Report 1877. pag. 359. Pl. LXXXII, fig. 10—12.

*Cerv. (Dicr.) gemmifer*, Cope. Pliocän von Nord-Amerika.

Cope, Annual Report 1873. 531.

Syn: Merycodus gemmifer, Cope.

Blastomeryx gemmifer, Cope.

Anmkg. Zu dieser Untergattung (Dicrocerus) kleiner Hirsche vom Muntjactypus, deren nordamerikanische Arten übrigens auch gewisse Beziehungen zu der lebenden Gabelantilope, Antilocapra, zeigen) gehören auch noch die einzelnen Reste, welche unter folgenden Namen beschrieben wurden:

Paläomeryx lunatus, v. Meyer. Miocän der Schweiz.
— medius, v. M. Ebendaher.
— minor, v. M. Ebendaher.
— Nicoleti, v. M. Miocän von Lachauxdefonds.
— grandis, v. M. Miocän von Sausan.
— Larteti, Giebel. Ebendaher.

*Cerv. (Capreolus) australis*, de Serres. Unter-Pliocän von Montpellier und Casino (Italien).
Gervais, Zool. et Pal. fr. Pl. 7. fig. 1.
Boyd Dawkins, Contributions.
Syn: Cerv. elsanus, Forsyth Major.
C. Tournalii, Marc. de Serres.

*Cerv. (Capr.) cusanus*, Coiz. et Job. Pliocän von Südfrankreich und Spanien.
Croiz. et Jobert, les oss. foss. de Puy de Dôme.
Pomel, Catalogue Methodique pag. 111.
Gervais, Zool. et Pal. fr. pag. 149.
Calderon, foss. Vert. hith. discov. in Spain. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XXXIII. 1877.
Boyd Dawkins, Contrib. fig. 2.
Syn: Cervus Cauvieri, Christol.
Cervulus cusanus, Marc. de Serres.

*Cerv. (Capr.) orobius*, Bals. Quartär der Lombardei.
Cornalia, Mammifères fossiles de Lombardie. Milan. 1858—71.
Syn: C. Breislackii, Bals.

*Cerv. (Capr.) affinis*, Cornal. Quartär der Lombardei.
Cornalia, l. c. Pl. XXVI. fig. 1.

*Cerv. Capreolus vulgaris fossilis.* Quartär von Europa.
Literatur zahlreich (prähistorische Anthr.)
Syn: C. Tolozani, Christ.
C. Solilhacus, Roberts.

*Cerv. (Axis) Matheronis*, Gervais, Miocän vom Mont Lébéron.
Gervais, Zool. u. Pal. fr. 1859. pag. 149.

Gaudry, Anim. foss. d. M. Lébéron. 1873. pag. 65. Pl. XIII. fig. 1—4.

Gaudry, Enchaîn. pag. 85. fig. 96.

Boyd Dawkins, Contributions fig. 1.

Syn: C. Bravardi, Bravard.

*Cerv. (A.) Perrieri,* Croiz et Job. Pliocän vom Mont Perrier in der Auvergne.

Croizet et Jobert, l. c. Pl. IV. V. VI. VIII. 9. 10.

Pomel, Cat. Meth. pag. 104. 105.

Gervais, Zool. et Pal. fr. pag. 147.

Boyd Dawkins, Contr. fig. 3. 4.

Syn: Cerv. issiodorensis, Pomel.

*Cerv. (A.) pardinensis,* Cr. et J. Pliocän der Jssoire und Auvergne.

Croizet et Jobert, l. c. Pl. XI.

Pomel, C. M. pag. 106.

Gervais, Zool. et Pal. fr. pag. 140.

Gaudry, Enchaîn. pag. 85. fig. 97.

Boyd Dawkins, Contr. fig. 5.

*Cerv. (A.) etueriarum,* Croiz. et Job. Pliocän der Auvergne.

Croizet et Jobert, l. c. Pl. VI, 1. 2. VII. VIII.

Gervais, Zool. et Pal. fr. pag. 148.

Pomel, Cat. Méth. pag. 106.

Boyd Dawkins, Contr. fig. 6.

Syn: C. rusoides, Pomel.

C. stylodus, Bravard.

C. peyrollensis, Bravard.

*Cerv. (A.) suttonensis,* Dawkins. Pliocän von Sutton in England.

Boyd Dawkins, Contr. fig. 8—10.

*Cerv. (A.) cylindroceros,* Bravard. Pliocän der Auvergne.

Boyd Dawkins l. c. pag. 11. 12.

Syn: C. gracilis, Bravard.

? C. ambiguus, Pomel.

*Cerv.* (A.) *clactonianus,* Falc. Pliocän (Forest-bed) von England und des Arnothales (?).

Rütimeyer, Pliocän und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. 1876. pag. 47.

Anmkg. Zur Axisgruppe oder zu Rucervus (s. u.) gehören vielleicht auch die 3 von Lydekker (Mem. Geol. Surv. India

Vol. I. 2. Serie X. 2. Molas teeth. etc. Calcutta. 1886. p. 47. etc.) beschriebenen Arten:

C. latidens (l. c. Pl. 8. fig. 7. 10.)

C. triplidens (l. c. Pl. 8. fig. 1. 2 5.)

C. simplicidens (l. c. Pl. 8. fig. 3.), aus dem Pliocän der Siwalikhügel.

*Cerv.* (*Tetraceros*) *tetracerus*, Bravard. Pliocän der Auvergne. Boyd Dawkins, Contr. fig. 13–17.

*Cerv.* (*Tetr.*) *ctenoides* Nesti. Pliocän des Arnothales. Cornalia, Mammif. foss. Lomb.

*Cerv.* (*Elaphus*) *fossilis.* Quartär von Europa. Zahlreiche prähist. Literatur.

Syn: C. primigenius, Pictet. — C. priscus. — C. Bresciensis. — C. intermedius, M. d. S. — C. Reboulii, M. d. S. — C. antiquus, M. d. S. — C. coronatus, M. d. S. — C. Destremii, M. d. S. — C. pseudo-virginianus, M. d. S. — C. Dumasii, M. d. S. — C. Costrizensis, Pom. — C. diluvianus, Pom. — C. canadensis, Pomel. —

*Cerv.* (*El.*) *canadensis fossilis.* Quartär von Nord-Amerika. Leidy, Extinct m. f. 1869. pag. 376.

*Cerv.* (*El.*) *americanus*, Wistar. Quarfär von Nord-Amerika. Leidy, Extinct m. f. 1869. pag. 368.

*Cerv.* (*Mazama*) *virginianus*, Bodd. Quartär von Nord-Amerika. Leidy, Ext. m. f. pag. 376.

Syn: Mazama Salinaria.
Panallodon tumularium.
Odocoileus spelaeus.

*Cerv.* (*Rucervus*) *namadicus*, Alluvium des Narbadathales in Ostindien. Medlicott & Blanford, Geology of India. 1879. pag. 385 und 574.

*Cerv.* (*Blastoceros*) *campestris fossilis.* Quartär von Süd-Amerika. Burmeister, Anales del Mus. publ. Buenos-Ayres. I. 234. Burmeister, Act. Soc. Pal. de Buenos-Ayres. 1866.

Syn: C. pampaeus, Bravard.

*Cerv.* (*Bl.*) *paludosus foss.* Quartär von Süd-Amerika. Burmeister, l. l. c.

Syn: C. magnus, Bravard.

*Cerv.* (*Polycladus*) *ramosus*, Croiz. et Jobert. Pliocän der Auvergne.

Croiz et et Jobert, l. c. Pl. V.

Gervais, Zool. et Pal. fr.

Nicht synonym mit C. ramosus Blainville.

*Cerv. (Pol.) ardeus*, Croiz. et Job. Pliocän der Auvergne.

Croizet et Jobert, l. c.

Gervais, l c.

*Cerv. (Eucladoceros) Sedgwickii*, Falc. Pliocän von Norfolk.

Falconer, Paläontol. Mem. pag. 471. Pl. 37.

Gaudry, Enchaîn. pag. 86. fig. 98.

Syn: Strongyloceros speläus, (?) Owen.

*Cerv. (Eucl.) dicranius*, Nesti. Pliocän des Arnothales.

*Cerv. (Dama) eurycerus*, Aldrovandi. Quartär von England, Frankreich, Deutschland und Italien. Der Riesenhirsch.

Literatur sehr gross.

Aldrovandi, Op. omnia.

Blumenbach, Naturgesch. 1807.

Cuvier, Rech. s. l. oss. foss. 1823. T. IV. pag. 70. Pl. VI. VII. VIII.

Hort, A description of the Skeleton of the fossil Deer of Irland. Dublin. 1825.

Owen, A history etc. 1846. fig. 182—192.

Fischer de Waldheim, Bull. Soc. Imp. de Moscou. T. VII. 1834. pag. 439.

Pictet, Traité de Paléontologie. T. I. 1853. Pl. XVI. fig. 1 u. 2.

Cornalia, Mammif. foss. d. Lombardie. Pl. XVIII—XX.

Pelzeln, A. v., Ueber den Riesenhirsch. C. megaceros. In Verhdlgn. d. k. k. zool.-bot. Ges. Bd. 29. 1879.

Laube, Verhdl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1880. Nr. 7.

Syn: Cerv. megaceros, Hort.

C. giganteus, Blum.

C. irlandicus, Blum.

C. hibernus, Desm.

C. platycerus altissimus, Moligneux.

Megaceros hibernus, Owen.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): Roger Otto

Artikel/Article: Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere (Fortsetzung) 52-64