Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

6) ***argentatus*** *Linné.* 2982.

arborator Herbst. — Zusmarshausen; Augsburg h., Mai, Juni; München h., bei Harlaching, Thalkirchen, Maria Einsiedl, Pullach auf Gesträuch und auf Blüten, Mai bis Juli, Dr. *Kr.*; Freising s. h. auf Bäumen; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg s. h.; Hessen überall g.

Er findet sich auf Obst- und Waldbäumen, an Obstbäumen zernagt er die jungen Triebe und Knospen, an Buchen die Blätter. (Leunis).

7) ***maculicornis*** *Herm.* 2983.

Augsburg ein Stück, Juni 1867; München, Bogenhausen, durch Schütteln der Gesträuche, Mai, bei Harlaching Juni, in Geiselgasteig, Juli, Dr. *Kr.*; Freising s.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; bei Königsstein und Falkenstein im Taunus je einmal von *Heyden.*

8) ***viridans*** *Boh.* 2984.

Baiern, Dr. *Gemminger.* (Ist var. von argentatus L., von *Heyden.*)

9) ***acuminatus*** *Boh.* 2985.

Baiern, Dr. *Gemminger.* (Zweifelhafte Art, von *Heyden.*)

10) ***virens*** *Boh.* 2986.

viridis Sturm Cat. — Moosburg, Notar von *Sonn.* (1871.); Nürnberg Dr. *Sturm.*

11) ***oblongus*** *Linné.* 2987.

floricola Herbst. — fuscus Laich. — pruni Scop. — querneus Fourcr. — rufescens Marsh. — Larve Nördling, Stett. Zeit. 1848. p. 232. Ueberall g., auf Bäumen, Mai bis Juli.

Auf Obstbäumen besonders Zwergobstbäumen schädlich, besonders an den Pfröpflingen der Baumschulen. Später setzt er sich in die entfalteten Knospen und verzehrt entweder blos das Weiche der Blätter, oder alles bis auf Hauptrippe und Stiel. Das Weibchen legt seine Eier in die Erde, wo sich die Larve von den

Wurzeln verschiedener Wiesenpflanzen nährt und überwintert, um im nächsten Frühjahre als Käfer zum Vorschein zu kommen. (Nördlinger.)

12) ***mus*** *Fabr.* 2988.

cinerascens Fabr. — canescens Germ. — spartii Sturm cat. — München; Passau; Regensburg g.; Nürnberg;

13) ***sinuatus*** *Fabr.* 2989.

obliquatus Meg. in litt. — München; Seligenstadt; Decan *Scr.*; Frankfurt auf Potentilla, von *Heyden*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*

14) ***pyri*** *Linné.* 2990.

vespertinus Fabr. — fulvipes Fabr. — mali Gyllh. — amaurus Marsh. — chrysoloma Ulr. — serotinus Meg. — Ueberall g. auf Bäumen, besonders auf Eichen, Mai bis August.

Er ist den Obstbäumen schädlich. Die Larve zernagt vorzüglich die Knospen und benagt den Fruchtknoten wie es die Raupe des Frostfalters macht, so dass zwar die Blüte sich noch manchmal entwickelt, aber die Frucht verkümmert, wodurch Aepfel, Birnen und Zwetschgen verkümmern. Sie bohrt sich einen Gang bis in den Fruchtstiel hinab und fällt dann mit demselben zur Erde, worin sie sich wahrscheinlich verpuppt und überwintert. Mit Anfang August verschwinden die Käfer. (Hegetschweiler.) Sehr gemein auf Erlen und Waldbäumen. (Nördlinger.)

var. aeruginosus Ziegl. — lar Panz. — mali Fabr. — Passau. — var. vespertinus Fabr. — fulvipes Fabr. — Mali Gyllh. — München, Dr. *Gemminger.*

15) ***Betulae*** *Fabr.* 2991.

betulinus Bechst. — dasypterus Ulr. — Augsburg s. s.; Mai, Siebentisch; München, Freising h., Weihenstephan, Mai und Juni von Bäumen geklopft; Regensburg s.; Steigerwald s.; Aschaffenburg s. s.; Fasanerie; Hessen n. h; Decan *Scr.*

16) ***Pomonae*** *Oliv.* 2992.

albidus Steph. — Augsburg n. s., Wolfratshausen, Pfersee, Mai; München; Freising n. s. Weihenstephan, Dürreneck, Mai; Regensburg g.; Nürnberg; Frankfurt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ober-Lais und in der Bergstrasse einzeln gesammelt, Decan *Scr.*

17) ***viridiaereus*** *Laich.* 2993.

uniformis Marsh. — argentatus Bonsd. — fulvipes Payk. —

minutus Steph. — parvulus Gylh. — forticornis Knoch in litt. — Augsburg s., Lechablass Mai; München, bei Pullach, bei der Georgenschweige, Juni, auf dem Marsfelde, Mai, bei Hartmannshofen, Juli, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s. h.; Hessen überall h., Decan *Scr.*

Häufig auf Gebüschen, besonders auf Schlehen, auch häufig auf Obstbäumen und dann schädlich (Leunis).

18) ***viridicollis*** *Fabr.* 2994.

Augsburg h., bei Lechhausen und am Lechablass, Mai; München, bei Bogenhausen; Mai, bei Harlaching durch Schütteln der Gesträuche, Juni, bei Maria Einsiedl auf einer Weide, Juni, Dr. *Kr.*; Freising h., Attachinger Au, Pförrer Au, Mai auf Bäumen; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Fränkische Schweiz, leider zu häufig.

Phyllobius atrovirens Gylh. kommt sicher bei Passau nicht vor. (Ist var. von calcaratus.)

B. Tropiphorini.

636. ***Tropidophorus*** *Schönherr.*

tropis Furche, phero ich trage.

Tropiphorus *Schönherr.*

1) ***elevatus*** *Herbst.* 2995.

Mercurialis Fabr. — lapidarius Payk. — ♀ tomentosus Marsh. — Passau; Regensburg s.; Augsburg; München; Erlangen; Steigerwald n. s.; Rhön, Professor Dr. *Döbner*; Umstadt, Decan *Scr.* Feldberg (Taunus) zweimal von Herrn Oberlieutenant von *Heyden* gefunden; Giessen, *Laubenheimer*; Hohe Rothskopf im hohen Vogelsberg, von *Heyden.*

2) ***carinatus*** *Müll.* 2996.

Mercurialis Dej. — suturalis Gmel. — Augsburg.

3) ***ochraceosignatus*** *Bohem.* 2997.

München.

C. Brachyderini.

637. ***Cneorrhinus*** *Schönherr.*

kneo ich zerreisse, rhin Nase.

Cneorhinus *Schönherr.*

1) ***globatus*** *Herbst.* 2998.

geminatus Fabr. — maritimus Marsh. — scrobiculatus Marsh.

— plagiatus Schall. — München, Passau; Erlangen; Hessen, im Süden des Gebietes besonders in Sandgegenden häufig. In Bingen soll nach Wagners Beobachtungen der Käfer einmal dem Weinstocke schädlich geworden sein. Auch bei Ortenberg von Dr. *Bose* aufgefunden (Decan *Scr.*). In Schlesien schadet er durch Abfressen der jungen Rebenknospen.

638. *Liophloeus* Germar.

leios glatt, phloios Rinde.

1) ***nubilus*** *Fabr.* 2999.

chrysopterus Herbst. — floccosus Marsh. — maurus Marsh. — tessellatus Bonsd. — Ueberall h., auf Bäumen, Mai, Juni, In Freising am 24. April in Isargenist gefunden.

2) ***Aquisgranensis*** *Först.* 3000.

atricornis Desbrouchers. — Auf dem Feldberg im Schwarzwald gefunden, von *Heyden.*

3) ***lentus*** *Germ.* 3001.

Augsburg, Professor Petry.

639. *Barynotus* Germar.

barys schwer (gross), notos Rücken.

1) ***margaritaceus*** *Germ.* 3002.

Chevrieri Schönh. — tardus Dej. — Augsburg, *Gscheidlen.*

2) ***obscurus*** *Fabr.* 3003.

murinus Bonsd. — Zusmarshausen; Augsburg h. Lechfeld bei Mering, Juni; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, an einem Holzhaufen bei Pullach, Juni; in der Kaiserklause bei Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., in Isargenist, April; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald n. s. Aschaffenburg h.; Hessen überall h.

3) ***moerens*** *Fabr.* 3004.

Bohemanni Gylh. — elevatus Marsh. — Augsburg s:; München; Marburg, Decan *Scr.*; am Geiselstein im hohen Vogelsberg von *Heyden.*

640. *Strophosomus* Billberg.

strophe Drehung, Wendung, soma Leib, Körper.

1) ***Coryli*** *Fabr.* 3005.

illibatus Bohem. — obesus Thoms. — Ueberall g. besonders auf Haselnuss, Mai bis Ende Oktober, überwintert in Moos.

Häufig und schädlich an Haseln, Birken, Buchen, Kiefern und Fichten, woran er Blätter, Rinde, Knospen und junge Triebe abnagt. Die Verwandlung erfolgt wahrscheinlich in der Erde.

2) ***obesus*** *Marsh.* 3006.

Asperifoliarum Steph. — cognatus Steph. — nebulosus Steph. rufipes Steph. — subrotundatus Steph. — Coryli Gylh. — ? fulvicornis Walton — Augsburg, Leitershofen in Moos, April; Freising n. s., April bis November; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg, Hessen, im Süden des Gebietes häufiger als im Norden desselben.

3) ***retusus*** *Marsh.* 3007.

alternans Bohem. — oxyops Bohem. — Augsburg, zwei Stücke bei Leitershofen gefunden; München; Regensburg g.

4) ***lateralis*** *Payk.* 3008.

limbatus Fabr. — squamiger Dej. — sus Steph. — Passau; bei Gleisweiler in der Pfalz einige Stücke, von *Heyden.*

5) ***faber*** *Herbst.* 3009.

pilosus Herbst. — pilosellus Gylh. — limbatus Oliv. — lineolatus Meg. — latirostris Gmel. — chaetophorus Steph. — Ueberall g. auf Gesträuch, Mai bis Juli.

641. ***Foucartia*** *Jacquelin Duval.*

Foucartia ein Eigenname.

1) ***squamulata*** *Herbst.* 3010.

grisea Meg. — Passau; Regensburg g.; Fränkische Schweiz g. auf Artemisia vulgaris; Hessen, allenthalben im Gebiet n. s., Decan *Scr.*

642. ***Sciaphilus*** *Schönherr.*

skia Schatten, philos Freund.

1) ***muricatus*** *Fabr.* 3011.

asperatus Fabr. — planirostris Gmel. — pusillus Steph. — setosus Sturm. — Ueberall g. auf Bäumen Mai bis November, überwintert in Moos.

2) ***barbatulus*** *Germ.* 3012.

Augsburg, am 20. Juni 1867 auf dem Lechfelde bei Mering in grosser Anzahl gekötschert, Aschaffenburg s.

3) ***scitulus*** *Germ.* 3013.

parvulus Fabr. — punctatus Sturm. — Augsburg, Lechfeld, von *Weidenbach.*

643. *Eusomus* Germar.

eu gut, schön, soma Leib.

1) ***ovulum*** *Herm.* 3014.

alneti Meg. — Augsburg, Spickelwald, Juni, München, bei der Georgenschweige, Juni, bei Grünwald durch Streifen, August, Dr. *Kr.*; Freising h., Mai und Juni, Weihenstephan auf Gräsern; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s. h.; Hessen im Süden des Gebietes häufig, im Norden desselben selten, Decan *Scr.*

Vorzüglich auf Zwetschgenbäumen.

644. *Brachyderes* Schönherr.

brachys kurz, deris Hals.

1) ***incanus*** *Linné.* 3015.

rufipes Linn. — griseo-apterus de Geer. — testipes Schrank. — lepidopterus Schh. — Ueberall n. s., Mai bis August; Hessen im Süden des Gebietes sehr häufig, im Norden ist mir kein Fundort bekannt. (Decan *Scr.*)

Der Käfer, dessen Brut noch unbekannt, ist häufig und schädlich an Blättern junger Kiefern, weniger an Fichten, am schädlichsten an den Blättern der Birken. (Leunis.)

645. *Sitones* Germar.

sitones, Getreidekäufer.

1) ***gressorius*** *Fabr.* 3016.

Erlangen. — Sicher unrichtig bestimmt. Früher hielt man grosse griseus dafür. Kommt nur im äussersten Süden Europas vor, von *Heyden.*

2) ***griseus*** *Fabr.* 3017.

fuscus Marsh. — hinnulus Schrank. — infossor Herbst. — suturalis Herbst. — intermedius Küst. — lupinus Dahl. — palliatus Oliv. — sutura alba Oliv. — trisulcus Kirby in litt. — Augsburg; München, bei der Teichenbeize durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg g. auf Sarothamnus scoparius; Erlangen; Steigerwald s. s.; Aschaffenburg Professor Dr. *Döbner;* Frankfurt und Mombach auf Sarothamnus, von *Heyden*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

Gallus (landwirth. Centralblatt 1865. II. S. 233.) giebt an, er beschädige junge Lupinen.

3) ***longicollis*** *Fahrs.* 3018.

alpinus Motsch. in litt. — lapidicola Oeskay in litt. — Einmal bei Frankfurt, Senator von *Heyden.*

4) ***flavescens*** *Marsh.* 3019.

caninus Gylh. — obsoletus Gmel. — Augsburg n. s.; München, im Sande des Isarufers unterhalb der Bogenhauser Brücke, Mai. Maria Einsiedl, Juni, bei Lochhausen, Juni, Starnberg, Juni, Wolfrathshausen, August, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan Juli bis November, Thalhausen, April, in Isargenist, November; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s. — var. octopunctatus Fahrs. — Augsburg; Passau; Regensburg g.; Steigerwald g. — var. sulcifrons Sturm. — Augsburg; Nürnberg.

5) ***suturalis*** *Steph.* 3020.

rufipes Marsh. — Drei Exemplare bei Frankfurt von v. *Heyden* aufgefunden. — var. elegans Gylh. — albolineatus Dahl. in litt. — Passau; Regensburg s.

6) ***sulcifrons*** *Thunb.* 3021.

Medicaginis Redtenb. — argutulus Gylh. — tibialis Gylh. — campestris Oliv. — chloropus Marsh. — pleuriticus Steph. — subauratus Steph. — verecundus Rossi. — Augsburg h.; München, bei Thalkirchen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising h., Mai bis November, in Isargenist, April und November; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaffenburg s. h.; Hessen h.; — var. argutulus Schh. — Hessen h., Decan *Scr.*

7) ***tibialis*** *Herbst.* 3022.

♀ striatellus Gylh. — ♀ canus Gylh. — affinis Kirby in litt. — lineatulus Kirby in litt. — rugulosus Dillw. in litt. — Augsburg, *Gscheidlen*; München; Freising n. h., Weihenstephan von Bäumen geklopft, von Mai an, Plantagenwald in Moos, Oktober; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.; Hessen h.

8) ***ambiguus*** *Gylh.* 3023.

decorus Sturm. — lineellus var. Gylh. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Aschaffenburg s., Hessen h., Decan *Scr.*

9) ***brevicollis*** *Sahlb.* 3024.

Augsburg; Aschaffenburg n. h.

10) ***lineellus*** *Bonsd.* 3025.

occator Herbst. — Augsburg; München, bei der Georgenschwaige, Juni, bei der Bogenhauser Brücke Juni, Dietramszell, August, Rosenheim, September, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Aschaffenburg h.

11) ***crinitus*** *Oliv.* 3026.

albescens Steph. — lineellus Steph. — macularis Marsh. — nanus Gylh. — tessullatus Meg. in litt. — setulosus Meg. — Ueberall h., von März bis November, überwintert in Moos.

12) ***regensteinensis*** *Herbst.* 3027.

strumosus Sturm. — femoralis Steph. — Spartii Steph. — Ulicis Steph. — Augsburg; München; Passau; Regensburg s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald s. s.; Aschaffenburg s. Hessen, durch das ganze Gebiet verbreitet, zuweilen n. s. (Dec. *Scr.*)

13) ***lambricus*** *Steph.* 3028.

cribricollis Gylh. — constrictus Fährs. — luridus Waltl. — München.

14) ***puncticollis*** *Steph.* 3029.

insulsus Gylh. — nigricavis Marsh. — octopunctatus Germ. in litt. — Moosburg, Notar von *Sonn.*; bei Frankfurt einzeln von v. *Heyden* gesammelt.

15) ***lineatus*** *Linné.* 3030.

intersectus Fourcr. — squamosus Gmel. — geniculatus Schh. — Pisi Steph. — Ueberall g. April bis Juli. — var. elegans Schh. München.

Der Käfer ist schon im Anfange des Frühlings überall sehr häufig in Wäldern und auf Feldern, vorzüglich auf Hülsengewächsen (Ackerbohnen, Platterbsen, Erbsen) und auf Kleefeldern, wo er die jungen Blätter am Rande zerfrisst, so dass sie wie gekerbt aussehen (Leunis, der übrigens S. lineellus, promptus, discoideus, tibialis, brevicollis und ambiguus als eine Art betrachtet) Die Larven verpuppen sich in einem Gespinnste.

Die Käfer überwintern.

16) ***lateralis*** *Gyllh.* 3031.

Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg ein Stück.

17) ***discoideus*** *Gyllh.* 3032.

Augsburg, *Gscheidlen*; München (?); Regensburg g.; Nürnberg g.; Würzburg Anfang April in grosser Menge von *Berymann* gesammelt; Aschaffenburg h.; im Odenwald und bei Seligenstadt n. s., Decan *Scr.*

18) ***hispidulus*** *Fabr.* 3033.

crinitus Herbst. — haemorrhoidalis Gylh. — hirtus Gmel. — hirsutulus Sturm. — pallipes Steph. — Zusmarshausen; Augsburg g.; Oettingen; München, bei Maria Einsiedl durch Streifen, Juli, in Isargenist von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*; Freising

g., im Frühjahr und Herbste in Moos, im Sommer auf Pflanzen; November in Isargenist, im September ein Stück als Beute von Polyergus flavus erhalten, auch auf Dung gefunden; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Dinkelsbühl, September; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Würzburg in Moos, April, *Bergmann*; Aschaffenburg h.; Hessen h.

19) ***tibiellus*** *Gylh.* 3034.

trisulcatus Gylh. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; einige Stücke bei Seligenstadt, Decan *Scr.*

20) ***humeralis*** *Steph.* 3035.

Pisi Steph. — promptus Gylh. — discoideus Gyssel. — Augsburg; Freising s., Marzlinger Wiesen, September; Nürnberg ein Stück Herrenhütte, August; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall h.

21) ***inops*** *Schönh.* 3036.

Augsburg; Frankfurt s., von *Heyden*; Darmstadt s.; Dr. *Nebel.*

646. ***Metallites*** *Germar.*

metallites metallisch.

1) ***mollis*** *Germ.* 3037.

cupreoaeneus Illig. — viridinitens Knoch in litt. — Zusmarshausen; Augsburg h., Spickel auf Nadelholz, Juni; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, bei der Georgenschwaige, Juni auf der Neureuth und Gründelalpe auf Nadelholz, August, Pfliegeleck, August, im schwarzen Tänner, August, Dr. *Kr.*; Freising Attachinger Au, Mai, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg n. h.; Hessen n. s. an jungen Kiefertrieben.

Häufig auf Nadelhölzern, er beschädigt besonders Blätter und junge Triebe der Fichten und Lerchen (Leunis). Er weidet Blätter des Flieders in Gärten ab (Nördlinger).

2) ***alomarius*** *Oliv.* 3038.

aeratus Grav. — pallidus Gylh. — tibialis Meg. in litt. — Augsburg, Hainhofen, *Schweiger*; München, bei Grünwald durch Streifen, Juni, am Ammersee, Juli, im schwarzen Tänner auf Nadelholz, August, Dr. *Kr.*; Freising; Wiesenwald, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Steigerwald, ziemlich h.; Hessen n. s. an jungen Kieferntrieben.

Häufig auf Nadelhölzern und schädlich durch Abnagen der jungen Triebe. (Leunis).

3) ***iris*** *Oliv.* 3039.

ambiguus Gylh. — fulvipes Germ. — marginatus Steph. —

Mali Meg. in litt. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Regensburg g.; Hexenagger bei Regensburg, von Weidenbach; Nürnberg n. s.; Steigerwald h.; Aschaffenburg n. h.; Hessen g.

647. ***Polydrosus*** *Germar.*

polydrosos viel bethaut.

1) ***undatus*** *Fabr.* 3040.

albofasciatus Herbst. — cinereus Schall. — fulvicornis Steph. — selenens Marsh. — tereticollis Degeer. — ? rufipes Linn. — Zusmarshausen; Augsburg h., Wald bei Deuringen, von Bäumen geklopft, Mai; München, in der Au, Mai, am Wege von Elmau nach Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Wald bei Thalhausen, April, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Erlangen; Steigerwald n. s. an Birken; Aschaffenburg h.; Hessen überall h., besonders auf Eichen und Birken.

2) ***fasciatus*** *Müll.* 3041.

fulvicornis Fabr. — Penninus Bremi. — ruficornis Bonsd. — undulatus Gmel. — intermedius Zett. — Gastein.

3) ***impressifrons*** *Gylh.* 3042.

azureus St. — Augsburg; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.

4) ***flavipes*** *De Geer.* 3043.

holosericeus Sturm. — ochropus Gmel. — pallipes Meg. — argentatus var. β Bonsd. — München, bei der Bogenhauser Brücke durch Abklopfen, Juni, bei Harlaching, bei Pullach, Juni, Dr. *Kr.* Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g., Hessen n. s. (Ist fraglich ob richtig bestimmt, von *Heyden*).

5) ***arvernicus*** *Desbrouchers.* 3044.

Ein Exemplar am Feldberg im Taunus, einmal bei Homburg auf Fichten, von *Heyden.*

6) ***pterygomalis*** *Bohem.* 3045.

flavipes Marsh. — Freising g., Weihenstephan Mai, von Bäumen geklopft; Regensburg; Aschaffenburg s. s.; Hessen n. s. auf Eichen.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 71-80