Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

7) ***coruscus*** *Germ.* 3046.

herbeus Gylh. — sericatus Dahl. — sericeus Ulrich. — Augsburg, Professor *Petry*; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.

8) ***flavovirens*** *Gyll.* 3047.

sericeus Herbst. — Augsburg, Professor *Petry*; München; (Ist var. von impressifrons Gyllh., von *Heyden*).

9) ***cervinus*** *Linn.* 3048.

Iris Fabr. — messor Herbst. — Larve Bouché Stett. Zeit. 1847. p. 165. — Ueberall h., besonders an Saalweiden.

10) ***chrysomela*** *Oliv.* 3049.

pulchellus Steph. — sericeus Steph. — Nürnberg n. s. s.; Aschaffenburg s.; Hessen s. (Fraglich ob richtig bestimmt, von *Heyden.*)

11) ***confluens*** *Steph.* 3050.

amaurus Steph. — chrysomela Gylh. — perplexus Gylh. — Bei Frankfurt und Mombach von v. *Heyden*, Ober-Lais von Herrn Decan *Scr.* in Mehrzahl gesammelt.

12) ***sparsus*** *Gyll.* 3051.

subundatus Peiroleri in litt. — Bei Frankfurt von v. *Heyden* zwei Stück aufgefunden, von Stud. *Weis* bei Darmstadt in der Fasanerie einmal in Mehrzahl von Eichen geklopft.

13) ***sericeus*** *Schaller.* 3052.

formosus Mayer. — smaragdinus Meg. — speciosus Steph. — splendidus Herbst. — squamosus Knoch in litt. — ♂ malachiticus Ulrich. — ♀ auratus Ulrich. — Ueberall h. auf Obstbäumen Mai—Juli.

14) ***micans*** *Fabr.* 3053.

argentatus Fourcr. — Pomonae Ulrich. — Pyri Linné. — Zusmarshausen; Augsburg h., München, bei Grünwald Mai, bei Harlaching Juni, Dr. *Kr.*; Freising, Wald bei Thalhausen auf Bäumen, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg; Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg h., Hessen g., besonders auf Hainbuchen. An Obstbäumen und Haseln häufig und schädlich (Leunis.).

15) ***Picus*** *Fabr.* 3054.

Erlangen.

16) ***virens*** *Sturm.* 3055.

Passau (als virescens Sturm); Nürnberg *Sturm.* (fragliche Art, von *Heyden.*)

648. *Scythropus* Schönherr.

skythropus mürrisch.

1) ***Mustela*** *Herbst.* 3056.

villosulus Herbst. — Augsburg n. h.; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete, manchmal an jungen Kiefertrieben n. s.

649. *Thylacites* Germar.

thylakos Sack, Beutel.

1) ***pilosus*** *Fabr.* 3057.

licinus Herbst. — pilosulus Herbst. — Moosburg, Notar von *Sonn.* (1871); — Passau.

650. *Tanymecus* Schönherr.

tanyo ich breite aus, mycos Länge.

1) ***palliatus*** *Fabr.* 3058.

canescens Herbst. — diffinis Marsh. — glis Rosi (?) — graminicola Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; Allgäu Obergeometer *Stark*; München, bei Maria Einsiedl durch Streifen, Juni, bei Lochhausen, Juni, in den Isarauen durch Schütteln, besonders der Weiden und Pappeln, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s. Dürreneck, Juni, in Isargenist, April; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall g.

651. *Chlorophanus* Germar.

chloros grün, phanos glänzend, strahlend.

1) ***viridis*** *Linn.* 3059.

brevicollis Gyll. — inermis Gyll. — flavocinctus Degeer. — Zusmarshausen; Augsburg n. s. ‚auf Weiden; München bei der Bogenhauser Brücke und bei Maria Einsiedl durch Abklopfen der Weiden, Juni bis September, Dr. *Kr.*; Freising n. s.. Weihenstephan, Pförrer Au, Juni, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn*; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. an Weiden; Aschaffenburg s. h.; bei Seligenstadt h. am Mainufer an Weiden.

2) ***pollinosus*** *Fabr.* 3060.

prasinus Sturm. — Augsburg; München; in den Isarauen durch Schütteln der Weiden und Pappeln, Juni, bei Maria Einsiedl, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; ein Exemplar bei Crumstadt gefunden; Frankfurt, von *Heyden.*

3) ***salicivola*** *Germ.* 3061.

Augsburg n. s. s., Professor *Kuhn;* München, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Aschaffenburg h.; von v. *Heyden* bei Mombach an Weiden gesammelt; Mainz (Dr. *Zilz*).

4) ***graminicola*** *Schh.* 3062.

festivus Bess. — flavescens Herbst. — pollinosus Oliv. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; bei Mainz von v. *Heyden* gefunden.

D. Byrsopsini.

Minyops costalis Gylh. kommt sicher bei Passau nicht vor.

652. *Gronops* Schönherr.

gronos ausgehöhlt, ops Gesicht.

1) ***lunata*** *Fabr.* 3063.

elevata Fabr. — amputata Oliv. — costata Gylh. — percussor Herbst. — Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg s. s. nur einige Male gehascht, einmal bei Seligenstadt von Herrn Decan *Scr.*, einigemal bei Frankfurt von v. *Heyden* aufgefunden.

E. Rhyparosomini.

653. *Orthochaetes* Germar.

orthos gerade, chaite Mähne.

1) ***setiger*** *Beck.* 3064.

setosus Sturm. — Einige Stücke bei Seligenstadt unter Waldreben, (Clematis Vitalba) von Herrn Decan *Scr.*, bei Soden von Herrn Senator von *Heyden* aufgefunden.

F. Molytini.

654. *Liparus Olivier.*

liparos, dick, fett.

Molytes *Schönherr.*

molytes erschöpft, träge, moles Last.

1) ***coronatus*** *Gonze.* 3065.

germanus Fabr. — anglicanus Marsh. — teutonus Illig. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., im Frühjahr unter Steinen; München, bei den Kalköfen, oberhalb Thalkirchen, Juni, bei Nymphenburg, Juli, Dr. *Kr.*; Freising h., am Kirchhof, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.;* Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Bamberg; Professor *Hoffmann*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; Hessen überall h.; die vogelsberger Exemplare sind kleiner und auf den Flügeldecken ungefleckt, Decan *Scr.*

2) ***germanus*** *Linn.* 3066.

fuscomaculatus Fabr. — tigris Goetze. — Zusmarshausen; Augsburg h., auf Pappeln vor dem Wertachbrücker-Thor, Anfang Mai; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München Bogenhausen Mai, Tegernsee, April bis August, Dr. *Kr.*; Freising, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau, Nürnberg g.; Erlangen; Culmbach s. *Schmidt*; Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s.; einige Stücke bei Dietzenbach gefunden, Decan *Scr.*

3) ***carinaerostris*** *Gyllh.* 3067.

flavomaculatus Dahl. — laevirostris Gylh. — glabrirostris Köst. — Kaufbeuren, Rector *Buchner*; Immenstadt, Obergeometer *Stark*; Benediktenwand Dr. *Kummer.*

4) ***dirus*** *Herbst.* 3068

glabratus Fabr. — reticulatopunctatus Sturm. — laevigatus Gylh. — Regensburg s.; Erlangen, *Schlemmer*; Kissingen, *Hope.*

655. *Liosoma Stephens.*

leios glatt, soma Leib.

Leiosomus *Schönherr.*

1) ***ovatulum*** *Clairv.* 3069.

crassicolle Dahl. — deflexum Panz. — limatulum Duf. — neglectum Bremi. — punctatum Marsh. — Augsburg, am 20.

April 1866 zwei Stück von Weiden bei Lechhausen abgeklopft; Allgäu, Obergeometer *Stark*; von Dr. *Bose* bei Ortenburg aufgefunden; hohe Rothskopf im Vogelsberg, von *Heyden*.

656. *Meleus* Lacordaire.

meleos eitel.

1) ***Megerlei*** *Panz.* 3070.

Findeli Bohem. — Illigeri Germ. — Larve Frauenfeld Verh. zool. bot. Ver. Wien. III. 1854. pag. 351. — Passau; Rippoldsau im Schwarzwald, von *Heyden*.

657. *Plinthus* Germar.

plinthos Seite.

1) ***caliginosus*** *Fabr.* 3071.

didymus Donov. — Larve Chapuis et Cand. Mèm. Liege 1853. p. 547. — Erlangen *Schlemmer*; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald s.; Aschaffenburg s. s.; Hessen, im Süden des Gebietes weniger selten als im Norden, Decan *Scr.*

658. *Adexius* Schönherr.

1) ***scrobipennis*** *Gyllh.* 3072.

Wimpfen einmal in einem faulen Eichenast, Decan *Scr.*

G. Tanyrhynchini.

659. *Trachodes* Germar.

trachodes rauh.

1) ***hispidus*** *Linn.* 3073.

acanthion Beck. — fasciculatus Dej. — squamifer Gylh. — München; zwischen Argetsried und Gauting durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Freising, am 15. April 1867 in der Attachinger Au ein Stück aus Moos gesiebt; Erlangen; einige Stücke bei Seligenstadt unter faulenden, auf der Erde liegenden Buchenästen, Decan *Scr.*

H. Hyperini.

660. *Alophus* Schönherr.

alophos ohne Kamm.

1) ***triguttatus*** *Fabr.* 3074.

cordiger Sulz. — melanocordius Herbst. — Van Schrank. —

rufimanus Marsh. — striatirostris Marsh. — trinotatus Marsh. — Ueberall h., von März bis November.

661. ***Hypera*** *Germar.*

hypera Strick.

Phytonomus *Schönherr.*

phyton Pflanze und nemo weiden, sich nähren.

1) ***punctata*** *Fabr.* 3075.

media Marsh. — Ueberall h., Juni—November; im März bei München aus Moos erhalten, Dr. *Kr.*; var. hostilis Ziegl. — München, Dr. *Gemminger.*

2) ***fasciculata*** *Herbst.* 3076.

Dauci Oliv. — fascicularis Ziegl. — fasciculosa Gylh. — lunata Wollast. — variegata Bach. — stictica Kirby in litt. — Augsburg s.; München, zwischen Hessellohe und Pullach, durch Streifen, Juli, Dr. *Kr.*; Steigerwald s.; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

3) ***intermedia*** *Bohem.* 3077.

♂ fuscescens Bohem. — globosa Dej. — Larve Goureau Ann. fr. 1866. Bull. p. 18. — Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner.*

4) ***elegans*** *Boh.* 3078.

Passau (?).

5) ***palumbaria*** *Germ.* 3079.

austriaca Meg. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1223. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; am Wege von Rosenheim nach Tegernsee, September, Dr. *Kr.*

6) ***comata*** *Bohem.* 3080.

palumbaria Dej. — viennensis Sturm. — München; Allgäu, Lehrer *Bischoff* u. *Stark.*

7) ***tessellata*** *Herbst.* 3081.

maculata Redtenb. — Hellwigi Megerle in litt. — Larve Capiom. Revis II. t. 3. f. 2. — Heeger Sitzgsb. Wien. Acad. VII. p. 348. t. 13. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; ein Stück bei Seligenstadt gefunden, Decan *Scr.*

Die Larve lebt von den Blättern der Schafgarbe (Achillea Millefolium) (Leunis.)

8) ***contaminata*** *Herbst.* 3082.

maculosa Dej. — Moosburg, Notar von *Sonn.* (1871.)

9) ***Oxalidis*** *Herbst.* 3083.

♀ Viennensis Herbst. — ♂ monticola Bach. — croatica Dej. — mehadiensis Dahl. — tesselata Dahl. — Larve Frauenfeld. Verh. zool. bot. Ver. Wien 1863. p. 1224. — Augsburg.

10) ***elongata*** *Payk.* 3084.

mutabilis Germ. — palustris Dahl. — punctulata Ziegl. — Augsburg s.; München; Freising; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen, *Schlemmer*; Hessen n. s.

11) ***suturalis*** *Redtenb.* 3085.

Augsburg, Schwimmschule, *Schweizer*; Nürnberg, ein Stück; Darmstadt ein Stück, stud. *Weiss.*

12) ***Rumicis*** *Linn.* 3086.

Acetosae Oliv. — pyrrhodactyla Marsh. — albicans Kirby in litt. — elongata Kirby in litt. — griseola Kirby in litt. — Larve Degeer. Mem. V. p. 252. t. 7. f. 10—16. — Goureau Ann. Fr. 1844. p. 49. t. 2. nr. I. — Augsburg, Professor *Kuhn*, Schmutterthal, *Schwaiger*; Allgäu, *Stark*; München; Freising n. s.; Juni—August; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg g.; Wäldchen bei der Herrenhütte an Pappeln, August; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s.; Hessen n. h.

13) ***Pollux*** *Fabr.* 3087.

adspersa Fabr. — commaculata Herbst. — fasciolata Villens. — interrupta Marsh. — bitaeniata Kirby in litt. — Larve Bose Stett. Zeitg. 1850. p. 359. — Augsburg s.; München; Freising s.; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.* — var. histrio Bohem. — Augsburg, drei Stück; Nürnberg s. — var. Julini Schh. — Frankfurt, einzeln, von *Heyden.*

14) ***suspiciosa*** *Herbst.* 3088.

bitaeniata Marsh. — miles Payk. — Larve Kaltenbach, Verh. nat. Verh. Preuss. Rheinld. XIX. p. 75. — Augsburg s.; München; bei Maria Einsiedl, Juni, Tegernsee am Wege zum Westenhof, April, Rosenheim, September, Dr. *Kr.*; Freising s.; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg h.; Hessen n. h.

15) ***Vicinae*** *Gyll.* 3089.

grisea Dej. — nigropunctata Khuenburg in litt. — Larve Perris Mem. Ac. Lyon. 1851. p. 93. — Augsburg n. s., Ablass, Mai; München; Freising n. s., Attachinger Au, Mai; Nürnberg n. s.; Hessen n. h.

16) ***Plantaginis*** *Degeer.* 3090.

naevia Gmel. — Spartii Hoppe. — cordicollis Kirby in litt. — Larve Degeer Mem. V. p. 237. t. 7. f. 17—21. — Ueberall h. Mai und Juni aus Isargenist, von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*

Er ist leicht aus der Larve zu ziehen, die Larve verpuppt sich in einem weitmaschigen Cocon auf der Unterseite der Blätter.

17) ***murina*** *Fabr.* 3091.

elongata Steph. — nebulosa Steph. — fuscocinerea Marsh. — Plantaginis Marsh. — variabilis Wollast. — dorsigera Kirby in litt. — Larve Degeer. Isis. 1848. p. 979. t. 8. f. 1—11. — Augsburg s.; München: Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.; bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.* — var. melancholica Fabr. — München, Dr. *Gemminger.*

18) ***variabilis*** *Herbst.* 3092.

bimaculata Marsh. — murina var. Wollast. — phaeopus Steph. — picipes Steph. — postica Steph. — sublineata Steph. — villosula Steph. — interstincta Kirby in litt. — stramina Kirby in litt. — Larve Audouin, Ann. sc. nat. ser. 2. XI. p. 107. — Augsburg, Schwimmschule, *Schweiger*; München; Freising, Wald bei Thalhausen, April, bei Düreneck, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s., Herrenhütte, September; Aschaffenburg s. h.; Hessen h.

19) ***Poligoni*** *Linn.* 3093.

cinerea Oliv. — fasciata Degeer. — striata Herbst. — Ueberall n. s., Mai—August.

Die röthlich weisse Larve höhlt nach Bouché die Triebe der Gartennelken aus).

var. arator Marsh. — München, Gemminger.

20) ***Kunzii*** *Germ.* 3094.

lineata Herbst. — Dinkelsbühl an Binsen, Pfarrer *Wolff*; Marburg ein Stück, Decan *Scr.*

21) ***striata*** *Bohem.* 3095.

alternans Meg. — lineata Dahl. in litt. — Nürnberg ein Stück.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 89-96