Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

O. Corysso merini.

691. *Corysso merus* Schönherr.

korysso ich bewaffne, meros Schenkel.

1) ***capucinus*** *Beck.* 3254.

Zusmarshausen; Augsburg, Geisberg am Lech, *Schweiger*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; im Odenwald, bei Seligenstadt und in Rheinhessen einzeln von Herrn Decan *Scr.* gesammelt, bei Frankfurt von Senator von *Heyden* und stud. *Böttger*.

P. Tychini.

692. *Lignyodes* Schönherr.

lignyodes, russig, rauchig.

1) ***enucleator*** *Panz.* 3255.

bicolor Germ. — Augsburg, zwei Stück, Professor *Kuhn*; München; Freising n. h, Attachinger Au, auf Weiden, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s., Bruderwörth, bei Frankfurt von Dr. *M. Schmidt*, bei Rödelheim von *Twardowski* häufig von blühenden Eschen geklopft.

693. *Elleschus* Stephens.

elleschos bekannt, gezeichnet.

1) ***scanicus*** *Payk.* 3256.

placidus Herbst. — rubicundus Herbst. — undatus Ulr. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Passau; Regensburg n. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald n. s. auf Weiden; Aschaffenburg s., Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt sehr einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt s., von *Heyden*.

2) ***bipunctatus*** *Linn.* 3257.

ruficornis Zetterst. — unipunctatus Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Passau; Regensburg n. s. Erlangen, *Schlemmer*; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. auf Salix capra; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiete häufig auf Saalweiden, Decan *Scr.*

694. *Tychius* Schönherr.

Tychios ein Eigenname.

1) ***quinquemaculatus*** *Linn.* 3258.

quinquepunctatus Linn. — quinquepunctatus Mannerh. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Wulfertshausen, Mai; München; Ammerland, Juni; Freising h., Plantagenwald, Wald bei Wippenhausen und bei der Wiesenkirche, Mai bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h., auf Sarothamnus scoparius, Herrenhütte, August, Wibelsberg h. im Frühjahr auf Orobus vernus, Orobus niger, Vicia pisiformis und Lathyrus tuberosus; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall h.

2) ***venustus*** *Fabr.* 3259.

albolineatus Ziegl. — bivittatus Marsh. — genistaecola Chevrol. — nervosus Marsh. — parallelus Oliv. — pegaso Herbst. — vernalis Reich. — vittatus Germ. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Frankfurt s., von *Heyden.*

3) ***polylineatus*** *Germ.* 3260.

lineolatus Meg. — Augsburg; München; Erlangen, *Schlemmer.*

4) ***Schneideri*** *Herbst.* 3261.

lineatellus Schönh. — lineatulus Steph. — Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden, Decan *Scr.*, von v. *Heyden* im Frankfurter Wald und bei Falkenstein im Taunus gesammelt (lineatulus Germ.).

5) ***Genistae*** *Bohem.* 3262.

Nach von *Heyden* bei Frankfurt selten vorkommend. (var. von venustus F.)

6) ***tomentosus*** *Herbst.* 3263.

picirostris Gyllh. — Stephensi Schönh. — villosus Marsh. — Augsburg, Lechhausen, Mai; München; Freising n. s., Weihenstephan, Pförer Au, von Bäumen geklopft, Mai, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen, *Schlemmer;* Steigerwald s.; Bamberg, Professor *Hoffmann;* Aschaffenburg h.; Hessen überall h.

7) ***juncus*** *Reich.* 3264.

canescens Marsh. — suturalis Megerle in litt. — Augsburg s.; München. im englischen Garten, April, bei Bogenhausen, Mai, Dr. *Kr.;* Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg,

Strietwald, Zingenberg in der Bergstrasse in Mehrzal gesammelt, Decan *Scr.*

8) ***curtus*** *Brisout.* 3265.

flavicollis Schh. — Ein Stück im Rebstock Wald bei Frankfurt von v. *Heyden* aufgefunden.

9) ***Meliloti*** *Steph.* 3266.

raptorius Germ. — Augsburg; Freising ein Männchen; Steigerwald; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

A. Pachytychius *Jekel.*

10) ***sparsutus*** *Oliv.* 3267.

Auf Genista bei Frankfurt, Rüdesheim, Oberstein und Ems von Senator von *Heyden* gesammelt.

B. Miccotrogus *Schönherr.*

11) ***cupriferr*** *Panz.* 3268.

procerulus Kiesw. — sericeus Ulr. — Ulmi Chevrol. — Zusmarshausen; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner.*

12) ***picirostris*** *Fabr.* 3269.

cinerascens Marsh. — fuscirostris Payk. — Augsburg; München, bei der Georgenschweige gestreift, Juni, bei Bogenhausen, Mai, bei Föhring, Juni, in Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Attachinger Au, Plantagenwald von Bäumen geklopft, April bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.;* Dinkelsbühl, September; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen, *Schlemmer;* Aschaffenburg n. h.; Hessen überall h.

695. *Sibynia* *Germar.*

Sibynes *Schönherr.*

1) ***pellucens*** *Scop.* 3270.

cana Herbst. — Augsburg h., Spickel, Juni; München; Freising h., Weihenstephan, Wald bei Thalhausen, Wiesenwald, Isarufer, Mai bis August; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Aschaffenburg n. s.; bei Seligenstadt und in Rheinhessen, Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

2) ***Viscariae*** *Linn.* 3271.

Ajugae Herbst. — Augsburg, Lechfeld bei Mering, am 20. Juni; München, zwischen Brunnthal und Föhring auf einer Wiese durch Streifen, Juni, bei der Georgenschweige, Juni bei Nymphenburg, Juni, Dr. *Kr.*; Freising s. Weihenstephan, Juli; Moosburg,

Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Frankfurt, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

3) ***fugax*** *Germ.* 3272.

Nach von *Heyden* bei Frankfurt vorkommend.

4) ***villata*** *Germ.* 3273.

Ein Exemplar bei Seligenstadt gefunden, Decan *Scr.*

5) ***Potentillae*** *Germ.* 3274.

pyrrhodactyla Marsh. — villosa Marsh. — Viscariae Steph. — Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; bei Ober-Lais einige Mal, Decan *Scr.*

6) ***phalerata*** *Steph.* 3275.

arenariae Steph. — centromaculata Villa. — primita Herbst. — dorsalis Sturm. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Frankfurt, von *Heyden*.

7) ***primita*** *Herbst.* 3276.

parvula Steph. — signata Panz. Gylh. — Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; Hessen s.

Q. Clonini.

696. *Clonus* *Clairville.*

kionis Träubchen.

1) ***Scrophulariae*** *Linn.* 3277.

Blattariae Panz. — punctulatus Voet. — Larve Perris. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291. — Ueberall n. s., Juni bis September.

Seine Larven finden sich auf Scrophularia nodosa, sie sind bräunlich grün. Mitte Juli verpuppen sie sich auf der Pflanze in ein glasiges Cocon, nach drei Wochen erscheinen die Käfer. Wahrscheinlich entsteht eine doppelte Generation. In der Larve schmarotzt Chrysocharis conspicua. Das Männchen des Käfers unterscheidet sich von dem Weibchen durch ein längeres letztes Tarsenglied und ungleiche Klauen, die äussere ist kürzer als die innere.

2) ***tuberculosus*** *Scop.* 3278.

Verbasci Fabr. — Scrophulariae var. d. Latr. — Larve Bouché. Nat. Ins. 1834. p. 198. — Ueberall n. s. auf Verbascum, Juni bis September.

3) ***Olivieri*** *Rosenschld.* 3279.

Thapsus Oliv. — Augsburg, Dr. von *Weidenbach*; München; Regensburg s. s.; Nürnberg; Aschaffenburg n. s.; Babenhausen in Mehrzahl auf Wollblumen, Decan *Scr.*

4) ***similis*** *Müll.* 3280.

Thapsus Fabr. — hortulanus Fourcr. — olens Falderm. — Scrophularia Latr. — Thapsi Germ. — Larve Perris Ann. Soc. Linn. Lyon. 1849. p. 291. — Ueberall n. s. auf Verbascum. — var. hortulanus Marsh. — Ueberall n. s., Juni, Juli, auf Verbascum-Arten.

5) ***olens*** *Fabr.* 3281.

Larve Goedart. Métam. Nat. 1740. II. p. 20. Exp. 10. — Augsburg s. s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Erlangen; Darmstadt, bei der Täubcheshöhle auf Wollblumen, Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*

6) ***Blattariae*** *Fabr.* 3282.

bipustulatus Marsh. — Larve Peragallo, Ann. Fr. 1866. Bull. p. 47. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Fichtelgebirg; Fränkische Schweiz; Koppenwind s. an Scrophularia nodosa; Aschaffenburg n. h.; Hessen h.

7) ***pulchellus*** *Herbst.* 3283.

immunis Marsh. — Solani Gylh. — Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen; Aschaffenburg s.; Hessen n. h.

8) ***Solani*** *Fabr.* 3284.

perpensus Rossi. — setiger Germ. — spinosulus Meg. — setosus Hellw. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Erlangen, *Schlemmer*; Fichtelgebirg; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*

A. Stereonychus *Suffr.*

9) ***Fraxini*** *Degeer.* 3285.

foetidus Fabr. — Geeri Gmel. — Larve Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Nederl. ent Ver. II. 1858. p. 156. fig. — Augsburg, Professor *Petry*; München; Fränkische Schweiz; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*

697. *Nanophyes* Schönherr.

nanophyes zwergähnlich.

A. Sphaerula *Kiesenwetter.*

hemisphaericus *Oliv.* 3286.

Larve Dufour. — Ann. Fr. 1854. p. 651. t. 19. III. — var. mi Germ. — Regensburg n. s.

2) ***Lythri*** *Fabr.* 3287.

fasciatus Villers. — leucozonius Gmel. — Salicariae Oliv. — transversus Oliv. — vittatus Fourcr. — Ueberall h. von Mai bis November, besonders auf Lythrum Salicaria und auf Weiden. Die Larve lebt in den Stengeln von Lythrum Salicaria.

B. Nanophyes *Schönherr.*

3) ***globulus*** *Germ.* 3288.

pygmaeus Herbst. — stramineus Bach. — München; Regensburg n. s.; Erlangen, *Schlemmer;* Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

R. Gymnetrini.

698. *Gymnetron* Schönherr.

gymnos nakt, etron der Bauch.

1) ***pascuorum*** *Gyll.* 3289.

collinum Steph. — nanum Dej. — Augsburg; München; Erlangen; bei Königstein im Taunus, Senator von *Heyden.*

2) ***villosulum*** *Gyll.* 3290.

Larve Bouché. Naturg. Ins. I. 1834. p. 202. t. 10. f. 22—23. — Löw. Allg. deutsch. nat. hist. Zeitg. II. 1847. p. 290. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen, *Schlemmer*; Egloffstein h., auf Veronica Beccabunga, Juni.

3) ***Beccabungae*** *Linn.* 3291.

concinnum Gyll. — Zusmarshausen; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschbach g. an Veronica Anagallis; Seligenstadt in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr.* — var. Veronicae Germ. — nigrum Germ. in litt. — Augsburg; München; Regensburg g.; Aschaffenburg n. s.; Hessen h.

4) ***labile*** *Herbst.* 3292.

marmoratum Fourcr. — obliquum Sturm. — tricolor Marsh. — Augsburg s., Wippenhausen, Juli; München; Freising s., Plantagenwald, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*

5) ***stimulosum*** *Germ.* 3293.

Regensburg g.; mehrmals bei Seligenstadt, Decan *Scr.*

6) ***rostellum*** *Herbst.* 3294.

Augsburg s.; München; Regensburg s.; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Hanau, Dr. *Hille.*

7) ***melanarium*** *Germ.* 3295.

intaminatum Steph. — perparvulum Bohem. — Bei Seligenstadt und Ober-Lais einige Stücke gefunden, Decan *Scr.*

A. Rhinusa *Steph.*

8) ***Asellus*** *Grav.* 3296.

♀ cylindrirostre Gylh. — nasutum Rosensch. — polonicum Rosensch. — plagiatum Gylh. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Darmstadt in Mehrzahl gefunden, stud. *Weiss.*

9) ***thapsicola*** *Germ.* 3297.

München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; bei Seligenstadt auf Verbascum in Mehrzahl gefunden, Decan *Scr.*

10) ***netum*** *Germ.* 3298.

ellipticum var. ♀ Steph. — pellicum Gylh. — Passau; Ein Exemplar hat Senator von *Heyden* bei Rüdesheim gefunden.

11) ***spilotum*** *Germ.* 3299.

bimaculatum Sturm. — bipustulatum Rossi. — melaraphum Ulr. — Bei Darmstadt von Dr. *Nebel* gesammelt.

12) ***collinum*** *Gylh.* 3300.

Augsburg; bei Seligenstadt einige Mal, Decan *Scr.*

13) ***Linariae*** *Panz.* 3301.

curvirostre Rossi. — tetrum Panz. — Orontii Hellw. in litt — Larve Kaltenb. Verh. naturh. Ver. Preuss. Rheinl. 1862. p. 84. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., die Larve lebt in Anschwellungen der Wurzel von Linaria vulgaris, der Käfer ist leicht zu ziehen; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg s. h.; Rheinhessen n. s. an Leinkraut, Decan *Scr.*

14) ***litura*** *Fabr.* 3302.

Larve Heeger. Sitzgsb. Wien. Ac. 34. p. 218. t. 3. — München; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

15) ***Antirrhini*** *Payk.* 3303.

Osyridis Germ. — Larve Cornelius Stett. Zeitg. 1863. p. 117. — Augsburg; München, bei den Kalköfen oberhalb Thalkirchen, Juni, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt n. s., Decan *Scr.*

16) ***noctis*** *Herbst.* 3304.

Antirrhini Marsh. — Larve Frauenf. Verh. zool. bot. Verh. Wien. 1863 p. 1227. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Steigerwald s.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt einige Stücke, Decan *Scr.*

17) ***pilosum*** *Gyll.* 3305.

Nürnberg ein Stück; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner.*

18) ***Plantaginis*** *Eppelsheim.* 3306.

Rheinpfalz.

699. ***Miarus*** *Stephens.*

miaros gefleckt.

Cleopus *Suffrian.*

1) ***graminis*** *Gyll.* 3307.

ellipticus Herbst. — Augsburg n. s., Leitershofen; München; Ammerland, Juni; Freising h., Attachinger Au, Pförer Au, April bis Juli; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Allgäu, *Stark.*

2) ***Campanulae*** *Linn.* 3308.

acephalus Marsh. — fossarum Meg. — Linariae Ziegl. — Ranunculi Müll. — Larve Laboulb. Ann. Fr. 1858. p. 900. t. 17. I. — Augsburg n. s.; München; Tegernsee im Lerchenwald, August, Miesbach, August, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Pförer Au, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald h. in den Blüten von Campanula-Arten; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; Hessen überall h., Allgäu, *Stark.*

3) ***micros*** *Germ.* 3309.

Von v. *Heyden* bei Frankfurt einmal auf Erica gefunden.

4) ***plantarum*** *Germ.* 3310.

acephalus Marsh. (pars.) — somnulentus Villa. — Regensburg s., bei Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*

8. Cryptorhynchini.

700. *Orobitis Germar.*

orobites einer Kichererbse ähnlich.

1) ***cyaneus*** *Linn.* 3311.

globosus Fabr. — giganteus Meg. — hypoleucus Quens. — Zusmarshausen; München; Freising n. s., April bis Juli; Attachinger Au; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. h. Fälzner Weiher auf Weiden, August; Steigerwald ziemlich s. im Grase; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s. s., auf jungen Waldschlägen; Hessen im ganzen Gebiete n. h.

701. *Camptorhinus Schönherr.*

kamptos biegsam, gebogen, rhin Nase.

1) ***statua*** *Rossi.* 3312.

Erlangen; Aschaffenburg s. s., Sehmerlenbacher Wald, bei Soden im Winterschlaf gesellig unter der Rinde von Eichen und zahmen Castanien aufgefunden, Senator von *Heyden*; Ober-Lais einige Mal an alten Eichen gefunden, Decan *Scr.*

702. *Acalles Schönherr.*

akalles missgestaltet.

1) ***Camelus*** *Fabr.* 3313.

Quercus Bohem. — Ein Stück im Bonfelder Wald bei Wimpfen an einem morschen Eichenaste gefunden (*Scr.*)

2) ***Aubei*** *Bohem.* 3314.

Wolfi Waltl in litt. — Nürnberg, ein Stück an einer Eiche auf dem Schmausenbuck, August.

3) ***Roboris*** *Curtis.* 3315.

abstersus Bohem. — Naviersi Bohem. — variegatus Steph. — Aschaffenburg, Professor *Oechsner*, Taunus, einmal gefunden, Senator von *Heyden.*

4) ***Lemur*** *Germ.* 3316.

sulcatus Bohem. — fallax Bohem. — Moosburg, Notar v. *Sonn.*

5) ***turbatus*** *Bohem.* 3317.

ptinoides Latr. — Aschaffenburg s.; Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*

6) ***ptinoides*** *Marsh.* 3318.

nocturnus Boh. — Erlangen, *Schlemmer*; Frankfurt ein Stück Senator von *Heyden*; Giessen ein Stück, *Laubenheimer.*

7) ***hypocritus*** *Bohem.* 3319.

München; oberhalb Maria Einsiedl unter Buchenrinde, Dr. *Gemminger*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Fränkische Schweiz; Ems unter Rubus-Gesträuch ein Exemplar, Senator von *Heyden.*

703. ***Gasterocercus*** *Laporte.*

gaster Bauch, kerkos Schweif.

1) ***depressirostris*** *Fabr.* 3320.

anthripoides Chevrol. — Dumerili Lap. et Brullé. — oblitus Dej. — plicatus Herbst. — *Reissig* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer* fanden diesen seltenen Käfer einzeln bei Darmstadt im Holzhofe; *Stern* in Frankfurt a. M. hat ihn in vielen Exemplaren aus Holz erzogen.

704. ***Cryptorhinchus*** *Illiger.*

kryptos verborgen, rhynchos Rüssel.

1) ***Lapathi*** *Linn.* 3321.

albicaudis Deg. — albipodex Voet. — trimaculatus Panz. — carbonarius Scop. — Larve Curtis. Trans. Linn. Soc. I. 1791. p. 86. t. 5. — Zusmarshausen; Augsburg n. s. an Weiden und Erlen; München; Geiselgasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Lauingen a. d. Donau; Passau; Regensburg; Nürnberg, Schmausenbuck, August; Erlangen; Weiden und Culmbach n. h., *Schmidt*; Fichtelgebirg; Steigerwald s. an Rumex-Arten; Aschaffenburg; Hessen im ganzen Gebiet, manchmal häufig auf Weiden vorkommend.

Die Larve lebt auf Weiden und jungen Erlen. Die Eier werden vom Weibchen im Mai nahe an der Erde in die Rinde gelegt, gewöhnlich an jungen Erlen, und die alsbald ausschlüpfende Larve bohrt sich in das Innere und nach oben, kehrt sich zur Verpuppung am Ende des Ganges um, und nach 14 Tagen Puppen-

ruhe ist der Käfer fertig, der aber, selbst wenn er zur hohen Sommerszeit zur Vollendung kam, seine Geburtsstätte nicht eher verlässt als im nächsten Frühjahre. Die Larve braucht wahrscheinlich ein Jahr zu ihrer Entwicklung. Sie hat in ihrem Körperbau nichsts Abweichendes von andern Rüsselkäferlarven. Die jungen Loden müssen desshalb abgetrieben werden.

T. Rhamphini.

705. *Rhamphus* Clairville.

ramphos Schnabel.

1) ***flavicornis*** *Clairv.* 3322.

Oxyacanthae Marsh. — pulicarius Payk. — Larve Heyden. Berl. Zeit. 1862. p. 63. — Augsburg n. s.; München bei Bogenhausen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising s.; Weihenstephan, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschbach n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen durchs ganze Gebiet vorkommend. Nach von *Heydens* Beobachtungen minirt die Larve in Kirschen, Birnen, Schlehen und Birkenblättern.

2) ***aeneus*** *Bohem.* 3323.

subaeneus Illig. — Regensburg n. s.; Deidesheim in der Pfalz (Dr. *Eppelsheim*).

U. Ceutorhynchini.

706. *Mononychus* Schönherr.

monos allein, eine, onyx Klaue.

1) ***punctum-album*** *Herbst.* 3324.

Pseudacori Fabr. — Salviae Germ. — deauratus Dahl. — Larve Westw. Introd. 1839. I. p. 345. fig. 41. 20. — Augsburg, *Gscheidlen*; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg s. s.; einige Exemplare aus dem Moorgrund bei Dettingen auf Iris Pseudacorus; Darmstadt Oberstlieutenant *Klingelhöffer* und Dr. *Nebel.*

707. *Coeliodes* Schönherr.

koliodes bauchig.

1) ***trifasciatus*** *Bach.* 3325.

Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden, Decan *Scr.*

2) **rubber** *Marsh.* 3326.

Quercus Oliv. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Steigerwald s.; Ober-Lais einzeln gesammelt, Decan *Scr.*, Ortenburg, Dr. *Bose.*

3) **rubicundus** *Payk.* 3327.

Zusmarshausen; Augsburg; München, bei der Bogenhauser Brücke, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Steigerwald s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s. s.; Frankfurt, von *Heyden*; Ortenburg, Dr. *Bose.*

4) **Epilobii** *Payk.* 3328.

Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer*; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Döbner*; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*

5) **Cardui** *Herbst.* 3329.

guttula Fabr. — guttula var. b. Gylh. — canaliculatus Gylh. — umbrinus Gylh. — carduelis Meg. in litt. — fuliginosus Marsh. — ruficornis Steph. — Hedenborgi Bohem. — Pruni Bohem. — Larve Rupertsb. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1870. p. 837. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Passau; Nürnberg n. h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenburg, Dr. *Bose.*

6) **fuliginosus** *Marsh.* 3330.

Pruni Bohem. — umbrinus Gylh. — canaliculatus Gylh. — Augsburg, Spickel in Moos, December; München; Freising n. s., Wald bei Thalhausen, April, Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg s.; bei Seligenstadt und Frankfurt n. s., Decan *Scr.* Wird von Herrn Dr. *Gemminger* zu Cardui Herbst (guttula Fabr.) gezogen.

7) **erythroleucos** *Gmel.* 3331.

subrufus Herbst. — cinctus Rossi. — tricinctus Walkenaer. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Weihenstephan und Wald bei Thalhausen von Bäumen geklopft, Mai; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s., Wäldchen bei der Herrenhütte von niederen Pflanzen gestreift, August, September; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiet vorkommend.

8) **Lamii** *Fabr.* 3332.

leucampyx Germ. — melanostictus Dahl. — variegatus Ziegl. — Augsburg, Spickel, November; München; Freising n. h., Wald bei Wippenhausen, August; Regensburg n. s.; Eichstädt; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen, *Schlemmer*; Steigerwald s. s.; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Taunus

von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*. — var. punctulum Herbst. — Regensburg s.

9) ***Geranii*** *Payk.* 3333.

affinis Payk. — exiguus Oliv. — lima Meg. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, *Stark*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg h., auf Geranium pratense, Professor Dr. *Döbner*; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Wimpfen, Pfarrer *Wolff*; am Staufstein im Vogelsberg h., von *Heyden*.

10) ***exiguus*** *Oliv.* 3334.

Augsburg; Regensburg n. s.; Marburg ein Exemplar. Wird von Herrn Dr. *Gemminger* zu Geranii gezogen.

708. *Megacoetes* Thomson.

megaketes sehr ausgehöhlt.

1) ***dryados*** *Gmel.* 3335.

Quercus Fabr. — rana Fabr. — pallens Marsh. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Wald bei Thalhausen von Bäumen geklopft, April; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s., Oktober; Erlangen; Aschaffenburg s.; Hessen n. s.

2) ***quadrimaculatus*** *Linn.* 3336.

didymus Fabr. — albopunctatus Goeze. Gmel. — bipunctatus Gmel. — ♂ oleraceus Scop. — tripunctatus Fourcr. — Urticae Schrank — urticarius Clairv. — viduus Panz. — Larve Goureau. Ann. Fr. 1866. p. 172. — Ueberall h.

709. *Scleropterus* Schönherr.

skleros hart, pteron Flügel.

1) ***serratus*** *Germ.* 3337.

Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln, Decan *Scr.* (als Scl. globulus Herbst.)

710. *Ceutorhynchus* Germar.

keutho ich verberge, rhynchos Rüssel.

1) ***macula alba*** *Herbst.* 3338.

Cardui Oliv. — seriatus Bohem. — Larve Klingelh. Stett. Zeit. 1843. p. 88. — Augsburg; Regensburg s.; Nürnberg, ein

Stück; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt einzeln, von *Heyden;* Darmstadt, Dr. *Nebel.*

Die Larve lebt in Mohnköpfen, oft sind 6—7 Larven in einem Mohnkopfe, dessen Samen alle von ihnen gefressen werden. Zur Zeit der Fruchtreife beissen sie ein Loch in die Kapsel, fallen zur Erde, graben sich 16 Cent. tief ein, verpuppen sich in einem ovalen ausgesponnenen Kokon; nach 20—25 Tagen erscheint der Käfer (*Klingelhöffer*).

2) ***sulcicollis*** *Fabr.* 3339.

Zusmarshausen; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h., Wäldchen bei der Herrenhütte, August, November; Erlangen; Aschbach und Ebrach n. s. an Allium cepa; Aschaffenburg s., Professor Dr. *Döbner*; Ortenburg, Dr. *Böse*; Ober-Lais s., Decan *Scr.*

3) ***alboscutellatus*** *Gyll.* 3340.

aegrotus Gyll. — consputus Germ. — rubescens Bohem. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen, *Schlemmer.*

4) ***arator*** *Gyll.* 3341.

cinerascens Nees v. Esenbeck. — glabrirostris Gyll. — inaffectatus Gyll. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einige Stücke, Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 147-160