Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

G. Lyctini.

549. *Lyctus* Fabricius.

lyge Schatten, Finsterniss; Lyctus eine Stadt auf Creta.

1) ***canaliculatus*** *Fabr.* 2705.

fuscus Linné (Silpha). — oblongus Oliv. — unipunctatus Herbst. — Augsburg n. s.; München; Freising n. s., in abgestorbenem Holze von Eschen, Eichen, Akazien und Nussbaum; die Larve verwandelt den Splint oft ganz in Wurmmehl; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg g., an Daubholz.

2) ***pubescens*** *Panz.* 2706.

subarmatus Meg. — Larve Heeger. Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 938. t. 5. f. 1—10. — Zusmarshausen; Augsburg, Professor *Petry*; Regensburg s.; Frankfurt, Senator von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Harxheim in Rheinhessen einzeln, Decan *Scriba*.

3) ***bicolor*** *Camolli.* 2707.

Frankfurt, öfter in Weidenholz, Senator *von Heyden.*

A. Xylotrogus Stephens.

xylon Holz, trogo ich nage.

4) ***brunneus*** *Stephens.* 2708.

Freising, *Mittermeier*; Nürnberg von Herrn Oberlieutenant *Angerer* aus Rosenholz von Cuba gezogen.

Die Larve des Splintkäfers, *Lyctus canaliculatus* ist stark gekrümmt, weiss, 3,7 Millimeter lang, vorn 1,9 Millimeter breit; sie besitzt einen durchsichtigen Kopf mit braunem Munde, die festen Leibesringe sind verhältnissmässig dick, mit drei Paar weissen, behaarten Beinen; der Bauch ist platt, beinahe hohl. Sie gleicht der Larve von *Anobium striatum*, noch mehr der von *Apate*. Die Puppe ist 4,8 Millimeter lang, 1,4 Millimeter breit,

weiss mit braunen Augen; die Fühler sind ganz wie bei dem vollkommenen Insekte. Der Hinterleib ist stark zugespitzt. Die Entwicklung des Käfers ist eine einjährige, er haust so lange in demselben Holzpflocke, bis derselbe ganz zerstört ist. Im mineralogischen Museum von Paris hat er von einem eichenen Schreinwerk alles zerstört, was nicht gutes Kernholz war. Er kommt zuweilen in Zimmer, und fliegt schwirrend herum, legt oft seine Eier an eichene Fensterrahmen. Auch in Zürgelbaumholz (*Celtis australis*) entwickelte sich schon der Käfer.

550. ***Hendecatomus*** *Mellié.*

hendeka elf, tomon Glied.

Dictyalotus Redtenbacher.

1) ***reticulatus*** *Herbst.* 2709.

rugosus Randall. — München.

II. Cisini.

551. ***Rhopalodontus*** *Mellié.*

rhopalon Keule, odus Zahn.

1) ***perforatus*** *Gyllh.* 2710.

villosus Parreys. — Larve Ann. Fr. 1849. Bull. p. 40. — München; Freising; Moosburg in Schwamm in grosser Anzahl, Notar *von Sonn.*; Erlangen einmal in grosser Menge in morschem Holz.

2) ***fronticornis*** *Panz.* 2711.

♀ minutus Peyrol in litt. — München, bei Tegernsee in einem Baumschwamme, Oktober, Dr. *Kr.*; Ober-Lais und Darmstadt n. s., Decan *Scr.*

552. ***Cis*** *Latreille.*

kis Holzwurm, Kornwurm.

Hadraule *Thomson.*

1) ***Boleti*** *Scopoli.* 2712.

boletorum Marsh. — picipes Herbst. — Zusmarshausen; Augsburg h., aus holzigen Boletusarten erzogen; München; Grünwald, Mai, Ebenhausen, Juni, Königsalpe, Juli, Dr. *Kr.*; Freising h. ge-

zogen, die Larve verpuppt sich in ein längliches, weisses Cocon, Isarufer unter Moos März, die Larve zerstörte die Pilze meines Herbars; Moosburg, Notar von *Sonn*; Passau; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald g. in Baumschwämmen; Würzburg; Aschaffenburg g.

2) ***rugulosus*** *Mellié.* 2713.

Frankfurt ein Stück, Niederwald, von *Heyden.* (Er ist var. von boleti Scop. von *Heyden.*)

3) ***seliger*** *Mellié.* 2714.

villosulus Marsh. — plagiatus Thoms. — Frankfurt, zwei Stück, *von Heyden.*

4) ***micans*** *Fabr.* 2715.

villosus Marsh. — Zusmarshausen; München; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.;* Darmstadt, Dr. *Nebel*; Frankfurt, von *Heyden.*

5) ***hispidus*** *Payk.* 2716.

micans Illig. — ruficornis Marsh. — festivus Sturm in litt. — Augsburg n. s., Lechfeld bei Mering, Juni; München; Freising n. s., Attachinger Au in Moos, April, Marzlinger Wiese in einem Eichenschwamm, April, in Mulm, September, auch in meinem Herbarium als Zerstörer der Pilze; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Eichstädt; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald s., in Baumschwämmen; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

6) ***striatulus*** *Mellié.* 2717.

flavipes Lucas. — Frankfurt, zwei Exemplare, *von Heyden.*

7) ***comptus*** *Gyllh.* 2718.

ciliatus Fairm. in litt. — Augsburg ein Stück am 20. April aus Moos von Deuringen; Nürnberg n. s., die Larve zerstörte die Pilze meines Herbariums; Frankfurt einige Mal, Senator von *Heyden*; Ober-Lais in Mehrzahl, Decan *Scr.*

8) ***elongatulus*** *Gyllh.* 2719.

Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.* (Sehr fraglich ob richtig bestimmt, da nur der typ. bekannt ist, von *Heyden.*)

9) ***bidentatus*** *Oliv.* 2720.

♀ inermis Marsh. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*, auf dem Lechberg bei Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.;* Frankfurt, Senator von *Heyden;* Ober-Lais in Mehrzahl, Decan *Scr.*; Frankfurt von *Heyden.*

10) ***nitidus*** *Herbst.* 2721.

contractus Dej. — Zusmarshausen; Augsburg; München, an Schwämmen alter Stöcke bei der Menterschwaige, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Weihenstephan, ein Stück aus Weidenmoder, Juli; Passau; Erlangen; Steigerwald n. s.; Frankfurt h. in morschem Fichtenholz, von *Heyden.*

11) ***glabratus*** *Mellié.* 2722.

Allgäu, in Menge, Obergeometer *Stark*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Schwarzwald.

12) ***Alni*** *Gyllh.* 2723.

punctulatus Lucas. — aphodioides Chevrol. in litt. — Larve Chap. et Cand. Mém. Liége. 1853. t. 6. f. 4. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg s.; Erlangen; Hessen n. h., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.* — var. recticollis Mellie. — Frankfurt, ein Stück, von *Heyden.*

13) ***festivus*** *Panz.* 2724.

micans Ullr. — vestitus Schönh. — substriatus Gysselen. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Aschaffenburg n. s.; Hessen h., Decan *Scr.*

14) ***castaneus*** *Mellié.* 2725.

Frankfurt und Zwingenberg in der Bergstrasse, von *Heyden.*

553. ***Ennearthron*** *Mellié.*

ennea neun, arthron Glied.

Entypus *Redtenbacher.*

1) ***cornutum*** *Gyllh.* 2726.

Larve Perris Ann. Fr. 1854. p. 639. t. 18. f. 290–298; 1862. p. 213. — Zusmarshausen; Augsburg am Lechufer, *Schweiger*; Passau, Dr. *Waltl*; Aschaffenburg s.; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

2) ***affine*** *Gyllh.* 2727.

fronticorne Ullrich. — Larve Mellié. Mon. p. 365. — Augsburg n. s., Deuringen; Immenstadt, Obergeometer *Stark*; München in Schwämmen alter Stöcke in der Leiten bei der Menterschweige, Mai, bei Maria-Einsiedl, Mai, Geiselgasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h., Isarufer an Baumschwämmen, Marzlinger Wiesen

unter Eichenrinde, April, und in Mulm, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

3) ***laricinum*** *Mellié.* 2728.

München; Erlangen.

554. ***Orophius*** *Redtenbacher.*

orophos bedeckt.

1) ***mandibularis*** *Gyllh.* 2729.

inaequidens Chevrol. — nasicornis Dej. — Augsburg; München; Erlangen. (Orophius und Octotemnus bilden ein genus, Octotemnus Mellié, von *Heyden.*)

557. ***Octotemnus*** *Mellié.*

octo acht, temno ich schneide ein.

1) ***glabriculus*** *Gyllh.* 2730.

rotundicollis Dej. — politus Gysselen. — Augsburg in grosser Anzahl an Baumschwämmen bei Leitershofen, April, von Herrn *Schweiger* in Weidenschwämmen gesammelt; München, auf dem Lechberg bei Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h, Isarufer an Baumschwämmen, März, Marzlinger Wiesen in Mulm, Oktober; Passau, *Kittel*; Erlangen; Hessen n. s., Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden.*

In Baiern finden sich 91 Arten, 1 Varietät; 536 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XXXVII. TENEBRIONIDAE.

Tentyria rotundata Brullé kommt sicher nicht bei Passau vor.

A. Blaptini.

556. ***Blaps*** *Fabricius.*

blapto ich schade.

1) ***mucronata*** *Latr.* 2731.

obtusa Sturm. — Chevrolati Solier. — mortisaga Oliv. — plicaticollis Ménétr. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*;

Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschbach und Ebrach s. in Häusern; Frankfurt n. s. in Pferdeställen, von *Heyden*; Mainz ein Stück, Decan *Scr.*

2) ***mortisaga*** *Linné.* 2732.

acuminata De Geer. — canaliculata Fisch. — foetida Mouffet. — officinarum Dalesch. — Larve Westw. Introd. I. 1839. p. 321. Nr. 39. f. 11. (forte) — Zusmarshausen; Augsburg; München, im Hause, Mai, Dr. *Kr.*; Freising n. s., August; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg s. h. in Häusern, April bis Herbst; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Weiden h., in Teichen, *Schmidt*; Fichtelgebirg; Aschbach und Ebrach n. s. in Häusern; Würzburg; Aschaffenburg h.

3) ***similis*** *Latr.* 2733.

fatidica Sturm. — mortisaga Dumeril. — opaca Falderm. — subquadrata Brullé. — perotapha Ménétr. — Larve Perris Ann. Fr. 1852. p. 609. t. 15. III. f. 20. 21. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg n. h.; Erlangen; Aschaffenburg n. h.

Die Nahrung der Todtenkäfer besteht in vermodernden vegetabilischen Abfällen. Das Erscheinen derselben wird in manchen Gegenden als die Vorbedeutung eines Todesfalles angesehen. Die Thiere verbreiten, wenn sie ergriffen werden, einen unangenehmen Geruch.

B. Crypticini.

557. *Cryptícus* *Latreille.*

kryptikos verborgen.

1) ***quisquilius*** *Linné.* 2734.

glaber Fabr. — laticollis Panz. — luctuosus Schrank. — caucasicus Ménétr. — pusillus Herbst. — niger Fourer. — Larve Bouché. Naturg. d. Ins. 134. p. 191. — Zusmarshausen; Freising n. s., auf der Stiege am Sporrer Keller; Regensburg s.; Nürnberg h., im Sommer an sandigen Stellen z. B. Duzenteich; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s. s.

C. Pedinini.

558. *Pedinus* Latreille.

pedinos flach.

1) ***helopodioides*** *Ahrens.* 2735.

gibbosus Gory. — laticollis Ziegl. — Passau (?).

2) ***femoralis*** *Linné.* 2736.

gemellatus Fourcr. — ♀ dermestoides Fabr. — ♀ laevigatus Panz. — ♂ femoratus Illig. — Regensburg s.

D. Opatrini.

559. *Opatrum* Fabricius.

hopatros von demselben Vater.

Hopatrum *Fabricius.*

1) ***sabulosum*** *Linné.* 2737.

rugosum De Geer. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Marsfeld h., Mai, im englischen Garten, April, Strasse nach Nymphenburg, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, bei der Turnschule auf dem Weg, März, bei der Grasanstalt auf dem Weg, April; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s g.; Eichstädt; Nürnberg g.; Herrenhütte, Mögeldorf, bei Fürth im Sande, September; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g. in sandigen Gegenden; Würzburg, *Bergmann*; Aschaffenburg s. h.

2) ***riparium*** *Klghfr.* 2738.

Allgäu, Obergeometer *Stark*; Rheingenist in mehreren Exemplaren, Oberstlieutenant *Klinge/höffer.* Es ist dem *O. sabulosum* sehr ähnlich, und unterscheidet sich durch folgende Merkmale: die Ausrandung des Kopfschildes ist mehr gerundet, das Halsschild nicht gleichförmig gekörnt, das Schildchen weniger dick und schwächer punktirt, die Flügeldecken einzelner gekörnt, und der Enddorn der Vorderschienen ist kräftiger als bei *O. sabulosum.*

3) ***pusillum*** *Fabr.* 2739.

agricola Rossi. — Regensburg s.

560. *Microzoum* *Redtenbacher.*

mikros klein, zoon Thier.

1) ***tibiale*** *Fabr.* 2740.

quisquiliarum Herbst. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

E. Bolitophagini.

561. *Bolitophagus* *Illiger.*

bolitos Schwamm, phago ich verzehre.

1) ***reticulatus*** *Linné.* 2741.

crenatus Fabr. — gibbus Panz. — cornutus Thunbg. — Augsburg; München, in der Au an einem sehr trockenen harten Baumschwamme, Mai, Dr. *Kr.*; Passau; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. in faulen Baumspitzen; aus Holzschwämmen, die aus Südbaiern stammten in Masse erzogen, Professor Dr. *Döbner.*

2) ***interruptus*** *Illig.* 2742.

Goedeni Panz. — Baden-Baden in einem Schwamme in grosser Anzahl gesammelt, Senator von *Heyden.*

3) ***armatus*** *Panz.* 2743.

München, an einer gefällten morschen Linde in grosser Anzahl, Dr. *Gemminger*; Erlangen.

562. *Eledona* *Latreille.*

hele Wärme, hedone Freude.

Heledona *Latreille.*

1) ***agricola*** *Herbst.* 2744.

agricola Banz. — Oliv. — sulcata Thunbg. — Larve Dufour. Ann. sc. nat. 1843. p. 284. t. 12. f. 1—9. — Erichs. Wiegm. Arch. 1842. p. 365. — Zusmarshausen; Augsburg; München im englischen Garten in modernden Baumschwämmen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, in grosser Anzahl bei Haindelfing in einem Pilze von

Salix alba, September; Passau; Regensburg s.; Nürnberg h., in Baumschwämmen; Erlangen; Steigerwald g., in Baumschwämmen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg.

F. Diaperini.

563. ***Diaperis*** *Geoffroy.*

diapeiro ich durchbohre.

1) ***boleti*** *Linné.* 2745.

fasciata Scop. — morio Stanz. — Larve Dufour. Ann. sc. nat. XX. 1843. p. 290. t. 12. B f. 10—14. — Muls. Col. Fr. 1854. Latig. p. 208. — Zusmarshausen; Augsburg; München, an der Eisenbahn, Mai, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fränkische Schweiz; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s.

Die drahtwurmartige Larve lebt in Baumschwämmen, wo sie einmal vorkommt in zahlreichen Gesellschaften.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeige.

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus

Neu-Seeland

erhaltene Bälge von

Apteryx Oweni *(Kiwi)* und

Stringops habroptilus *(Höhlenpapagei)*,

sowie **2 Skelette** des Letzteren, kann ich zu äusserst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms.

Hamburg-Borgfelde. Am Burggarten Nr. 1.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): unbekannt unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 104-112