Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

564. *Scaphidema* Redtenbacher.

skaphe Kahn, demas Körper.

1) ***metallicum*** *Fabr.* 2746.

bicolor Fabr. — aeneum Payk. — ahenum Marsh. — Larve Westwood. Introd mod. Class. Ins. I. p. 314. f. 37. Nr. 11—19. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn*; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt s., Decan *Scr.*; Frankfurt, *M. Schmidt*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

565. *Platydema* Laporte.

platys breit demas Leib.

1) ***violaceum*** *Fabr.* 2747.

dytiscoides Rossi. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 346. — München; Regensburg s. s.; Aschaffenburg s. s., nur einmal in der Fasanerie; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Lieutenant *Scr.*

566. *Pentaphyllus* Latreille.

penta fünf, phyllon Blatt.

1) ***testaceus*** *Hellwig.* 2748.

Larve Erichs. Wiegm. Arch. 1842. I. p. 366. — Letzn. Arb. schles. Ges. 1853. p. 218. f. 39—40. — Erlangen s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Hessen n. s. s, in hohlfaulem trockenem Eichenholz Decan *Scr.*

G. Ulomini.

567. *Tribolium* Mac Leay.

tris dreimal bole Wurf, Wegwurf.

Margus Redtenbacher.

1) ***ferrugineum*** *Fabr.* 2749.

navale Fabr. — testaceum Fabr. — castaneum Herbst — cinnamomeum Herbst. — Larve Westw. Introd. mod. Class. Ins. I. p. 319. f. 39. Nr. 2. — Lucas Ann. Fr. 1855. p. 249. t. 13. III.

— München; Passau, Dr. *Waltl*; Nürnberg, von Buchbinder Welldes eine grosse Partie Käfer erhalten, welche sich in einem Mehlwurmhafen entwickelt hatte; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt in Spezereiwaaren, Decan *Scr.*; Frankfurt, unter Rinde, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

Er fand sich in Menge in ausländischem, 1847 nach Schwaben gekommenen Getreide. (*Nördlinger.*) *Gnathoncus cornutus* s. (*G. ruber* Thunbg. *cucullatus* Montrouz.) (Larve Gernet Hor. ent. Russ.) wird zuweilen aus Südeuropa mit Getreide verschleppt, z. B. nach England (*Nördlinger*) und dürfte sich wohl auch in Baiern noch vorfinden.

568. ***Hypophloeus*** *Hellwig.*

hypo unter, phloios Rinde.

1) ***depressus*** *Fabr.* 2750.

melinus Herbst. — unicolor Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.

2) ***castaneus*** *Fabr.* 2751.

picipes Fabr. — cimeterius Herbst. — taxicornis Rossi. — nitidus Melsh. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Pullach, Mai, zwischen der Menterschweige und Geiselgasteig an Buchen, August, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschbach ziemlich s. unter Buchenrinde; Aschaffenburg n. s. unter Rinden.

3) ***Fraxini*** *Kugelann.* 2752.

ferrugineus Crentz. — Pini Zetterst. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 351. t. 8. f. 430—438. — München; Aschaffenburg s.; im Frankfurter Walde zwei Exemplare unter Kiefernrinde, von *Heyden.*

4) ***Pini*** *Panz.* 2753.

nocivus Wollast. — Augsburg; München; Regensburg s.; Eichstädt.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 127-128