Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

5) ***longulus*** *Gyllh.* 2754.

Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Frankfurt.

6) ***rufulus*** *Rosenh.* 2755.

Augsburg; Erlangen; Darmstadt ein Exemplar, *Reissig*.

7) ***bicolor*** *Oliv.* 2756.

Larve Westw. Introd. mod. Class. I. p. 315. f. 38. m. 6. — München; Passau; Regensburg s.; Frankfurt n. s., Decan *Scr.*

8) ***fasciatus*** *Fabr.* 2757.

Augsburg; München; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden*; Heidelberg.

9) ***linearis*** *Fabr.* 2758.

Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 458. t. 8. f. 439—443. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Aschaffenburg s.; in grosser Anzahl aus dürrem Waldholz erzogen, von *Heyden*.

569. *Uloma* *Castelnau.*

uloo ich werde verwundet hinweggeführt.

1) ***culinaris*** *Linné.* 2759.

♀ ferruginea Panz. — rufa Pill. — Zusmarshausen; Augsburg: München, in alten Stöcken auf dem Lehberg, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg s., Schmerlenbacher Wald; Ober-Lais n. s., in morschem Buchenholz, Decan *Scr.*; Frankfurt, an morschen Apfelbäumen, Dr. *Haag*; Schwanheimer Wald, an einer alten Eiche, von *Heyden*.

Er soll auch an Fleischwaaren vorkommen. (*Nördlinger.*)

570. *Alphitobius* *Stephens.*

alphiton Mehl, bioo ich lebe.

1) ***diaperinus*** *Panz.* 2760.

mauritanicus Curtis. — opatrinus Sturm. — opatroides Brullé. — ovatus Herbst — unicolor Ulrich. — Larve Lucas Ann. Fr. 1848. Bull. p. XIII. — München; Erlangen.

Er fand sich in ziemlicher Menge in dem fremden Getreide, das in den letzten Theuerungsjahren aus Egypten und America nach Würtemberg gekommen war. (*Nördlinger.*)

II. Tenebrionini.

571. *Tenebrio* Linné.

Tenebrio ein lichtscheuer Mensch, Dunkelmann, Schwindler.

1) ***opacus*** *Duftschm.* 2761.

Larve Muls et Guilleb. Ann. soc. Linn. Lyon. 1855. p. 9. — Nürnberg; Frankfurt und Soden, von *Heyden*; Ober-Lais im Mulme hohler Bäume, Decan *Scr.*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

2) ***obscurus*** *Fabr.* 2762.

granarius Hentz. — tristis Haldem. — atterrimus Schneider in litt. — Larve Curtis. Brit. Ent. VII. t 331 — Muls. Col. Fr. 1854. p. 186 München, Passau, Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald ziemlich h. in Häusern: Aschaffenburg n. h.; Hessen n s., Decan *Scr.*; Frankfurt n. s. in Pferdeställen, zusammen mit *Blaps mucronata* von *Heyden*.

3) ***molitor*** *Linné.* 2763.

molitorius Fourcr. — punctulatus Hentz. — Larve Muls. Col. Fr. 1854. Latig. p. 281. — Ueberall s. g. in Mehl und in Häusern.

4) ***picipes*** *Herbst.* 2764.

transversalis Duftschm. — noctivagus Muls. et Rey. — laticollis Steph. — Larve Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 11. — Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt einzeln, Senator von *Heyden*.

Die Larve des Mehlkäfers, *Tenebrio molitor Linné*, der Mehlwurm, ist hart, glänzend, von gelber Farbe; sie besitzt einen gewölbten Kopf, drei Paar viergliederige Beine, am Schwanze oben zwei hornige feine Spitzen, unten zwei warzige Nachschieber. Ihre Nahrung besteht in Mehl, Brod, Tuchabfällen, alten Federn, Fleisch, (sie skelettirt Vögel), Schmetterlingen, Kehricht. In der Gefangenschaft frisst sie ihre todten Genossen auf, und benagt die Wände des Gefängnisses. Der naturhistorische Verein in Augsburg besitzt ein Stück Boden von einem Getreidespeicher, welches sehr stark von ihnen zerfressen ist. Ihr Koth ist schwärzlich. Sie gleitet langsam von der Stelle. Sie häutet sich vier-

mal. Die noch im Sommer erscheinenden kleinen Lärvchen häuten sich zum ersten Mal im Oktober. Die abgestreiften Bälglein sind vier Millimeter lang. Sie braucht ein Jahr zur Entwicklung. Wenn sie sich verpuppen will, macht sie sich gewöhnlich eine Wiege in die Wand der hölzernen Mehlbehälter. Nach einigen Wochen wird die weissliche Puppe zum Käfer, der einige Tage lang gelb bleibt, und sich dann dunkelbraun färbt. Der Käfer erscheint gewöhnlich im Juli. Die Larven können durch Sieben leicht vom Mehle entfernt werden. Es ist diess die einzige Käferlarve, welche allgemein gezüchtet wird, um für Nachtigallen etc. als Futter zu dienen.

572. *Menephilus* Mulsant.

mene Mond, philos Freund.

1) ***cylindricus*** *Herbst.* 2765.

curvipes Fabr. — affinis Fabr. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 361. t. 8. f. 444—457. — Passau.

573. *Bius* Mulsant.

bios Leben.

1) ***thoracius*** *Fabr.* 2766.

Allgäu, an einer abgestorbenen Eiche, Obergeometer *Stark*.

574. *Boros* Herbst.

Boros ein mythologischer Name.

1) ***Schneideri*** *Panz.* 2767.

Boros Fabr. — corticalis Payk. — elongatus Herbst. — Passau; Erlangen.

I. Helopini.

575. *Helops* Fabricius.

Helops ein mythologischer Name.

1) ***lanipes*** *Linné.* 2768.

aeneus Scop. — arboreus Schrank. — cupreus Fourcr. — Larve Blanch. Mag. Zool. 1837. t. 175. f. 1—2. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Leitershofen an Baumstämmen, Spickel, April, Mai; München, Kalköfen oberhalb Thalkirchen, Juni; Planeck,

Mai, Geiselgasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h.; Weihenstephan von Bäumen geklopft, Juni, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt, im Frühling s. h. unter den Weiden der am Wege stehenden Bäume, wo er überwinterte Larven und Puppen aufsucht und verzehrt; Nürnberg h., Duzenteich an Bäumen; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt einzeln, von *Heyden.*

2) ***incurvus*** *Küst.* 2769.

Augsburg, Professor Dr. *Döbner.*

3) ***badius*** *Redtenb.* 2770.

Augsburg.

4) ***striatus*** *Fourcr.* 2771.

caraboides Panz. — quisquilius Panz. — cordatus Küster. — sardous Dahl in litt. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 367. t. 9. f. 438—465. — Ueberall in Waldungen n. s. Die Larve lebt unter Rinde von Eichen etc.

5) ***convexus*** *Küster.* 2772.

alpinus Heer. in litt. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, auf dem Schildstein bei Kreuth, Juni, Dr. *Kr.*

6) ***quisquilius*** *Fabr.* 2773.

Fabricii Gemming. — Augsburg; Passau; Aschaffenburg n. h.; auf dem Niederwald bei Rüdesheim unter Eichenrinden gefunden, Senator von *Heyden.*

Helops tuberculatus Küst. (*tuberculiger* Reiche) kommt sicher bei Passau nicht vor.

In Baiern finden sich 42 Arten; 4264 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XXXIX. CISTELIDAE.

576 *Allecula Fabricius.*

Allecula, Name eines Fisches.

1) ***morio*** *Fabr.* 2774.

rufipes Fabr. — fulvipes Duftschm. — opaca Illig. — fuscata Gysselen. — Larve Muls. Col. Fr. 1865. Pectin. p. 40. (forte.) — Zusmarshausen; Augsburg; München einmal an einer gefällten morschen Linde in grosser Anzahl, Dr. *Gemminger*, an den Linden von Maria Einsiedl, Juli, von den Linden der Allee bei Schleissheim geschüttelt, Juli, Dr. *Kr.*; Freising; Weihenstephan, an einer alten Weide ein Dutzend, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg in Häusern; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.

2) ***rhenana*** *Bach.* 2775.

Frankfurt ein Paar von *Heyden*, das Originalexemplar vom Niederwald im Rheingau, von *Heyden*.

577. ***Cistela*** *Fabricius.*

Cistela Name eines Insektes.

A. Gonodera *Mulsant.*

1) ***luperus*** *Herbst.* 2776.

fulvipes Fabr. — rufipes Dufour. — erythropus Marsh. — Augsburg; München; bei Schäftlarn, Juni, Dr *Kr.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg h. — var. ferruginea Fabr. — testacea Ziegl. — Frankfurt, von *Heyden*.

B. Cistela *Mulsant.*

2) ***ceramboides*** *Linné.* 2777.

rufa Degeer. — striata Fourer. — Larve Muls. Opusc. ent. I. p. 70. — Perris Ann. Fr. 1862. p. 221 t. 6. f. 588–592. — Augsburg; München; Freising s.; Weihenstephan, Mai; Passau; Regensburg s. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Obersteinach ein Stück an einem alten Föhrenstrunke; Hessen sehr einzeln, Decan *Scr.*; Schwanheimer Wald an alten Eichen, von *Heyden*.

C. Hymenalia *Mulsant.*

3) ***rufipes*** *Fabr.* 2778.

fusca Illig. — Larve Muls Col. Fr. 1856. Pectin. p. 50. — Zusmarshausen; Augsburg München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Hexenagger bei Regensburg in grosser Anzahl an Lerchen, Dr. von *Weidenbach*; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Frankfurt un d Eberstadt einzeln, Senator von *Heyden*; Crumstadt, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

D. Isomira *Mulsant.*

4) ***murina*** *Linné.* 2779.

Zusmarshausen; Augsburg n. s; München; Harlaching, Juni, Moosburg, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, von Gesträuch abgeklopft, Ende Mai bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Muggendorf Ende Juni, Dr. *Sturm*; Steigerwald n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.* — var. Evonymi Fabr. — München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg. — var. holosericea Ziegler. — München. — var. reppensis Herbst. — München. — var. rufipes Sturm. — München — var. thoracica Fabr. — rubricollis Panz. — collaris Krynick. — München; Freising; Nürnberg.

E. Eryx *Stephens.*

Prionychus *Solier.*

5) ***atra*** *Fabr.* 2780.

nigra Degeer. — nitidula Thoms. — ♂ melanaria Germ. — Zusmarshausen; Augsburg, ich erhielt den Käfer aus den Köpfen von *Carlina acaulis*, welche ich im Herbste vor dem Ablass gesammelt hatte, um die darin befindlichen Trypetenlarven zu ziehen; München, auf der Strasse bei Feldkirch, August, Dr. *Kr.;* Freising n. h.; Weihenstephan in Weidenmoder; Eichstädt; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s., in alten Alleebäumen. — varians Fabr. — Erlangen.

578. ***Mycetochares*** *Latreille.*

mycetos Pilz, chairo ich freue mich.

Mycetophila *Gyllenhal.*

1) ***axillaris*** *Payk.* 2781.

♂ var. linearis Redtenb. — ♀ var. morio Redtenb. — maurina Mulsant. — rufipes Frivald. — estonica Falderm. — atra Dahl in litt. — Larve Bouché. Nat. Ins. 1834. p. 197. t. 10. f. 1. — München; Regensburg s. s.; Erlangen; Ober-Lais in Mehrzahl in faulen Buchen, Decan *Scr.*

2) ***flavipes*** *Fabr.* 2782.

bipustulata Thunbg. — humeralis Illig. — ♀ bimaculata Mannerh. — München; Schleissheim, Notar von *Sonn.*; Nürnberg s.; Erlangen; Aschaffenburg s., an den Staketen des Schönthals.

3) ***bipustulata*** *Illig.* 2783.

♂ scapularis Gyllh. — Augsburg, Professor *Petry;* München, an den Stacketen zur schmerzhaften Kapelle, Mai, in einem Baume zwischen Nymphenburg und Hartmannshofen; Wolfrathshausen, Dr. *Kriechbaumer*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg, Prof. Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Aschaffenburg s., an den Staketen des Schönthals; Hanau, ein Männchen, *Heynemann*; Ober-Lais, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Bose* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer*. Dr. *Bose* hat bei Ortenberg beide Geschlechter des Käfers in einem faulen Eichenstumpfe in grosser Menge gesammelt, wodurch die Vermuthung Mulsant's bestärkt wird, dass sie die beiden Geschlechter einer Art sind. Decan *Scr.*

4) ***barbata*** *Latr.* (*Fabr.*) 2784.

♀ brevis Panz. — linearis Illig. — flavipes Oliv. — — Larve Cussac. Ann. Fr. 1855. p. 243. t. 13. f. 11—21. —

Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, im Hause gefangen, Mai; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s., an den Staketen des Schönthals. — var. picipes Panz. — brevis Illig. (Helops.) — Freising im Hause gefangen, Juni.

579. ***Cteniopus*** *Solier.*

ktenion kleiner Kamm, pus Fuss.

1) ***sulphureus*** *Linné.* 2785.

flavus Scop. — luteus Fourcr. — sulphuripes Gmel. — Augsburg; Allgäu. Obergeometer *Stark*; München s.; Freising h.; Weihenstephan, Juli, auf blühendem *Galium verum*, bei Giggenhausen, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau h.; Regensburg g., Walhalla; Nürnberg g., auf blühender *Spiraea* an Geltners Weiher; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g. auf Blüthen; Aschaffenburg s. — var. bicolor Fabr. — sulphuratus Gmel. — Augsburg, Professor *Petry*; Passau, ein Exemplar unter sulphurea, Dr. *Waltl*; Erlangen; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

579. ***Podonta*** *Mulsant.*

pus Fuss, odus Zahn.

Megischia *Redtenbacher.*

1) ***nigrita*** *Fabr.* 2786.

carbonaria Steph. — nigra Dahl. — oblonga Oliv.

Ich erhielt den Käfer, angeblich bei Nürnberg gesammelt. —

580. ***Omophlus*** *Solier.*

1) ***lepturoides*** *Fabr.* 2787.

lepheroides Fabr. — Betulae Herbst. — elongatus Küst. — rufitarsis Leske. — alpinus Müller. — Augsburg, Professor *Petry*; Freising; Weihenstephan; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Erlangen; Herrstein zwei Stück, von *Heyden*.

2) ***picipes*** *Fabr.* 2788.

sericeicollis Küst. — tibialis Costa. — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*

3) ***Amerinae*** *Curt.* 2789.

pallidipennis Meg. — pubescens Muls. — pinicola Redtenb. — Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*; Lorsch, Mombach, von

Heyden; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*. — var. lividipes Muls. — picipes Redtenb. — München; Seligenstadt; Darmstadt; Ortenberg, Decan *Scr.* auf *Euphorbia* Sandgegenden von Lorsch, Mombach, *von Heyden*.

In Baiern finden sich 16 Arten, 8 Varietäten; 255 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XL. PYTHIDAE.

581. *Pytho Fabricius.*

Pytho ein mythologischer Name.

1) ***depressus*** *Linné.* 2790.

coeruleus Herbst. — planus Herbst. — laevigatus Herbst. — ligniarius De Geer. — Larve Westw. Introd. mod. Class. I. 1839. p. 289. f. 32. Nr. 16—17. — Allgäu, unter Tannenrinde, Obergeometer *Stark*; München, bei der Sägemühle in der Au an einem gefällten Baumstamme, Mai, Dr. *Kr.* — var. castaneus Fabr. — festivus Fabr. — München.

582. *Salpingus Illiger.*

salpinx Trompete.

A. Sphariestes *Stephens.*

1) ***ater*** *Payk.* 2791.

München.

2) ***bimaculatus*** *Gyllh.* 2792.

Wolfrathshausen.

3) ***aeneus*** *Steph.* 2793.

aeratus Muls. — tarsatus Guillebeau. — Freising, ein Stück in altem Holz gezogen; Bieber, und im Frankfurter Walde einzeln an Kiefern, von *Heyden*.

4) ***cursor*** *Gyllh.* 2794.

Erlangen, Prof. Dr. *Rosh.*

5) ***castaneus*** *Panz.* 2795.

Achilleae Bon. — Piceae Germ. — rufescens Dej. — rufoaeneus Müll. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Mün-

chen durch Abklopfen der Föhren zwischen Grünwald und der Menterschwaige, August; Wolfrathshausen, Dr. *Kr.*; Regensburg s. s.; Nürnberg; Erlangen; Füttersee s. unter Föhrenrinde; Aschaffenburg n. h.; Hessen n. s. unter Kiefernrinde, Decan *Scr.*

6) ***mutilatus*** *Beck.* 2796.

virescens Muls. — Zusmarshausen.

B. Rabocerus *Mulsant.*

7) ***foveolatus*** *Ljungh.* 2797.

Darmstadt, Dr. *Nebel;* Ortenberg unter Buchenrinde, Dr. *Bose*; Nidda ein Stück unter Birkenrinde, Decan *Scr.*

8) ***quadriguttatus*** *Lapelt.* 2798.

Erlangen, Prof. Dr. *Rosh.* — *Salpingus cyaneus* Waltl. — Allgäu, Obergeometer *Stark.*

583. ***Lissodema*** *Curtis.*

lissos glatt, demas Körper.

1) ***denticolle*** *Gyllh.* 2799.

humerale Villa. — quadrimaculatum Muls. — quadripustulatum Marsh. — quadriguttatum Serv. — München; Erlangen, *Heyden*; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Soden an Zäunen, Senator von *Heyden.*

584. ***Rhinosimus*** *Latreille.*

rhin Nase, simos Affe.

1) ***ruficollis*** *Panz.* 2800.

roboris Fabr. (Salpingus.) — ruficeps Bose. — Genei Costa. — viridipennis Steph. — Larve Erichs. Wiegm. Arch. 1847. I. p. 287. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, Obergeometer Stark; München, in der Au an einer Birke, April, auf dem Pfliegeleck unter der Rinde eines Ahornstockes, März; Eichstädt, Dr. *Kr.*; Regensburg s.; Erlangen; Mannheim, *Panzer*; Aschaffenburg n. h.

2) ***viridipennis*** *Latr.* 2801.

ruficollis Linné. — roboris Payk. — bicolor Steph. — rostratus De Geer. — Augsburg; München; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg n. h.; Ortenberg in Mehrzahl unter Birkenrinde, Dr. *Bose.*

3) ***planirostris*** *Fabr.* 2802.

fulvirostris Payk. — Spinola Costa. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in der Au unter Steinen, März, April, bei der

Bäckermühle in Tegernsee unter Ahornrinde, April, Dr. *Kr.*; Regensburg s. s; Nürnberg s., Duzenteich an einem Kiefernstumpfe im Frühjahr; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h.

In Baiern finden sich 13 Arten und eine Varietät; 47 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLI. MELANDRYIDAE.

A. Tetratomini.

585. *Tetratoma Fabricius.*

tetra vier, tome Einschnitt.

1) ***fungorum** Fabr.* 2803.

dermestoides Herbst. — München, September mit *Endomychus coccineus*, aber nicht so häufig, Dr. *Kr.*; Erlangen; Ebrach n. s. auf Baumschwämmen und unter frischen Baumrinden; Aschaffenburg; Hessen n. s., an Baumschwämmen, Decan *Scr.*

2) ***ancora** Fabr.* 2804.

picta Newm. — Zusmarshausen; Hessen, von Dr. *Bose* und Decan *Scr.* in Mehrzahl aus Moos geschüttelt, welches im Winter von Bäumen abgekratzt wurde, und in welchem der Käfer seinen Winterschlaf hielt. Von *v. Heyden* auch bei Kirschberg aufgefunden.

B. Melandryini.

586. *Eustrophus Latreille.*

eustrophos beweglich.

1) ***dermestoides** Fabr.* 2805.

Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s. s.; Nürnberg s.; Erlangen; Fränkische Schweiz; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.

587. *Orchesia Latreille.*

orcheo ich springe.

1) ***micans** Panz.* 2806.

boleti Marsh. — clavicornis Latr. — picea Herbst. — Larve Chap. et Cand. Mem. Soc. Liége. 1853 p. 519. t. 6. f. 8. — München; Regensburg s., unter Moos; Eichstädt; Erlangen, aus Baumschwämmen; Ebrach unter der Rinde einer faulen Birke; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; Hessen n. s. in Baumschwämmen, Decan *Scr.*

2) ***minor*** *Walk.* 2807.

sepicola Rosenh. — München; Seligenstadt einige Stücke, Decan *Scr.*; Ortenberg zwei Stück, Dr. *Bose.*

3) ***fasciata*** *Payk.* 2808.

Larve Fischer Oryctogr. du Gouv. Mosc. 1830. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Wimpfen, Decan *Scr.*

588. ***Hallomenus*** *Panzer.*

hallomai, ich springe.

1) ***humeralis*** *Panz.* 2809.

binotatus Quensel. (Orchesia.) — boleti Kugel. — elateroides Kugel. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 382. t. 9. f. 481—490. — Zusmarshausen; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, im englischen Garten an Baumschwämmen, Juni, Tegernsee, August, Kreuth Strasse auf die Königsalpe, Juni, Dr. *Kr.*; Erlangen, im Reviere Burgwindheim s. an Baumschwämmen; Aschaffenburg s.; Frankfurt ein Stück, Senator von *Heyden*; Darmstadt, *Hopfner.*

2) ***fuscus*** *Gyllh.* 2810.

axillaris Illig. (Dryala). — piceus Marsh. — bipunctatus var. β. γ. Payk. — München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff.*

589. ***Serropalpus*** *Hellenius.*

Serra Säge, palpus Palpe.

1) ***barbatus*** *Schaller.* 2811.

striatus Hellen. — substriatus Haldem. — obsoletus Haldem. — Larve As muss. Wien. ent. Monatschr. III. 1859 p. 255. — Augsburg einmal gefangen, als er Abends einem Lichte zuflog; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Freiburg im Breisgau *(von Heyden.)*

590. ***Phloeotrya*** *Stephens.*

phloios Rinde, tryo ich nage.

1) ***rufipes*** *Gyllh.* 2812.

livida Dej. — tenuis Hampe. — Larve Westw Introd. mod. Class. Ins. I. 1839. p. 307. — Aschaffenburg, Prof. Dr. *Döbner.*

2) ***Vaudoueri*** *Muls.* 2813.

Aschaffenburg s. s., Fasanerie; Ober-Lais, Decan *Scr.*; Cronthal, Senator von *Heyden*; Dr. *M. Schmidt*; Darmstadt, stud. *Weiss.*

591. *Dircaea* Fabricius.

Dircaea ein mythologischer Name.

A. Xylita Paykull.

xyli tes hölzern.

1) ***laevigata*** *Hellen.* 2814.

discolor Fabr. — buprestoides Payk. — Larve Perris Mém. Liége. X. 1855. p. 248. t. 5. f. 47—55. — Erichs. Wiegm. Arch. 1842. I. p 367. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark;* München, Au an einer alten Planke der Sägmühle, Mai, Dr. *Kr.*; Regensburg s. s.; Nürnberg; Erlangen; Reichelsheim im Odenwalde, *Wider*; Aschaffenburg s. s., Fasanerie.

592. *Anisoxia* Mulsant.

anisos ungleich, oxys spitz.

1) ***fuscula*** *Illig.* 2815.

tenuis Rosenh. — Franken; Seligenstadt ein Exemplar, Decan *Scr.*

593. *Abdera* Stephens.

Abdera ein Eigenname.

1) ***quadrifasciata*** *Curtis.* 2816.

Hallgarten im Rheingau einige Exemplare, Dr. *Haag.*

2) ***triguttata*** *Gyllh.* 2817.

var. scutellaris Muls. — Frankfurt, ein Stück an schimmeliger Kiefernrinde, Senator von *Heyden.*

A. Carida Mulsant.

3) ***affinis*** *Payk.* 2818.

Augsburg; München; Nürnberg; Erlangen aus Baumschwämmen; Aschaffenburg s. s.; Hessen in Baumschwämmen oft in grosser Anzahl, Decan *Scr.*

4) ***flexuosa*** *Payk.* 2819.

undata Panz. — Larve Perris Ann. Fr. 1857. p. 378. t. 9. f. 473—480. — Zusmarshausen; München; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Nürnberg; Erlangen aus Baumschwämmen; Aschaffenburg s.; Frankfurt, *von Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Ober-Lais in Mehrzahl an einem Baumschwamme, Decan *Scr.*

594. *Hypulus* Paykull.

hypulos listig.

1) ***quercinus*** *Quensel.* 2820.

dubius Fabr. — blekingensis Rehn. — Larve Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon 1863. p. 245. — Nürnberg; Erlangen aus Eichenholz; Frankfurter Wald einige Stücke, von *Heyden*: Lissberg an einem faulen Eichenstumpfe in Menge nebst der Larve, Decan *Scr.*

2) ***bifasciatus*** *Fabr.* 2821.

fasciatus Panz. — Alni Kugel. — Larve Heeger Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 474. t. 5. f. 1–11. — München.

595. *Melandrya Fabricius.*

melas schwarz, dryus Dryade, Waldbewohner.

1) ***caraboides*** *Linné.* 2822.

serrata Fabr. — dentata Passerini. — rufibarbis Schaller. — Larve Perris Ann. Sc. nat. 1840. p. 36. t. III. A. f. 14–18. — Znsmarshausen; Augsburg n. s., im Frühjahr an Weiden zwischen der Borke, Wertachufer bei Pfersee; München bei Grünwald an Stämmen; Neufahrn; Freising, Wiesenwald; Moosburg, Notar v. *Sonn.*: Passau; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Kissingen s., *Rösch*; Reichelberg n. s. an Baumschwämmen und Stöcken; Aschaffenburg h.

2) ***dubia*** *Schaller.* 2823.

canaliculata Fabr. — castanea Besser. — München; Thalkirchen, Dr. *Kr.*

596. *Phryganophilus* Sahlbg.

phryganon dünner Zweig, philos Freund.

1) ***ruficollis*** *Fabr.* 2824.

analis Fabr. — Kreuth, an einem Zaun bei der Gaisalpe, Anfang Juni, Dr. *Kr.*

597. *Conopalpus* Gyllenhal.

Conus Kugel, palpus Palpe.

1) ***testaceus*** *Oliv.* 2825.

ruficollis Newm. — Vigorsi Steph. — ♀ flavicollis Gyllh. —

Augsburg; Aschaffenburg s. s., Professor Dr. *Döbner*; Frankfurt, *von Heyden*; Ober-Lais einige Stücke an einem faulen Stücke Hainbuchenholz, Decan *Scr.*

In Baiern finden sich 23 Arten; 120 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLII. LAGRIARIAE.

598. *Lagria Fabricius.*

lagaros schlaff, weich.

1) ***hirta*** *Linné.* 2826.

♂ pubescens Linné. — villosa Degeer. — Larve Perris Mém. Soc. Liége. X. p. 265. t. 5. f. 64—72. — Zusmarshausen; Augsburg h auf Himbeersträuchern und blühendem Weissdorn; München, zwischen den Kalköfen und der Teichenbeize durch Abklopfen besonders der Weiden, Juli, Dr. *Kr.*; Freising h.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.

Die Wollkäfer erscheinen von der zweiten Hälfte des Mai an. Nach der Paarung vergehen sechs bis zehn Tage, ehe das Weibchen seine Eier einzeln unter Sträucher in lockere Erde absetzt, am liebsten in der Nähe von Waldbächen, an Hohlwegen und an anderen geschützten Plätzen. Erst nach dreissig bis vierzig Tagen kommen die Larven daraus hervor, und ernähren sich anfangs nur von feuchten Pflanzenüberresten, später von abgefallenem Laube verschiedener Sträucher. Sie häuten sich viermal in sehr verschiedenen Zwischenräumen, die jedoch stets wenigstens zwanzig Tage dauern. Ende August und Anfang September richten sie sich für den Winter ein, und hören auf zu fressen, viele vor der dritten Häutung. Im April erwachen sie wieder, und fressen Tag und Nacht, in der Gefangenschaft fressen sie einander selbst auf, wenn es ihnen an Nahrung gebricht. Anfangs Mai verpuppen sie sich in lockerer Erde ohne Cocon, nach vierzehn Tagen schlüpft der Käfer aus.

Die sechsbeinige Larve ist walzig, dickhäutig und dunkelbraun, sie hat eine leichte Rückenlinie und verwaschene Makeln jederseits derselben auf jedem Ringe, mit Ausnahme des letzten, vor welchem die Linie aufhört. Dieser läuft in zwei Hornspitzchen aus, welche wie eine schwach gekrümmte Zange hintenaus

stehen. Dichte Borstenbinden bedecken den Körper. Ueber den dunklen Kopf ziehen von einem Punkte im Nacken aus drei gerade Linien von weisser Farbe, die zweigliederigen Fühler erreichen seine Länge, die breiten kurzen Kinnbacken enden in zwei Zähne, und tragen inmitten der Kaufläche noch drei Zähne, An der herzförmigen Unterlippe sitzen zweigliederige Taster, an der Stelle des inneren Kinnlappens an zwanzig flache Hacken, nach aussen von ihnen in einem Abstande, welcher ihrer Länge gleichkommt, die dreigliederigen Taster.

In Baiern findet sich eine Art; 131 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLIII. PEDILIDAE.

599. *Scraptia* Latreille.

Scrapta Dirne.

1) ***fusca*** *Latr.* 2827.

dubia Oliv. — fuscula Gyllh. — sericea Gyllh. — Bamberg, Professor *Hoffmann.*

2) ***fuscula*** *Müll.* 2828.

minuta Muls. — nigricans Steph. — Augsburg, Professor Petry; Freising; Weihenstephan, zwei Stück aus Eichenmoder, Juli; Erlangen; Aschaffenburg s.; Frankfurt n. s., aus Waldholz gezogen, von *Heyden.*

600. *Xylophilus* Latreille.

xylon Holz, philos Freund.

1) ***nigrinus*** *Germ.* 2829.

morio Märkel. — dispar Märkel in litt. — Frankfurt sehr einzeln, Senator von *Heyden*; Darmstadt, Oberstl. *Klingelhöffer*; Lauterbach ein Stück in faulem Buchenholz, von *Heyden.*

2) ***pygmaeus*** *De Geer.* 2830.

populneus Fabr. — calycinus Panz. — ♀ melanocephalus Panz. — fulvus Oliv. — parvus Schönh. — nanus Gmel. — ♂ oculatus Payk. — ♂ nigricollis Marsh. — Aschaffenburg s.; Hessen n. h., Decan *Scr.*

3) ***populneus*** *Panz.* 2831.

boleti Marsh. — München; Regensburg s., durch Klopfen an Gebüsch; Nürnberg; Erlangen; Winkelhof s. unter Baumrinden; Aschaffenburg, Professor Dr *Döbner*; Frankfurt in Mehrzahl, Senator von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

In Baiern finden sich 5 Arten; 107 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLIV. ANTHICIDAE.

601. *Notoxus Geoffroy.*

notos Rücken, oxys spitzig, scharf.

1) ***monoceros*** *Linné.* 2832.

medius Meg. — cucullatus Fourcr. — melanocephalus Zschorn. — Zusmarshausen; Augsburg h. auf Blüthen; München, in der Au geschöpft, Mai, Teichenbeize, Juni, Dr. *Kr.*; Freising h.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h. Er überwintert und verzehrt animalische Kost; Schmidt fand einige 20 Stück in einem todten Frosche.

2) ***cornutus*** *Fabr.* 2833.

minor Meg. — trifasciatus Rossi. — monocerus var β. — Rossi. — München; Rüdesheim einige Stücke, Senator v. *Heyden.*

602. *Mecinotarsus Laferté.*

mekyno ich verlängere, tarsos Tarse.

1) ***rhinoceros*** *Fabr.* 2834.

serricornis Panz. — München; Erlangen.

603. *Anthicus Paykull.*

anthikos auf Blüthen lebend.

1) ***humilis*** *Germ.* 2835.

riparius Dy. — nigrinus Zetterst. — constrictus Curtis. — myrmecinus Ullrich. — calycinus Stev. — München; Passau; Creutznach, Nauheim, Wisselsheim, Salzhausen auf Salzboden in Menge vorkommend, Decan *Scr.*

2) ***bimaculatus*** *Illig.* 2836.

pictus Fisch. — sagitta Krynick. — Darmstadt ein Stück, Senator von *Heyden.*

3) ***floralis*** *Fabr.* 2837.

Umbellatarum Dej. — pedicularius Schrank. — formicarius Oliv. — fuscus Marsh. — myrmecephalus Rossi. — ♂ basalis Villa. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München, von Geländer beim Hirschgarten, Mai. Pullach, Juni, Dr. *Kr.*; Freising, am Fenster gefangen, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Nürnberg, unter Eichenrinde, September; Erlangen; Aschbach in Glashäusern, etwas s.; Aschaffenburg n. s., *Striet.*

4) ***bifasciatus*** *Rossi.* 2838.

quadriguttatus Latr. — quadripustulatus Dahl. — guttatus Friv. in litt. — tetraspilus Germ. in litt. — tetrastigma Kunze in litt. — Frankfurt einzeln, von *Twardowsky*; Darmstadt, Dr. *Nebel* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*

5) ***sellatus*** *Panz.* 2839.

arenarius Dahl. — bipunctatus Ziegl. — Erlangen, Professor Dr. *Rosenhauer*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

6) ***gracilis*** *Panz.* 2840.

Erlangen, Professor Dr. *Rosenhauer.*

7) ***antherinus*** *Linné.* 2841.

tripustulatus Fabr. — cinctellus Rossi. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Wolfrathshausen, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau, Professor Dr. *Waltl*; Regensburg n. s.; Eichstädt; Erlangen; Aschbach in Glashäusern, etwas s.; Würzburg; Aschaffenburg n. s., Fasanerie.

8) ***luteicornis*** *Schmidt.* 2842.

Allgäu, Obergeometer *Stark*; Oberbaiern, von Dr. *Waltl* als humerilis eingesandt, *Schmidt*; Giessen, *Laubenheimer.*

9) ***flavipes*** *Panz.* 2843.

brunnipennis Sturm. — obscurus Sturm. — nigriceps Mannerh. — rufiges Payk. — München; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen, Professor Dr. *Rosenhauer*; am Main- und Lahnufer n. s. auf Kiesboden, Senator v. *Heyden*; Giessen, *Laubenheimer.* — bipunctatus Fabr. — Erlangen.

In Baiern finden sich 12 Arten; 424 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XLV. PYROCHROIDAE.

604. *Pyrochroa Fabricius.*

pyr Feuer, chroa Farbe.

1) ***coccinea*** *Linné.* 2844.

purpurata Schrank. — rubra De Geer. — Larve Ahrens. Sib. Rev. ent. 1833. p. 247. t. 14. — Dufour. Ann. sc. nat. ser. 2. XIII. p. 522. t. V. f. 1. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Leitershofen; Allgäu, Obergeometer *Stark*; München, am Saume des Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching durch Schütteln, Juni, Pullach, Juni, zwischen Geiselgasteig und der Menterschweige an Stricken, Juni, Teichenbeize an einem Stocke, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald ziemlich h.; Würzburg; Aschaffenburg n. s., *Striet*, auf Eichenblättern; Taunus, von *Heyden.*

2) ***rubens*** *Schall.* 2845.

serraticornis Scop. — satrapo Schrank. — coccinea Donov. — purpurata Müll. — ruberrima Fourer. — rutilans Voet. — Augsburg; München, am Wege nach Bogenhausen, Juni, im englischen Garten, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s.; Weihenstephan, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s. s., *Striet*, Taunus, von *Heyden.*

(Fortsetzung folgt)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 143-160