Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

C. Hybalini.

409. *Ochodaeus* Serville.

ochos tragend, odus Zahn.

1) ***chrysomelinus*** *Fabr.* 2231.

chrysomeloides Schrank. — indianus Reiche in litt. — Ingolstadt, *Schrank*; Aschaffenburg, Prof. *Oechsner*; Offenbach und Frankfurt, in der Dämmerung fliegend, Senator von *Heyden*.

D. Geotrupini.

410. *Bolboceras* Kerby.

bolbos Knollen, Zwiebel, keras Horn.

1) ***unicornis*** *Schrank.* 2232.

quadridens Fabr. — Aeneas Panz. — Aschaffenburg, 1830 am Rande des Strietwaldes in vielen Exemplaren, Dr. *Hoffmann*.

411. *Odontaeus* Klug.

1) ***mobilicornis*** *Fabr.* 2233.

♀ bicolor Fabr. — armiger Hochenw. — Zusmarshausen; Augsburg, auf Feldern, welche mit Schafmist gedüngt waren, Abends im Fluge gefangen, Prof. *Petry*, Spickel, Leitershofen, Lechfeld bei Mainz, immer Abends gestreift, *Schweiger*; München; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s.; Fränkische Schweiz; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschbach, im Schlossgarten, ein Weibchen im Fluge gefangen 1844, nur die rothe Varietät; Erlangen; Burgberg, Pfarrer *Hackel*; Aschaffenburg s. s.; Glattbach, Fasanerie; Frankfurt, Senator v. *Heyden*; Odernheim, Decan *Scr.*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Ortenberg, Dr. *Bose*.

412. *Geotrupes* Latreille.

ge Ende, trypao ich durchbohre.

Geotrypes *Latreille.*

A. Minotaurus *Mulsant.*

Ceratophyus *Fischer.*

1) ***Typhoeus*** *Linné.* 2234.

vulgaris Leach. — München; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Re-

gensburg s. s.; Kehlheim, in Schafdung, *Schrank*; Erlangen; Bayreuth, *Richter*; Aschaffenburg u. s., besonders in Schafmist; Hanau; Seligenstadt; Frankfurt; Darmstadt: Büdingen; Decan *Scr.*

B. Geotrupes *Mulsant.*

2) ***stercorarius*** *Linné.* 2235.

putridarius Erichs. — Larve Muls. Col. Fr. Lamell. p. 345. — Ueberall h. in Dung, fliegt Abends, und wird als Verkünder schönen Wetters betrachtet. Bei München kommen auf ein Männchen des stercorarius 2 foveatus und 4 spiniger, Major von *Harold.*

3) ***spiniger*** *Marsh.* 2236.

mesoleius Thoms. — puncticollis Malinowsk. — sublaevigatus Steph. — stercorarius Erichs. — München; Neufahrn, eine ausgezeichnete und durch den Autor (Scand. Col. X. 1868. p. 331) vom ächten stercorarius Linné durch vorzügliche Merkmale wohl unterschiedene Art, welche in Gemeinschaft mit demselben in hiesiger Gegend doch etwas seltener vorkommt, die weitere geographische Verbreitung bleibt noch fest zustellen, Major v. *Harold*; Passau, *Kittel.*

4) ***foveatus*** *Marsh.* 2237.

punctato striatus Steph. — stercorarius var. minor Erichs. — intermedius Ferrar. — stercorarius var. mas Thoms. — putridarius Muls. — Neufahrn, mit den zwei vorigen Arten, Major von *Harold.*

5) ***mutator*** *Marsh.* 2238.

affinis Falderm. — politus Malinowsky. — fimicola Megerle in litt. — sylvicola Megerle in litt. — virescens Muls. — stercorarius Herbst. — stercorarius var. Latr. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Not. v. *Sonn.*

6) ***sylvaticus*** *Panz.* 2239.

stercorarius Hartm. — Ueberall h., vorzüglich in Wäldern. — var. monticola Heer. — München.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 33

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 39-40