Korrespondenz-Blatt
des
zoologisch-mineralogischen Vereines
in
Regensburg.

Nr. 5. 9. Jahrgang. 1855.

Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von
O. Hofmann Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer.**

(Fortsetzung zu pg. 190 v. 1854.)

277. *Eudorea* Curt.

809. *Dubitalis H.* Häufig; in Hecken, Mai bis Juli.

810. *Ambigualis Tr.* Häufig; überall an Nadelholzstämmen. Juni, Juli.

811. *Mercurella L.* Gemein; in den Promenaden und in Gärten. Juni, Juli.

812. * *Crataegella H.* An Zäunen und Baumstämmen (Espen), bei Tegernheim, im botanischen Garten &c. Juni, Juli.

Anm. Wahrscheinlich werden einige der neu aufgestellten Arten auch hier sich finden.

279. *Chilo Zinck.*

813. *Forficellus Thb.* Ziemlich selten; am Graben nach Pürkelgut. Juni.

281. *Crambus F.*

814. *Pascuellus L.* Gemein auf allen Wiesen und Rainen Ende Juni bis August.

815. *Dumetellus H.* Ziemlich gemein; eben da.

816. *Pratorum F.* Ganz gemein auf allen Wiesen und Rainen; Ende Mai bis August.

817. *Silvellus H.* In neuerer Zeit nicht gefunden.
818. * *Ericellus H.* In Schlägen mit Heidekraut, nicht selten, am häufigsten in den südlich gelegenen Wäldern.
819. *Cerusellus WV.* Gemein, auf Rainen, in Chaussegräben. Juni, Juli.
820. *Inquinatellus WV.* Gemein; in Gärten; am Keilstein. Juli, August.
821. *Saxonellus Zinck.* Selten; am Keilstein und Mittelberg. Juli.
822. *Culmellus L.* Ganz gemein auf allen Wiesen. Juli, August.
823. * *Falsellus WV.* Hier ziemlich selten, am Keilstein und den Winzerbergen; an bemoosten Felsen in der Nähe von Nadelholz; bei Wörth, Juli, August.
824. *Chrysonuchellus Scop.* Ganz gemein an allen Rainen, besonders an den Winzerbergen. Die zuerst erscheinende Art der Gattung. Mai bis Juli.
825. *Hortuellus H.* Gemein auf Waldwiesen. Juni bis August.
826. *Margaritellus H.* Nicht selten auf feuchten Wiesen zwischen Pürkelgut und Weinting und jenen nördlich vom Mittelberg. Juni, Juli.
827. *Pinetellus Clerck.* Nicht selten; Keilstein, Wörth. Juli, August.
828. *Mytilellus H.* Sehr selten; an der Seidenplantage, in Hecken wo kein Nadelholz; am Mittelberg, Juli, August.
829. *Myellus H.* Selten: bei Weinting und Tegernheim, Juni, Juli.
830. *Tristellus WV.* Ganz gemein in Schlägen. August.
831. *Pratellus L.* (*Selasellus Zinck.*) Hier selten, in der Oberpfalz auf nassen Wiesen sehr gemein August.
832. *Luteellus WV.* Nicht selten; am Keilstein. August.
833. *Perlellus Scop.* Gemein, an Rainen und feuchten Wiesen. Juni, Juli.
834. * *Lithargyrellus H.* Nicht gemein am Keilstein. August.

283. *Pempelia H.*

835. *Carnella L.* Ganz gemein auf Wiesen. Juli, August.
836. * *Perfluella Zinck.* Sehr selten, in Schlägen mit Heidekraut hinter Stauf. Mai.
837. * *Betulae Göz.* Hinter Grass. Juni, Juli.

838. * *Subornatella Dup* Keilstein. Juli.

839. * *Adornatèlla Tr.* Keilstein, in manchen Jahren häufig. Juli, August.

840. *Ornatella WV.* Gemein an Bergabhängen und Rainen, Juni, Juli.

841. * *Obductella FR.* An den Winzer- und Tegernheimer Bergen sehr gemein. Juli, August.

842. * *Palumbella WV.* Ziemlich selten und einzeln. Keilstein, Tegernheimer Berge. Mai, Juli.

284 *Nephopteryx HV.*

843. *Abietella WV.* Selten; an Nadelholz bei Weinting und Tegernheim; auch bei Königswiesen. Juli, August.

844 *Roborella WV.* Selten, von Sch. in Menge erzogen.

845. *Rhenella Zinck.*. Selten. Juni.

846. * *Similella Zinck.* Selten; aus Eichenraupen. Mai, Juni.

847. *Janthinella H.* Selten; vor mehreren Jahren in grosser Menge auf dem Rücken des Keilsteins mit folgender, welche sparsamer war. Juli, August.

848. *Argyrella WV.*

849. * *Albicilla HS.* Einige Exemplare.

285. *Hypochalcia H.*

850. *Ahenella WV.* Ueberall nicht selten. Juni, Juli.

287. *Epischnia H.*

851. * *Illotella Zell.* Nur Ein altes Exemplar.

288. *Zophodia H.*

852. * *Compositella Tr.* Keilstein. Selten Juli, August.

291. *Ancylosis Zell.*

853. *Cinnamomeella Dup.* Auf den Winzer- und Tegernheimer Bergen, am meisten nördlich vom Mittelberg. Juni.

292. *Trachonitis Zell.*

854. *Cristella* H. Sehr selten.

293. *Myeloïs Zell.*

855. *Rosella.* Selten und einzeln bei der Weichselmühle, bei Königswiesen und Kleinprüfening. Juni bis August.

856. * *Legatella* H. Selten. Juli.

857. *Advenella Zinck.* Selten; öfter erzogen. Juli.

858. *Suavella Zinck* Nicht selten; auf den Winzerbergen, in den Hecken südlich am Fusse des Mittelberges Juli, August.

859. * *Epelydella FR.* Selten. Schwedenschanze bei Dechbetten. Juli.

860. * *Terebrella Zinck.* Von O. Hofm. erzogen.

294. *Acrobasis Zell.*

861. *Tumidella Zinck.* Selten.

862. *Consociella H.* Raupe im Mai und Juni an Eichen. Juli.

295. *Glyptoteles Zell.*

863. * *Leucacrinella Tr.* Nur zweimal. Tegernheim. Juli.

296. *Cryptoblabes Zell.*

864. * *Rutilella FR.* Selten. Mai und Juni um Föhren.

298. *Nyctegretis Zell.*

865. *Achatinella H.* Auf einer Wiese bei Sinzing auf Gnaphalium; auf dem Bruderwöhr, am westlichen Fuss des Keilstein. Juli, August.

300. *Homoeosoma Curt.*

866. *Cirrigerella Zinck.* Sehr selten, an den Winzerbergen, am Keilstein, im Weintingerholz. Juni.

867. * *Tetricella WV.* In Heideschlägen, hinter Stauf; Mai, Juni, selten.

868. *Cribrum WV.* Nicht selten; an den Tegernheimer Bergen; Juni, Juli. Die Raupe im Winter in den Stielen von Disteln.

869. *Obtusella H.* Am Fuss des Keilsteins an Birnbäumen. Juli.

870. *Nebulella WV.* An Disteln an den Schwabelweisser Bergen und auf dem Bruderwöhr. Juni, Juli.

871. * *Nimbella Zell.* An den Schwabelweisser Bergen, häufiger hinter Stauf. Mai bis Juli.

872. *Convolutella H.* Selten. Die Raupe häufig in Stachelbeeren.

303. *Ephestia Guen.*

873. * *Elutella H.* In Zimmern häufig, die Raupe lebt auch von getrockneten Insekten und entwickelt sich das ganze Jahr hindurch.

304. *Achroea Zell.*

874. *Alvearia F.* Die Raupe lebt in Bienenstöcken häufig. Schmetterling fliegt Abends um die Stöcke. Vom Mai bis in den September.

305. *Aphomoea H.*

875. *Colonella L.* Häufig, Abends an Hecken; auch in Häusern. Juni, Juli

307. *Galleria F.*

876. * *Mellonella* L. Die Raupe lebt häufig in Bienenstöcken, entwickelt sich vom Juni bis in den August.

Pyralidina.

308. *Aglossa Ltr.*

877. *Pinguinalis L.* Häufig in Häusern; Juni.

311. *Asopia Tr.*

878. *Farinalis L.* Häufig in Häusern.

879. *Fimbrialis VV.* Sehr selten. Bei Wörth auf dem Herrnberg nicht selten. Juli.

880. * *Glaucinalis L.* Seit lange nicht mehr gefunden. Wörth. E. Hfm.

312. *Pyralis L.*

881. *Angustalis VV.* Häufig an den Winzer- und Schwabelweisser Bergen; Juni, Juli.

Tortricina.

313. *Tortrix L.*

1. *Teras Tr.*

882. *Cristana WV.* Einmal im Weintinger Holz von Saalweiden geklopft. Hfm. Oktober.

883. * *Permutatana FR.*

884. *Abildgaardana F.* An den Schwabelweisser Bergen an Haseln. August, September.

Var. Nycthemerana H. Einmal im botanischen Garten gefangen. August.

885. * *Erutana HS.* Nur einzeln.

886. * *Favillaceana H.* Nicht selten; an vielen Stellen, z. B Weintinger Holz. August bis Oktober, dann wieder im ersten Frühjahr.

887 *Ferrugana WV.* Nicht selten in Birkenschlägen im Spätherbst und Frühjahr.

888. * *Adspersana H.* Im August im Weintinger Holz.

889. * *Lithargyrana Pod.* September.

890. * *Quercinana Mann.* Im Weintinger Holz und bei Stauf. Juli.

891. * *Mixtana H.* Hinter Grass.

892 *Lipsiana WV.* Selten; Weintinger Holz in Birkenschlägen. März.

893. *Scabrana WV.* Ziemlich verbreitet und in allen Varr. Im Weintinger Holz und Schwaighauser Forst. März bis Mai. Auch im Spätherbst, überwinternd. *(Sparsana* Top.)

894. *Abietana H.* Selten; im Weintinger Holz von Fichten geklopft. Spätherbst und erstes Frühjahr.

895. *Treveriana H.* An Birkenstämmen häufig.

896. *Literana L.* Nur einzeln.

897. *Asperana WV.* Selten; an Eichen bei Weinting und Hohengebraching. Frühjahr.

898. *Contaminana H.* Gemein; im Herbst an Birnbäumen.

899. *Caudana F.* Im Weintinger Holz, bei Grossberg und Hohengebraching an Saalweiden häufig; August, September.

Var. Emargana. Nur einzeln.

900. * *Effractana H.* Wie vorige; viel seltener.

2. *Loxotaenia Stph.*

901. *Ameriana L.* Sehr selten; Schwabelweisser Berge. Juli.

902. *Piceana L.* Oefters erzogen.

903. *Xylosteana L.* Juni. Selten.

904. *Crataegana H.* Selten.

905. *Laevigana WV.* Häufig; Abends an Hecken. Juni, Juli. Raupe häufig an Liguster.

906. *Gerningiana WV.* Nicht selten; an den Schwabelweisser Bergen. Juli, August.

907. *Diversana H.* Gemein; Abends an den Schwabelweisser Bergen an Birnbäumen. Juni, Juli.

908. *Orana FR.* Selten; Schwabelweisser Berge, Königswiese. An Erlen. Juni, Juli.

909. *Grotiana F.* Selten. Keilstein.

910. *Strigana H.* Nicht selten, am Keilstein. Juni, Juli.

911. *Gnomana L.* Häufig; Abends an Hecken. Juli, August.

912. * *Obliterana v. Heyd.* Von Forstrath Koch erzogen.

913. *Sorbiana H.* Selten; Weintinger Holz und Schwabelweisser Berge. Juni.

914. *Cerasana H.* Nicht selten. Juni.

915. *Heparana WV.* Gemein. Juli.

916. *Ribeana H.* Nicht selten; an Obstbäumen. Juni bis August

917. *Corylana F.* Nirgends selten. August.

918. * *Histrionana H.* Im Weintinger Holz; in manchen Jahren häufig; um Nadelholz. Juli.

919. * *Nubilana H.* Nicht selten; bei Stauf und Tegernheim, Abends an Hecken. Juni, Juli.

920. *Musculana H.* Nicht selten; in Wäldern an Erlen, auch an Hecken Ende April, Mai.

3. *Argyrotosa Stph.*

921. *Holmiana L.* Nicht selten; an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juti.

922. *Hoffmannseggiana H.* Gemein, an Berberis; Juli.

923. *Loeflingiana L.* Nicht selten bei Stauf. Juni, Juli. Um Eichen. (*Plumbana* Top.)
924. *Bergmanniana L.* Gemein, an Rosen. Juni, Juli.
925. * *Bifasciana H. Beitr.* Nur einmal hinter dem Tegernheimer Keller. Juni. HS.

4. *Ptycholoma Stph*

926. *Leacheana L.* Selten; an den Hecken beim Tegernheimer Keller. Juni.

5. *Tortrix L.*

927. *Viridana L.* Nicht selten; an Eichen. Juni.
928. *Rusticana Tr.* Nicht selten; hinter dem Mittelberge, Stauf. Mai, Juni. Um Nadelholz.

6. *Lophoderus Stph.*

929. *Ministrana L.* Gemein in Birken- und Erlenschlägen. Mai, Juni.

7. *Xanthosetia Stph.*

930. *Hamana L.* Gemein auf Kleefeldern. Juli.
931. *Zoegana L.* Nicht gemein, doch an vielen Stellen. Schwabelweisser und Winzerberge, Weintinger Holz. Juli, August.

8. *Eucelia HV.*

932. *Mediana F.* Selten, auf Blumen. Bei Riekofen.

9. *Ablabia Stph.*

933. *Gouana L.* am Keilstein selten, im Weintinger Holz in grosser Menge. Juni.

11. *Cochylis Tr.*

934. *Tesserana HV.* Häufig auf Waldwiesen und Rainen. Juni, Juli.
935. * *Rutilana H.* Um Wachholder bei Regendorf, nur einzeln.
936. *Zephyrana Tr.* Ziemlich selten und einzeln. Keilstein; hinter dem Mittelberg, Weintinger Holz, Wörth. Anfang Mai, dann wieder Ende Juni, Anfang Juli.

937. *Baumanniana F.* Gemein an Rainen und auf Wiesen Mai, Juni.
938. *Kindermanniana Tr.* Nicht selten; an den Schwabelweisser Bergen an Artemisia vulgaris. Mai, Juli.
939. *Smeathmanniana F.* Nicht selten an Rainen bei Weinting, Tegernheim und Lappersdorf. Mai, Juni, August.
940. *Rubigana Tr.* Selten. Juni.
941. *Tischerana Tr.* Ziemlich selten; an den Schwabelweisser Bergen. Juli, August.
942. * *Hilarana HS.* Abends an den Schwabelweisser und Winzerbergen, auch bei Wörth um Artemisia campestris fliegend. Juli, August.
943. *Rubellana.* Gemein auf Wiesen. Mai, Juli.
944. * *Heydeniana Koll.* Abends an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Mai bis August.
945. * *Epilinana Zell.* Einzeln auf Feldern.
946. * *Manniana FR.* Bei Stauf in nassen Gräben, im August.
947. *Mussehlina Tr.* Selten. Am Bruderwörth.
948. *Posterana Hffgg.* Gemein, fast überall um Disteln. Mai bis Juli. (*Angustana* Top.)
949. *Purgatana Tr.* Selten.
950. * *Cruentana Frhl.* An den Schwabelweisser und Winzerbergen nicht selten. Juni, Juli.
951 *Dubitana H.* Nicht selten. in Birkenschlägen. Mai bis Juli.
952. *Ambiguana Fröhl.* Selten; hinter dem Tegernheimer Keller und am Mittelberg. Mai bis August.

12. *Cnephasia Curt.*

953. * *Punctulana WV.* Selten; Schwabelweisser Berge an Haselnuss, Bruderwörth. April, Mai.

14. *Phteochroa Stph.*

954. * *Rugosana H.* Nur einmal am Bruderwörth. Mai.
955. * *Amandana HS.* Nur einmal bei Regendorf.

15. *Sciaphila Tr.*

956. *Cinctana WV.* Gemein, an Rainen. Juli.
957. *Rigana Tr.* Nicht gemein; an den Schwabelweisser u. Winzer bergen, bei Weinting und Kleinprüfening. Mai bis August.

958. * *Albulana Tr.* An den Schwabelweisser Bergen und hinter Stauf. Mai, Juni. Einmal nächst der Stadt in Menge an einer Fichtenhecke.

959. *Penziana H.* Einzeln; beim Tegernheimer Keller und in den Promenaden. Juni, Juli.

960. * *Chrysanthemana Gold.* An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juli.

961 *Wahlbomiana L.* Gemein, in Nadelwaldungen. Juni, Juli.

962. * *Communana HS.* Bei Grass, Weinting und Tegernheim an Birnbäumen. Mai, Juni.

963. * *Alticolana FR.*

964. * *Minorana Mann.* Im Weintinger Holz. Mai bis Juli.

965. * *Virgaureana Tr* Auf den Winzerbergen, bei Stauf und Weinting. Juni.

16. *Poecilochroma Stph.*

966. *Parmatana H.* Selten. Bei Weinting, Gebraching und Lappersdorf. Ende Juni bis August.
Var. Sordidana im September.

17. *Euchromia Stph.*

967. * *Rosetana H.* Einmal bei Tremelhausen gefangen. Juli.

968. * *Rosaceana Schlaeg.*

969. * *Maurana H.* Hinter dem Mittelberg.

970. * *Terreana Tr* Bei Weinting, Hohengebraching und Etterzhausen. Mai, Juni.

18. *Rhyacionia Stph.*

971. *Hastiana H.* Einzeln an den Schwabelweisser Bergen nächst dem Keller. Juni, Juli.

19. *Ditula Stph.*

972. *Ophthalmicana H.* Sehr selten; beim Tegernheimer Keller. August bis September.

973. *Corticana H.* Selten. An Eichenstämmen. Scheibelberg. Juni, Juli..

974. *Profundana WV.* Ziemlich selten; bei Regendorf um Eichen. Juli.

975. *Aehatana WV.* In Hecken an den Schwabelweisser Bergen. Juli.
976. * *Ratzeburgiana Sax.* Nur am Scheibelberg. Juli, August.

20. *Sericoris Tr.*

977. * *Antiquana H.* Einzeln; auf Brachfeldern, im Mai und im September; auch hinter Stauf.
978. * *Trifoliana.* In der Regel selten, doch gesellschaftlich auf dem Bruderwörth an Rainen; Juni.
979. * *Capreolana FR.* Auf den Schwabelweisser und Winzer-Bergen, bei Weinting und Tegernheim. Juni, Juli, August; oft häufig.
980. *Striana FR.* Häufig an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.
981. *Zinckenana Fröhl.* Nicht gemein, mehr in den nördlich gelegenon Nadelwaldungen mit Heide. Zeitlarn. Juli, August.
982. *Conchana H.* Ueberall in Schlägen gemein. Juni bis August.
983. * *Gigantana HS* Einmal bei Etterzhausen, Mariaort, Sinzing. Mai.
984. *Cespitana H.* In Unzahl auf Wiesen; am Keilstein. Juni, Juli.
985. *Olivana Tr.* Selten, an Schlehen und Nadelholz; Juni.
986. * *Palustrana Lien.* Bei Hohengebraching im Juli.
987. * *Umbrosana Zell.* Einzeln im Juni, Juli.
988. * *Lacunana WV.* Die gemeinste unter den Verwandten. Mai, Juni.
989. * *Rurestrana FR.* Vielleicht nicht von voriger verschieden.
990. *Urticana H.* Häufig an Hecken, in Erlen und Birkenschlägen im Juni.
991. * *Venustana H.* Hinter dem Tegernheimer Keller. Juli.
992. * *Decrepitana FR.* Einzeln auf dem Rücken des Keilsteins, Juni, Juli um Föhren.
993. * *Lucana Guen.* Ziemlich verbreitet und häufig, mehr an den Bergen. Mai bis Juli.
994. *Bipunctana F.* Hinter dem Mittelberg und bei Stauf auf Heidelbeeren. Juni.

21. *Notocelia Stph.*

995. *Uddmaniana L.* Nicht selten auf Brombeeren, überall. Juli.

22. *Coccyx Tr.*

996. *Comitana WV.* In Unzahl an allen Fichten. Mai bis Juli.
997. * *Proximana Mtzn.* Wohl nur Var. der vorigen, unter den zuerst erscheinenden Exemplaren.
998. * *Nigricana Mann.* An der Nordseite des Keilsteins, Juni.
999. * *Nana Tr.* Im Weintinger Holz und am Mittelberg an Fichten; am häufigsten im Wäldchen südlich vom Stolzenhof. Juni.
1000. * *Rufimitrana FR.* Im Juli einzeln um Nadelholz bei Gebraching.
1001. *Clausthaliana Ratzeb.* Selten; bei Gebraching und Weinting an Fichten. Mai, Juni. (*Hercyniana* Top.)
1002. *Resinana F.* Ueberall an Föhren. Mai.
1003. *Fuligana H.* Ziemlich verbreitet, doch immer einzeln, in den südlichen Wäldern. Mai, Juli.
1004. *Bouoliana WV.* Nicht selten; im Weintinger Holz, bei Wörth, auf dem Rücken des Keilsteines an Föhren. Juni u. Juli.
1005. *Turionana H.* Ziemlich verbreitet, doch nie in Menge, an Föhren. Mai, Juni.
1006. * *Pudendana FR.* In den Thälern hinter Stauf; auch bei Lappersdorf; selten; um Föhren. Juni.
1007. *Duplana H.* Ziemlich verbreitet, an Föhren. April, Mai.
1008. *Schreibersiana H.* Im Hofgarten um Prun. pad.
1009. * *Fischerana Tr.* Bei Sinzing, Aichhofen. Mai, Juli.

23 *Penthina Tr.*

1010. *Salicana L.* Nicht selten; im Weintinger Holz, bei Königswiesen. Juni.
1011. * *Inundana WV.* Hinter dem Tegernheimer Keller; im Wäldchen südlich vom Stolzenhof; einzeln; Juli, August.
1012. *Acutana Tr.* Sehr selten; im Weintinger Holz. Juli.
1013. *Hartmanniana L.* Selten.

1014. *Capreana H.* Nicht gemein, doch verbreitet. Juni, August.
1015. *Ochroleucana H.* Selten. Keilberg; Juni, Juli.
1016. *Variegana H.* Ueberall nicht selten, Juni.
1017. *Pruniana H.* An allen Schlehenhecken in Unzahl. Juni.
1018. *Dimidiana Sod.* Sehr selten, bei Weinting und Gebraching an Birken und Sahlweiden. Mai, Juni.
1019. *Sauciana H.* Selten.
1020. * *Gentianana H.* Einmal am Mittelberg gefangen. Juli. Hfm.
1021. * *Sellana H.* Doch kaum von voriger zu trennen. Leicht aus den im Frühling gesammelten dürren Köpfen des Dipsacus zu erziehen.
1022. * *Betuletana Zell.* Bei Kleinprüfening und Weinting an Birken. Mai, Juni.
1023. *Dealbana Fröhl.* Ziemlich gemein, im botanischen Garten, bei Gebraching und Weinting. Juni bis August. (*Minorana* Top.)
1024. * *Aceriana Mann.* Einzeln.
1025. *Suffusana Khlw.* In der Nähe des Tegernheimer Kellers, hinter Grass. Juni, Juli (*Amoenana* Top.)
1026. *Incarnatana H.* Am Keilstein und südlich von Grass; selten. Juli.
1027. *Roborana WV.* Gemein an Hecken, um Rosen u. Obstbäume. Juni bis August.
1028. *Tripunctana WV.* Ziemlich verbreitet, an Hecken um Rosen. Mai, Juni.
1029. *Ocellana WV.* Sehr selten; in Obstgärten; bei Gebraching und Wörth. Juni, Juli.
1030. * *Simplana FR.* Selten, bei Grass und Gebraching an Wollweiden. Mai, Juni.
1031. * *Servilleana Dup.* Sehr selten, im Weintingerholz. Mai, Juni. O. Hofm.
1032. * *Pauperana Khlw.* Selten; an den Schwabelweisser und Winzer Bergen an Berberis. April, Mai.

24. *Paedisca Tr.*

1033. *Similana WV.* Nicht selten, an den Schwabelweisser Bergen. Mai, Juni.
1034. * *Hepatariana FR.* Selten. Schwabelweisser Berge. Juni, Juli.

1035 *Hepaticana Tr.* An den Schwabelweisser Bergen und bei Weinting. Juni, Juli.

1036. *Scutulana WV.* Nicht selten.

1037. *Dissimilana Tr* Nicht selten, hinter Grass, bei Mariatannerl und Weinting an Eichen. Juli, August.

1038. *Graphana Tr.* Häufig an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juni, Anfang Juli.

1039. * *Cirsiana Zell.* Ziemlich verbreitet; am Mittelberg, bei Wörth. Juni, Juli.

1040. * *Confusana m.* Seltener. Juni, Juli.

1041. *Brunnichiana L.* Sehr verbreitet; in Steinbrüchen mit Huflattich. Juni, Juli.

1042. * *Luctuosana Dup.* Selten, an Hecken, hinter dem Tegernheimer Keller. Juni.

25. *Aphelia Curt.*

1043. *Lanceolana H.* Gemein, auf allen feuchten Wiesen. Mai, Juni.

26. *Semasia Guen.*

1044. * *Absinthiana H.* Einmal auf dem Mittelberge HS.

1045. *Citrana H.* Häufig an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juni, Juli.

1046. * *Incana Zell.* Nicht selten, am Keilstein, in Hohlwegen. Mai, Juni, die Raupe im Herbst häufig in den Stengeln der Artem. camp. (*Arenana* Top)

1047. * *Coecimaculana H.* Auf den Schwabelweisser und Winzerbergen, mehr auf feuchten Wiesen hinter Grass. Juni, Juli.

1048. * *Conterminana FR.* Abends an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juli. (*Memorana* Top.)

1049. *Aspidiscana H.* Sehr verbreitet in Schlägen mit Heidekraut. Juni bis August.

1050. *Hohenwarthiana WV.* Gemein, besonders um Hypericum. Mai bis Juli.

1051. * *Aemulana Schlaeg* Hinter Grass, selten; Juli.

1052. *Hypericana H.* Gemein an Hypericum. Ende Mai bis August.

27. *Roxana Stph*

1053 *Arcuana L.* Gemein in Haselhecken; Mai bis Juli.

28. *Carpocapsa Tr.*

1054. *Pomonana L.* Gemein in Obstkammern. Juni, Juli.
1055. *Splendana H.* Selten. Keilstein.
1056. *Succedana.* Gemein; am Keilstein. Mai bis Juli.
1057. * *Iuliana Curt.* Einzeln.

29. *Grapholitha Tr.*

1058. *Daldorfiana F.* Selten, bei Lappersdorf. Mai. (*Rhediana* Top.)
1059. *Fulvifrontana Zell.* In den Thälern hinter Stauf und bei Wörth. Selten; Mai, Juni. (*Germarana* Top.)
1060. *Blepharana Khlw.* Ueberall gemein an Rainen, besonders um Artem. vulgaris. Mai bis Juli. (*Zachana* Top.)
1061. * *Roseticolana Zell.* Einzeln; Keilstein; Juni.
1062. * *Microgrammana Guen.* Bisweilen in Mehrzahl im Juni um Ononis spin.
1063. * *Tenebrosana FR.* Im Juni und Juli gemein auf Erbsenfeldern.
1064. *Nebritana Tr.* Selten; Schwabelweisser Berge. Juli. O. Hfm.
1065. *Funebrana Tr.* Selten. Um Schlehenhecken; Mai, Juli, August.
1066. * *Acuminatana Schlg.* Nicht selten. Schwabelweisser und Winzerberge. Mai bis August.
1067. * *Alpestrana FR.* vielleicht nicht von *Blepharana* verschieden. Einzeln; bei Stauf. Juni.
1068. *Plumbagana Tr.* Selten; im Weintinger Holz. Mai. O. Hfm.
1069. *Caliginosana Tr.* Selten; im Grasser Wäldchen, am Keilstein. Juli, August.
1070. * *Kochiana HS.* Einzeln, nur am Keilstein. Juni, Juli.
1071. * *Incisana FR.* Bei Sonnenuntergang über Gartenzäune fliegend, nur am Waisenhausgarten nächst dem Ostenthor.

1072. * *Pudicana Heyd.* Nur einmal.

1073. *Woeberiana WV.* Sehr selten; auf dem Mittelberg. Juli. O. Hfm.

1074. *Composana F.* Häufig an blühenden Euphorbien. Mai, Juni. (*Gundiana* Top.)

1075 * *Corollana H* Sehr selten, einzeln im Mai.

1076. * *Fissana Frhl.* Nur einzeln.

1077 *Schrankiana Frhl.* Selten. (*Loderana* Top.)

1078 *Dorsana H.* Nur einzeln.

1079. * *Coniferana Sax.* Sehr selten.

1080 * *Incursana HS.* An mehreren Stellen; Mai, August. HS. Bei Wörth auf der Lärchenhaube. Juni. E. Hfm.

1081. * *Coronillana Zell.* Häufig, im Grase. Mai, Juni.

1082. *Filana Khlw.* Einzeln.

1083. *Foeneana L.* Nicht selten, am Bruderwörth, bei Königswiesen. HS.

1084. *Jungiana L.* Gemein an Rainen und Kleefeldern. Mai, Juni.

1085. *Inquinatana H.* Selten; an Nadelholz. Juni. HS.

1086. * *Interruptana Khlw.* Selten; Hohengebraching. Wörth. Ende Mai, Juni, an Föhren.

1087. * *Spiniana FR.* Ende August um Schlehen, gegen Abend häufig fliegend. HS.

1088. *Ephippana H.* Selten. Juli.

1089. * *Motacillana Tr* In den Promenaden; bei Wörth.

1090. *Regiana Zell.* Einzeln in den Promenaden. HS.

1091. *Petiverana F.* Ueberall gemein an Rainen. Ende Mai bis August

1092. * *Alpinana Tr.* Einzeln unter *Petiverana* fliegend und kaum davon zu trennen.

1093. *Augustana H.* Selten; bei Gebraching und hinter dem Mittelberg um Saalweiden. Juni.

1094. * *Loxiana Tisch.* Nur einmal im Juni.

1095. * *Strobilana L.* Im Weintinger Holz an Fichten. April, Mai. Raupe in Fichtenzapfen.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz-Blatt
des
zoologisch-mineralogischen Vereines
in
Regensburg.

Nr. 6. 9. Jahrgang. 1855.

Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von

O. Hofmann Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer.**

(Fortsetzung.)

1096.* *Pactolana* Khlw. Um Fichten bei Gebraching, Stauf, Weinting. Mai, Juni.

1097. *Cosmophorana* Tr. Selten; an jungen Föhrentrieben bei Tremelhausen, Eulsbrunn, Stauf. Mai, Juni. O. Hfm.

1098. *Scopariana* HS. (*Lathyrana* Top.) Häufig; in Schlägen. Mai.

30. *Syndemis* HV.

1099.* *Vacciniana* Tisch. Selten; in den Thälern hinter Stauf, Gebraching, Harthof; um blühende Berberis.

1100.* *Ericetana* Zell. Selten; an Birken bei Grass, Weinting und Gebraching. Ende Mai.

1101. *Cuphana* Tr. Häufig; auf Wiesen. Mai, August.

1102. *Quadrana* H. Selten; einmal bei Tegernheim. Mai.

31. *Steganoptycha* Stph.

1103.* *Freyeriana* FR. Einmal bei Donaustauf Ende Juni. O. Hfm.

1104. *Campoliliana* Tr. Nicht selten; bei Weinting, Grass, Wörth. Mai, Juni; an Saalweiden.

1105.* *Immundana* Tisch. Bei Weinting und Gebraching an Erlen. Mai.

1106. *Ramana* L. Bei Weinting und Gebraching. Juli, August.
1107. *Siliceana* H. Ueberall häufig an Espenstämmen. Juli.
1108. **Granitana* FR. Sehr selten; bei Weinting und Stauf an Fichten. Juni.
1109. *Naevana* H. Ende Juni bis August. Häufig um Heidelbeeren, besonders nördlich von Stauf und an der Nordseite des Mittelberges; nur die kleinen grauen Exemplare.
1110. **Abiegnana* FR. An Fichten bei Grass, Weinting und Kleinprüfening. Ende April, Anfang Mai.
1111. *Pygmaeana* H. Wie vorige.
1112. *Frutetana* H. Gemein in Erlengebüsch. Mai.
1113. **Rubiginosana* FR. Nur einmal.
1114. *Penkleriana* WV. Gemein um Erlen. Mai bis Anfang August.
1115. *Minutana* H. Schwabelweisser Berge. Anfang August.
1116. **Lithoxylana* Fröhl. Einmal im Weintinger Holz gefangen. Juli. O. Hfm.
1117. **Segmentana* Khlw. Am östlichen Abhange des Mittelberges. Mai, Juni. HS.

32. *Phoxopteryx* Tr.

1118. *Tineana* H. Fast in allen Birkenschlägen, doch nur einzeln. Mai bis August.
1119. *Mitterpacheriana* WV. Nicht selten. Um Eichen; Gebraching, Mai. HS.
1120. *Derasana* H. Selten. Mai, August.
1121. *Badiana* WV. Nicht selten, in Schlägen. Mai bis August.
1122. *Myrtillana* Tr. Gemein, an Haide bei Grass, Stauf und Lappersdorf. Mai.
1123. **Comptana* Fröhl. Gemein an den Schwabelweisser Bergen. Ende April, Mai bis Juli.
1124. *Unguicana* F. Gemein in Schlägen mit Haide. Mai. Juni.
1125. *Uncana* WV. Nicht selten in Birkenschlägen. April bis Juni.
1126. **Fluctigerana* FR. In Birkenschlägen bei Grass, Weinting, Gebraching. Ende Mai, Juni.
1127. *Cuspidana* Tr. Selten, in Birkenschlägen bei Grass und Weinting. Mai, Juni.

1128. * *Harpana* H. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Mai, Juni.

1129. *Siculana* H. Gemein, an Bergabhängen. Mai, Juli.

Canephorina.

315. *Fumea* Haw.

1130. *Bombycella* WV. Selten; an den Schwabelweisser Bergen und am Mittelberg. Juni. Im Frühling gelang uns die Zucht aus den im Grase lebenden Säcken, welche ähnlich denen der *Pulla* gebildet sind, nur grösser, das Weib ist fuss- und fühlerlos. Hfm.

1131. *Pulla* Esp. Nicht selten; am Mittelberg, im Weintinger Holz und im Laberthale. Mai, Juni.

1132. * *Sieboldii* Reutti? In Menge aus Säcken, welche von E. Hofmann auf einer Waldwiese bei Wörth gesammelt wurden. Der im April in Menge entwickelte Schmetterling zeigt die in meiner Syst. Bearb. pg. 61 angegebenen Unterschiede.

316. *Epichnopteryx* HV.

1133. * *Plumella* WV. Bei Lappersdorf Ende Mai; auf dem Bruderwörth. O. Hfm. erzog die Art bei Regensburg aus einem der *Pectinella* ähnlichen Sack. Er sah die männliche Puppenhülse aus dem Sack hervortreten, das Weib ist wahrscheinlich fusslos, in welchem Falle dann die Art eine *Fumea* ist.

1134 *Nitidella* H. Nicht selten, bei Weinting und Tegernheim; man klopft die Säcke häufig von Laubholz (Haseln). Das Weib entwickelt sich im Juni, der Mann im Juli.

1135. * *Sepium* Zell. Die Säcke klopften wir häufig im September und Mai von Fichtenflechten bei Weinting, Gebraching, Etterzhausen. Entwicklung Ende Juni. Hfm.

1136. * *Betulina* Zell. Wir fanden die Säcke nicht selten im Weintinger Holz im Juni an Birkenstämmen, von deren

Flechten sie leben; es schlüpften erst 1855 Anfang Juli Männer. Hfm.

Tineina.

Anm. Da die Zahl der hier aufgezählten Arten im Vergleich zu jenen in der Topographie verzeichneten höchst bedeutend geworden ist, dort auch mehrere Arten irrthümlich als Regensburgisch aufgeführt waren, so bleibt von hier an der Stern (*) weg.

317. *Lypusa* Zell.

1137. *Maurella* WV. Selten und einzeln bei Stauf, Kleinprüfening, Wörth Im Mai. O. Hfm. entdeckte den Sack am Keilstein, er ist aus einem Blatte zusammengerollt, fast cylindrisch, wenig gekrümmt, die Blattrippen bilden convexe Ringe vor und hinter der Mitte.

318. *Scardia* Tr.

1138. *Choragella* WV. Selten, östlich vom Mittelberg.

320. *Incurvaria* Haw.

1139. *Masculella* H. Nicht häufig; bei Stauf und Weinting. Mai.
1140. *Zinckenii* Zell. Um Birken.
1141. *Oehlmanniella* Tr. Einzeln, Juni.
1142. *Koerneriella* Zell. Selten; bei Etterzhausen. Mai.

321. *Tinea* L.

1143. *Tapetiella* L. Im Juni in Häusern.
1144. *Arcella* F. Am Fuss des Keilsteins, bei Wörth. Juli.
1145. *Parasitella* H. Aus Baumschwämmen erzogen.
1146. *Infimella* Heyd. Einzelne Exemplare unter hiesigen Vorräthen der *Granella*.
1147. *Granella* L. Schädlich; in der Nähe von Kornvorräthen, doch auch häufig an den Stämmen der ital. Pappel. April bis Juni.

1148. *Misella* Zell. Im botanischen Garten im Juni. Wörth. Juli.
1149. *Spretella* WV. Im Weintinger Holz im Juli, auch in Häusern.
1150. *Pellionella* L. In Häusern. Juli, August.
1151. *Simplicella* Zell. Im Juli einzeln an Rainen.
1152. *Ganomella* Tr. Selten; an den Winzerbergen. Juni, Juli.
1153. *Ignicomella* FR. Im Weintingerholz in jungen Schlägen Juli.
1154. *Albicomella* FR. Ebenda; einzeln.
1155. *Vinculella* FR. Im Juli am Keilstein.
1156. *Bistrigella* Haw. Einzeln; Keilstein.

323. *Nemophora* WV.

1157. *Swammerdamella* L. Häufig, im Mai an fast allen Hecken.
1158. *Schwarziella* Zell. Selten, bei Kleinprüfening und Tegernheim im Mai.
1159. *Pilella* WV. Nicht selten, an Fichten bei Tegernheim, Pentling, Weinting, Gebraching. Mai, Juni.
1160. *Pilulella* H. In Nadelwäldern ziemlich gemein. Mai, Juni.

326. *Blabophanes* Zell.

1161. *Imella* H. Selten; im Lappersdorfer Wäldchen und mehreren anderen Stellen. Mai, Juni, August.
1162. *Ferruginella* H. Wörth. Juli.
1163. *Monachella* H. Abends an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juni, Juli.

327. *Monopis* WV.

1164. *Rusticella* H. Selten; an den Winzerbergen in Felsenlöchern. Juni.

331. *Tineola* HS.

1165. *Biselliella* Humm. Häufig in Wollenmöbeln. Zerstört auch Insektensammlungen. Das ganze Jahr.

332. *Euplocamus* Ltr

1166. *Fuesslinellus* Sulz. Sehr selten; am Mittelberg, bei Stauf und Wörth. Mai, Juni.

336. *Solenobia* Dup.

1167. *Pineti* Zell. Den Sack im Herbst von Fichtenflechten geklopft und erzogen. Hfm.

1168. *Triquetrella* FR. Der Sack im April an Felsen bei Schwabelweiss und Kleinprüfening. Schmetterling im April. Hfm.

1169. *Lichenella* L. Sack im April an Felsenflechten; auch im Herbst an Flechten junger Eichen gefunden. Schmetterling im März und April; nur Weiber. Hfm.

341. *Scythropia* WV.

1170. *Crataegella* L. Nicht selten, besonders das Gespinnst der Raupe. Juli.

342. *Hyponomeuta* Ltr.

1171. *Stanniella* Zell. Nur einmal Mitte Juni bei Etterzhausen.

1172. *Plumbella* WV. Nicht selten in Hecken. Juli, August.

1173. *Irrorella* H. Selten, im Weintinger Holz. Juli.

1174. *Variabilis* Zell. Gemein an Schlehenhecken. Juli.

1175. *Malinella* Zell. Nicht selten.

1176. *Evonymi* Zell. Gemein; Schwabelweisser Berge. Juli, August.

1177. *Padi* Zell. Gemein in Hecken mit Prunus Padus. Juni, Juli.

343. *Glyphopteryx* HV.

1178. *Bergstraesserella* F. Am Fuss der Stauferberge. Mai, Juni.

344. *Aechmia* Tr.

1179. *Thrasonella* Scop. An vielen Stellen häufig um Juncus. Juni.

1180. *Equitella* Scop. An kahlen Bergen häufig. Juni bis August.

1181. *Fischeriella* Zell. Häufig wie vorige. Mai, Juni.

46. *Simaethis* Leach.

1182. *Diana.* Nur nördlich von Gebraching. Juli.

1183. *Pariana* L. Im Juli und August, besonders auf blühendem

Tanacetum. Einmal im Juni von einer Raupe geschlüpft, die auf Rosen lebte. Hfm.

1184. *Fabriciana* L. Ziemlich selten. Die Raupe im Mai im zusammengesponnenen Nesselblättern. O. Hfm.

348. *Diplodoma* Zell.

1185. *Marginepunctella* Stph. Den Sack fanden wir im Herbst und Frühjahr an den Stämmen und unter der Rinde alter Bäume bei Tegernheim und Wörth. Schmetterling im Juni. Hfm.

349. *Nemotois* WV.

1186. *Scabiosellus* Scop. Häufig auf Scabiosen. Juni bis August.

1187. *Violellus* WV. Selten; im Weintinger Holz, Kleinprüfening. Juli, August.

1188. *Schiffermüllerellus* WV. Selten; an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.

1189. *Minimellus* WV. Selten, auf dem Mittelberg. Juli, August.

1190. *Dumeriliellus* Dup. Gemein, am Mittelberg, bei Gebraching und Wörth. Ende Juni bis Anfang August.

350. *Adela* Ltr.

1191. *Fibulella* WV. Oft häufig; an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Mai, Juni.

1192. *Rufifrontella* Tr. Immer selten. Auf Wiesen bei Kleinprüfening.

1193. *Frischella* H. Auf dem Bruderwörth im Mai an den Blüthen von Symphytum.

1194. *Viridella* Scop. Häufig im Mai an jungen Eichentrieben, Mittelberg &c.

1195. *Tombacinella* FR. Im Juni und Juli auf dem Mittelberg nicht selten.

1196. *Cuprella* WV. An den Schwabelweisser Bergen und bei Kleinprüfening an blühenden Saalweiden. Mai.

1197. *Degeerella* L. Häufig an Scabiosen. Juni, Juli.

1198. *Ochsenheimerella* H. Einzeln, bei Kleinprüfening, Gebraching, Mittelberg, im Mai u. Juni, um Nadelholz.

1199. *Associatella* FR. Um Nadelholz, hinter Grass. Mai.
1200. *Sulzeriella* H. Nicht selten, bei Hohengebraching. Mai, Juni.
1201. *Congruella* FR. Hinter Grass, Stauf, Weinting. Juni, ziemlich selten.

351 *Roeslerstammia* Zell.

1202. *Cariosella* Zell. Gemein in Schlägen bei Gebraching. Mai, Juni, August.

352 *Plutella* Schr.

1203. *Porrectella* L. Häufig in Gärten an Hesperis. Mai, Juni
1204. *Xylostella* L. Die ganze gute Jahreszeit hindurch an allen Rainen und Hecken; besonders häufig an Haidekraut.

353. *Ochsenheimeria* HV.

1205. *Taurella* WV. Einmal im Laberthal von Fichten geklopft. August. Hfm.
1206. *Urella* FR. Im Grasser Wäldchen von hohem Grase gestreift, oft in Begattung. August.

354. *Atemelia* HS.

1207. *Torquatella* Lien. Ende Juli am östlichen Abhange des Mittelberges von Haide; auch in Begattung. HS.

356. *Talaeporia* HV.

1208. *Pseudobombycella* H. Die Säcke bei Etterzhausen an Felsen, im Weintinger Holz an Stämmen im Herbst gefunden. Hfm.

357. *Dasystoma* Curt.

1209. *Salicella* H. Einzeln erzogen. März. Hfm.

358. *Diurnea* Kirb.

1210. *Phryganella* H. In Schlägen bei Weinting, Gebraching und Etterzhausen im Oktober.
1211. *Fagella* WV Häufig im Weintinger Holz und andern Stellen. März bis Mai.

359. *Semioscopis* HV.

1212. *Avellanella* H. An Birkenstämmen im Weintinger Holz. März, April.

1213. *Strigulana* WV. Selten.

1214. *Alienella* Tr. Selten; an Birkenstämmen im Weintinger Holz; März, April.

360. *Depressaria* Haw.

1215. *Liturella* H. Raupe in Gespinnsten auf Hypericum, schlüpft im Juli.

1216. *Conterminella* FR. Selten; Raupe auf Weiden.

1217. *Vaccinella* H. Selten, bei Tegernheim, Wörth, Sinzing. April, Mai.

1218. *Applana* F. Ueberall nicht selten. Juli bis April.

1219. *Albipunctella* H. Selten.

1220. *Emeritella* Heyd. Am Mittelberg selten.

1221. *Capreolella* Zell. Auf den Winzerbergen, bei Gebraching und Weinting im März und April.

1222. *Assimilella* Ti. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juli.

1223. *Atomella* WV. Im Weintinger Holz und bei Gebraching. September.

1224. *Characterella* WV. Die Raupe lebt im Mai in den jungen Knospen der Saalweiden bei Gebraching. Schmetterling im August. Hfm.

1225. *Depunctella* Pod. Selten, an den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz im Juli und August.

1226. *Arenella* WV. Nicht selten im Weintinger Holz und an den Schwabelweisser Bergen. Juni bis Oktober.

1227. *Propinquella* Tr. Selten, im Weintinger Holz im Mai, September.

1228. *Laterella* WV. Selten, am Mittelberg und im Weintinger Holz. Juli.

1229. *Angelicella* H. Selten.

1230. *Flavella* H. Selten.

1231. *Culcitella* Tr. Selten; Abends an den Schwabelweisser Bergen an Echium fliegend. Juni, Juli.

1232. *Badiella* H. Selten, im Weintinger Holz. Juli.
1233. *Impurella* Tr. Selten.
1234. *Daucella* WV. Selten
1235. *Chaerophylli* Zell. Selten.
1236. *Libanotidella* Schlaeg. Die Raupe auf dem Mittelberge im Juli u. August häufig.
1237. *Pimpinella* Zell. Selten.
1238. *Depressella* F. Einzeln.
1239. *Dictamnella* FR. Raupe lebt in Gespinnsten an den Blüthen des Diptam an den Schwabelweisser Bergen nicht selten, schlüpft im Juli, August.

361. *Epigraphia* Stph.

1240. *Steinkellneriana* WV. Selten.

362. *Carcina* HV.

1241. *Fagana* WV. Selten, am Abhang des Mittelberges von Buchen geklopft. Juli, August.

363. *Psecadia* HV.

1242. *Funerella.* Von Forstrath Koch; nicht mit Sicherheit aus hiesiger Gegend.
1243. *Decemgutella* H An den Schwabelweisser Bergen gefangen Juni. Hfm.
1244. *Sexpunctella* H. Selten; im Weintinger Holz und am Mittelberg. Juni, Juli.
1245. *Echiella* WV. Ziemlich selten. Keilstein.

364. *Lamprus* Tr.

1246. *Oliviella* T. Selten; auf Dolden bei Tegernheim und Wörth. Juli.
1247. *Denisella* WV. Bei Kleinprüfening und Mariaort. Mai.
1248. *Sordidella* H. Selten; Keilstein und bei Stauf. Juni, Juli.
1249. *Ferruginella* WV. Verbreitet und nicht selten. Keilstein, Zeitlarn. Juli.
1250. *Tinctella* H. Im Juni und Juli um Nadelholz und an den Winzerbergen.

1251. *Flavifrontella* WV. Selten; am Tegernheimer Keller, bei Wörth. Ende Mai, Anfang Juni.
1252. *Sulphurella* H. Bei Kleinprüfening und am Mittelberg. Mai, Juni.
1253. *Proboscidella* Sulz. Nicht selten, an Hecken bei Weinting, Pentling, Tegernheim &c. Juni, Juli.
1254. *Cinnamomea* Zell. In Nadelholz. Weinting, Grass. Juli.
1255. *Minutella* WV. Im Weintinger Holz. Juni. In Häusern das ganze Jahr hindurch.
1256. *Similella* FR. Einmal an Nadelholz, Juni.
1257. *Luridicomella* FR. Selten; Grass, Stauf; Juli, August.
1258. *Procerella* WV. Im Weintinger Holz, bei Stauf, hinter dem Mittelberg. Juli.
1259. *Schaefferella* H. Selten und einzeln.

Oegoconia Guen.

1260 *Quadripunctella* Haw. An den Hecken am Fusse des Keilsteins. HS. Juli.

365. *Carposina* Zell.

1261. *Berberidella* Mann. Eben da an Berberis. Juni.

366. *Hypercallia* Stph.

1262. *Christiernella* Zell. Nicht selten in Schlägen bei Tegernheim und an den Winzerbergen. Juni, Juli.

368. *Henicostoma* Stph.

1263. *Lobella* WV. Bei Lappersdorf und Wörth. Juni. Selten.

373. *Pleurota* HV.

1264. *Bicostella* L. Häufig in Schlägen mit Haidekraut. Mai, Juni.
1265. *Schlaegeriella* Zell. Häufig an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.

374. *Rhinosia* Tr.

1266 *Asperella* L. Im Weintinger Holz und bei Kleinprüfening im Herbst und Frühjahr.

1267. *Scabrella* L. In den Promenaden, sehr selten. HS.
1268. *Antennella* WV. Am Fuss des Keilstein an Hecken; bei Wörth. Juli, September.
1269 *Silvella* L. Einzeln; August.
1270. *Falcella* WV. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz im Juli
1271. *Harpella* WV. Selten; im Weintinger Holz und im botanischen Garten. Juli, August.
1272. *Fissella* H. An Fichten bei Weinting, Gebraching, Etterzhausen, Tegernheim. Juli bis Oktober.
1273. *Sequella* Clerck. Selten hinter dem Mittelberge, Juli.
1274. *Vitella* Clerck. Im Weintinger Holz und bei Gebraching im März u. April. Juli.

375. *Theristis* HV.

1275 *Cultrella* H. Selten.

376. *Anarsia* Zell.

1276 *Spartiella* Schr. An den Schwabelweisser Bergen und hinter Grass. Mai, Juni, August.

377. *Hypsolopha* F.

1277. *Juniperella* L. Sehr selten. Gebraching. Juli.
1278. *Fasciella* H. Gemein in Hecken auf den Winzer- und Schwabelweisser Bergen. Mai, Juni.
1279. *Quadrinella* FR. Selten an den Hecken am Fuss des Keilsteins. Juli.
1280. *Barbella* WV. Sehr selten; auf dem Weg nach Grass, bei Lappersdorf und am Osterberge Mai, Juli.
1281. *Marginella* F. Selten, am Keilstein. Juli.

378. *Sophronia* HV.

1282. *Parenthesella* L. Im Weintinger Holz, bei Wörth, zwischen Grass und Gebraching, gesellschaftlich Juli.
1283. *Humerella* WV. Nicht selten; am Rand von Weinbergen. Juni.
1284. *Chilonella* Ti. An den Schwabelweisser und Winzerbergen und im Lappersdorfer Hölzchen Juni, Juli.

1285. *Consanguinella* FR. Einzeln. Hfm.
1286. *Sicariella* Zell. Nicht selten an den Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.

380. *Gelechia* HV.

1287. *Verbascella* WV. Raupe häufig an Verbascum auf den Winzerbergen u. a. O. Juti.
1288. *Sabinella* Bd. Ein Exemplar von E. Hfm. bei Wörth.
1289. *Gibbosella* Zell. Einmal im Juli geschlüpft, wahrscheinlich von Etterzhausen.
1290. *Aleella* F. Selten; in den Thälern hinter Donaustauf im Juni, bei Gebraching und beim Tegernheimer Keller.
1291. *Albicipitella* FR. Sehr selten.
1292. *Gemmella* L. (*Lepidella* FR.) An den Schwabelweisser Bergen, bei Gebraching und Kleinprüfening im August an Föhren.
1293. *Quadrella* F. An den Schwabelweisser Bergen und am Mittelberg um Berberis, nicht selten.
1294. *Electella* FR. An Fichten bei Weinting, Gebraching und am Mittelberg. Juli, August.
1295. *Luculella* H. Sehr selten; Gebraching.
1296. *Apicistrigella* FR. Sehr verbreitet, an bemoosten Felsen. An den Winzer- und Schwabelweisser Bergen, bei Weinting im Juni bis August.
1297. *Nanella* WV. Selten; im Weintinger Holz; Keilstein. Juli.
1298. *Alburnella* Ti. Weintinger Holz im Juli. Hfm.
1299. *Vulgella* WV. Selten; Stauf, im Weintinger Holz. Juni, Juli.
1300. *Euratella* Ti. Im Grasser Wäldchen häufig um Saalweiden. Mai, Juni.
1301. *Proximella* H. Häufig in Birken- u. Erlenschlägen. Mai, Juni.
1302. *Dodecella* L. Grasser Wäldchen, Keilstein. Juni.
1303. *Triparella* Zell. In den Thälern hinter Stauf. Mai, Juni.
1304. *Rhombella* WV. Bei Wörth auf dem Herrnberg. Juni. E. Hfm.
1305. *Mouffetella* L.? (*Pedisequella* H.) An den Schwabelweisser Bergen und im botan. Garten. Raupe an Lonicera. Schm. Juni.

1306. *Artemisiella* Ti. Gemein an allen Rainen, an Thym. serp. Juni, Juli.

1307. *Galbanella* FR. Selten; im Weintinger Holz und am Mittelberg. Juni, Juli.

1308. *Terrella* WV. Sehr gemein an Rainen. Juni bis August, am häufigsten auf den Blüthen des Tanacetum.

1309. *Distinctella* FR Schwabelweisser Berge. Juni bis August.

1310. *Senectella* Zell. Grass, Weinting, Lappersdorf. Juli.

1311. *Malvella* FR. Die Raupe im botanischen Garten, hinter Grass und am Fuss des Keilsteines, in dem Samen der Malven. Der Schmetterling im Juli und August um Malven selten.

1312. *Solutella* FR. Auf der Höhe der Schwabelweisser Berge. Mai, Juni.

1313. *Infernella*. An den Schwabelweisser Bergen und bei Lappersdorf im Juli.

1314. *Decrepidella* HS. Mariaort, Keilstein. Juli.

1315. *Murinella* Mann. Im Mai einzeln.

1316. *Incomptella* HS. Gebraching, Tegernheim. Mai, Juni.

1317. *Velocella* Ti. Selten; Keilstein. Juni.

1318. *Lentiginosella* FR. Auf einer Wiese hinter Grass. August. HS.

1319. *Flavicomella* Mtzn. Selten, an den Schwabelweisser und Winzer Bergen. Mai.

1320. *Peliella* Ti. Bei Wörth auf dem Herrnberg. Mai.

1321. *Oppletella* HS. Bei Stauf im August. HS.

1322. *Continuella* Zell. Zwischen Zeitlarn und Regenstauf in Föhrenwäldchen. August. HS.

1323. *Basaltinella* Zell. Am Mittelberg und den Winzerbergen. Juni bis August.

1324. *Scotinella* Mtzn. Bei Stauf im August; selten.

1325. *Ericetella* H. (*Gallinella* Ti &c.) Häufig in allen Schlägen mit Haide. Mai, Juni.

1326. *Cautella* Zell. Stauferberge, Grass. Juni, Juli. HS.

1327. *Turpella* Mus Schiff. (*Pinguinella* Tr.) An Pappelstämmen in Alleen, häufig. Die Puppe unter loser Rinde in Unzahl.

1328. *Sororculella* H. Um Wollweiden. Pentling.

1329. *Vicinella* Dgl. Gebraching. Mai bis Juli.

1330. *Marmorea* Haw. An Föhren bei Tegernheim, Pentling, Weinting. April, Mai, Juli.
1331. *Maculatella* H. Nur einmal am Keilstein; August. HS.
1332. *Cytisella* Ti. Selten; an den Schwabelweisser Bergen und bei Kleinprüfening. Mai, Juni.
1333. *Tischeriella* FR. An den Schwabelweisser Bergen und bei Wörth. Juni.
1334. *Leucomelanella* Zell. An den Sinzinger- und Winzer-Bergen und bei Wörth. Juni, August.
1335. *Luctuella* H. An Nadelholz, hinter Grass. HS.
1336. *Sestertiella* FR. Seit lange nicht mehr gefunden.
1337. *Zebrella* Ti. An Haide auf dem Mittelberg und bei Gebraching. Mai, Juni.
1338. *Mulinella* Ti. Einzeln.
1339. *Pictella* Zell. An den Winzerbergen beim goldenen Kreuze. Juni.
1340. *Superbella* Ti. Im Mai einzeln.

381. *Anacampsis* Curt.

1341. *Alacella* Zell. In Schlägen bei Hohengebraching, Keilstein. Juli, August.
1342. *Populella* L. Häufig an Espenstämmen. Juni, Juli.
1343. *Vetustella* FR. An den Schwabelweisser Bergen, am Mittelberg und bei Gebraching. Mai bis Juli.
1344. *Coronillella* Ti. Ueberall häufig. Mai bis Juli.
1345. *Scintillella* FR. An den Schwabelweisser Bergen im Juli und August. Seltener.
1346. *Ligulella* WV. Selten, im Juli.
1347. *Vorticella* Scop. Ueberall gemein. Mai, August.
1348. *Taeniolella* Tr. Ueberall gemein. Juni, Juli.
1349. *Umbriferella* FR. Im Weintinger und Grasser Holz im Juli.
1350. *Albopalpella* HS. Im August einzeln.
1351. *Anthyllidella* H. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz häufig. Mai bis August.
1352. *Subsequella* FR. Von den Winzerbergen bis Stauf. Juli, August.
1353. *Unicolorella* Zell. Mehr in den südlichen Schlägen. Juni bis August.

1354. *Tenebrella* Zell. Gebraching. Juni, Juli.
1355. *Tenebrosella* FR. Weinting, Wörth. Juni.
1356. *Naeriferella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen, bei Lappersdorf und im botanischen Garten. Mai, August.
1357. *Stipella* H. Bei Wörth. Mai.
1358. *Decurtella* H. Bei Lappersdorf, an den Schwabelweisser und Winzerbergen und bei Weinting. Juli, August.
1359. *Ericinella* Zell. Häufig auf Haide. Juli, August.
1360. *Hermannella* F. Im Weintinger Holz und an den Schwabelweisser Bergen. Mai, Juni.
1361. *Dissonella* FR. Am Mittelberg an Obstbäumen; Juli.
1362. *Cinerella* L. Gemein, in Laubholzschlägen. Juni bis August.
1363. *Dimidiella* H. An den Schwabelweisser und Winzerbergen. Am häufigsten auf dem Bruderwörth. Juni, Juli.

382. *Mesophleps* HV.

1364. *Silacella* H. An den Schwabelweisser Bergen im Juni. Einzeln.

383 *Eupleuris* HV.

1365. *Coenulentella* FR. Nur einzeln.
1366. *Striatella* WV. Gemein an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Mai bis Juli. Um Leucanth. corymbos.

384. *Chelaria* Haw.

1367. *Conscriptella* H. Im Weintinger Holz und am Keilstein, im August.

385. *Recurvaria* Haw.

1368. *Leucatella* L. Bei Tegernheim an Birnbäumen. Juni, Juli.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Hofmann Ottmar, Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger

Umgegend (Fortsetzung zu pg. 190 v. 1854.) 57-88