Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von

O. Hofmann Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer.**

(Fortsetzung.)

386. *Parasia* Dup.

1369. *Paucipunctella* Zell Sehr selten; Mittelberg. Juni.
1370. *Lappella* L. Sehr selten; am Keilstein u. bei Grass. Juni.
1371. *Metzneriella* St. Aus Centaureenköpfen erzogen. HS.

388. *Calotrypis* HV.

1372. *Illigerella.* Im Weintinger Holz und am Keilstein im Juli.
1373. *Pontificella.* An den Schwabelweisser Bergen und bei Mading. Mai, Juni.

389. *Mompha* HV.

1374. *Langiella.* Im Laberthal bei Alling, bei Wörth. Juli, August.
1375. *Sturnipennella* Ti. Bei Kleinprüfening und hinter Donaustauf. Mai, Juni.
1376. *Gibbiferella* Zell. Sehr selten. Grass. Juni.
1377. *Divisella* Wocke. Sehr selten. Mai.
1378. *Conturbatella* H. Sehr selten.
1379. *Epilobiella* WV. Die Raupe im Juni an Epilobium im Weintinger Holz. Schmetterling im August und September häufig.
1380. *Rhamniella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen. Juli.

390. *Pancalia* Stph.

1381. *Leuwenhoekella* WV. Bei Etterzhausen, im Weintinger Holz und auf dem Bruderwörth. Mai, Juni, August.
1382. *Latreillella* Stph. Im Mai am Keilstein.

392. *Cycnodia* HS.

1383. *Cygnipennella* H. Im Lappersdorfer Wäldchen nicht selten. Juni.

393. *Hypatima* HV.

1384. *Mouffetella* Zell. Is. Bei Gebraching an Fichten, Juni. Sehr selten.

395. *Tichotripis* HV.

1385. *Testacella* H. An Fichten im Weintinger Holz und bei Gebraching. April, Mai, dann Juli bis September.

396. *Chionodes* HV.

1386. *Triguttella* Dup. Auf den Schwabelweisser Bergen und bei Wörth, häufig, Juni, Juli.

397. *Ochromolopis* HV.

1387. *Ictella* H. Auf dem Bruderwörth. HS. Juni.

398. *Metriotes* HS.

1388. *Modestella* Dup. An Schlehenhecken hinter Stauf. Mai.

399. *Tebenna* HV.

1389. *Aurifrontella.* Sehr selten.

1390. *Miscella* H. In Schlägen bei Tegernheim, Wörth, Stauf, Weinting und Kleinprüfening. Mai, Juli.

1391. *Tessellatella* Wocke.

1392. *Raschkiella* Ti. Auf dem Mittelberg, im Weintingerholz, im Mai, Juli u. August.

400. *Psacaphora* HS.

1393. *Lineella* Cl. Sehr selten.

1394. *Schrankella* H. Grasserwälder, Juli um Fichten.

401. *Stagmaphora.*

1395. *Serratella* Tr. An den Stauferbergen im Mai; selten.

1396. *Albiapicella* FR. Ebenda im Juni; selten.

403. *Coleophora.*

1397. *Mayrella* H. Im Weintinger Holz und bei Gebraching Juni, Juli.

1398. *Deauratella* Zell. Nur einzeln. Juni.

1399. *Alcyonipennella* Koll. An vielen Stellen z. B. bei Tegernheim, Weinting und auf den Winzerbergen. Mai, Juni, Juli.

1400. *Paripennella* FR. Sehr selten.

1401. *Laricella* H. In Unzahl an Lärchen; Raupe lebt im Herbst und Frühjahr an den Nadeln der Lärchen. Mai, Juni.

1402. *Albitarsella* Zell. Der Sack wurde bei Wörth und Regensburg im Mai an Salvia und Origanum gefunden. Schmetterling im Juni u. Juli.

1403. *Fuscocuprella* HS. Der Sack wurde im Frühjahr 1854 an Haseln bei Wörth von Ernst Hfm. entdeckt. Schmetterling im Mai u. Juni.

1404. *Annulipes* HS. Einzeln am Keilberg.

1405. *Fuscedinella* Zell.. Der Sack lebt Ende Mai auf Erlen u. Birken bei Weinting und Gebraching. Schmetterling im Juni.

1406. *Binderella* Koll. Von Erlen erzogen.

1407. *Orbitella* Zell. Man findet den Sack im Frühjahr u. Herbst an Saalweiden und Birken bei Weinting, Grass u. Wörth. Schmetterling im Juni.

1408. *Infantilella* Heyd. Am Mittelberg und bei Tremelhausen von Haide gestreift. Juni.

1409. *Coracipennella* H. Häufig; der Sack lebt an Obstbäumen, Schlehen, Birken und Erlen. Schmetterling im Juni und Juli.

1410. *Lusciniaepennella* Tr Im Weintinger Holz, bei Stauf, im Mai u. Juni.

1411. *Flavipennella* FR. Einmal im Lappersdorfer Wäldchen gefangen. Juni.

1412. *Lutipennella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen und bei Gebraching Juni, Juli.

1413. *Badiipennella* FR. Der Sack lebt im Frühjahr an Birken bei Weinting, Gebraching und Wörth. Schmetterling im Juni.

1414. *Limosipennella* Dup. Im Weintinger Holz, bei Stauf, im Mai und Juni.

1415. *Ochripennella* Schlg. Selten, Raupe auf Ballota nigra.

1416. *Niveicostella* FR. Bei Weinting, Gebraching und Wörth gefangen; Juni, Juli.

1417. *Imberbis* HS. Bei Stauf; Juni, Juli.

1418. *Minusculella* HS Im Weintinger Holz, Keilstein, Mai u. Juni.

1419. *Gallipennella* H. Im Weintinger Holz u. an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juni, Juli. Selten.

1420. *Albifuscella* Zell. Selten; nächst dem Tegernheimer Keller. Mai, Juni.

1421. *Leucapennella* H. Bei Wörth und Lichtenwald. Mai, Juni.

1422. *Onobrychiella* FR. Im Weintinger Holz u. bei Wörth; Sack an Genista Juli.

1423. *Bilineatella* Zell. Der Sack im Juni an Genista tinctoria im Weintinger Holz. Schmetterling im Juli.

1424 *Coronillae* Zell. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juni, Juli.

1425. *Serenella* Ti Keilstein. Juli.

1426. *Vulnerariae* Zell. Ziemlich verbreitet und häufig, z. B. bei Kleinprüfening und im Weintinger Holz Mai, Juni.

1427. *Trifariella* Zell. Nächst dem Tegernheimer Keller, Lappersdorf. Sack im Juni, an Genista. Juli.

1428. *Pyrrhylipennella* Ti. Grass; Juni.

1429. *Vibicigerella* Zell. Nicht selten. An den Winzerbergen beim goldenen Kreuz; Mai, Anfang Juni.

1430. *Ditella* Zell. An den Schwabelweisser u. Winzerbergen und bei Wörth. Sack im Mai an Artemisia campestris. Schmetterling im Juli.

1431. *Vibicella* H. Im Weintinger Holz u. bei Gebraching. Raupe auf Genista tinctoria. Juli, August.

1432. *Conspicuella* Mann. Weintingerholz, Juli.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz-Blatt
des
zoologisch-mineralogischen Vereines
in
Regensburg.

Nr. 10. 9. Jahrgang. 1855.

Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von

O. Hofmann Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer.**

(Fortsetzung.)

1433. *Chalcogrammella* Zell. Abends an Galium verum auf den Winzerbergen und bei Wörth. Mai, Juni.

1434. *Ornatipennella* H. Häufig an den Schwabelweisser und Winzerbergen; am häufigsten auf den Donauwiesen. Mai, Juni.

1435. *Lixella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juli.

1436. *Ochrea* Haw. Am Keilstein, nächst dem Tegernheimer Keller. August. Raupe im Mai an Helianthemum vulgare.

1437. *Onosmella* Brhm. Häufig an den Schwabelweisser Bergen. Der Sack lebt auf Centaurea, Betonica off. u. Echium vulg. u. ist nach diesen Pflanzen sehr verschieden; im Juni zur Verwandlung an Grasstengeln angesponnen. Schmetterling im Juni bis August.

1438. *Virgatella* Zell. Im Weintinger Holz, bei Gebraching und an den Schwabelweisser Bergen. Sack im Mai an Achillea u. Salvia. Schmetterling im Juni u Juli.

1439. *Auricella* F. An den Schwabelweisser Bergen; Sack im Mai an Stachys recta. Schmetterling im Juni, Juli.

1440. *Caespititiella* Zell. Gemein auf feuchten Waldwiesen. Sack im Herbst in Unzahl an Juncus conglomeratus. Schmetterling

Mai, Juni an denselben Orten an trüben Tagen in Unzahl fliegend.

1441. *Currucipennella* FR. Bei Wörth; Sack im Mai an Eichen. Schmetterling im Juni.

1442. *Troglodytella* Dup. Im Weintinger Holz und bei Wörth, Raupe im Mai an Solidago virgaurea. Schmetterling Juni, Juli.

1443. *Murinipennella* Dup. Häufig; an den Schwabelweisser und Winzerbergen und im Weintinger Holz. Mai, Juni.

1444. *Linearíella* FR. Im Weintinger Holz und bei Wörth, einzeln; Mai, Juni.

1445. *Therinella* Tengst. Auf dem Mittelberg und Bruderwörth; Juni, Juli.

1446. *Ramosella* Zell. Bei Weinting, Tegernheim und Wörth. Juni bis August.

1447. *Crocogrammos* Zell. Bei Wörth; der Sack lebt im Mai an Betonica officinalis; Schmetterling im Mai, Juli.

1448. *Ciconiella* FR. Weintingerholz. Juni.

1449. *Millefolii* Zell An den Winzerbergen. Sack im Mai an Achillea millefolium. Schmetterling im Juli, August.

1450. *Argentula* Stph. Im Weintinger Holz, bei Gebraching und an den Schwabelweisser Bergen. Ende Mai, Juni. Der Sack im Herbst häufig an Schafgarbe.

1451. *Otitae* Zell. Selten; Keilstein, Stauf. Mai. Sack an Alyssum mont.

1452. *Succursella* HS. Am Keilstein in verödeten Weinbergen im August nicht selten. Der Sack an Artemisia camp. im Mai.

1453. *Annulatella* Nygl. An den Winzer und Schwabelweisser Bergen. Juni, Juli.

1454. *Obscenella* FR. Einzeln.

1455. *Gnaphalii* Zell. Raupe im Herbst im Weintinger Holz in den Samen von Gnaphalium. Der Schmetterling im Juli selten.

1456. *Tiliella* Schr. Im Weintinger Holz; Juni, Juli. Raupe im Mai auf Eichen.

1457. *Hemerobiella* Scop. Häufig in Gärten; Juli. Raupe im Mai an Birn- und Apfelbäumen.

405. *Tinagma* Zell.

1458. *Perdicella* Ti. An vielen Orten; auf dem Rücken des Keilsteines häufig; Winzerberge. Mai, Juni.

1459. *Borkhauseniella* v. Heyd. An vielen Stellen; Mittelberg, Winzerberge, Lappersdorf; einzeln; Mai, Juni.

1460. *Balteolella* FR. Am Keilstein im Mai.

406. *Augasma* HS.

1461. *Aeratella* Zell. Bei Gebraching und am Mittelberg. Juli, August; selten.

407. *Lyonetia* HV.

1462. *Clerckella* L. Ueberall in Gärten und Hecken gemein, Mai bis September.

1463. *Padifoliella* H. Am Keilstein, sehr selten.

408. *Schreckensteinia* HV.

1464. *Festaliella* H. Einzeln um Brombeer, bei Stauf, Mariaort. Mai.

409. *Endrosis* HV.

1465. *Lacteella* HV. In Häusern das ganze Jahr hindurch gemein.

410. *Oecophora* Ltr.

1466. *Cuspidella* WV. Im Juni und Juli bei Stauf und Wörth, an wenigen Stellen, aber gesellschaftlich.

1467. *Inspersella* H. An Epilobium nicht selten; Mittelberg, Grass, Pentling Juli, August.

1468. *Dissimilella* v. Heyd. Am Keilstein und bei Gebraching. Juli, August bis September.

1469. *Armatella* HS. An vielen Stellen, auf dem Rücken des Keilsteins häufig, bei Tremelhausen. Mai bis August.

1470. *Fallacella* Schlg. Juni, August. Einzeln.

1471 *Senescens* St Mai bis August auf dem Keilstein, häufig.

1472. *Crassiuscula* m. Einzeln am Keilstein. Juni.

1473 *Incongruella* St. Einzeln im April am Keilstein. Hfm.

1474. *Laminella* H Bei Kleinprüfening, Lappersdorf und Gebraching. Mai, Juni, Juli.

1475. *Parvella* FR. Ziemlich verbreitet; Weinting, Stauffer-berge, Wörth. Ende Mai bis August.

1476. *Denigratella* Schlg. Mai bis August an den Stauferbergen und bei Tremelhausen.

1477. *Incongruella.*

411. *Argyresthia* HV.

1478. *Arceuthina* Zell. Gebraching, Winzerberge. Mai, Juni, August.

1479. *Illuminatella* FR. Grass, Weinting. Mai bis Juli,

1480. *Certella* Zell. Bei Weinting, Gebraching, Etterzhausen. Mai bis Juli.

1481. *Aurulentella.* Bei Wörth.

1482. *Abdominalis* Zell. Bei Lappersdorf, im Weintinger Holz Juni, Juli.

1483. *Fundella* Ti. Weinting. Juni, Juli.

1484. *Retinella* Zell. Weinting, Etterzhausen. Juli.

1485. *Cornella* F. Am Keilstein, bei Kleinprüfening und Tremelhausen an Obstbäumen. Juni.

1486. *Pygmaeella* WV. Ziemlich verbreitet; an Saalweiden bei Grass, Weinting. Juni, Juli.

1487. *Goedartella* L. Nicht selten, meist in grosser Anzahl auf Laubholz. Juni, Juli.

1488. *Brockeella* H. Selten. Juni.

1489. *Nitidella* F. Ueberall in Hecken. Juni bis August.

1490. *Ephippella* F. Ueberall in Hecken gemein. Juni bis August.

1491. *Mendicella* Haw. Ueberall in Hecken. Juni.

1492. *Pulchella* Zell. Bei Wörth und Mading im August; selten.

1493. *Semitestacella* Curt. Einzeln am Mittelberg. Juli. HS.

1494. *Fagetella* Mz. Bei Grass, Gebraching, Keilstein, Winzerberge. Juni bis August.

412. *Cedestis* Zell.

1495. *Gysseleniella* Khlw. Ziemlich verbreitet, in Nadelholz am Keilstein, im Weintinger Holz. Juli, August.

1496. *Farinatella* Zell. Mit voriger; seltener.

415. *Swammerdamia* HV.

1497. *Comptella* H. Bei Lappersdorf, im Mai HS.

1498. *Caesiella* H Bei Königswiesen, Stauf, Wörth und am Keilstein. Juni bis August.

1499. *Oxyacanthella* Mann. Im botanischen Garten und am Keilstein. Mai, Juni.

1500. *Cerasiella* H. Nicht selten, an Obstbäumen. Mai bis August.

416. *Ocnerostoma* Zell.

1501. *Piniariella* Zell. Bei Weinting und Grass an Föhren, im Mai.

417. *Stathmopoda* Zell.

1502. *Pedella* L. Bei Gebraching und Mariaort an Erlen. Juli.

418. *Batrachedra* St.

1503. *Turdipennella* Ti. Hinter dem Stolzenhof an Espenstämmen. August.

1504. *Pinicolella* Zell. Bei Weinting, Grass und Gebraching an Fichten. Juni, Juli.

419. *Cosmopteryx* HV.

1505. *Druryella* F. Ein einziges Mal hinter dem Tegernheimer Keller. Juni. HS.

420. *Coriscium* Zell.

1506. *Brogniardellum* T. Im Mai und Herbst um Eichen bei Grass, selten.

1507. *Cuculipennellum* H. In den Promenaden an Liguster. September.

1508. *Citrinellum* FR. Im botanischen Garten an Lonicera, im Mai. Hfm.

421. *Gracilaria* Haw.

1509. *Franckella* H. Ziemlich verbreitet; bei Weinting, Tremelhausen, am Mittelberg an Hecken. Juni.

1510. *Tringipennella* FR. Im Weintinger Holz im Mai im Grase.

1511. *Hemidactylella* WV. Im Mai bei Gebraching und Weinting.
1512. *Falconipennella* H. Im Weintinger Holz an Erlen im Mai.
1513. *Stigmatella* F. Nicht selten im Herbst und Frühling an Fichten im Weintinger Holz.
1514. *Populetorum.* Bei Weinting und Gebraching im Mai an Fichten.
1515. *Limosella* FR. Im Weintinger Holz im Mai im Grase.
1516. *Elongella* L. Ziemlich verbreitet. Im Herbst und Frühling an Fichten im Weintinger Holz.
1517. *Rufipennella* H. Seltener.
1518. *Syringella* T. Ueberall an Syringa in Unzahl. Mai.

422. *Euspilopteryx* Zell.

1519. *Phasianipennella* St Im August, September u. Oktober bei Gebraching und Wörth an Haide.
1520. *Lacertella* FR. Fast überall in Schlägen, vom Mai bis August.
1521. *Quadruplella* Zell. Einzeln, am Bruderwörth, hinter Grass, bei Stauf und Wörth. Mai, Juni, August und September.
1522. *Ononidis* Zell. Fast überall, besonders bei Weinting. Mai, Juni, Juli.
1523. *Kollariella* Zell. Häufig bei Grass und Weinting an Eichengebüsch. Mai. Raupe minirt im Herbst an Cytisus capitatus..
1524. *Gradatella* HS. Einigemale im Mai bei Stauf.

422. *Ornix* Tr.

1525. *Torquillella* Zell. An den Winzerbergen und am Keilstein. Ende Mai, Anfang Juni bis Juli.
1526. *Finitimella* Zell. Im Weintinger Holz im Juni und Juli. Raupe im Herbst an Corylus und Crataegus in zusammengerollten Blättern.
1527. *Avellanella* St. Im Mai; von Haseln erzogen.
1528. ? *Devoniella* St. Im Mai ein einzelnes Exemplar gefangen. HS.
1529. *Guttiferella* Zell. Im botanischen Garten an Lonicera, beim Tegernheimer Keller im Mai.

423. *Poeciloptilia* HV.

1530. *Zonariella* Tengstr. Im Mai bei Stauf.
1531. *Cingillella* FR. Einzeln.
1532. *Cinctella* Zell. Ebenso.
1533. *Gangabella* FR. An den Winzerbergen Anfang Juni an Cornus sanguinea.
1534. *Pullella* FR. Bei Wörth im Mai.
1535. *Exactella* HS. Ist das Weib zu folgender. Im Juni und Juli häufig auf Haidekraut.
1536. *Parvulella* FR. Bei Kleinprüfening, Weinting, an den Winzerbergen. Mai, Anfang Juni und im Juli.
1537. *Pullicomella* Zell. Bei Lappersdorf und an den Winzerbergen. Vom Mai bis in den August.
1538. *Truncatella* Zell. An den Winzerbergen im Juni häufig.
1539. *Pulchella* Haw. Juni, Juli; Weinting, Tegernheim.
1540. *Subnigrella* St. Mai, August. Selten.
1541. *Nigrella* St. Am Keilstein und an den Winzerbergen; Mai bis Juli.
1542. *Obscurella* St. Am Keilstein und bei Kleinprüfening. Mai, Juni; besonders auf Wiesen.
1543. *Humiliella* Zell. Im Weintinger Holz und bei Gebraching. Mai bis August.
1544. *Quadrella* H. Ende Mai, Juli, August. Selten.
1545. *Fractella* m. Auf dem Keilstein und bei Wörth, im Mai und Juni.
1546. *Nobiliella* FR. Einzeln.
1547. *Magnificella* Zell. Am Keilstein und bei Wörth; im Mai.
1548. *Geminatella* HS. Ziemlich verbreitet. Juni bis August.
1549. *Disertella* FR. Bei Kleinprüfening, am Keilstein und den Winzerbergen im Mai und Juni.
1550. *Anserinella* FR. Ebenda.
1551. *Rudectella* FR. An den Stauferbergen. Mai bis Juli.
1552. *Pollinariella* Zell. Im Mai und Juni auf Gnaphalium.
1553. *Dispunctella* FR. Keilstein. Mai bis August.

425. *Chrysesthia* HV.

1554. *Roesella* L. Einzeln bei Wörth im August.

1554 b. *Siccella*. Ein einziges Exemplar 1855.

426. *Antispila* HV.

1555. *Pfeifferella* H. Im Mai an Hecken der Winzerberge.

427. *Heliozela* Zell.

1556. *Metallicella* FR. Einzeln im Mai bei Stauf, beide Geschlechter.

1557. *Resplendella* St. Ebenda, beide Geschlechter; kleiner, dunkler, die Fühler deutlich kürzer, die Vorderflügel an Spitze und Saum abgerundeter.

428. *Lithocolletis* HV.

1558. *Roboris* Zell. Bei Regendorf und Wörth. Raupe an Eichen.

1559. *Quercifoliella* FR. Die Raupe im Herbst häufig auf Eichen minirend.

1560. *Alniella* Zell. Häufig an Erlen. April, Mai. Bei uns die zuerst erscheinende *Lithoc.* Raupe an Alnus glutinosa.

1561. *Heegeriella* Zell. Häufig im Mai an Eichen. Raupe im Herbst an Eichen.

1562. *Tenella* Zell Im Weintinger Holz im Mai; Raupe minirt an Carpinus betula.

1563. *Cramerella* F. Bei Weinting und Gebraching im Mai, Anfang Juni. Raupe minirt an Eichen.

1564. *Strigulatella* Lien. Bei Stauf im Mai an Erlen; Raupe besonders an Alnus incana.

1565. *Ulmifoliella* H. Häufig bei Weinting und Gebraching im Mai; Raupe minirt an Betula alba.

1566. *Insignitella* Zell. Keilstein um Föhren. HS.

1567. *Quinquenotella* HS. Häufig im Weintinger Holz und bei Mariaort; Ende Mai. Raupe an Genista sagittalis minirend im April und wieder im August und September.

1568. *Capraeella* Nic. Bei Wörth an Saalweiden. E. Hfm.

1569. *Dubitella* Nic. Im botanischen Garten und im Weintinger Holz im Mai. Raupe minirt auf Saalweiden.

1570. *Cavella* Zell. Von Birken.
1571. *Cerasicolella* HS. Ziemlich verbreitet.
1572. *Faginella* Mann. Raupe im Herbst an Fagus sylvatica häufig
1573. *Elatella* Zell. Bei Sinzing an Viburnum lantana minirend. Hfm.
1574. *Sorbifoliella* (*Sorbi*) Frey. Bei Kleinprüfening und Weinting im Mai. Raupe auf Sorbus minirend.
1575. *Carpinicolella* St. Von Wörth; Raupe auf Carpinus betulus und Corylus avellana minirend.
1576. *Pomifoliella* Ti. Häufig in Gärten an Aepfelbäumen minirend; auch an Crataegus bei Pentling.
1577. *Corylella* (*Coryli*) Nic. Im Weintingerholz im Mai.
1578. *Betulella* Zell. Nur einzeln gefangen.
1579. *Lautella* Heyd. Bei Wörth; Raupe auf Eichen minirend.
1580. *Scopariella* Zell. Nur gefangen. HS.
1581. *Fraxinella* Zell. Raupe im Mai an Genista germanica. Schmetterling im Juni.
1582. *Spinolella* Dup, Im Weintinger Holz und bei Grass; Raupe minirt auf Saalweiden.
1583. *Ulminella* Zell. Wörth; Raupe minirt an Fagus sylv., Carpinus betulus u. Ulmus camp.
1584. *Emberizaepennella* Bouch. Häufig im botanischen Garten im Mai; Raupe minirt an Lonicera tartarica und xylosteum.
1585. *Froehlichiella* Zell. Einzeln an Erlen.
1586. *Kleemanella* F. Bei Stauf und Weinting. Ende April, Mai; Raupe minirt auf Erlen.
1587. *Scabiosella* Dougl. Die Raupe bei Etterzhausen in den Wurzelblättern der Scabiosa columbaria gefunden. Hfm.
1588. *Acerifoliella* Zell. Im botanischen Garten und am Keilstein im Mai. Raupe minirt an Acer campestris.
1589. *Populifoliella* Zell. Im Mai und Herbst an der Rinde der Pappelbäume; Raupe minirt an Pappeln.
1590. *Tremulella* Zell. Bei Gebraching im August. Raupe minirt auf Populus tremula.

429. *Bedellia* St.

1591. *Somnulentella* Zell. Oktober; Raupe minirt in Convolvulus arvensis Hfm.

431. *Tischeria* Zell.

1592. *Gaunacella* FR. Im Juni und Juli um Schlehen.
1593. *Angusticolella* Heyd. Wörth im Mai. Raupe minirt in Rosenblättern.
1594. *Emyella* Dup. Wörth; im Mai; Raupe minirt in Brombeerblättern.
1595. *Complanella* H. Im Mai und Juni häufig an Eichen, an denen die Raupe im Herbst minirt.

432. *Bucculatrix* Zell.

1596. *Cristatella* FR. An den Winzerbergen, im Juni.
1597. *Nigricomella* Zell. Weintinger Holz im Mai und Juni Raupe minirt auf Rosen.
1598. *Cidarella* Ti. Im Juni um Erlen.
1599. *Argentisignella* HS. Zweimal gefangen.
1600. *Hippocastanella* Dup. Anfang Juni an Rosskastanienbäumen.
1601. *Frangulella* Goez. Häufig im Juni im Weintinger Holz an Rhamnus.
1602. *Boyerella* Dup. Im Mai um Ulmen, selten
1603 *Ulmella* Mann. Im Mai, Juni und August im Weintinger Holz und bei Regendorf an Ulmen.
1604. *Crataegifoliella* Dup. Im Mai und Juni um Weissdorn.
1605. *Gnaphaliella* Tr. Häufig am Keilstein, bei Lappersdorf und den Winzerbergen. Mai, Juni, Juli; Raupe in den jungen Trieben von Artemisia campestris.
1606. *Humiliella* HS. Bei Weinting und Gebraching. Ende Mai, Anfang Juni in niederem Gesträuch.

433. *Phyllocnistis* Zell.

1607. *Saligna* Zell. Im September an Weiden.
1608. *Suffusella* Zell. Bei Weinting, Tegernheim und im botanischen Garten. Mai und Juli. Raupe minirt an Populus tremula.

434. *Cemiostoma* Zell.

1609. *Laburnella* v. Heyd. Häufig im Mai, Juli u. August bei Grass, Weinting &c. Raupe minirt im Herbst an Genista tinctoria.

1610. *Scitella* Mtzn. Im Juli in Gärten; Raupe minirt in Aepfelblättern.

435. *Nepticula* v. Heyd.

Die Zucht dieser prächtigen Thierchen wurde von uns noch zu wenig betrieben und ist uns auch zu selten geglückt, als dass wir hier auf nur einigermassen erschöpfende Aufzählung der hier vorkommenden Arten Anspruch machen könnten. Bei nur einiger Aufmerksamkeit liessen sich ohne Zweifel mehr als 10 Arten hier auffinden.

1611. *Ruficapitella* Haw. Im Mai an Saalweidenblüthen.

1612. *Salicella* St.

1613. *Assimilella* Mtzn.

1614. *Septembrella* St.

1615. *Cursoriella* Zell. Im Mai an Eichenstämmen.

1616. *Argyropezella* Zell.

436. *Trifurcula* Zell.

1617. *Pallidella* FR. Im Mai und Juni in hohem Grase.

1618. *Serotinella* HS. Hinter Grass.

Pterophorina.

438. *Agdistis* HV.

1619. *Adactyla* H. An den Schwabelweisser Bergen im Juli Abends um Artemisia camp. fliegend.

439. *Platyptilus* Zell.

1620. *Rhododactylus* WV. Keilstein, Winzerberge, Wörth. Juli. Raupe an Rosen.

1621. *Ochrodactylus* H. Im Weintinger Holz und bei Gebraching im Juli.

1622. *Gonodactylus* Mus. Schiff. Bei Grass, Tegernheim und im Weintinger Holz häufig in verlassenen Steinbrüchen, wo Tussilago wächst. Juni, August.

1623. *Fischeri* Zell. Sehr verbreitet, im Mai an Gnaphalium.

1624. *Acanthodactylus* H. Winzerberge im Juni, Herbst und Frühling.

440. *Oxyptilus* Zell.

1625. *Ericetorum* Zell. Am Keilstein und im Weintinger Holz im Juli.

1626. *Hieracii* Zell. Sehr häufig am Keilstein. Juni, Anfang August. Raupe auf Hieracium umbellatum.

1627 *Pilosellae* Zell. Häufig. Keilstein und Winzerberge, Juni; Raupe auf Hieracium pilosella.

1628. *Obscurus* Zell. Häufig am Keilstein, bei Wörth. Ende Mai bis Anfang Juli. Erscheint viel früher als die Verwandten.

1629. *Marginellus* Zell. Mit voriger und kaum specifisch verschieden. HS.

441. *Pterophorus* Zell.

1630. *Fuscus* Retz. Häufig im Juni und Juli, dann im August und September.

1631. *Serotinus* Zell. Nicht selten. Am Keilstein und auf den Winzerbergon. Vom Mai bis in den August.

1632. *Phaeodactylus* H. An den Winzerbergen, bei Weinting und Gebraching. Juni, Juli, August.

1633. *Pterodactylus* L. Ueberall sehr häufig. März, April, dann Juli bis Oktober.

1634. *Scarodactylus* H. Ueberall häufig. Mai bis Juli.

1635. *Distinctus* HS. Hinter Grass; Juni, Juli.

1636. *Carphodactylus* H. In den Hecken beim Tegernheimer Keller im Juni; auch an den Winzerbergen.

Aciptilus Zell.

1637. *Xanthodactylus* Tr. Am Mittelberg, bei Wörth; Juni bis August.
1638. *Baliodactylus* FR. Beim Tegernheimer Keller. Juli.
1639. *Tetradactylus* L. Ueberall sehr häufig; Juni bis August.
1640. *Pentadactylus* L. Häufig in der Nähe von Wohnungen und Gärten. Mai bis September.

Alucitina.

443. *Alucita* L.

1641. *Dodecadactyla* H. Am Keilstein und im Weintinger Holz. Juli, August.
1642. *Desmodactyla* Zell. Ende Juni. Anfang Juli bei Sonnenuntergang an den Schwabelweisser Bergen, um Lonicera.
1643. *Hexadactyla* H. Häufig, in Gärten, im Weintinger Holz, im Juni.

Micropterygina.

444. *Micropteryx.*

1644. *Calthella* L. Im Mai an Caltha palustris, am häufigsten hinter dem Mittelberg.
1645. *Aruncella* Scop. In Schlägen häufig, besonders im Weintinger Holz; Mai bis Juli.
1646. *Mansuetella* Zell. Im Mai im Nabthal.
1647. *Anderschella* H. Ein Pärchen im Mai bei Etterzhausen von Fichten geklopft.
1648. *Thunbergella* F. Im Mai.
1649. *Sparmannella* Bosc. Linn. Trans. Bei Hohengebraching und Wörth von Fichten geklopft. März bis Mai.
1650. *Fastuosella* Zell. Im Mai an blühenden Schlehen.
1651. *Chrysolepidella* Koll. Am Keilstein an Föhren am 19. April 1855.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Hofmann Ottmar, Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger

Umgegend (Fortsetzung.) 133-149