

Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Berger Keienvenn im Kreise Lingen

Mit 9 Tabellen und 4 Abbildungen

Von CARL ALTEHAGE

Inhalt

I. Standortverhältnisse

1. Lage und Eigenart des Gebietes
2. Geologische und klimatische Verhältnisse

II. Die Pflanzenwelt des Gebietes

1. Zielsetzung
2. Methodik
3. Spezieller Teil
4. Säurewert und Härtegrade des Wassers
5. Bodenprofilaufbau
6. Die Pflanzengesellschaften

III. Zusammenfassung

Literatur

I. Standortverhältnisse

1. Lage und Eigenart des Gebietes

Das Naturschutzgebiet „Berger Keienvenn“ liegt 6 km nordöstlich der Stadt Schüttorf im südwestlichen Teil des Kreises Lingen des Regierungsbezirks Osnabrück (Meßtischblatt 3609) in der Gemeinde Berge. Hier bildet es bei einer Höhenlage von $\pm 33,5$ m NN westlich der Straße, die 1 km östlich Schüttorf von der Bundesstraße 65 nach Emsbüren hin abzweigt, eine rechteckige Niederung, deren Breite durchschnittlich 160 m beträgt und die sich mit 375 m Länge von SSO nach NNW erstreckt. Bei einem schwachen Anstieg zum Rande hin hat die Mulde eine Durchschnittstiefe von etwa 50 cm. Sie ist ein Heidegewässer mit einer reichhaltigen atlantischen Flora, wobei allerdings stellenweise auch Arten mit weiterer Verbreitung eindringen. Das Schwinden der Ödlandflächen infolge der Meliorations- und Kultivierungsmaßnahmen in der Gegenwart hat die ursprünglich vorhandenen Heidetümpel mit ihren für unser nordwestdeutsches Gebiet so typischen atlantischen Pflanzenbeständen auf einen Bruchteil zusammenschrumpfen lassen. Die Abhängigkeit vom Wasser macht gerade diese Pflanzengesellschaften für etwaige Änderungen der Umgebung solcher Gebiete sehr empfindlich. So ist es ein glücklicher Umstand, daß die Sicherung des obigen Gebietes durch Eintragung in das Reichsnaturschutzbuch erfolgt ist. Auf Grund der Zusammenstellung der wichtigsten Arten durch Rektor BUSCHE, Lin-

gen, im Jahre 1938 und eines von ihm eingereichten Antrages, der von dem Bezirksbeauftragten für Naturschutz, KARL KOCH, Osnabrück, weiterbearbeitet wurde, konnte die Erklärung des Berger Keienvenns als Naturschutzgebiet am 1. 7. 1939 in einer Größe von 6,25 ha erfolgen.

2. Geologische und klimatische Verhältnisse

Das Berger Keienvenn liegt im Bereich der Talsande zwischen Ems und Vechte. Sein Abstand nach Osten zur Ems und nach Westen zur Vechte hin beträgt je 5 km. Vereinzelt stehen diluviale Sande an, so östlich der Straße, die weiter nach Emsbüren führt. In geringer Entfernung nach Norden und Nordosten hin bei Emsbüren, westlich des Emstals, treten langgestreckte Bildungen im Zuge der Endmoränen und Stauchzonen aus Sand, Kies und Ton in der Landschaft auf, die eine bemerkenswerte Hügelkette von 62,7 m Höhe darstellen. Das Gebiet wird klimatisch dem südlichen Ems-Unterkreis zugerechnet.

Die mittlere monatliche Niederschlagshöhe hatte nach dem Klimaatlas von Niedersachsen in den Jahren 1891 bis 1930 folgende Werte:

Januar	60—70 mm	Juli	70—80 mm
Februar	40—50 mm	August	60—70 mm
März	50—60 mm	September	60—70 mm
April	40—50 mm	Oktober	60—70 mm
Mai	50—60 mm	November	50—60 mm
Juni	60—70 mm	Dezember	60—70 mm

Im Sommer (April bis September) 360—420 mm,
im Winter (Oktober bis März) 300—360 mm,
mittlere Jahresniederschläge 720—840 mm,
der geringste Niederschlag ist für Februar angegeben,
die höchste Niederschlagsmenge für August.

Die mittleren Temperaturen haben folgende Werte:

Jahresdurchschnitt 8,5°—8°

Sommer: über 14°,

Juli: 16°—17°,

Januar: 1°—0,5°.

Die mittlere jährliche Temperaturschwankung beträgt 15,5°—16°.

Der mittlere Luftdruck reduziert auf den Meeresspiegel beträgt

im Januar 763,5—763 mm

im April 760,5—760 mm

im Juli 761,5—761 mm

im Oktober 761,5—761 mm.

Die Hauptwindrichtung ist im Januar 30 % aus Südwesten,
im April 20 % aus Südwesten,
im Juli 25 % aus Südwesten,
im Oktober 25 % aus Südwesten.

II. Die Pflanzenwelt des Gebietes

1. Zielsetzung

Die folgenden Ausführungen sollen einen Einblick in die pflanzensoziologische Gliederung des Naturschutzgebietes geben. Bemerkenswert sind hauptsächlich die Vegetationsverhältnisse der zentralen Senke, die durch die Gesellschaften der Randzone ergänzt werden. Da es sich um die Beschreibung eines einzelnen Gebietes handelt, ergibt sich zwangsläufig, daß auch Assoziationsindividuen aufgeführt werden mußten, deren charakteristische Artenkombination nicht die Optimalentwicklung einer Gesellschaft aufweist bzw. nur fragmentarischen Charakter hat. Zugrunde gelegt sind Beobachtungen vom Jahre 1950 ab und Einzeluntersuchungen, die ich hauptsächlich in den Sommermonaten 1956 bis 1958 durchführte. Einzelne Beobachtungen im Jahr 1959 nach vollständiger Austrocknung des Gebietes in den Sommermonaten dienten u. a. zur Kontrolle der früheren Beobachtungsergebnisse. Die Benennung der Arten erfolgte in den meisten Fällen nach der „Flora des Regierungsbezirks Osnabrück und der benachbarten Gebiete“ von Karl Koch, 2. Auflage, Osnabrück 1958. Aufgeführt in den Tabellen sind die Gefäßführenden Kryptogamen, also Pteridophyten, mit den Farnen, Schachtelhalmen und Bärlappgewächsen, dazu die Moose (Bryophyten) und die Samenpflanzen (Phanerogamen). Besonderen Dank möchte ich Herrn Dr. Koppe, Bielefeld, aussprechen für die Durchsicht bzw. Bestimmung des Moosmaterials.

2. Methodik

Bei der Aufstellung der Gesellschaften ist das „System von Braun-Blanquet“ zugrunde gelegt, wobei in den Tabellen die erste der beiden Ziffern in kombinierter Weise die Häufigkeit (Abundanz) und den Deckungsgrad (Dominanz), die zweite die Geselligkeit der Art (Soziabilität) angeben. Die erste Ziffer bedeutet:

- + = Zahl und Deckungsgrad sehr schwach,
- 1 = Artenzahl weniger als 1/20 des Bestandes,
- 2 = Artenzahl 1/20—1/4 des Bestandes,
- 3 = Artenzahl 1/4 —1/2 des Bestandes,
- 4 = Artenzahl 1/2 —3/4 des Bestandes,
- 5 = Artenzahl mehr als 3/4 des Bestandes,

die zweite Ziffer:

- 1 = Vorkommen einzeln,
- 2 = gruppenweise,
- 3 = truppweise,
- 4 = scharenweise,
- 5 = herdenweise.

VC, OC, KC = Verbands-, Ordnungs-, Klassen-Charakterarten.

Im Schichtenaufbau (Staffelung im Raum) sind die Baum- (MP), Strauch- (NP), Kraut- und Moos- oder Bodenschicht zu nennen.

3. Spezieller Teil

Zeitig im Frühjahr, wenn die Eisdecke geschmolzen ist, sorgt der Nordwestwind durch den erzeugten Wellenschlag für eine Durchlüftung des Wassers und teilweise Fortspülung der abgestorbenen Pflanzenreste zum Ufer hin. Von dem im SSO des Gebietes vorbeiführenden Feldweg aus schaut man auf die Wasserfläche, die bereits jetzt mancherlei Wasservogel zeigt. Die umliegenden Parzellen bestehen im Westen, Osten und Norden ausnahmslos aus Wiesen bzw. Weiden, im Süden bildet größtenteils ein Gebüschgürtel in einer Breite bis zu 10 m den Abschluß, wobei gleichfalls im NW und N des Gebietes Bruchwaldbestände entstanden sind. Die Höhe des Wasserstandes beträgt um diese Zeit im Durchschnitt 50 cm und wird zur Mitte hin größer. Dabei wechselt allerdings besonders der sommerliche Wasserstand entsprechend der vorhandenen Niederschläge. Eine Zuleitung von Wasser erfolgt u. a. durch eine Rohrleitung, die von Osten her in das Naturschutzgebiet eintritt.

4. Säurewert und Härtegrade des Wassers

Betr. des Säure-(pH)Wertes und der Härte des Wassers wurden am 23. 9. 1958 einige Messungen durch HELMUT DIERKES, Osnabrück, ausgeführt, dem ich für diese Angaben meinen Dank ausspreche. Benutzt wurden für die pH-Bestimmung der flüssige Universalindikator „Merck“ (Fl) und das Spezialindikatorpapier von „Merck“ (Sp), für die Bestimmung der Karbonathärte Methylorange mit n/10 HCl bis zum Farbumschlag von Gelb nach Orange und die der Gesamthärte Titriplex B bzw. C.

1. Bruchwald am Südwestrand: Wasser gelblich, trübe, Geruch schwach torfig, pH-Wert (Fl) 6,2, (Sp) 6,2, Karb.-Härte 1,12, Gesamthärte 1,9⁰ dH.
2. Südrand des Gebietes im Bruchwald: Wasser fast farblos, klar, Geruch schwach dumpfig, pH-Wert (Fl) 5,1, (Sp) 5,9, Karb.-Härte 0,42⁰ dH., Gesamthärte 0,70⁰ dH.
3. Nordostufer, im Binsengürtel: Wasser gelblich-klar, Geruch dumpfig, pH-Wert (Fl) 5,9, (Sp) 5,9, Karb.-Härte 0,62⁰ dH., Gesamthärte 1,45⁰ dH.
4. Nordostufer, 6 m nördlich von der vorigen Probeentnahmestelle, mit reicher *Lemna minor* - Entwicklung: Wasser gelblich-klar, Geruch schwach dumpfig, pH-Wert (Fl) 6,1, (Sp) 6,1, Karb.-Härte 2,24⁰ dH., Gesamthärte 3,90⁰ dH.
5. Nordostufer, vor Erlenbruchwaldstadium im freien Wasser mit reichlich Fadenalgen, eutroph.: Wasser gelblich-klar, Geruch schwach torfig, pH-Wert (Fl) 6,4, (Sp) 6,1, Karb.-Härte 3,50⁰ dH., Gesamthärte 4,85⁰ dH.

„Die pH-Wert-Unterschiede, vor allem im schwach gepufferten, sehr weichen, praktisch kalkfreien Wasser, dürften auf Fehlerquellen im

Spezialindikatorpapier zurückzuführen sein (Eigen-pH-Wert des Papiers, Indikator- und Salzfehler). Die Werte des flüssigen Universalindikators „Merck“ liegen günstiger, wahrscheinlich aber noch zu hoch.

Bemerkenswert ist die Gleichheit der Messungen im eutrophen Wasser, das relativ stark gepuffert ist, so daß sich Fehler durch den Eigen-pH-Wert von Papier bzw. Lösung nicht oder nur kaum bemerkbar machen.“

5. Bodenprofilaufbau

Profil I

Standort: Mitte des Gebietes

Vegetation: Littorella-Zone

0—2 cm: Vegetationsdecke

2—20 cm: feiner, weißer Sand

20—40 cm: niedermoorartiger Schlamm, von weißen Faserwurzeln durchsetzt

40—70 cm: dunkelrostbrauner, verfestigter Sand mit Wurzelresten

Alle Horizonte sind stark sauer (pH etwa 4—4,5)

Profil II

Standort: Westufer, südlicher Abschnitt

Vegetation: überwiegend *Eleocharis palustris* und *Comarum palustre*

0—10 cm: Wurzelhorizont

10—25 cm: niedermoorartiger Schlamm, etwas sandig, von Wurzeln durchsetzt

25—35 cm: schmutzig-grauer bis rostroter verfestigter Sand

35—48 cm: rostroter, verfestigter Sand

48—70 cm: schmutziggrauer Sand, von dunklen und rostroten Bändern durchzogen, faulig riechend (H_2S).

Auch hier sind alle Horizonte stark sauer (pH etwa 4,5—5).

(NIEMANN)

6. Die Pflanzengesellschaften des Gebietes

Anmerkungen zu Tabelle I:

Aufnahme 1: 2—5 m breites Lobelietum im NO des Gebietes auf Feinsand, stellenweise mit schwachen Faulschlammresten, am Rande außerhalb des zurückgegangenen Wasserstandes. 22. 7. 57

2: Lobelietum im Osten auf feuchtem Sand. 11. 8. 57

3: Schwach vertiefte, feuchte Senke vor Aufn. 1. 22. 7. 57

4: Degradiertes Lobelietum als Initialphase zum *Eleocharetum multicaulis* im SO des Gebietes, 22. 7. 57

5: 10x5 m breite Zone zwischen einer Littorella-Senke und einer schwachen Erhöhung mit *Hypericum elodes*, dem Sumpfartheu. 22. 7. 57

Tabelle I

Isoeto-Lobelietum (Koch 1926) Tx. 1937

(Brachsenkraut-Lobelien-Gesellschaft)

Aufnahmen 1 und 2: Optimalstadium,

Aufnahmen 3 bis 5: Initialstadium zum *Eleocharetum multicaulis*

Nr. der Probestfläche	1	2	3	4	5	
Artenzahl	3	4	5	13	7	
Größe der Probestfläche, qm.	25	4	20	2	50	
Vegetationsbedeckung, %	10	90	90	90	60	
C-Ass. Isoeto-Lobelietum:						
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	5.5	4.4	3.3	3.3	1.2	Wasserlobelie
VC Littorellion:						
(Strandling-Gesellschaften)						
<i>Littorella uniflora</i> (L.) ASCHERS.	.	1.1	4.4	+2	+2	Teichstrandling
<i>Scirpus fluitans</i> L.	.	.	.	+3	+2	Flutende Moorbinsse
<i>Echinodorus ranunculoides</i>	.	.	.	+2	+1	Hahnenfußähnlicher
(L.) ENGELM.						Igelschlauch
OC Littorelletalia:						
(Strandling-Gesellschaften)						
<i>Eleocharis multicaulis</i> SM.	.	+1	.	2.2	5.5	Vielstengelige Sumpfbinsse (= Sumpfsimse)
<i>Juncus bulbosus</i> L.	.	.	.	2.2	.	Sumpfbinsse
<i>Apium inundatum</i> (L.) RCHB. FIL.	.	.	.	+2	.	Flutende Sellerie
<i>Hypericum elodes</i> L.	.	.	.	+3	.	Sumpfartheu
Begleiter:						
<i>Equisetum fluviatile</i> L. EM. EHRH.	+2	2.2	+2	1.2	+1	Schlamm-schachtelhalm
<i>Potamogeton natans</i> L.	.	.	+2	.	+2	Schwimmendes Laichkraut
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	.	.	+2	.	Gemeiner Wassernabel
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	.	.	.	+2	.	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	.	.	+1	.	Brennender Hahnenfuß
<i>Drepanocladus fluitans</i> (L.) WARNST.	.	.	.	+2	.	Flutendes Sichelmoos
CV Helodo-Sparganion						
(Flutende Igelkolben-Gesellsch.)						
<i>Potamogeton oblongus</i> VIV.	+1	.	+1	.	.	Knöterichbl. Laichkraut

Zu Tabelle I:

Die Tabelle 1 zeigt die Lobelia-Gesellschaft, und zwar in Aufnahme 1 und 2 in ihrer optimalen Entwicklung, während die Aufnahmen 3—5 als Degenerationsstadien zum Eleocharetum multicaulis, der Vielstengelsimengesellschaft, zu betrachten sind. Aufnahme 3 bildet hier die Subassoziatio mit *Littorella uniflora*, dem Strandling. Das Lobelietum wächst heute hauptsächlich in der östlichen Hälfte des Naturschutzgebietes, und zwar im mittleren Abschnitt auf Feinsand bei einer normalen Wassertiefe von 5—15 cm. Es hält sich jedoch noch in einer Tiefe von 20—30 cm und kann auch ein vorübergehendes, sommerliches Schwinden des freien Wassers ertragen. Stellenweise sind der Sandschicht des Bodens bis zu 1 cm Faulschlammreste aufgelagert. Wichtig ist die immer wieder erfolgende Freilegung des Sandbodens von den abgestorbenen Pflanzenteilen durch Wind und Wellenschlag. Die Aufnahmen 1 und 2 zeigen noch heute diese ökologischen Voraussetzungen, Aufnahme 3 liegt etwas tiefer und trägt etwa 2 cm Schlamm, die Aufnahmen 4 und 5 haben sich im Laufe der letzten Jahre sichtlich zum Eleocharetum multicaulis hin verschoben. In dem trockenen Sommer dieses Jahres konnte festgestellt werden, daß bereits am 3. 7. die Vegetationsfläche der Gesellschaft vollständig wasserfrei war, wobei die mehrere Meter breiten Lobeliabestände üppig blühten. 1958 standen die Lobeliahorste in einem seichten Wasser. Zur Mitte hin ist in Aufnahme 3 eine Littorella-Senke entwickelt, das Lobelietum wird abgebaut. Von der Uferzone her dringt stellenweise als abbauende Art der Schlammshachtelhalm, *Equisetum fluviatile*, in die Gesellschaft ein, im übrigen erfolgt der Abbau durch das Eleocharetum multicaulis.

Das Lobelietum ist eine Pflanzengesellschaft, die im atlantischen Teil Westeuropas ihr Optimum besitzt und im Süden bis in die atlantischen Teildistrikte Spaniens im Mediterrangebiet hineinreicht. Über Holland, Westfalen mit spärlicher Verbreitung, Niedersachsen und Schleswig-Holstein dringt *Lobelia* bis Mecklenburg vor. Ihre Bestände sind jedoch in den letzten Jahren auf ein Minimum des früheren Areals zusammengeschrunpft. KUBITZKI gibt als Wassertiefe der Lobelia für den Ihlsee, ein NSG Schleswig-Holsteins, 0,20 bis 1,30 m an. Nach seinen Angaben sind die Lobeliabestände in den holsteinischen Seen von großer Dichte. Für den Regierungsbezirk Osnabrück sind dem Verfasser im Augenblick nur noch zwei Fundorte mit größeren Beständen und drei Vorkommen, die fast erloschen sind, bekannt.

Anmerkungen zu Tabelle II:

Aufnahme 1: 10 m breiter Littorella-Streifen zur Mitte der Sumpffläche hin unterhalb der Lobeliazone, im SO des Gebiets, dünne Schlickdecke. 22. 7. 57

2: östliche Gebietshälfte. 22. 7. 57

- 3: größere Fläche zwischen dem Wasser und dem höher gelegenen Ostufer. 1 cm Faulschlamm ist dem Sand aufgelagert. 22. 7. 57
- 4: in der Mitte des Gebiets, südlich eines Stadiums der Teichbinse, Wassertiefe 8 cm. 11. 8. 57
- 5: Mitte des Gebietes, Wassertiefe 13 cm, pH-Wert 5,6. 11. 8. 57
- 6: größere, sumpfige Fläche im Norden. 11. 8. 57
- 7: feuchte Niederung in der südlichen Hälfte. 22. 7. 57
- 8: nordöstlicher Gebietsteil bei 30 cm Wassertiefe. 8.10.56
- 9: 1 bis 2 m breiter *Hypericum-elodes*-Streifen im Süden. 22. 7. 57
- 10: größere Fläche mit *Hypericum elodes* im NW des Gebietes, Wassertiefe am 8.10.56 33 cm.
- 11: 8 bis 10 m breite Zone in der Osthälfte. 22. 7. 57

Zu Tabelle II:

Das *Eleocharetum multicaulis*, die Vielstengelsimsengesellschaft, ist über den größten Teil des Naturschutzgebietes verbreitet, soweit normalerweise stehendes Wasser vorhanden ist. Die Wassertiefe beträgt in den Sommermonaten bei normalem Wasserstand 10—40 cm, 1956 wurden am 8. 10. 56 Werte zwischen 25 und 35 cm Wasserhöhe gemessen, während am 11. 7. 57 entsprechende Messungen wegen der größeren Trockenheit nur 8—13 cm ergaben. Am 3. 7. 59 war fast die gesamte Fläche bis auf eine schmale Ost-West-Mulde ausgetrocknet, die dann am 7. 8. 59 kein Wasser mehr enthielt.

Die Aufnahmen 1—4 stellen die Facies mit *Littorella uniflora*, dem Strandling, dar. *Littorella* selbst besiedelt die tiefste Zone von etwa 20—40 cm Wassertiefe. Der sandige Untergrund ist 1—2 cm hoch mit abgestorbenen Pflanzenresten bedeckt und besteht aus schwach tonigem Sandboden. *Eleocharis multicaulis* und *Echinodorus ranunculoides* sind konstant vorhanden, letztere im flachen Wasser, *Juncus bulbosus* wird bei Austrocknung dominant und überzieht im Gegensatz zur Wasserform dann als kurze rötliche Landform den Boden.

Aufnahme 4 zeigt das Eindringen von *Eleocharis palustris*, der Sumpfbinsse, die von der westlichen Gebietshälfte aus mehr oder weniger weitgehend in das Gesellschaftsgefüge eintritt. Verursacht bzw. gefördert wird diese Entwicklung durch tierische Fäkalien, die von einer an das Westufer grenzenden Rinderweide in das Wasser gelangen. Zu beachten ist hier, daß *Elisma natans* sich den Nährstoffen gegenüber recht widerstandsfähig zeigt. Die Vegetationsfläche mit *Eleocharis palustris* stellt wohl eine durch zugeführte Nährstoffe bedingte Facies dar (Aufnahme 5—6), nach den Aufnahmen, allerdings nur dieses einzelnen Gebietes, könnte es eine Subassoziatio-

Tabelle II

Eleocharetum multicaulis Allorge 1922
(Vielstengelsimsengesellschaft nebst Abbaustadien)

Nr. der Probefläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Artenzahl	5	5	5	8	7	9	10	11	15	12	14	
Größe der Probefläche, qm.	100	100	100	50	100	100	50	50	10	50	100	
Vegetationsbedeckung, %	80	80	70	100	100	90	100	30	100	60	100	
Charakter- u. Differentialarten:												
<i>Eleocharis multicaulis</i> SM.	1.2	3.3	4.4	1.2	3.3	1.2	1.2	2.2	1.2	3.4	+2	Vielstengelige Sumpfbirse
<i>Scirpus fluitans</i> L.	.	.	.	.	+2	+3	3.3	+3	+2	+3	1.2	Flutende Moorbirse
<i>Deschampsia setacea</i> (HUDS.) RICHT.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	+2	.	Borstenschmiele
<i>Littorella uniflora</i> (L.) ASCHERS.	5.5	4.4	2.3	3.3	.	.	+1	.	+1	.	.	Strandling
<i>Pilularia globulifera</i> L.	.	.	.	.	.	.	4.4	4.4	.	.	.	Pillenfarne
<i>Hypericum elodes</i> L.	.	.	.	+3	.	.	.	+2	4.4	3.4	.	Sumpfhartheu
<i>Elisma natans</i> BUCHENAU	.	.	.	1.1	3.3	+1	.	.	.	.	.	Schwimmendes Froschkraut
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. ET S.	.	.	.	2.3	3.3	3.4	.	.	.	.	.	Gemeine Sumpfbirse
<i>Potamogeton natans</i> L.	.	+1	.	1.2	3.3	2.3	+2	+2	.	+2	.	Schwimmendes Laichkraut
<i>Equisetum fluviatile</i> (L.) EM. EHRH.	.	+1	+2	.	.	.	1.2	.	1.2	.	4.4	Schlamm-schachtelhalm

VC Littorellion:

(Strandlingengesellschaften)

<i>Echinodorus ranunculoides</i> (L.)	+2	+2	+2	+2	.	+1	+1	+2	+2	2.2	2.2	Hahnenfußähnlicher Igel-schlauch
---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	-----	-----	----------------------------------

ENGELM.

<i>Lobelia dortmanna</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wasserlobelie
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

VC Helodo-Sparganion:

(Flutende Igelkolbengesellschaften)

<i>Potamogeton oblongus</i> VIV.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	+1	Längliches Laichkraut
<i>Sparganium minimum</i> FRIES	+1	.	.	.	+	1.3	.	+1	.	1.2	.	Kleinster Igelkolben

OC Littorelletalia:

(Strandlingengesellschaften)

<i>Juncus bulbosus</i> L.	.	.	.	.	.	+2	+2	1.2	1.2	1.2	+2	Rasenbinse
<i>Apium inundatum</i> (L.) RCHB. FIL.	.	.	.	+3	.	.	.	1.2	+2	.	.	Flutende Sellerie

Arten der Röhrichte u. Kleinseggen-sümpfe:

<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. BR.	.	.	.	.	+2	+2	.	+3	.	.	.	Flutender Schwaden
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	+1	.	+1	+2	+2	Wassernabel
<i>Comarum palustre</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+1	.	Sumpfbilutauge
<i>Eriophorum angustifolium</i> HONCK.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	Schmalblättriges Wollgras

Begleiter:

<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	+1	+1	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Myosotis scorpioides</i> L. EM. HILL.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
subsp. <i>palustris</i> (L.) F. HERM.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	+1	Sumpfergäßmeinnicht
<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	1.2	Brennender Hahnenfuß

Außerdem wurden je einmal notiert:

Aufn. 6: *Lysimachia thysiflora* L. +2; Aufn. 8: *Ranunculus hololeucus* LLOYD +2;
 Aufn. 9: *Mentha aquatica* L. +2; Aufn. 11: *Sparganium simplex* HUDS. 2.2;
Cardamine pratensis L. +2; *Scorpidium scorpioides* (L.) LIMPR. +2;
Epilobium palustre L. +1.

Aufnahme 7 und 8 zeigen eine Facies mit *Pilularia globulifera*, dem Pillenfarn, mit der *Scirpus fluitans*, die flutende Moorbinsse, vergesellschaftet ist, wenigstens solange die Vegetationsfläche mit Wasser bedeckt bleibt. In dem trockenen Sommer des Jahres 1959 allerdings haben sich auf der jetzt wasserfreien Fläche des Teichgrundes getrennte Herden von Pillenfarn und Moorbinsse in Größe bis zu 50 qm gebildet, wobei *Scirpus fluitans* als Landform ein frisches Aussehen behalten hat, während die Blätter des Pillenfarns allmählich vertrocknet sind und sich als abgestorbene Decke über einer großen Menge von Sporenkapseln ausbreiteten.

Aufnahme 9 bis 10 bilden die Facies mit *Hypericum elodes*, die sich meist als höhergelegene Zone zum Ufer hin der zentralen Wasserfläche anlegt. Von Jahr zu Jahr können Schwankungen in der Dichte und Größe dieser Bestände eintreten. An mehreren Stellen, besonders infolge einer gewissen Eutrophierung vom Ostufer her, macht sich in dieser östlichen Gehietshälfte die Konkurrenz des Schlamm-schachtelhalms, *Equisetum fluviatile*, bemerkbar. Aufnahme 11 ist bereits ein stark degradiertes Stadium mit Arten des Röhrichts, in dem *Equisetum fluviatile* dominiert. Die Aufnahmen der Tabelle deuten durch das Eindringen des Gemeinen Laichkrautes, *Potamogeton natans*, der Laichkrautgesellschaften und des vermehrten Auftretens von Arten des Röhrichts, so der Sumpfbinsse, *Eleocharis palustris*, des Schlamm-schachtelhalms, *Equisetum fluviatile*, des Flutenden Schwadens, *Glyceria fluitans*, und des Einfachen Igelkolbens, *Spartanium simplex*, darauf hin, daß im Gegensatz zu mehr oligotrophen Verhältnissen im Ahlder Pool, Kreis Lingen, eine gewisse Nährstoff-anreicherung vorliegt, die bis in die zentrale Wasserfläche hinein die Vielstengelsimsengesellschaft beeinflusst. Gleichfalls wird der weitere Entwicklungsgang zum Kleinseggensumpf durch einzelne Arten dieser Klasse bereits erkennbar.

Das Eleocharietum multicaulis ist im Regierungsbezirk Osnabrück weiter verbreitet als das sehr empfindliche Lobelietum. Die Beobachtungen ergeben, daß es in einer sehr artenarmen Zusammensetzung, jedoch mit starker Vitalität, noch in einzelnen flachen Moorstichen und Heidetümpeln vorhanden ist. Es ist dann oftmals noch mit *Scirpus fluitans* vergesellschaftet. *Littorella*, *Deschampsia setacea* und *Hypericum elodes* können in diesem Falle vollständig fehlen.

Littorella uniflora selbst wird für Deutschland im Norden als zerstreut, nach Süden hin für Sachsen als selten angegeben. Fundorte liegen dazu in Westfalen, Rheinland, Baden-Württemberg, Nordbayern und Hessen. In Westeuropa ist die Pflanze eine Charakterart des Littorellion-Verbandes mit seinen beiden Gesellschaften Eriocauleto-Lobelietum und dem Eleocharietum multicaulis. Gefährdet sind diese Bestände in der heutigen Zeit durch Meliorationsmaßnahmen und eine Eutrophierung der Gebiete.

Anmerkungen zu Tabelle III:

- Aufnahme 1: größerer Bestand vor dem Ostrande des Naturschutzgebietes, Datum der Vegetationsaufnahme: 11. 8. 57.
- 2: ähnlicher Bestand im NO, am 8. 10. 56 Wassertiefe: 25 cm.
- 3: größerer Bestand mit Faulschlammunterlage vor dem Westufer. 11. 8. 57
- 4: Bestand im SSW des Gebietes, bei 20 cm Wassertiefe am 8. 10. 56.
- 5: Facies der Schnabelsegge dicht vor dem Ostufer, Boden abgetrocknet. 11. 8. 57
- 6: kleinere Stadien mit einheitlicher Herdenbildung vor dem Westufer des Gebietes, wobei der Einfluß von der hochgelegenen Weide spürbar ist. 11. 8. 57
- 7: Dauerbestand der Flatterbinse im NO, Wassertiefe am 8. 10. 56 15 cm.
- 8: gleichfalls vor dem NO-Ufer bei 30 cm Wassertiefe am 8. 10. 56, Rohrkolbenbestand.
- 9: größere Rohrkolbenbestände in der westlichen Hälfte zum Ufer hin, südlich eines größeren Weidengebüsches, bei 25 cm Wassertiefe am 8. 10. 56.
- 10: Mitte der Wasserfläche mit größerer Herde der Teichbinse, im Wasser stehend, Datum der Vegetationsaufnahme: 11. 8. 57.
- 11: größerer Bestand des Ästigen Igelkolbens in der westlichen Hälfte unweit des Ufers, Boden sumpfig. 11. 8. 57

Zu Tabelle III:

Die Gesellschaft der Grausegge und des Hundsstraußgrases baut die Vielstengelsimsengesellschaft zum Ufer hin ab. Die vermehrte Auflagerung von unvollkommen zersetzten Pflanzenteilen schafft eine Faulschlammsschicht, die den Arten der vorhergehenden Gesellschaften der Tabelle I und II die Existenzmöglichkeit nimmt. Die Wassertiefe ist geringer und kann so weit zurückgehen, daß der Boden nur noch feucht ist. 1956 wurden am 8. 10. Werte zwischen 15 und 30 cm gemessen, am 11. 8. 57 waren diese Flächen nur 0—10 cm hoch vom Wasser bedeckt. Die Aufnahmen 1 bis 4 zeigen den Aufbau der Gesellschaft u. a. durch das Schmalblättr. Wollgras, das Hundsstraußgras und das Blutaue. Das Wollgras geht in größere Wassertiefe, während der stellenweise seichte Wasserstand zum Ufer hin vorwiegend die Dominanz des Blutauges erkennen läßt. Von den mancherlei Möglichkeiten der pflanzlichen Besiedlung der Wasserfläche könnte Aufnahme 5 als Subass. mit *Carex rostrata* (= *inflata*) angesprochen werden. Die beiden Aufnahmen 6 und 7 zeigen in den Stadien mit der Flatterbinse bzw. dem Weißen Straußgras und dem Einfachen Igelkolben, daß hier das Eleocharetum multicaulis weitgehend abgebaut

Cariceto canescens-Agrostidetum caninae
Gesellschaft der Grausegge und des Hundstraußgrases,
mit Faciesbildungen zum Röhrriecht

Nr. der Probefläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Artenzahl	6	8	18	16	13	7	7	7	20	7	15	
Größe der Probefläche, qm.	100	50	150	50	100	50	20	50	100	20	50	
Vegetationsbedeckung, %	90	100	100	60	90	100	100	90	80	70	100	
Charakter- und Differentialarten:												
<i>Agrostis canina</i> L.	3.3	4.4	+2	+2	1.2	+2	+2	1.2	1.2	.	.	Hundsstraußgras
<i>Carex canescens</i> L.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Weißgraue Segge
<i>Carex rostrata</i> STOKES	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	Schnabelsegge
VC Caricion canescenti-fuscae:												
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	+	1.2	+2	1.2	.	.	.	1.2	.	.	Wassernabel
<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	.	+1	.	+1	+2	.	.	+2	.	+2	Brennender Hahnenfuß
<i>Stellaria palustris</i> RETZ.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	Sumpfmühere
<i>Epilobium palustre</i> L.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	+1	Sumpfwidenröschen
Höhere Einheiten:												
<i>Comarum palustre</i> L.	3.3	1.2	4.4	4.4	1.2	2.3	+2	1.2	2.3	.	.	Sumpflblutauge
<i>Eriophorum angustifolium</i> HONCK.	4.3	2.2	3.3	2.2	+2	.	+2	3.3	.	.	.	Schmalblättr. Wollgras
Relikte des Eleocharietum multicaulis:												
<i>Hypericum elodes</i> L.	.	.	.	+3	+2	.	.	.	+2	.	+2	Sumpfharthau
<i>Juncus bulbosus</i> L.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.2	.	+2	Rasenbinse
<i>Apium inundatum</i> (L.) RECHB. FIL.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2	+2	.	Flutende Sellerie
<i>Eleocharis multicaulis</i> SM.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+3	+2	Vielstengelige Sumpfbinsse
<i>Scirpus fluitans</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+3	.	.	Flutende Moorbinsse
<i>Echinodorus ranunculoides</i> (L.) ENGELM.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	Hahnenfußähn. Igelkolben
<i>Deschampsia setacea</i> (HUDS.) RICHT.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	Borstenschmiele
<i>Sparganium minimum</i> FRIES	.	.	+2	.	.	.	.	.	+2	+2	.	Kleinster Igelkolben
Eindringende Arten anderer höherer Einheiten:												
Phragmitetalia												
(Eurosibirische Röhrichte)												
<i>Equisetum fluviatile</i> (L.) EHRH.	+1	.	.	+1	1.1	.	.	.	+1	.	.	Schlamm-schachtelhalm
<i>Typha latifolia</i> L.	.	.	.	.	+2	.	+1	3.4	4.4	.	.	Breitblättr. Rohrkolben
<i>Sparganium simplex</i> HUDS.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	+1	+2	.	Einfacher Igelkolben
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. ET S.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	+2	Sumpfbinsse
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) POIR.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+2	Wasserrüchel
<i>Scirpus lacustris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	Teichbinse
<i>Sparganium erectum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	Ästiger Igelkolben
Magnocaricion elatae												
(Großseggen-Rieder)												
<i>Galium palustre</i> L.	1.2	.	+2	+1	+2	.	.	+1	+1	.	+2	Sumpflabkraut
Bidentetia												
(Zweizahngesellschaften)												
<i>Bidens tripartita</i> L.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	+1	Dreiteiliger Zweizahn

ist. In Aufnahme 8 und 9 dominieren Herden des Breitblättr. Rohrkolbens, wobei die Bestände der Aufnahme 9, die sich aus dem Eleocharitetum multicaulis entwickelt haben, noch zahlreiche Arten dieser Gesellschaft aufweisen. Aufnahme 10 und 11 sind Stadien mit starker Dominanz der Teichbinse bzw. des Ästigen Igelkolbens. Die Mannigfaltigkeit der Vegetationszonierung, die sich hier zeigt, ist in der Hauptsache wohl auf die Nährstoffanreicherung bestimmter Gebiets- teile und die verschiedene Wassertiefe zurückzuführen. Die stärkste Ausbildung hat die Gesellschaft mit ihren Faciesbildungen in der Westhälfte. Allgemein löst sie die Vielstengelsimsengesellschaft zur Uferzone hin ab.

Anmerkungen zu Tabelle IV:

- Aufnahme 1: Kleiner, inselartiger Bestand im Osten des Gebietes, der die *Carex canescens*-*Agrostis canina*-Gesellschaft abgebaut hat. 11. 8. 57
- 2: Ähnlicher Bestand im nordwestlichen Gebietsteil. Wassertiefe am 20. 8. 56: 25 cm.
- 3: Aufnahme im mittleren Teil der nördlichen Hälfte, 3. 7. 59, am 20. 8. 56 wurde mit dem Spezialindikatorpapier von Merck der pH-Wert 5,4 gemessen.

Tabelle IV

Caricetum lasiocarpae, Fadenseggengesellschaft

Nr. der Probestfläche	1	2	3
Artenzahl	12	11	7
Größe der Probestfläche, qm.	30	100	50
Vegetationsbedeckung, %	100	90	80

Charakterart:

Carex lasiocarpa EHRH. 4.5 4.4 4.4 Fadensegge

VC Caricion canescenti-fuscae:

Hydrocotyle vulgaris L. +.2 1.2 1.2 Wassernabel
Ranunculus flammula L. +.1 +.1 +.1 Brennender Hahnenfuß

Höhere Einheiten:

Comarum palustre L. +.1 +.2 . Sumpfbblutauge
Eriophorum angustifolium HONCK. +.1 +.2 . Schmalblättr. Wollgras

Begleiter:

Lysimachia vulgaris L. 1.2 2.2 + Gem. Gilbweiderich
Hypericum elodes L. +.2 1.3 Sumpfhhartheu
Eleocharis multicaulis SM. +.1 . +.2 Vielstengl. Sumpfbbinse
Apium inundatum (L.) RCHB. FIL. +. +.2 +.2 Flutende Sellerie
Typha latifolia L. +.2 . Breitblättr. Rohrkolben
Echinodorus ranunculoides (L.) +.2 Hahnenfußähnlicher
 ENGELM. Igel-schlauch
Equisetum fluviatile (L.) EHRH. 1.1 . . Schlammschachtelhalm
Deschampsia setacea (HUDS.) RICHT. +.1 . Borstenschmiel
Drepanocladus fluitans (L.) WTF. +.2 . . Flutend. Sichelmoos
Galium palustre L. +.2 . . Sumpflabkraut
Cardamine pratense L. +.2 . . Wiesenschaumkraut
Sparganium simplex HUDS. +.2 . Einfach. Igelkolben
Salix cinerea L. +.2 . . Grauweide

Zu Tabelle IV:

Für den Sukzessionsverlauf der Gesellschaftsentwicklung des Gesamtgebietes ist von besonderer Bedeutung das Auftreten einzelner Herden der Fadensegge, *Carex lasiocarpa*, die sich ganz charakteristisch durch die auffallende Dichte ihrer Bestände, die schmalen, lang ausgezogenen Blätter der Einzelhorste, die Behaarung ihrer länglichspitzen Fruchtschläuche und den Rhythmus der Bewegung, wenn der Wind über die Fläche hinwegstreicht, hervorheben. WALO KOCH beschreibt 1926 mit 11 Aufnahmen das Caricetum lasiocarpae aus der Nordostschweiz, TÜXEN führt es 1937 für Nordwestdeutschland als seltene Charaktergesellschaft des Stieleichenbirkengebietes in nassen, nährstoffarmen Senken an.

Die Aufnahmen 1 bis 3 zeigen die Artenkombination dieser Bestände in der nördlichen Hälfte des Gebietes, wo sie sich auf schwach erhöhtem Boden ausbreiten. Verbandscharakterarten der Schnabelsimensümpfe, des Rhynchosporion-Verbandes, wozu das Caricetum lasiocarpae heute gerechnet wird, sind nicht vorhanden. Dafür treten einige Arten höherer Ordnung einschließlich des Verbandes der Grauseggen-Sumpfwiesen, des Caricion canescenti-fuscae, in der Gesellschaft als bemerkenswert auf. Die Entwicklung aus den Strandling-Gesellschaften der Littorelletea wird durch die Reste besonders des Helodo-Sparganion-Verbandes, der Flutenden Igelkolben-Gesellschaften, bestätigt. Dazu kommen einige Begleiter anderen Charakteren.

W. KOCH weist schon darauf hin, und seine Aufnahmen zeigen es, daß die bestandschaffende und erhaltende Fadensegge die wichtigste Charakterart ist. Das fragmentartige Auftreten in Nordwestdeutschland, das auch von TÜXEN erwähnt wird, hindert nicht, daß das Caricetum lasiocarpae trotz einer gewissen Verarmung an Charakterarten des Verbandes bei uns eine festumrissene Gesellschaft bildet.

Anmerkungen zu Tabelle V:

Aufnahme 1: außerhalb des SO-Randes vom Naturschutzgebiet als abgeplagte Sandfläche inmitten eines Weiden-Birken-Gebüsches. 22. 7. 57

2: Vegetationsfläche im NO des Gebietes auf einer 20 cm hoch die Sumpffläche überragenden Sandzone. 3. 7. 59

3: kleine Vegetationsfläche, die 10 cm tiefer als Aufnahme 1 liegt und ziemlich feucht mit einem Algenüberzug ist. 22. 7. 57

4: kleine, östlich von Aufnahme 3 gelegene, 20 cm erhöhte, ehemals abgeplagte sandige Fläche. 22. 7. 57

5: abgeplagte Fläche neben der vorigen Aufnahme. 7. 8. 59

Tabelle V

Rhynchosporium caricetosum paniceae Diemont et Tx. 1937
Schnabelsim sengesellschaft

Nr. der Probefläche	1	2	3	4	5	
Artenzahl	15	8	13	11	15	
Größe der Probefläche, qm.	1	0,5	0,5	1	2	
Vegetationsbedeckung, %	80	100	70	80	30	
Charakterarten:						
<i>Drosera intermedia</i> DREVES	2.2	+2	1.2	3.3	1.2	Mittlerer Sonnentau
ET HAYNE						
<i>Lycopodium inundatum</i> L.	+2	.	.	1.2	+2	Sumpfbärlapp
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) AITON . .	3.4	2.2	.	.	.	Braunes Schnabelriet
Differentialarten:						
<i>Zygogonium ericetorum</i>	2.3	+2	1.2	1.2	3.4	Heidealge
(DILL.) KTZ.						
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	+2	+2	.	+2	+2	Rundblättr. Sonnentau
<i>Carex serotina</i> MERAT	+2	.	3.3	.	+2	Späte Segge
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) DELARBRE	.	.	+1	.	+1	Bitterkraut
<i>Carex panicea</i> L.	.	.	.	.	+2	Hirseartige Segge
<i>Sphagnum compactum</i> DC.	+2	.	.	.	.	Dichtes Torfmoos
VC Rhynchosporion-Verband:						
(Schnabelsim sen-Verband)						
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) WAHL . . .	.	+2	.	.	1.2	Weißes Schnabelriet
VC Caricion canescenti-fuscae:						
(Grauseggensumpfwiesen)						
<i>Agrostis canina</i> L.	+1	.	+	+1	+1	Hundsstraußgras
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	.	+2	.	+1	Wassernabel
Höhere Einheiten:						
<i>Comarum palustre</i> L.	.	.	+2	.	.	Sumpfbblutauge
<i>Eriophorum angustifolium</i> HONCK.	+1	+2	1.2	+	.	Schmalblättr. Wollgras
Begleiter:						
<i>Molinia coerulea</i> (L.) MOENCH . .	+2	+2	+2	1.2	+2	Pfeifengras
<i>Potentilla erecta</i> (L.) RAENSCH. . .	1.2	.	+1	+2	+1	Blutwurz
<i>Polytrichum perigoniale</i> MICH. . .	+2	.	+1	+2	+3	Haarmützenmoos
<i>Betula pubescens</i> EHRH.	1.2	.	+1	+1	+1	Moorbirke
<i>Erica tetralix</i> L.	+2	3.3	.	+2	.	Glockenheide
<i>Juncus articulatus</i> L.	+2	.	+2	.	+2	Glanzfrüchtige Binse
<i>Pedicularis silvatica</i> L.	+1	.	+1	+	.	Waldläusekraut
<i>Salix repens</i> L.	+3	.	.	+2	.	Kriechende Weide
<i>Thymus serpyllum</i> L.	1.2	.	1.2	.	.	Feldthymian
<i>Scirpus caespitosus</i> L.	.	.	.	.	1.2	Rasensimse
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) HULL.	.	+2	.	.	.	Gemeines Heidekraut
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	.	.	+2	.	.	Sumpfruhrkraut
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. ET S. .	.	.	+2	.	.	Gemeine Sumpfbbinse
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	.	.	.	+2	.	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Genista anglica</i> L.	.	.	.	.	+1	Englischer Ginster
<i>Salix cinerea</i> L.	+2	.	.	.	.	Grauweide
Sonstige Moose und Flechten:						
<i>Fossombronina Dumortieri</i>	+2	.	+2	1.2	.	Moorzipfelmoos
(HUBN. U. G.) LINDB.						
<i>Sphagnum cymbifolium</i> EHRH. . . .	+2	.	.	+2	.	Kahnblättr. Torfmoos
<i>Haplozia crenulata</i> (SM.) DUM. . . .	+2	.	+2	.	.	Lebermoos-Art
<i>Aneura incurvata</i> (LDBG.) STEPH.	+2	.	.	+2	.	Ohnervmoos
<i>Hypnum ericetorum</i> (BRID.) PAUL . .	.	.	.	+2	+2	Heideschlafmoos
<i>Gymnocolea inflata</i> (HUDS.) DUM. .	.	.	.	.	+2	Nacktkelchmoos
<i>Sphagnum papillosum</i> LINDB. . . .	.	2.2	.	.	.	Warziges Torfmoos
<i>Sphagnum auriculatum</i> SCHPR. . . .	.	.	+2	.	.	Kuhhornmoos

In Aufnahme 5 wurde noch *Frangula alnus*, der Faulbaum, mit +2 notiert.

Zu Tabelle V:

Auf ehemals abgeplagten Stellen bzw. dort, wo Sand gegraben wurde und die Vegetationsdecke noch nicht wieder geschlossen ist, tritt als heute seltene Vegetationseinheit das Rhynchosporium, die Schnabelsimengesellschaft, auf. Sie findet sich hier in beschränkter Ausdehnung unmittelbar außerhalb der Südostecke des Gebietes und im Nordosten. Als heute überall seltene Charakterarten sind der Mittlere Sonnentau, *Drosera intermedia*, der Sumpfbärlapp, *Lycopodium inundatum*, und das Braune Schnabelriet, *Rhynchospora fusca*, zu nennen. Auch die von TÜXEN für das Rhynchosporium caricetosum paniceae genannten Differentialarten finden sich gleichfalls in dem vorstehenden Untersuchungsgebiet, so daß sie in der Tabelle, obwohl das Rhynchosporium sphagnetosum cuspidati nicht im Naturschutzgebiet auftritt, als Differentialarten aufgeführt sind. Die Kleinheit der Bestände läßt zahlreiche abbauende Arten auftreten. Die Entwicklung zum Ericetum ist aber besonders in Aufnahme 2 der Tabelle klar ersichtlich.

Anmerkungen zu Tabelle VI:

Aufnahme 1: kleinere Vegetationsfläche vor dem Gebüschgürtel an der Südseite des Naturschutzgebietes, normalerweise trocken. 11. 8. 57

2: Bestand im Südosten des Gebietes vor dem Erlen-
gebüsch. Die Wassertiefe betrug am 8. 10. 56 10 bis
20 cm, der pH-Wert 5,6.

Zu Tabelle VI:

Der Grauseggen-Sumpfwiesen-Verband, das Caricion canescentifuscae, ist in dem behandelten Naturschutzgebiet noch durch den Waldbinsen-Sumpf, das Juncetum acutiflori, vertreten. Diese Gesellschaft bildet an mehreren Stellen als Randzone der Wasserfläche den Übergang zu einem Erlenbruchwald in fragmentarischer Ausbildung. Der Boden der Waldbinsengesellschaft ist bereits in Jahren mit normalem Wasserstand größtenteils trocken und wird nur zeitweise bei Zufuhr größerer Niederschlagsmengen vom Wasser bedeckt. Als Charakterart besitzt die Spitzblütige Waldbinse einen hohen aufbauenden und festigenden Wert. Außerdem wird die Gesellschaft aufgebaut durch eine Anzahl von Verbands-, Ordnungs- und Klassen-Charakterarten, wobei die Bedeutung dieser Waldbinsengesellschaft in besonderer Weise noch darin besteht, daß sie durch das reliktartige Vorkommen eine Reihe von Arten anderer Verbände und Ordnungen, so der Röhrichte und Großseggen-Rieder und der Feuchtwiesen vom Molinia-Charakter die Sukzessionsfolge erkennen läßt. Aufnahme 2 ist bereits ein weit fortgeschrittenes Degenerationsstadium

mit dem Lanzettlichen Reitgras, *Calamagrostis canescens*, das in seiner soziologischen Stellung dem Schwarzerlen-Verband angehört und mit den gleichfalls aufkommenden Weiden die Entwicklung zum Erlenbruchwald anzeigt.

Tabelle VI

Juncetum acutiflori, Waldbinsensumpf

Nr. der Probestfläche	1	2
Artenzahl	26	15
Größe der Probestfläche, qm.	50	25
Vegetationsbedeckung, %	100	100
Charakterart:		
<i>Juncus acutiflorus</i> EHRH.	5.5	1.2 Spitzblütige Binse
VC Caricion canescenti-fuscae:		
(Grauseggen-Sumpfwiesen)		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	2.2	. Wassernabel
<i>Agrostis canina</i> L.	1.2	+2 Hundstraußgras
<i>Viola palustris</i> L.	+2	. Sumpfteiellen
<i>Ranunculus flammula</i> L.	+1	. Brennender Hahnenfuß
<i>Epilobium palustre</i> L.	+2	. Sumpfwidenröschen
OC Caricetalia fuscae:		
(Braunseggensümpfe)		
<i>Carex stolonifera</i> HOPPE	+2	. Wiesensegge
KC Scheuchzerio-Caricetea fuscae:		
(Kleinseggensümpfe)		
<i>Eriophorum angustifolium</i> HONCK.	+1	+1 Schmalblättriges Wollgras
<i>Comarum palustre</i> L.	1.2	1.2 Sumpflblutauge
Begleiter anderer Einheiten:		
Phragmitetea		
(Röhrichte und Großseggen-Rieder)		
<i>Equisetum fluviatile</i> (L.) EHRH.	+1	+2 Schlammsschachtelhalm
<i>Galium palustre</i> L.	+2	+2 Sumpflabkraut
<i>Scirpus lacustris</i> L.	+2	. Teichbinse
<i>Mentha aquatica</i> L.	+1	. Wasserminze
Molinietalia		
(Feuchtwiesen)		
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	+1	1.2 Gemeiner Gilbweiderich
<i>Galium uliginosum</i> L.	+2	. Moorlabkraut
<i>Juncus effusus</i> L.	.	+3 Flatterbinse
Alnion glutinosae		
(Erlenbruchwälder)		
<i>Calamagrostis canescens</i>	.	5.5 Lanzettl. Reitgras
(WEB.) ROTH.		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	+2	+2 Schwarzerle
<i>Salix aurita</i> L.	+2	+2 Öhrchenweide
<i>Salix cinerea</i> L.	+2	+2 Grauweide
<i>Alnus glutinosa</i> K.	+	. Schwarzerle
Sonstige Begleiter einschl. Moose:		
<i>Drepanocladus fluitans</i> L.	+2	1.2 Flutendes Sichelmoos
<i>Polygonum amphibium</i> L.	+2	+1 Wasserknöterich
<i>Sphagnum auriculatum</i> SCHPR.	1.2	1.2 Kuhhornmoos
<i>Sphagnum inundatum</i> (RUSS.) WTF.	+3	. Flutendes Torfmoos
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	+2	. Wasserpfeffer
<i>Polytrichum gracile</i> DICKS.	+2	. Schlankes Haarmützenmoos
<i>Polytrichum strictum</i> BANKS	+2	. Steifes Haarmützenmoos

Tabelle VII

Initialphase zum Erlenbruchwald
(Verband des Alnion glutinosae)

Nr. der Probefläche	1	2	3	
Artenzahl	15	11	22	
Größe der Probefläche, qm.	100	200	50	
Vegetationsbedeckung, %	70	60	70	
VC Alnion glutinosae:				
(Erlenbruchwälder)				
MP <i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	5.5	4.4	5.5	Schwarzerle
NP <i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	3.3	1.2	.	Schwarzerle
<i>Lycopus europaeus</i> L.	+2	.	+2	Wolfstrapp
<i>Salix cinerea</i> L.	+2	2.2	+2	Grauweide
<i>Salix aurita</i> L.	+2	.	+2	Öhrchenweide
Begleiter früherer Gesellschaften:				
Molinietaalia (Feuchtwiesen)				
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	3.3	3.3	4.4	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Molinia coerulea</i> (L.) MOENCH	+2	.	+2	Pfeifengras
<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	+2	Flatterbinse
<i>Cardamine pratensis</i> L.	+2	.	.	Wiesenschaumkraut
Caricetea-fuscae-Wiesen				
(Kleinseggenstümpfe)				
<i>Agrostis canina</i> L.	1.2	.	.	Hundstraußgras
<i>Viola palustris</i> L.	1.2	.	.	Sumpfteißen
<i>Comarum palustre</i> L.	.	+2	.	Sumpfpflutauge
<i>Epilobium palustre</i> L.	.	+1	.	Sumpfwidenröschen
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	.	+2	Wassernabel
<i>Carex stolonifera</i> HOPPE	.	.	+2	Wiesensegge
<i>Carex canescens</i> L.	.	.	+2	Weißgraue Segge
Phragmitetea				
(Röhrichte und Großseggen-Rieder)				
<i>Galium palustre</i> L.	1.2	+2	+2	Sumpflabkraut
<i>Equisetum fluviatile</i> (L.) EHRH.	.	4.4	.	Schlamm-schachtelhalm
<i>Poa palustris</i> L.	.	.	+1	Sumpfrispengras
Bidentetea				
(Zweizahn-Gesellschaften)				
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	+1	.	.	Wasserpfeffer
<i>Polygonum minus</i> HUDS.	.	.	+1	Kleiner Knöterich
Sonstige Begleiter:				
<i>Lemna minor</i> L.	+2	.	.	Kleine Teichlinse
<i>Dryopteris austriaca</i> (JAQ.)	+1	.	+2	Dorniger Nierenfarn
WOYNAR				
<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	+2	Wolliges Honiggras
<i>Holcus mollis</i> L.	.	.	+2	Weiches Honiggras
<i>Ranunculus repens</i> L.	.	.	+2	Kriechender Hahnenfuß
<i>Agrostis alba</i> L.	.	.	+2	Weißes Straußgras
<i>Myosotis palustris</i> (L.) NATHH.	.	.	+2	Sumpfergüßmeinnicht
Moose und Pilze:				
<i>Mnium hornum</i> L.	+3	+2	.	Schwanhalsiges Sternmoos
<i>Plagiothecium curvifolium</i>	.	+2	.	Krummblättriges
SCHLIEPK.				
<i>Calliergon cuspidatum</i> (L.) KDBG.	.	+2	.	Schiefbüchsenmoos
<i>Xerocomus badius</i> FR.	.	.	+1	Spießmoos
<i>Russula spec.</i>	.	.	+	Maronenröhrling
<i>Laccaria laccata</i>	.	.	+	Violetter Täubling
(SCOP. EX FR.) BK. U. BR.				
				Lackbläuling

Anmerkungen zu Tabelle VII:

- Aufnahme 1: zehnjähriger Erlenbruchwald mit älteren Stämmen im Westen des Gebietes, Bestandsbreite 10 m, Kronenschluß 0,7, im Vergleich zur westlich vorgelagerten Weide vertieft. 8. 10. 56
- 2: Gebüsch mit Erlen und Weiden in der SO-Ecke des Gebietes, etwa zehnjährig, Kronenschluß 0,8, mit Unterholz. 11. 8. 57
- 3: Bruchwaldbestand im SW. 11. 8. 57

Zu Tabelle VII:

Die 3 Aufnahmen zeigen das Aufkommen kleinerer Einzelbestände vom Erlenbruchwaldcharakter in der äußeren Randzone des Naturschutzgebietes. Die Artenkombination ist noch unausgeglichen. Nur wenige Arten gehören dem Alnion-Verbande an. Eine größere Anzahl der verschiedensten Klassen sind reliktiert vertreten. Trotz des noch nicht ausgeglichenen Artenbestandes sind die aufkommenden Bruchwaldstadien äußerst wichtig. Sie beleben das Landschaftsbild und können auch in einem gewissen Rahmen der Eutrophierung der zentralen Wasserfläche durch Abfangen von Staub und Düngesalzteilen entgegenwirken.

Anmerkungen zu Tabelle VIII:

- Aufnahme 1: schwache Mulde im NO der Randzone. 3. 7. 59
- 2: feuchte Randzonenniederung im NO. 3. 7. 59
- 3: kleine versumpfte Fläche im NW der Randzone. 8. 10. 56
- 4: stark degradierte Fläche im SO des Gebietes. 8. 10. 56 und 22. 7. 57
- 5: Glockenheidefragment im SO neben Aufn. 4. 22. 7. 57
- 6: feuchte Vegetationsfläche im NO innerhalb des Ericetum. 8. 10. 56

Zu Tabelle VIII:

Die Glockenheidebestände, die das Ericetum tetralicis in fragmentarischer Form darstellen, sind im Gebiet im NO auf schwach erhöhtem Uferrand des Heidegewässers in kleineren Beständen entwickelt, im SO finden sie sich nur fragmentarisch.

Aufnahme 1 bildet das Initialstadium einer ehemaligen Schlenke mit der Schnabelsimsegengesellschaft, die sich zum Ericetum entwickelt. Aufnahme 2 ist bereits durch zahlreiche Arten und Differentialarten der feuchten Gruppe der Sandheiden gefestigt. Aufnahme 3 stellt nur einen kleinen Komplex im NW des Gebietes dar und weist vielleicht durch *Succisa pratensis* auf die gleichnamige Subassoziation dieser Art hin. Aufnahme 4 bildet ein degeneriertes Stadium, das

Tabelle VIII

©Naturwissenschaften - Ericetum tetralicis - Snabrück e.V.

(Glockenheidegesellschaft, meist in fragmentarischer Ausbildung)

Nr. der Probefläche	1	2	3	4	5	6	
Artenzahl	12	18	9	23	17	9	
Größe der Probefläche, qm	4	100	4	50	10	1	
Vegetationsbedeckung, %	100	100	100	100	100	100	
Lokale Charakter- u. Differentialarten:							
<i>Erica tetralix</i> L.	2.3	4.4	1.2	1.2	3.3	1.2	Glockenheide
<i>Scirpus caespitosus</i> L.	.	+2	.	.	.	.	Rasensimse
<i>Narthecium ossifragum</i> HUDS.	.	+2	.	.	.	.	Ährenllilie
<i>Sphagnum compactum</i> DC	.	+2	.	.	.	.	Dichtes Torfmoos
<i>Sphagnum molle</i> SULL.	.	+2	.	.	.	.	Weiches Torfmoos
Differentialarten:							
<i>Sphagnum papillosum</i> LINDB.	2.3	1.2	4.5	1.2	3.4	5.5	Warziges Torfmoos
<i>Succisa pratensis</i> MUCH.	.	.	1.2	.	.	.	Teufelsabbiss
OC Ericeto-Sphagnetalia:							
(Glockenheide-Bleichmoos-Gesellsch.)							
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	+1	+2	.	+2	+2	.	Rundblättriger Sonnentau
<i>Aulacomnium palustre</i> (L.)	.	+2	.	.	.	.	Sumpfstreifensternmoos
SCHWÄGR.							
Begleiter:							
<i>Molinia coerulea</i> (L.) MOENCH.	+2	1.2	+2	4.4	1.3	+2	Pfeifengras
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) HULL.	+2	+2	.	+	.	.	Gemeine Heide
<i>Drosera intermedia</i> DREVES	1.1	+2	.	+3	.	.	Mittlerer Sonnentau
ET HAYNE							
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	.	+1	+2	+1	.	.	Lungenenzian
<i>Hypnum Schreberi</i> WILLD.	.	.	.	+2	+2	.	Rotstengelmoss
<i>Hypnum ericetorum</i> (BRID.) PAUL	.	.	.	+2	+2	.	Heideschlafmoos
<i>Betula pubescens</i> L.	+2	+2	.	.	.	.	Moorbirke
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	.	.	.	+1	+1	+1	Gemeiner Gilbweiderich
<i>Potentilla erecta</i> (L.) RAENSCH.	.	.	+2	+2	+2	.	Blutwurz
<i>Viola palustris</i> L.	.	.	.	+2	+2	.	Sumpfeveilchen
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	.	.	.	+1	+2	.	Schwarzerle
<i>Drepanocladus fluitans</i>	.	+2	.	+2	.	.	Flutendes Sichelmoos
<i>Salix repens</i> L.	.	+2	.	.	.	.	Kriechweide
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) VAHL.	3.3	.	.	.	.	.	Weißes Schnabelriet
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) AITON	+2	.	.	.	.	.	Braunes Schnabelriet
<i>Cirsium palustre</i> (L.) SCOP.	.	.	.	.	+1	.	Sumpfkratzdistel
<i>Galium saxatile</i> (L.) FL. WETT.	.	.	.	.	+1	.	Steinlabkraut
<i>Agrostis canina</i> L.	.	.	+2	+2	+1	1.2	Hundsstraußgras
<i>Comarum palustre</i> L.	.	.	+	+1	.	+2	Sumpfbloodauge
<i>Carex canescens</i> L.	.	.	.	.	+2	.	Weißgraue Segge
<i>Betula pubescens</i> EHRH.	.	.	.	+1	.	+1	Moorbirke
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	.	.	.	+2	.	+1	Wassernabel
<i>Frangula alnus</i> MILL.	.	.	+	+1	.	+1	Faulbaum
<i>Quercus robur</i> K.	.	.	.	+	.	.	Stieleiche
<i>Pedicularis silvatica</i> L.	.	.	.	+2	.	.	Waldläusekraut
Sonstige Sporenpflanzen:							
<i>Leptocyphus anomalus</i> (HOOK.)	.	+2	.	.	.	.	Unechtes Dünkelchmoos
LDBG.							
<i>Zygogonium ericetorum</i> (DILLW.)	.	+2	.	.	.	.	Heidealge
KTZ.							
<i>Gymnocolea inflata</i> (HDS.) DUM.	2.2	+2	.	+2	.	.	Nacktkelchmoos
<i>Cephalozia fluitans</i> (NEES) SPRUCE.	+2	.	.	.	.	.	Flutendes Kopfsproßmoos
<i>Sphagnum auriculatum</i> SCHPR.	.	.	.	.	+2	.	Kuhhornmoos
<i>Polytrichum commune</i> L. fo. <i>perigon</i>	.	.	.	.	+2	.	Gemeines Haarmützenmoos
(Moorform)							
<i>Cephalozia Franzisci</i> (HOOK.) DUM.	.	.	.	+2	.	.	Kopfsproßmoos
<i>Polyporus brumalis</i>	.	.	.	.	+2	.	Winterportling
<i>Cladonia condensata</i> FLOERK.	+2	.	.	.	.	.	Milde Säulenflechte

durch Abbau des Ericetum entstanden ist. Aufnahme 5 im SO ist gekennzeichnet durch ein reichliches Vorkommen von *Sphagnum papillosum*, Aufnahme 6 zeigt auf einer kleinen Fläche im NO des Gebietes die herdenweise Ausbildung von *Sphagnum papillosum*, die hier ein Stadium im Ericetum tetralicis darstellt.

Anmerkungen zu Tabelle IX:

Aufnahme 1: Heidefragment im SO, Sand. 22. 7. 57

2: kleinere Heidefläche auf sandigem Hügel der Randzone im NO, trocken. 3. 7. 59

Tabelle IX

Calluno-Genistetum subatlanticum (Ginster-Sandheide)

Nr. der Probestfläche	1	2
Artenzahl	21	12
Größe der Probestfläche, qm.	50	50
Vegetationsbedeckung, %	100	100

Lokale Charakterarten:

der feuchten Sandheide

(Calluno-Genistetum molinietosum)

<i>Calluna vulgaris</i> (L.) HULL.	4.4	4.3	Gemeines Heidekraut
<i>Genista anglica</i> L.	+1	.	Englischer Ginster

Differentialarten der feuchten Gruppe:

<i>Erica tetralix</i> L.	1.2	3.3	Glockenheide
<i>Molinia coerulea</i> (L.) MOENCH.	1.2	+2	Pfeifengras
<i>Scirpus lacustris</i> L.	+2	.	Rasensimse
<i>Juncus squarrosus</i> L.	+2	.	Sparrige Binse

Begleiter:

<i>Betula pendula</i> ROTH	1.2	+2	Weißbirke
<i>Quercus robur</i> L.	+1	+	Stieleiche
<i>Pinus silvestris</i> L.	2.2	.	Waldkiefer
<i>Betula pubescens</i> EHRH.	2.2	.	Moorbirke
<i>Salix repens</i> L.	+2	.	Kriechende Weide
<i>Salix aurita</i> L.	1.2	.	Öhrchenweide
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.	+2	.	Schwarzerle
<i>Potentilla erecta</i> (L.) RAENSCH.	+3	.	Blutwurz

Dazu wurden an Kryptogamen einmal notiert:

in Aufnahme 1: *Hypnum Schreberi* 4.4, *Sphagnum cymbifolium* 1.2, *Leptocyphus anomalus* +2, *Cetraria islandica* +2, *Polytrichum perigoniale* +2, *Sphagnum papillosum* +2, *Cladonia condensata* +;

in Aufnahme 2: *Hypnum ericetorum* 2.2, *Funaria hygrometrica* +2, *Pohlia nutans* +2, *Ceratodon purpureus* +2, *Cladonia condensata* 1.2, *Cladonia laxiscula* +2, *Cladonia Floerkeana* +2.

Zu Tabelle IX:

Die Ginstersandheide bildet nur kleine Reste im SO und NO des Gebietes und stellt hier die Fortentwicklung des Ericetum, das in der feuchteren Niederung zu finden ist, zur trockenen Sandhöhe hin dar. Im Bereich des von Zeit zu Zeit steigenden Grundwassers findet sich die Aufnahme 1. Auf der Kuppe der etwa 1 m hohen Sandhügel, die allerdings in den letzten Jahren teilweise abgegraben wurden, ist dann die Sandheide der Aufnahme 2 entwickelt, die durch das Vorkommen mehrerer Arten der atlantischen Flechtenheiden charakterisiert werden kann. Es handelt sich hier in der Hauptsache um Arten bzw. Formen der *Cladonia impexa*-Gruppe, die im Gegensatz zu solchen *Cladonia*-Arten, deren Verbreitung nach Mitteldeutschland hineinreicht, auf die Feuchtigkeit des atlantischen Gebietes angewiesen sind.

III. Zusammenfassung

Es handelt sich bei dem Naturschutzgebiet „Berger Keienvenn“ um eine flache Senke, deren durchschnittliche Wasserhöhe normalerweise ca. 50 cm beträgt und die zum Ufer hin allmählich ansteigt. Die Fläche liegt in einem Gebiet, das vor seiner Kultivierung durch die Gesellschaften der Glocken- bzw. Callunaheiden bestimmt war und in seiner natürlichen Waldentwicklung Eichen-Birkenwald-Bestände des Querceto-roboris-betuletum aufweist, während in den feuchten Niederungen Bruchwaldfragmente mit Erlen oder Birken vorhanden sind. Die Wasserverhältnisse bedingen das heute noch reichliche Vorkommen einer großen Zahl atlantischer Arten. Entsprechend der Wassertiefe und äußerer eutropher Einflüsse auf ein an sich saures, oligotrophes Substrat ist die Senke durch eine Zonierung der Vegetation ausgezeichnet, die außer der Littorella-Fazies der Vielstengelsimsengesellschaft, dem Eleocharetum multicaulis, noch verschiedene Faziesbildungen dieser Gesellschaft zeigt. Hier ist zu nennen die Ausbildung von größeren Beständen mit *Elisma natans*, *Eleocharis palustris* und *Potamogeton natans* hauptsächlich in der Westhälfte der Wasserfläche, die in der Hauptsache wohl auf Grund reichlich eindringender Nährstoffe und einer vermehrten Faulschlammabildung beruht. Stellenweise dominiert im Wasser auf größeren Flächen der Pillenfarn, *Pilularia globulifera*. Das Sumpfharthheu, *Hypericum elodes*, bildet eine etwas höher ansteigende Randzone der ausklingenden Wasserfläche. In der Osthälfte, wo der Wellenschlag immer wieder eine Freilegung des sandigen Untergrundes zur Folge hat, steht das Lobelietum. Der Vielstengelsimsengesellschaft folgt der Grauseggen-Hundsstraußgras-Sumpf, in dem das Schmalblättrige Wollgras, *Eriophorum angustifolium*, das Sumpflblutauge, *Comarum palustre*, oder die Schnabelsegge, *Carex rostrata*, dominieren können. Als abbaue Arten aus der Klasse der Eurosibirischen Röhricht-Gesellschaften breiten sich örtlich der Breitblättrige Rohrkolben, *Typha latifolia*,

die Teichbinse, *Scirpus lacustris*, der Schlamm-schachtelhalm, *Equisetum fluviatile*, der Ästige und Einfache Igelkolben, *Sparganium erectum* et *simplex*, aus. Diese Gesellschaft zeigt den Sukzessionsverlauf zur Fadenseggengesellschaft, dem Caricetum lasiocarpae, an, deren flächenmäßige Ausdehnung in den letzten Jahren erkennbar war. Auf den sauren Sanden der Randzone des Gebietes sind besonders im SO und NO die Gesellschaften der Glockenheide und der Ginsterheide, das Ericetum und Calluno-Genistetum subatlanticum, meist fragmentarisch entwickelt, wobei im SO das bedeutungsvolle Vorkommen der Schnabelsimsegengesellschaft zu erwähnen ist. Der Waldbinsensumpf, das Juncetum acutiflori, bildet die Weiterentwicklung zu den vorhandenen Erlenbruchwaldfragmenten mit Erle, *Alnus glutinosa*, Moorbirke, *Betula pubescens*, und dem Lanzettlichen Reitgras, *Calamagrostis canescens*.

Ein Profil am Fundort der Lobelia zeigte, daß unter der oberflächlichen Sandschicht, auf der Lobelia reichlich wuchs, bis zur untersuchten Tiefe von 70 cm Sand- und Humusschichten einander ablösen, so daß man hier wohl auf eine wiederholte, alte natürliche Sandauftragung durch Wind oder Wasser aus der höheren Umgebung des Gebietes schließen kann.

Die Reichhaltigkeit der atlantischen Arten und die eindrucksvolle pflanzensoziologische Gliederung der Vegetation zeigt das Gebiet als eine überregional bedeutungsvolle Florenstätte. Alle wasserwirtschaftlichen Maßnahmen müssen, falls nicht eine Vernichtung der heutigen Vegetation eintreten soll, in bezug auf die notwendige Wasserhöhe und ein Fernhalten eutropher Einflüsse einer besonders sorgfältigen Beachtung unterzogen werden. Dazu sind auch Pflegemaßnahmen unerlässlich, um die durch den modernen Wirtschaftsbetrieb der Umgebung oft gestörte naturnahe Entwicklung zu unterstützen.

Literatur

- ALTEHAGE, CARL: Die Scheuchzeria-Moore des Hümmlings als wichtige Natururkunden Nordwestdeutschlands. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabrück, **27**, 1955.
- : Der „Ahlder Pool“ im Kreise Lingen als wichtige atlantische Florenstätte Nordwestdeutschlands. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabrück, **28**, 1957.
- BERTSCH, KARL: Moosflora. Eugen Ulmer, Stuttgart 1949.
- BRAUN-BLANQUET: Pflanzensoziologie. Berlin 1928.
- BRAUN-BLANQUET & TÜXEN: Übersicht der höheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas. Montpellier 1943.
- BUSCHBAUM, H.: Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Osnabrück 1891.
- CASPERSON, GERH.: Vegetationsstudien im Verlandungsgebiet des Wublitzsees. — Wiss. Zeitschr. d. Päd. Hochschule, Potsdam 1955, **2**, Heft 1.

- FREITAG, H., MARKUS, CH. & SCHWIPPL, I.: Die Wasser und Sumpfpflanzengesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Fläming. — Wiss. Zeitschr. d. Päd. Hochsch. Potsdam 1958, 4, Heft 1.
- GARCKE, F. A.: Illustr. Flora von Deutschland. Berlin 1922.
- GRIESEBACH, A.: Die Vegetationslinien des nordwestl. Deutschlands. Göttingen 1847.
- HEGI, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. I. München 1935.
- HELLMANN, G.: Regenkarte der Prov. Schleswig-Holstein und Hannover. Berlin 1902.
- HOFFMEISTER, J., & SCHNELLE, F.: Klima-Atlas von Niedersachsen. Oldenburg i. O., 1945.
- JAHN, HERMANN: Pilze rundum. Park-Verl. Hamburg 1949.
- JESCHKE, LEBRECHT: Pflanzengesellschaften einiger Seen bei Feldberg in Mecklenburg, Feddes Repertorium Beiheft 138, 1. 7. 1959.
- JONAS, F.: Die Vegetation der emsländischen Heidekölke. Fedde, Rep. Beih., Band LXVI. Dahlem 1932.
- KOCH, K.: Flora des Regierungsbezirks Osnabrück; 2. Aufl., Osnabrück 1958.
- : Natur- und Landschaftsschutz im Reg.-Bez. Osnabrück. Veröffentl. Naturw. Verein Osnabrück. Oldenburg 1941.
- KOCH, WALO: Die Vegetationseinheiten der Linthebene. Jahrb. der St. Gall. Naturf.-Ges. 61, 1926.
- KOPPE, F.: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Heiliges Meer bei Hopsten. — Abhandl. Westfäl. Prov.-Museum f. Naturkde. 2, Münster (Westf.) 1931.
- MOSER, M.: Blätter u. Bauchpilze. — In: Gams, Kleine Kryptogamenflora, 2 b. Fischer, Stuttgart 1955.
- MÜLLER-STOLL & GRUHL: Das Moosfenn bei Potsdam. — Wissensch. Zeitschr. der Päd. Hochsch. Potsdam. 1959, 4, H. 2.
- PASCHER, A.: Die Süßwasserflora Mitteleuropas. H. 14, Jena 1931.
- ROTHMALER, W.: Exkursionsflora. Berlin 1958.
- SANDSTEDE, H.: Die Cladonien des nordwestdeutschen Tieflandes und der deutschen Nordseeinseln. III. — Abh. Nat. Ver. Bremen. 25, 2. H. Bremen 1922.
- : Ergänzungen zu Wainios „Monographia Cladoniarum universalis“. — Repert. Fedde, Berlin-Dahlem 1938.
- TÜXEN, R.: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. Flor.-soziol. Arb.-Gem. in Niedersachsen. Hannover 1937.
- : Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften. — Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 5. Stolzenau/Weser 1955.
- : Die Bullenkuhle bei Bokel — Abh. Naturw. Ver. Bremen, 35, 2, Bremen 1958.
- : Die Pflanzenwelt Spaniens, II. Teil — Verl. Huber, Bern. Geobot. Institut Rübel, Zürich, Heft 32.
- : Die Pflanzenwelt Irlands. Verl. Huber, Bern, Veröff. Heft 25.
- VEREENIGING tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: Handboek, Lijst van de Natuurmonumenten in Nederland . . . Amsterdam 1957.

Anschrift des Verfassers:

Carl Althage

(23) Osnabrück, Katharinenstr. 84

Bildtafel

zu „C. Althage, Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes
Berger Keienvenn im Kreise Lingen



Abb. 1. Blick von SO auf die Wasserfläche des Naturschutzgebietes, 4. 8. 55.

Phot.: Althage



Abb. 2. Die Fadenseggengesellschaft im Hundsstraußgras-Grauseggen-Rasen mit Ge-
büschbildung im Hintergrunde. 11. 8. 57

Phot.: Althage

Bildtafel

zu „C. Altehage, Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes
Berger Keienvenn im Kreise Lingen



Abb. 3. Blick nach SO: Lobelia-Gesellschaft mit eindringendem Schlammshachtelhalm, 14. 7. 58.
Phot.: Altehage



Abb. 4. Lobelia dortmanna in der östlichen Hälfte des Sumpfgebietes, 27. 6. 52.
Phot.: Altehage

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Althage Carl

Artikel/Article: [Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Berger Keienvenn im Kreise Lingen 17-36](#)