IX.

Beitrag zur Kenntnis der niederen Tierwelt Pommerns (Hirudinea, Bryozoa).

Von Dr. P. Backhoff, Stettin.

Über die in Pommern vorkommenden Egel ist bisher nur wenig bekannt geworden. Einiges Material, das ich gesammelt hatte, habe ich Dr. Augener-Hamburg zur genaueren Untersuchung und Nachprüfung überlassen. In seiner Arbeit: „Nachtrag zur Blutegelfauna der Balkanhalbinsel nebst Bemerkungen über Egel aus anderen Gebieten", Zool. Anz. Bd. 68, 1926, hat er einige dieser Funde veröffentlicht. Hier sei eine Liste aller von mir gefangenen pommerschen Egel gegeben.

1. Piscicola geometra L. Madüsee, Binower See, Löcknitzsee.
2. Hirudo medicinalis L. Der Blutegel scheint in früheren Jahren in Pommern verbreiteter und häufig gewesen zu sein. Karl Rosenow, Rügenwalde, schreibt in der Pommerschen Heimat, 13. Jg. 1924 Nr. 10, von dem häufigen Vorkommen des Egels bei Pöhlen (zwischen Bärwalde und Tempelburg) und Rügenwalde vor zirka 30—35 Jahren, doch haben seine neuerlichen Nachforschungen ihn hier nicht mehr feststellen können. — Auch Paul Robien berichtet — gleichfalls in der Pomm. Heimat 1924 Nr. 11 über das zahlreiche Vorkommen in Tümpeln, die sich einst dort befanden, wo sich jetzt der Stettiner Hauptfriedhof ausbreitet. — 1921 hat er ein Exemplar im Zahlsee bei Blumberg gefangen und 1925 in größerer Zahl im Gelliner See bei Grambow. — Nach Angabe von Dr. Wehrmeister kommt der Blutegel auch im Bierbach und einem Stauteich der Landwirtschaftsschule bei Eldena vor. — Dr. Herold hat ihn — laut mündlicher Mitteilung — im Wokninsee bei Ückeritz auf Usedom festgestellt. — Ich selbst fing ein junges Tier, an einer Kröte saugend, in einem Moortümpel am Rande der Buchheide bei Stettin.
3. Aulastoma gulo Braun ist in den Seen und Tümpeln der Umgegend Stettins ziemlich allgemein verbreitet.
4. Nephelis octoculata L., Buchheide—Stettin (Mühlenbeck).
5. Nephelis testacea Sar., Buchheide—Stettin (bei Buchholz).
6. Nephelis testacea var. nigricollis Brand, Glambecksee b. Stettin.
7. Helobdella stagnalis L., Buchheide—Stettin (Waldtümpel b. Kolow).

8. Clepsine complanata L., Binower See—Buchheide, Kl. Petznicksee—Buchheide, Glambecksee—Stettin, fauler Brückenbach—Buchheide, sowie auch in verschiedenen Tümpeln daselbst. — Prof. Thienemann erwähnt diesen Egel aus dem kl. Steinbach, d. Bach b. Wittenfelde und dem Tieschower Bach, alle auf Rügen.

Auch die Bryozoen Pommerns haben bisher nur wenig Beachtung gefunden.

In Brauers Süßwasserfauna sind folgende Angaben enthalten:

Plumatella spongiosa Krpln., bei Greifswald,
Victorella pavida Kent. Ryck bei Greifswald,
Paludicella Mülleri Krpln., Ryck bei Greifswald,

die beiden letzteren sind Brackwasserformen.

Samter und Weltner berichten über Paludicella, daß sie in einem vom Madüsee ausgehenden Graben reichlich vorhanden war. Eine Spezies-Angabe ist nicht gemacht; es muß sich hier, da P. Mülleri nur Brackwasserform ist, um die andere deutsche Art Pal. Ehrenbergi Bened. handeln.

Aus der Umgebung Stettins kann ich noch die folgenden Funde hinzufügen:

Plumatella repens L., Sandsee, Löcknitzsee, Statoblasten fanden sich auch im Glambecksee. — Nach mündlicher Mitteilung von Dr. Herold fand er sie auch im Wolgastsee auf Usedom.

Plumatella emarginata Allm., von dieser Form fand ich im Herbst auf der Unterseite von Nymphaea-Blättern nur Chitinröhren mit den länglichen Statoblasten, sitzende und auch solche mit Schwimmring. Kl. Petznicksee.

Cristatella mucedo Cuv., Sandsee; Statoblasten auch in einem Tümpel am Buchheiderand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Backhoff Paul

Artikel/Article: Beitrag zur Kenntnis der niederen Tierwelt Pommerns (Hirudinea, Bryozoa) 85-86