Die Brombeeren des Regensburger Florenbezirkes.

Von Studienrat Anton Mayer in Regensburg.

Die Zahl der in Vollmanns Flora von Bayern für Regensburg angegebenen Rubusarten (ca. 30) gibt nur ein sehr unvollkommenes Bild von der Reichhaltigkeit der Rubusflora dieser Gegend, daher gebe ich im Folgenden ein Verzeichnis der von mir in den letzten Jahren aufgefundenen Arten und Bastarde.

Varietäten wurden in dem Verzeichnisse weggelassen, da in der nächsten Denkschrift eine ausführlichere Arbeit über die hiesige Brombeerflora erscheinen soll.

Herrn Bezirkstierarzt A. Ade in Gemünden spreche ich für die mühevolle Revision, der er meine Aufsammlungen bereitwilligst unterzog, auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus.

1. Rubus saxatilis L. Nj verbreitet, aber nicht häufig.
2. R. Idaeus L. Hu, Nj, Wb häufig.
3. R. suberectus And., Nj, Wb, Nk, Hu nicht selten.
4. R. plicatus Wh u. N. ebenso.
5. R. sulcatus Vest. Nj, Wb, Hu, seltener als die beiden vorigen.
6. R. vulgaris Wh. u. N. Wb. Tegernheimer Berge.
7. R. chaerophyllus Sag. u. W. Schultze. Wb. zwischen Tegernheim und Donaustauf nicht selten, Hu Oberhinkofen.
8. R. villicaulis Koehl. Wb Tegernheimer Berge; Nj Keilberg.
9. R. argenteus Wh. u. N. Nj Mariaort.
10. R. albiflorus Boul. u. Luc. Wb Tegernheim u. Donaust. (Vollm.)
11. R. alterniflorus Muell. u. Lef. Nj Mariaort, Pentling.
12. R. Mercieri Gen. Hohengebrachinger Wald.*)
13. R. Godronii Lec. u. Lam. Wb Reifelding.
14. ssp. R. propinquus P. J. Muell. Hu Hohengebrachinger Wald, Nj Keilstein, St. Lorenzen, Penk.
15. R. bifrons Vest. Hu, Wb, Nj nicht selten.
16. R. pubescens Wh. Wb Regenstauf.
17. ssp. R. evagatus Sudre. Wb Hohe Linie.
18. ssp. R. flaccidus P. J. Muell. Nj Pentling.
19. R. procerus P. J. Muell. Nj Mariaort, Keilstein, Wb Hohe Linie.

*) Die mit Stern bezeichneten Arten sind neu für Bayern.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0137-0

R. thyrsoideus Wimm.

20. ssp. R. phyllostachys P. J. M. Nj Keilstein u. Keilberg, Mariaort; Wb Tegernheim; Hu Hohengebrachinger Wald.
21. ssp. R, Leventii S. Nj Keilstein, Mariaort, Dechbetten, Lappersdorf, Weltenburg, Wb Hohe Linie.
22. ssp. R. thyrsanthus F. Nj Keilstein, Pentling; Wb Reifelding.
23. ssp. R. constrictus Lef. et Muell. Wb Tegernheim, Regenstauf.
24. ssp. R. candicans Wh. Nj Mariaort, Keilstein, Pentling, Niedergebraching, Wb Reifelding, Tegernheim, Hu Hohengebrachinger Wald.
25. ssp. R. goniophyllus Lef. et Muell. Nj Niedergebraching, Mariaort.
26. R. tomentosus Borkh. Verbreitet in Nj u. Wb, seltener in Hu.
27. P ssp. R. Lloydianus Genev. Verbreitet in Nj u. Wb.
*28. ssp. R. tomentocaulis S. Nj Kelheim.

R. macrostachys P. J. M.

29. ssp. R. chlorifolius S. u. Sabr. Hu Hohengebrachinger Wald. Großberg.
30. ssp R. Caflischii F. Nj Weltenburg.
*31. ssp. R. septorum P. J. M. Hu Neudorf.
32. R. podophyllus P. J. M. Hu Oberisling.
*33. ssp. R. hypopectus S. Wb Reifelding.
34. R. Muelleri Lef. Hu Hohengebrachinger Wald; Wb Lichtenwald.

R. Colemanni Blox.

35. ssp. R. inopacatus Lef. u. M. Wb Donaustauf. (Vollm.).
36. ssp. R. helveticus Gremli Hu Scharmassing.
37. R. hebecaulis S. Hu Hohengebrachinger Wald.
38. R. Radula Wh. Nj Kleinprüfening, Wb Tegernheim, Donaustauf, Lichtenwald, Reifelding.
39. ssp. R. uncinatus P. J. M. Nj Arzberg, Hohengebrachinger Wald.
*40. ssp. R papulosus M. u. Lef. Nj Wald zw. Toign u. Fecking.
*41. ssp. R. aspericaulis Lef. u. M. Nj Hohengebrachinger Wald.
42. R. Genevieri Bor. Wb Reifelding.
43. ssp. R. discerptus P. J. M. Hu Hohengebraching.
44. R. apiculatus Wh. Nj Keilberg.
*45. ssp. R. malacotrichus S. Wb Reifelding.
*46. ssp. R. lauracensis S. Wb Reifelding.
*47. R. micans Godr. Wb Reifelding.
48. ssp. R. subcanus P. J. M. Wb Donaustauf.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0138-6

R. foliosus P. J. M.
49. ssp. R. flexuosus P. J. M. Wb Reifelding, Lichtenwald.
*50. ssp R. litigiosus S. Wb Donaustauf.
R. insericatus P. J. M.
51 ssp. R rhombophyllus M. u. Lef. Wb Hohe Linie, Reifelding.
52. R pallidus Wh. Wb Donaustauf.
*53 ssp. R. aciphyllus S. Wb Tegernheim.
R. Menkei Wh.
*54. ssp. R. muricatus B. u. Gil. Nj Saal a. D.
55 ssp. R. suavifolius S. Nj Kelheim.
56. R. homalus S. Wb Falkenstein, Hohe Linie, Tegernheim.
57. ssp. R. scitulus S. Nj Keilberg, Brandlberg, St. Lorenzen.
58. ssp. R. thelybathos F. Wb Verbreitet zw. Tegernheim u. Donaustauf, Regenstauf, Nj verbreitet.
59 ssp. R. rigiduliformis S. Wb Reifelding, Hohe Linie.
60. R. melanoxylon P. J. M. u. Wirtg. Hu Hohengebr. Wald.
*61. ssp. R. rigidulus Schm Wb Reifeldinger Tal.
62. R. rudis Wh. u. N. Wb Tegernheim, Nj Arzberg.
63. R. vallisparsus S. Wb Lichtenwald.
R. glaucellus S.
64. ssp. R. scaberrimus S. Wb Tegernheim.
65. ssp. R. dispectus S. Hu Hohengebr. Wald.
R. obtruncatus P. J. M.
66. ssp. R. pilocarpus Gremli. Wb Tegernheim, Donaustauf.
R. hebecarpus P. J. M.
67. ssp. R. indusiatus F. Hu Wald bei Oberisling.
68. ssp. R. aceratispinus S. Wb Karlstein, Reifelding.
69. ssp. R. bavaricus F. Verbreitet in Wb, Nj, Hu.
70. R. Koehleri Wh. Wb Donaustauf, Nj Kelheim.
71. ssp. R. spinulifer M. u. Lef. Wb Tegernheim, Donaustauf.
72. ssp. R asperidens S. Wb Hohe Linie.
73. ssp. R. apricus Wimm. Wb Reifelding.
74. ssp. R. polyoplon Boul. u. Mot. Hu Hohengebr. Wald.
R. furvus S.
75. ssp. R. fontivagus S. Wb Reifeldinger Tal.
76. R. Schleicheri Wh. Nj Regendorf.
77. ssp. R. chloroxylon S. Hu Hohengebrachinger Wald.
78. ssp. R. humifusus Wh. Wb Reifeldinger Tal.
79. R. scaber Wh. Hu Hohengebrachinger Wald.
80. R. tereticaulis P. J. M. Wb Hohe Linie, Reifelding.
81. ssp. R. fragariiflorus P. J. M. Wb Reifelding.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0139-4

82. ssp. R. curtiglandulosus S. Nj. Schwaighausen.
83. R. Bellardii Wh. u. N. Verbreitet in Wb u. Hu. ebenso Nj.
84. ssp. R. pseudohirtus Ade. Wb Donaustauf, Hohe Linie.
85. ssp. R. pseudorivularis Ade. Wb Hohe Linie.
86. ssp. R. pseudoserpens Ade. Wb Donaustauf.
R. rivularis.
87. ssp. R. lusaticus Rostock. Hu Hohengebraching; Wb. Reifelding.
88. ssp. R. lamprophyllus Gr. Nj Mariaort.
89. ssp. R. spinosulus S. Wb Hohe Linie; Hu Hohengebr. Wald.
90. ssp. R. aculeolatus P. J. M. Hu Hohengebr. Wald.
91. ssp. R. leptobelus S. Hu Hohengebr. Wald.
R. serpens Wh.
92. ssp. R. corylinus P. J. M. Hu Hohengebr. Wald.
93. ssp. R. angustifrons S. Wb Hohe Linie, Tegernheim.
94. ssp. R. leptadenes S. Hu Hohengebr. Wald.
95. R. hirtus W. u. Kit. Wb Tegernheim.
96. ssp. R. offensus P. J. M. Hu Hohengebrachinger Wald.
97. ssp. R. Guentheri Wh. u. N. Wb. Grüntal—Tegernheim.
98. ssp. R. nigricatus Bf. u. M. Wb. Falkenstein, Hohe Linie, Reifeldinger Tal; Hu Hohengebr. Wald.
99. ssp. R. hercynicus G. Br. Nj Keilberg, St. Lorenzen;
100. ssp. R. tenuidentatus S. Wb Regenstauf.
101. ssp. R. trachyadenes S. Wb Hohe Linie.
102. ssp. R. interruptus S. Nj Arzberg.
103. ssp. R. elegantulus S. Wb Reifelding.
104. R. caesius L. Verbreitet im ganzen Gebiete.

Bastarde.

1. R. caesius × Idaeus a) R. idaeoides Ruthe. Wb. Hohe Linie. b) R. supercaesius × Idaeus Ade Nj. Sendtner Mühle bei Lappersdorf.
2. R. eupruinosus F. Abstammung sehr unsicher; die Meinung Sudres ist sicher falsch.
3. R. caesius × sulcatus a) R. maximus Marss. Nj Königswiesen Wb Tegernheim. b) R. sulcatiformis S. Hu Hohengebr. Wald; Nj Pentling.
4. R. caesius × plicatus = R. bahusiensis Schentz. Wb Karlstein, Hu Hohengebr. Wald.
5. R. caesius × procerus = R. dumalis Hal. Hu Hohengebr. Wald; Wb. Tegernheim.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0140-5

6. R. caesius × alterniflorus = R. semialterniflorus Nj Pentling.
7. R. caesius × nitidus = R. serrulatus Lindbg. Nj Regendorf.
8. R. caesius × suberectus = R. suberectiformis S. Hu Hohengebrach. Wald; Wb Tegernheim.
9. R. caesius × villicaulis = R. Wahlbergii Arrh. N J Mariaort.
10. R. caesius × thyrsanthus = R. ambifarius P. J. M. Nj Mariaort, Lappersdorf, Keilstein Wb Donaustauf.
11. R. caesius × candicans a) R. virgulterum P. J. M. Nj Hohengebr. Wald. b) R. sepicolus Bf. u. M. Nj Mariaort.
12. R. caesius × constrictus = R. semiconstrictus S. Nj Keilberg, Wb Hohe Linie, Donaustauf.
13. R. caesius × phyllostachys = R. hemiphyllostachys S. Nj Keilberg, Keilstein, Mariaort.
14. R. caes. × Leventii a) R. semi-Leventii Ade nov. spec. hybr.*) b) R. leventiformis Ade nov. spec. hybr. c) R. leventigenus Ade nov. spec. hybr.
15. R. caesius × radula = R. cuspidatus P. J. M. Wb Reifelding.
16. R. caesius × chaerophyllus = R. semichaerophyllus Ade, nov. spec. hybr. Wb Donaustauf.
17. R. caesius × chlorifolius = R. semichlorifolius Ade, nov. spec. hybr. Hu Hohengebr. Wald.
18. R. caesius × leptadenes = R. seebergensis Pfuhl. Nj Mariaort.
19. R. caesius × incultus = R. corymbulifer S. Nj Kleinprüfening, Wb Tegernheim.
20. R. caesius × longipetalus = R. pseudopsis F. Nj Dechbetten, Hohengebrachinger Wald, Großberg.
21. R. caesius × corylinus = R. semicoryliniformis mh., nov. spec. hybr.
22. R. (caes. × tomentosus) × hirtus = R. holosericeus Vest. Hu Hohengebrachinger Wald (Nordrand) häufig.
23. R. bavaricus × caesius = R. latifrondosus mh., nov. spec. hybr. Nj. Schwaighausen.
24. R. bifrons × tomentosus a) R. curtidentatus S. Nj Mariaort. b) R. inconstans S. Wb Reifelding. c) R. Schwarzeri Holul. Nj Großberg.
25. R. procerus var. dynatos × tomentosus = R. dynatophyllus mh., nov. spec. hybr.
26. R. Radula × tomentosus = R. megathamnus Kerner Wb. Hohe Linie, Tegernheim.

*) Die Diagnosen für die Neufunde werden in der nächsten Denkschrift veröffentlicht.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0141-1

27. R. thelybathos × tomentosus = R. thelybathophyllus mh., nov. spec. hybr.
28. R. spinulifer × tomentosus = R. tegernheimensis Ade, nov. spec. hybr.
29. R. bavaricus × tomentosus a) R. semibavaricus Ade, nov. spec. hybr. b) R. bavaricola Ade, nov. spec. hybr. c) R. Mayerianus Ade, nov. spec. hybr.
a) Nj Weltenburg, b) Nj Arzberg, c) Wb Reifelding.
30. R. tereticaulis × tomentosus = R. curtisepalus Kupc. Wb Reifelding, Tegernheim, Donaustauf.
31. R. Bellardii × tomentosus = R. Mariae mh., nov. spec. hybr. Wb Tegernheim, Hohe Linie.
32. R. serpens × tomentosus = R. Kupcokianus Borb. Wb Hohe L.
33. R. hirtus × tomentosus = R. Kodruensis Simr. Wb Hohe Linie.
34. R. rivularis × tomentosus = R. Bakabanyae Borl. Wb Tegernheim.
35. R. procerus var. dynatos × thyrsanthus = R. hemidynatos mh., nov. spec. hybr. Wb Tegernheim.
36. R. chaerophyllus × serpens = R. Adeanus mh., nov. spec. hybr. Wb Tegernheim.
37. R. thelybathos × serpens = R. Sackianus mh., nov. spec. hybr. Hu Hohengebraching.
38. R. bavaricus var. scharnosinensis × bifrons = R. scharnosinensiformis mh. Hu Hohengebrachinger Wald
R. caesius × tomentosus.
39. R. Vollmanni Ade Hu Hohengebrachinger W., Nj Lappersdorf.
40. R. pseudoviretorum Ade. Nj Lappersdorf, Weg nach Graß, Pentling Wb Tegernheim.
41. R. Lamottei Genev. Nj Kareth, Regendorf.
42. R. villosicaulis Ade Wb Regenstauf.
43. R. raduloides Ade Nj Kleinprüfening, Eichhofen, Kareth, Pentling, Dechbetten, Hu Hohengebraching Wb Tegernheim.
44. R. divergens P. J. M. Nj Winzerberge, Pentling, Saxberg, Hu Hohengebraching, Wb Tegernheim.
45. R. deltoideus P. J. M. Nj Lappersdorf, Arzberg, Hu Hohengebrachinger Wald, Wb Karlstein, Tegernheim.
46. R. agrestis W. u. K. Nj Lappersdorf.
47. R. leucophaeus P. J. M. Nj Arzberg, Winzerberge.
48. R. pseudofascieulatus Ade. Nj Pentling Wb Tegernheim Hu Hohengebrachinger Wald.
49. R. pseudo-Lajtnensis Ade. Nj Keilstein.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03295-0142-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: 1922_15

Autor(en)/Author(s): Mayer Anton

Artikel/Article: Die Brombeeren des Regensburger Florenbezirkes 129-134