

Jahresbericht der Arbeitsgruppe für Amphibien- und Reptilienschutz für das Jahr 1996

JÜRGEN B. KÜHNIS & PETER NIEDERKLOPFER

AMPHIBIEN

Amphibien - Inventar FL:

- **Laubfrosch (*Hyla arborea*)**: Die Laubfroschpopulation des Ruggeller Rietes scheint stabil zu sein; am 17. Mai (21.00 Uhr) 1996 konnten insgesamt 23 rufende Männchen kartiert werden.

Mit dem Erlös aus dem T- Shirt Verkauf der Aktion «Letzte Chance für den Laubfrosch» wurden im Gebiet des Ruggeller Rietes (anfangs Mai) neue, temporäre Pfützen ausgebaggert, um den Laubfröschen geeignete Laichgewässer zu schaffen. Organisiert wurde diese Aktion durch die BZG, dem Amt für Wald, Natur und Landschaft sowie der LGU. Beim NSG Birka in Mauren konnte (trotz mehrerer Kontrollgänge) nur noch 1 rufendes Männchen festgestellt werden. Der Neunachweis bei den Teichen des Forstpflanzgartens in Schaan konnte 1996 nicht mehr bestätigt werden.

- **Feuersalamander (*Salamandra salamandra*)**: Am 2. September konnten auf einer Exkursion im Bereich des Montlinger Schwamms (SG) zwei überfahrene Feuersalamander, der Unterart *Salamandra salamandra terrestris* nachgewiesen werden; die Tiere wurden mitgenommen und in der NSFL konserviert. Auf einem weiteren Kontrollgang am 20. Oktober wurden im selben Gebiet 4 Totfunde registriert. Im Frühjahr 1997 soll im Rahmen einer Feuersalamander - Langzeituntersuchung in der Schweiz dieses Vorkommen genauer untersucht werden (Bearbeiter: J. Kühnis).

- **Kammolch (*Triturus cristatus*)**: Das Kammolch - Vorkommen im Ruggeller Riet ist stark gefährdet; 1996 konnte nur 1 juveniles Ex. nachgewiesen werden. Sofortige Schutzmassnahmen (Ausbaggern des Torfgrabens) sind dringend erforderlich ! Am 19. April wurden in Gamprin 7 adulte Kammolche eingefangen und während einer Woche in Aquarien der Biologiesammlung des liechtensteinischen Gymnasiums gehalten und fotografiert. Das Schaaner Kammolch - Vorkommen scheint grösser zu sein als bislang vermutet wurde; am 27. April konnten hier 10 adulte Exemplare (6 ♀♀ und 4 ♂♂) beobachtet werden.

- **Teichmolch (*Triturus vulgaris*)**: Am 27. April gelang anlässlich einer Amphibienexkursion mit 5. Klässlern der Primarschule Hanfland Buchs ein Neunachweis (!) in Gamprin (1 ad. ♂♂, Abb. 1). Am Abend dieses Tages konnten hier 2 weitere Teichmolche (2 ad. ♀♀) beobachtet werden.




Abb. 1: Adultes Teichmolchmännchen aus Gamprin

Amphibien - Zugstellen in Liechtenstein:

1. Vorwort

Frau Regierungsrätin Dr. Cornelia Gassner organisierte 1996 zwei Sitzungen, an welche Vertreter des Landestiefbauamtes, des Amtes für Wald, Natur und Landschaft sowie der BZG (J. Kühnis u. Josef Biedermann) eingeladen wurden:

- 1. Februar: «Kröten und Froschwanderung beim Gampriner Seele und Schwabbrünnen» an dieser Sitzung im liechtensteinischen Gymnasium wurden die Massnahmen betreffend der Laichplatzwanderung 1996 diskutiert. Nebst einer Verbesserung der bestehenden Schutzsysteme (Zäune u. Unterführungen) sollte auch die Zahl der wandernden Tiere erfasst werden.
- 29. August: «Amphibienschutzmassnahmen in Liechtenstein», in Vaduz. Diese Zusammenkunft sollte einen Erfahrungsaustausch bzw. einen konkreten Rückblick auf die Zählungen des Frühjahres (Tab. 1 - 4) ermöglichen.

Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Ein besonderer Dank geht an die Herren P. Biedermann, A. Marxer und A. Pfeiffer, welche den Grossteil der lokalen Zählungen durchgeführt haben.

2. Auswertung der Amphibienzählungen in Liechtenstein (März und April 1996)

Die einzelnen aufgeführten Fangzahlen (*Tab. 1 - 4*) mögen den Anschein erwecken, dass doch noch relativ viele Amphibien an den Frühjahrswanderungen teilnehmen - dem ist aber leider nicht so. Wir müssen die ermittelten Werte von 1996 in einen Vergleich mit früheren Jahren setzen und so lässt sich bei allen untersuchten Populationen ein massiver Rückgang der Bestände feststellen. Fast überall im liechtensteinischen Talraum sind die Amphibienpopulationen durch die zunehmende Verkehrs- und Siedlungsdichte stark dezimiert worden (*Abb. 2*).




Abb. 2: Amphibien - Zugstellen im Fürstentum Liechtenstein (Stand 1996)

2.1 Situation beim NSG Gampriner Seele

Die Zählungen wurden hier durch Herrn P. Biedermann und J. Kühnis durchgeführt (Tab. 1). Herr Biedermann erstellte auf der zum laichgewässer-zugewandten Seite der Landstrasse mehrere Auffangbehälter aus Holz, um die Durchwanderungshäufigkeit kontrollieren zu können. Er konnte jedoch keine einzige Kröte in diesen Auffangbehältern nachweisen und somit deckt sich seine Beobachtung mit den Ergebnissen meiner Untersuchung von 1995; in diesem Jahr benutzten lediglich 4 % aller Erdkröten (!) die Unterführungen.

Die vorliegenden Fangzahlen sind verglichen mit 1994 (618 Ind.) und 1995 (370 Ind.) sehr tief. Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte die schlechte Witterung im März und anfangs April sein, die womöglich einige Erdkröten in ihren Winterquartieren zurückhielt. Die beste Zugnacht 1996 war am 22. März. Im Jahre 1995 kam es ebenfalls zu einer Häufung in der zweiten Märzhälfte (KÜHNIS & POSSNER 1995).

Tab. 1: Amphibienzählungen beim Gampriner Seele, März - April 1996

Zähler:	Amph. Art:	Anzahl			Total:
		♀♀	♂♂	davon Paare	
J. Kühnis	Grasfrosch	–	1	–	1
J. Kühnis	Erdkröte	51	47	34	98
P. Biedermann	Erdkröte	31	29	–	60
Total:	2 Arten	82	77	34	159

2.2 Situation an der Landstrasse Schaanwald

Beim Strassenabschnitt in Schaanwald wurde das Amphibienproblem leider viel zu spät erkannt und die Schutzzäune erst in den letzten Jahren erstellt. Die vielen hundert Totfunde jedes Jahr und die ermittelten Fangzahlen von 1995 und 1996 (Tab. 2) bestätigen jedoch wie wichtig es wäre, auch hier ein funktionierendes Abwehrsystem zu errichten. Das grösste Problem in diesem Abschnitt ist sicherlich die hohe Verkehrsdichte (Grenzverkehr) sowie die offene, ungeschützte Forststrasse. Die besten Zugnächte waren am 21. - 23. März festzustellen. 1995 waren die grössten Wanderzüge am 18. - 20. März zu beobachten.

Tab. 2: Vergleich der Amphibienzählungen an der Landstrasse Schaanwald 1995 und 1996

Jahr:	Zähler:	Amph. Art:	Anzahl			Total:
			♀♀	♂♂	davon Paare	
1995	J. Kühnis	Grasfrosch	9	16	3	25
1995	J. Kühnis	Erdkröte	39	38	10	77
1995	J. Kühnis	Bergmolch	1	–	–	1
Gezählte Amphibien:		3 Arten	49	54	13	103
1996	J. Kühnis	Grasfrosch	21	36	16	57
1996	J. Kühnis	Erdkröte	67	42	22	109
1996	P. Biedermann	Erdkröte	73	65	–	138
Gezählte Amphibien:		2 Arten	161	143	38	304

2.3 Situation beim NSG Schwabbrünnen - Äscher

Hier konnten insgesamt 1042 Amphibien (Tab. 3) gezählt und sicher über die Landstrasse gebracht werden. Im Vergleich mit früheren Zählungen von A. Gassner, M. Christen und C. Matt aus dem Jahre 1976 (Tab. 3) scheint die heutige Gesamtpopulation nur noch etwa ein Drittel (!) des früheren Vorkommens zu umfassen. Insbesondere die Bergmolch - Bestände sind stark zurückgegangen; der Teichmolch ist inzwischen ausgestorben! Die gegebene Situation bedarf dringend neuer Überlegungen, die bestehenden Schutzmassnahmen müssen neugestaltet und verbessert werden, um wenigstens den «Amphibienrestbestand» in diesem Gebiet für die Zukunft absichern zu können. Die besten Zugnächte konnten am 22., 25. - 27. März und am 9. April festgestellt werden.

Tab. 3: Vergleich der Amphibienzählungen im NSG Schwabbrünnen im Jahre 1976 und 1996 (Quelle: «Das Amphibien - Problem» in Schwabbrünnen. A. Gassner, M. Christen und C. Matt. 1974 - 1976)

Jahr:	Zähler:	Amph. Art:	Anzahl			Total:
			♀♀	♂♂	davon Paare	
1996	J. Kühnis	Grasfrosch	20	38	4	58
1996	J. Kühnis	Erdkröte	66	139	38	205
1996	J. Kühnis	Bergmolch	1	–	–	1
1996	A. Marxer	Erdkr. u. Grasfr.	*	*	75	778
Gezählte Amphibien:		3 Arten	87	177	117	1042
1976	A. Gassner u. a.	Grasfrosch	152	140	20	332
1976	A. Gassner u. a.	Erdkröte	533	1052	662	2909
1976	A. Gassner u. a.	Bergmolch	8	6	–	14
Gezählte Amphibien:		3 Arten	693	1198	682	3255

* Die Zähler haben hier nicht nach Art oder Geschlecht unterschieden; es scheint sich jedoch hauptsächlich um Erdkröten zu handeln. (A. Marxer mündl. Mitt.)

2.4 Situation beim NSG Heilos Triesen

Insgesamt wurden hier 832 Amphibien (Tab. 4) gezählt. Laut persönlicher Mitteilung von A. Pfeiffer konnten in den Kübeln keine Molche nachgewiesen werden. Der Amphibienbestand ist auch hier sehr stark zurückgegangen. Ein Grossteil der Amphibien wird nicht nur eingangs der Abzweigung in die Landstrasse Triesen - Balzers überfahren, sondern auch auf dem gesamten Strassenabschnitt Richtung Camping - Platz Mittagsspitze; hier konnten 1995 und 1996 jeweils dutzende von überfahrenen Erdkröten und Grasfröschen nachgewiesen werden.

Die besten Zugnächte waren am 22., 26. - 27. März und 9. - 10. April.

Tab. 4: Amphibienzählungen NSG Heilos Triesen

Zähler:	Amph. Art:	Anzahl:		davon Paare	Total:
		♀♀	♂♂		
A. Pfeiffer	Erdkr. u. Grasfr.	*	*	*	832
Total:	2 Arten	*	*	*	832

* bei der Zählung wurden Frösche und Kröten zusammengefasst und nicht nach Art oder Geschlecht unterschieden!

Amphibien – Zugstellen in der Region Werdenberg-Sarganserland:

Zugstelle Plattis (Weite):

Seit 1988 werden an der Landstrasse zwischen Sevelen und Plattis an zwei neuralgischen Stellen (Bereich Wassergräben eingangs Plattis sowie im Bereich des Kieswerks) Amphibienzäune erstellt (R. Kobelt, mündl. Mitt.). Die anwandernden Tiere (fast ausschliesslich Erdkröten) werden in Fangkübeln gesammelt, gezählt (Tab. 5) und von Schülern über die Hauptstrasse getragen. Der Grossteil der Tiere scheint vom Gebiet «Plattsnas» und den Mischwäldern im Bereich «Magletsch» zu stammen.

Tab. 5: Übersicht der Amphibienzählung an der Zugstelle Plattis

Jahr:	Zugbeginn:	Zugende:	Gezählte Tiere:*
1988	20.3	24.4	466
1989	4.3	14.5	585
1990	7.3	7.4	766
1992	–	–	980
1993	17.3	19.4	1113
1994	3.3	25.3	1430
1995	21.2	21.4	766
1996	22.3	31.3	612

* Die Zähler haben Erdkröten und Grasfrösche unter dem Begriff «Frösche» zusammengefasst; es scheint sich jedoch hauptsächlich um Erdkröten (ca. 80% aller Tiere) zu handeln (R. Kobelt, mündl. Mitt).

(Quelle: persönliche Zählungsunterlagen von Hans und Renate Kobelt)

Kontaktadresse:

Hans und Renate Kobelt

Schalärweg

9476 Weite

Zugstelle Wangs (Kiesgrube Feerbach):

Eine sehr grosse Grasfroschwanderung von ca. 1500-2000 Tieren (*Tab. 6*) findet jährlich mitten durch das Dorf Wangs statt (G. Castelberg, mündl. Mitt.). Während der Laichplatzwanderung werden die Tiere in Sammelbehältern (Fangkübel) aufgefangen und durch freiwillige Helfer (vor allem Schulklassen) eingesammelt und in die Kiesgrube getragen. Als zusätzliche Schutzmassnahmen sollten entlang des Grossbaches ein stationärer Amphibienzaun sowie im oberen Teil des Dorfes eine Amphibienunterführung errichtet werden.

Tab. 6: Übersicht der Amphibienzählungen an der Zugstelle in Wangs

Jahr	Gezählte Tiere:*
1993	ca. 1500
1994	ca. 720
1995	ca. 1600
1996	ca. 1600
1997	ca. 1200

* Bei den Zählungen wurden Schätzungen vorgenommen, es existieren keine genaueren Angaben (G. Castelberg, mündl. Mitt.).

(Quellen: Persönliche Zählungsunterlagen, Zeitungsartikel und Fotos von G. Castelberg sowie ACKERMANN, G. & WEIDMANN, P. (1996): Amphibienschutzkonzept der Region Sargans. Projektbericht für das Planungsamt des Kantons St. Gallen - Abteilung Natur- und Landschaftsschutz)

Kontaktadresse:

Gabi Castelberg

Obere Rosenstrasse. 6

7323 Wangs

REPTILIEN

Reptilien - Inventar FL:

- **Mauereidechse** (*Podarcis muralis*): Erstbeobachtung am 22. Februar (1 ad. ♂♂, Rheindamm Klettergarten Balzers). Am 19. April wurden am Rheindamm (Höhe Heilos) in Triesen 14 Exemplare (10 ♀♀ und 4 ♂♂) gezählt.

- **Zauneidechse** (*Lacerta agilis*): Am 20. April konnten am Rheindamm in Ruggell auf einer Strecke von ca. 1400 m insgesamt 34 Individuen gezählt werden (15 ♂♂, 14 ♀♀ und 5 juv. Ex.). Am 15. Mai wurden in diesem Bereich zwei adulte Männchen eingefangen und vermessen (GL: 19,9 cm / SL: 12,5 cm und GL: 19,2 cm / SL: 11,9 cm). Die Letztbeobachtung 1996 gelang am 10. November (1 juv. ♀♀) bei einem Steinhaufen, Firmengelände KUBATEC Ruggell.

- **Bergeidechse** (*Lacerta vivipara*): 1996 gelangen drei Neunachweise: Auf Gapfohl konnten am 10. Juni 2 ad. Bergeidechsen auf 2005 m. ü. M. entlang der Felskante zwischen Augstaberg und Goldlochspetz beobachtet werden; 1 ad. Ex. auf 1880 m. ü. M. im Bereich Älphäldele. Beim Schlucher (Sareis) wurde am 15. Juli 1 ad. ♂♂ (ca. 50 m unterhalb der Liftstation, in Steinhaufen, 1950 m. ü. M.) nachgewiesen.

- **Blindschleiche** (*Anguis fragilis*): Letztbeobachtung am 16. September (1 juv. Ex.) bei einer Trockenmauer im Bereich des Tennisplatzes Vaduz.

- **Ringelnatter** (*Natrix natrix*): Am 2. Juni wurde im Bereich des Klettergartens Balzers 1 ad. ♀♀ eingefangen und vermessen (GL: 119 cm / SL: 19,1 cm); am 2. Juli konnten im Bereich der Fischtreppe am Rheindamm in Ruggell 4 ad. ♀♀ gezählt werden. In unmittelbarer Grenznähe konnten in Fläsch (GR) am Fuss des Ellhorns am 29. Mai 1 ad. ♂♂ und 1 ad. ♀♀ beobachtet werden (Ruchegg, 500 m. ü. M., Koord.: 754 900 / 213 100).

- **Schlingnatter** (*Coronella austriaca*): 1996 wurden zwei mehrjährige Schlingnatteruntersuchungen abgeschlossen. Die Arbeit «Verbreitung und Biologie der Schlingnatter entlang des liechtensteinischen Bahngeländes» wurde im BZG Band 23 publiziert. Die Ergebnisse der Untersuchung am Rheindamm sollen im Frühjahr 1998 in der «Bergheimat» des Liechtensteiner Alpenvereins abgedruckt werden. Im 4-jährigen Untersuchungszeitraum (1993 - 1996) konnten am liechtensteinischen Rheindamm insgesamt 42 Individuen (35 Adulttiere und 7 Jungtiere) nachgewiesen werden. Ein ähnlich grosses Gesamtvorkommen konnte bislang nur entlang des Bahndammes (KÜHNIS 1996) festgestellt werden. Das grösste zusammenhängende Vorkommen findet sich am Rheindamm in Ruggell; hier konnten im Jahre 1996 auf einer Fläche von 150 x 20 m 8 Individuen (4 ♂♂, 3 ♀♀ und 1 juv. Ex.)

beobachtet werden. Das ermittelte Geschlechterverhältnis liegt bei 1 : 0,4 zugunsten der ♂♂. KÜHNIS (1996) findet am liechtensteinischen Bahndamm ein Verhältnis von 1 : 0,5 zugunsten der ♂♂.

In diesem Jahr konnte auch der von NIGG (1993) stammende alpine Nachweis einer Schlingnatter im Bereich Schneeflocht, Balzers (1440 m. ü. M.) bestätigt werden; in der Umgebung eines Steinhaufens konnte 1 ad. ♂♂ (GL: 61,1 cm / SL: 13,3) mehrmals beobachtet werden.

- **Kreuzotter (*Vipera berus*):** Die Ergebnisse von 1996 waren sehr erfreulich, es konnten insgesamt 32 Individuen nachgewiesen werden, die sich 6 unterschiedlich grossen Lokalvorkommen zuordnen lassen. Der Höchstfund 1996 lag auf 1910 m. ü. M. nördlich Kolme, Bereich Lärchabödele, 2 ad. trächtige ♀♀ (GL: 64 bzw. 56 cm). Am 23. August wurden auf einer ausgedehnten Exkursion Matta - Galinakopf - Guschgle 7 ad. ♀♀ (davon 4 trächtig) beobachtet; am 27. September konnten auf einer Begehung im Bereich Gapfohl innerhalb vier Stunden (11.00 - 15.00) 16 ♀♀ (davon 9 trächtig) und 1 adultes ♂♂ nachgewiesen werden. Die Kreuzotter-Untersuchungen sollen 1998 abgeschlossen werden und nach Möglichkeit im BZG Band 25 (1998) publiziert werden.

Neue herpetologische Objekte in der Naturkundlichen Sammlung (NSFL):

Salamandra salamandra terrestris

NSFL 1567 als Beleg in Flüssigkeit

NSFL 1568 als Beleg in Flüssigkeit

Coronella austriaca

NSFL 1640 als Beleg in Flüssigkeit

Herpetologisches Dokumentationsmaterial (Dias):

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit möchten wir als Auskunfts- und Dokumentationsstelle für jedermann zugänglich sein. Die Archivierung von Dias über unsere einheimische Herpetofauna liefert dazu einen wichtigen Beitrag (Tab. 7). Das vorliegende Bildmaterial soll in Diaserien (insbesondere für Schulen) zusammengestellt werden.

Tab. 7: Liste der Herpeto - Dias über Liechtenstein (Stand Ende 1996)

AMPHIBIEN:	Anzahl Dias:	REPTILIEN:	Anzahl Dias:
<i>Froschlurche:</i>		<i>Echsen:</i>	
Wasserfrösche	6	Zauneidechse	27
Grasfrosch	46	Berg-, Waldeidechse	18
Laubfrosch	8	Mauereidechse	14
Gelbbauchunke	6	Blindschleiche	22
<i>Schwanzlurche:</i>		<i>Schlangen:</i>	
Bergmolch	3	Ringelnatter	41
Kammolch	8	Schlingnatter	72
Teichmolch	2	Kreuzotter	47
Alpensalamander	1		
Feuersalamander	1		
<i>Spezielles:</i>		<i>Spezielles:</i>	
Erdkrötenprojekt FL	26	Reptilienhabitate	40
Gewässer im FL	109	im FL	
Total	216	Total:	281

Weitere Aktivitäten

- März / April: Mitarbeit bei den Kartierungen für das Projekt «Vorarlberger Amphibienwanderwege» unter der Leitung von Georg Willi. 1996 wurde in den Bezirken Fedlkirch und Bludenz kartiert. (J. Kühnis & Helga Ammann)
- 1. April: Öffentlicher Vortrag «Situation der Amphibien und Reptilien in Liechtenstein» anlässlich der Vereinsversammlung der BZG im liechtensteinischen Gymnasium. (J. Kühnis)
- Juli: Antrag für ein Pilotprojekt «Reptilien im Kanton St. Gallen» an Dr. Mario F. Broggi zuhanden einer liechtensteinischen Stiftung (Dr. Rainer Neumeyer & Martina Funk-Neumeyer, Dr. Bernhard Egli und J. Kühnis)
- September: Unser Antrag für ein Reptilien- und Amphibienprojekt für Vorarlberg wurde bewilligt (Dr. Margit Schmid, Vorarlberger Naturschau). Die bereits angelaufenen Felduntersuchungen sollen 1997 und 1998 intensiviert werden. Erste Zwischenergebnisse (Verbreitung, Biologie und Gefährdung der Kreuzotter in Vorarlberg) sollen 1998 im Forschungsband der Vorarlberger Naturschau publiziert werden. (Dietmar Huber & J. Kühnis)
- 7. Dezember: Vortrag «Schlingnatterpopulationen in Saumbiotopen des Rheintals» am 3. KARCH Herpeto- Kolloquium, UNI Fribourg. (J. Kühnis)

Dank

Für wertvolle Hinweise danken wird den folgenden Personen:

Thomas Hainschwang, Ruggell; Helmut Kindle, Triesen; Georg Willi, Vaduz; Dietmar Possner, Gamprin; Hanno Meier, Mauren; Hanspeter Guidolin, Gamprin; Mario F. Broggi, Triesen; Josef Schädler, Triesenberg

Literatur

KÜHNIS J. B. & NIEDERKLOPFER P. (1996): Jahresbericht der Arbeitsgruppe für Amphibien- und Reptilienschutz für das Jahr 1995. Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein - Sargans - Werdenberg, 23: 381 - 387.

KÜHNIS J.B. & POSSNER D.R.E. (1995): Zur Situation der Gampriner Erdkrötenpopulation. Populationsbiologie, Wandverhalten und Schutzmöglichkeiten. Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein - Sargans -Werdenberg. 22: 163 - 178.

NIGG A. (1993): Die Reptilien des Fürstentums Liechtenstein. Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein. Band 14: 63 S.

Adresse der Autoren:

Jürgen B. Kühnis

Jägerweg 5

FL-9490 Vaduz

Peter Niederklopf

Saalbaugasse 2

A-6800 Feldkirch

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Kühnis Jürgen B., Niederklopper Peter

Artikel/Article: [Jahresbericht der Arbeitsgruppe für Amphibien- und Reptilienschutz für das Jahr 1996 349-361](#)