

Beiträge zur Kryptogamenflora des Riesengebirges und seiner Vorlagen.

Von

V. v. Cyper.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Jänner 1893.)

Pilze.

I.

Das in botanischer Beziehung, namentlich betreffs seiner Phanerogamenflora so eingehend durchforschte Gebiet des Riesengebirges ist, was seine Kryptogamenflora anbelangt — soweit der österreichische Antheil in Betracht kommt —, verhältnissmässig wenig bekannt und gilt dies in erster Reihe von den Pilzen. Dies veranlasst mich, obzwar ich mich mit dem Studium der Pilze erst kürzere Zeit beschäftige, die Resultate meiner bisherigen Beobachtungen über die Pilze des Riesengebirges und seiner südlichen Vorlagen schon jetzt zu veröffentlichen.

In der folgenden Aufzählung folge ich dem ausgezeichneten Florenwerke unseres Nachbarlandes, der „Kryptogamenflora von Schlesien“, III. Band: Die Pilze, von Dr. J. Schroeter.

- Lycogala epidendron* (L.). An Weidenstrünken im Hutgarten (434 m) und an Fichtenstrünken im Mangelwalde (439 m) bei Harta, an Fichtenstrünken bei Krausebauden (690 m) und im Silbergrund bei Schwarzenthal (820 m).
Reticularia lycoperdon (Bull.). An Fichtenstümpfen im Mangelwalde bei Harta.
Badhamia utriculosa (L.) Gmel. Auf alten Fichtenstümpfen und über *Hydnum ochraceum* im Mangelwalde bei Harta (25./VIII.).
Fuligo septica (L.). Auf faulem Holze in der Weissbach (440 m), über Moos, Pflanzenstengeln und auf Fichtenstümpfen im Mangelwalde bei Harta.
Plasmidiophora brassicae Woron. An den Wurzeln von Kohlarten, namentlich Kohlrüben häufig in Harta, Hohenelbe, Forst.
Pl. Alni (Woron.). An Wurzeln von *Alnus glutinosa* am Untergraben und in der Wustlich bei Harta, am Elbeufer in Fuchsberg (442 m) und Nieder-Hohenelbe.

- Synchytrium anemones* (DC.). An Stengeln und Blättern von *Anemone nemorosa* im Zeskenwinckel bei Harta.
- S. mercurialis* (Lib.). Auf *Mercurialis perennis* im Hutgarten bei Harta und im Sattler bei Langenau (520 m).
- S. taraxaci* De Bary et Woron. An *Taraxacum officinale* in Harta.
- S. stellariae* Fuekel. An *Stellaria media* im Mangelwalde bei Harta.
- S. succisae* De Bary et Woron. An *Succisa pratensis* im Raubbachthale bei Hohenelbe (560 m).
- Empusa muscae* Cohn. Auf *Musca domestica* in Harta.
- Cystopus candidus* (Pers.). Auf *Capsella bursa pastoris* überall sehr häufig, um Harta, Pelsdorf, Hennersdorf, Fuchsberg, Hohenelbe, Langenau; auf *Cardamine amara* auf der Bodenwiese (1100 m).
- C. tragopogonis* (Pers.). Auf *Tragopogon pratensis* in Nieder-Hohenelbe.
- Plasmopara epilobii* (Rab.). Auf *Epilobium parviflorum* im Mangelwalde bei Harta (18./VIII.).
- Peronospora calotheca* De Bary. Auf *Galium verum* bei Brana (490 m, 10./V.).
- P. myosotidis* De Bary. Auf *Pulmonaria officinalis* in der Weissbach bei Harta (18./VI.).
- Protomyces macrosporus* Unger. Auf *Aegopodium podagraria* in Nieder-Hohenelbe (12./VI.).
- Ustilago longissima* (Sowerby). Auf *Glyceria fluitans* in der Wustlich bei Harta (14./VI.).
- U. segetum* (Bull.). Auf *Avena sativa* in Harta, bei Hohenelbe und Langenau.
- Sphacelotheca hydropiperis* (Schum.). Auf *Polygonum bistorta* in Harta (7./VIII.).
- Tilletia striaeformis* (Westend.). Auf *Holcus lanatus* im Mangelwalde bei Harta (7./VIII.).
- Urocystis anemones* (Pers.). Auf *Anemone nemorosa* im Zeskenwinckel und im „Sumpf“ bei Harta; auf *Anemone ranunculoides* in der Weissbach bei Harta (8./V.).
- Tubercinia trientalis* (Berkeley et Brome). Nach mündlicher Mittheilung des Herrn Ober-Regierungsrathes Kühn in Halle auf *Trientalis europaea* am Wege vom Elbgrunde gegen die Elbfallbaude (ca. 1270 m).
- Uromyces ficariae* (Schum.). Auf *Ficaria verna* in Harta.
- U. geranii* (DC.). Auf *Geranium pratense* in der Weissbach bei Harta (I.—III.).
- U. valerianae* (Schum.). Auf *Valeriana dioica* im „Sumpf“ bei Harta (II.—18./VI.).
- U. pisi* (Pers.). (I.) Verbreitet auf *Euphorbia cyparissias* bei Huttendorf, Harta, Hohenelbe (auch im Herbar Kablik), Langenau etc. (II., III.), auf *Pisum sativum* in Pelsdorf (3./VIII.).
- U. veratri* DC. (II.) Auf *Veratrum Lobelianum* am Abhange des Krkonosch gegen den Elbgrund (1250 m, 18./VII.).
- U. astragali* (Opiz). Auf *Astragalus glycyphyllus* am Fuchshübel bei Harta (21./VII.).
- Puccinia asparagi* DC. Auf *Asparagus officinalis* in Harta (II., III.).
- P. prenanthis* (Pers.). Auf *Prenanthes purpurea* am Pinner bei Langenau (560 m, II.); auf *Lactuca muralis* bei Pelsdorf (II., III.—6./VIII.).

- P. violae* (Schum.). (I—III.) Auf *Viola silvestris* im Böhmischem Walde und in der Wustlich bei Harta, im Sattler bei Langenau (540 m), Elbthal bei Krausebauden (660 m), Gross-Aupa (720 m).
- P. adoxae* (DC.). Auf *Adoxa moschatellina* im Hutgarten bei Harta (I.—6./V.).
- P. pimpinellae* (Strauss). Auf *Anthriscus silvestris* im Raubbachthale bei Hohenelbe (I.—3./V.).
- P. menthae* Pers. (I.—III.) Auf *Clinopodium vulgare* im Böhmischem Walde bei Harta und im Sattler bei Langenau.
- P. graminis* Pers. (I.) Auf *Berberis vulgaris* in Harta, Hohenelbe und Ober-Hohenelbe; auf *Avena sativa* um Harta, Hohenelbe und Langenau (II., III.); auf *Dactylis glomerata* in der Weissbach bei Harta, auf *Triticum repens* in Harta.
- P. coronata* Corda. (I.) Auf *Frangula alnus* in der Weissbach bei Harta, am Elbeufer in Pelsdorf; (II., III.) auf *Holcus mollis* in der Weissbach und auf *Holcus lanatus* im Mangelwalde bei Harta; auf *Calamagrostis silvatica* im Teufelsgrund (980 m).
- P. rubigo-vera* (DC.). (II., III.) Auf *Calamagrostis epigaea* in der Weissbach bei Harta (11./IX.).
- P. poarum* Nielsen. (I.) Auf *Tussilago farfara* in der Wustlich, am Fuchshübel, am Obergraben, am Fuchsberge bei Harta, in Nieder-Hohenelbe, am Pinner bei Langenau.
- P. suaveolens* (Pers.). (II., III.) Auf *Cirsium arvense* um Harta, Hohenelbe und Langenau.
- P. hieracii* (Schum.). (II., III.) Auf *Cirsium oleraceum* am Fuchshübel und im Zeskenwinckel bei Harta, in Nieder-Hohenelbe.
- P. polygoni* Alb. et Schw. (II., III.) Auf *Polygonum convolvulus* in Harta (25./VIII.).
- P. tanacetii* DC. Auf *Artemisia vulgaris* in der Weissbach bei Harta (II., III. —11./IX.).
- P. oblongata* (Link). (II., III.) Auf *Luzula pilosa* im Mangelwalde und in der Weissbach bei Harta, im Sattler bei Langenau.
- P. bistortae* DC. (II., III.) Auf *Polygonum bistorta* bei Harta und Hohenelbe, verbreitet.
- P. mammillata* Schroeter. Auf *Polygonum bistorta* in Harta (15./IX.).
- P. pruni* Pers. (II., III.) Auf *Prunus domestica* in Harta.
- P. fusca* Relhan. (III.) Auf *Anemone nemorosa* bei Hohenelbe (Herbar Kablik), bei Mönchsdorf.
- P. aegopodii* (Schum.). (III.) Auf *Aegopodium podagraria* in der Weissbach bei Harta, in Nieder-Hohenelbe.
- P. arenariae* (Schum.). (III.) Auf *Stellaria media* im Mangelwalde bei Harta; auf *Stellaria graminea* am Pinner bei Langenau.
- Trachyspora alchemillae* (Pers.). Auf *Alchemilla vulgaris* im Zeskenwinckel bei Harta, im Raubbach bei Hohenelbe, im Sibergrund bei Schwarzenthal (840 m).

- Phragmidium potentillae* (Pers.). Auf *Potentilla aurea* im Silbergrund bei Schwarzenenthal (850 m).
- Phr. subcorticium* (Schränk.). Auf *Rosa canina* in der Weissbach bei Harta, im Sattler bei Langenau (II.).
- Phr. fusciforme* Schroeter. (I.—III.) Auf *Rosa alpina* am Rande des Mangelwaldes bei Harta.
- Endophyllum sempervivi* (Alb. et Schw.). Auf *Sempervivum soboliferum* an trockenen Kalkhängen im Raubbach bei Hohenelbe.
- Gymnosporangium juniperinum* (L.). (I.) Auf *Sorbus aucuparia* am Pinner bei Langenau (23./VII.).
- Melampsora lini* (Pers.). (II.) Auf *Linum catharticum* in Füllenbauden (790 m, 24./VII.).
- M. farinosa* (Pers.). (II., III.) Auf *Salix aurita* verbreitet im Mangelwalde, Hartaer Walde, in der Wustlich bei Harta; auf *Salix caprea* in der Weissbach bei Harta.
- M. mixta* (Schlechtld.). Auf *Salix purpurea* in Harta.
- M. vitellinae* (DC.). Auf *Salix vitellina* am Bahndamme in Harta und Pelsdorf (18./IX.).
- M. tremulae* Tulasne. Auf *Populus tremula* in Harta und am Pinner bei Langenau.
- M. betulina* (Pers.). Auf *Betula alba* im Mangelwalde, Gänshalse und in der Weissbach bei Harta.
- M. pustulata* (Pers.). Auf *Epilobium roseum* in der Wustlich und im Mangelwalde bei Harta; auf *E. angustifolium* am Pinner bei Langenau; auf *E. alsinifolium* oberhalb der Hammermühle bei Pommerndorf (760 m).
- Calyptrospora Goeppertiana* J. Kühn. (I.) Auf *Abies alba* im Mangelwalde und in der Wustlich bei Harta (19./VII.).
- Coleosporium senecionis* (Pers.). (II., III.) Auf *Senecio silvaticus* in der Wustlich bei Harta, auf *S. Fuchsii* im Mangelwalde bei Harta.
- C. sonchi arvensis* (Pers.). (II., III.) Auf *Sonchus arvensis* in Harta; auf *Tussilago farfara* bei Huttendorf; auf *Petasites officinalis* am Fuchsberge bei Harta und im „frischen Wasser“ bei Langenau.
- C. campanulae* (Pers.). Auf *Campanula rotundifolia* bei Schlüsselbauden (1000 m); auf *C. rotundifolia* var. *Scheuchzeri* am Brunnenberg (1530 m); auf *C. rapunculoides* in Harta und am Pinner bei Langenau; auf *C. trachelium* und *C. latifolia* in der Weissbach bei Harta.
- C. euphrasiae* (Schum.). Auf *Melampyrum silvaticum* im Hartaer und Mangelwalde bei Harta (II., III.).
- Chrysomyxa pirolae* (DC.). Auf *Pirola secunda* am Pinner bei Langenau.
- Chr. abietis* (Wallr.). Auf *Picea excelsa* bei Pelsdorf und im Mangelwalde bei Harta.
- Cronartium flaccidum* (Alb. et Schw.). (II., III.) Auf *Paeonia officinalis* im Spinnereigarten in Harta.
- Aecidium aquilegiae* Pers. Auf *Aquilegia vulgaris* im Sattler bei Langenau (2./VI.).

- Aec. convallariae* Schum. Auf *Majanthemum bifolium* in der Weissbach bei Harta (30./VIII.).
- Aec. elatinum* Alb. et Schw. Auf *Abies alba* im Mangelwalde bei Harta (16./VIII.).
- Sebacina incrustans* (Pers.). Ueber Moos und Kräuterstengeln im Böhmischem Walde und in der Weissbach bei Harta.
- Exobasidium vaccinii* Wor. Auf *Vaccinium vitis Idaea* um Pelsdorf, Harta, Hohenelbe, am Pinner bei Langenau, am Heidelberge (1030 m).
- Corticium ochraceum* (Fries). An Baumstümpfen in der Weissbach bei Harta.
- C. laeve* (Pers.). An Strüngen von *Alnus* und *Quercus* in der Weissbach bei Harta.
- C. incarnatum* (Pers.). Auf *Acer pseudoplatanus* in der Weissbach bei Harta, bei Brana.
- C. cinereum* Pers. Auf Stümpfen von *Acer pseudoplatanus* in der Weissbach bei Harta, auf Stämmen von *Fagus sylvatica* im Silbergrund bei Schwarzen-thal (860 m) und im Elbgrunde bei Spindelmühle (980 m).
- Stereum rugosum* Pers. An Stümpfen von *Alnus* bei Brana.
- St. crispum* (Pers.). An Tannen- und Fichtenstümpfen in der Weissbach bei Harta und bei Brana, an Kieferstümpfen im Mangelwalde bei Harta.
- St. hirsutum* (Willd.). An Erlenstümpfen am Elbeufer in Pelsdorf.
- St. tabacinum* (Sow.). An abgefallenen Zweigen von *Corylus* am Fuchsberge bei Harta.
- Thelephora laciniata* (Pers.). An Fichtenstümpfen in der Wustlich bei Harta.
- Craterellus cornucopioides* (L.). Bei Hohenelbe (Herbar Kablik).
- C. crispus* (Sow.). Auf Nadelwaldboden in der Weissbach bei Harta.
- Clavulina rugosa* (Bull.). In Wäldern bei Pelsdorf und bei Brana.
- Cl. cristata* (Holmk.). Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta, bei Schlüssel-bauden (890 m) und am Abhange des Ziegenrückens gegen St. Peter (1120 m).
- Cl. cinerea* (Bull.). Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta.
- Clavaria ligula* (Schäff.). Auf Waldboden im Böhmischem Walde bei Harta.
- Cl. inaequalis* Müll. In Wäldern in der Wustlich und Weissbach, im Böhmischem Walde bei Harta, am Pinner bei Langenau.
- Cl. botrytes* Pers. Auf Waldboden in der Wustlich bei Pelsdorf.
- Cl. flava* Schäff. Im Böhmischem Walde bei Harta.
- Cl. fastigiata* (L.). An Waldrändern bei Hennersdorf.
- Clavariella stricta* (Pers.). Auf Kieferstümpfen in der Weissbach bei Harta.
- Cl. formosa* (Pers.). Auf Waldboden und an Baumstöcken in der Wustlich bei Harta und am Pinner bei Langenau.
- Cl. aurea* (Schäff.). Auf Waldboden im Böhmischem Walde und in der Wustlich bei Harta.
- Hydnum ochraceum* (Pers.). Auf Stümpfen von *Abies alba* im Mangelwalde bei Harta.
- H. repandum* L. Auf Nadelwaldboden in der Wustlich und Weissbach, im Gäns-hals und Böhmischem Walde bei Harta.
- Phaedon suaveolens* (Scop.). Auf Nadelwaldboden in der Wustlich bei Harta.
- Ph. imbricatum* (L.). In Nadelwäldern in der Wustlich bei Pelsdorf.

- Sistostrema confluens* Pers. Auf lichten Waldstellen zwischen Moos in der Wustlich bei Harta (4./IX.).
- Merulius serpens* Tode. Auf abgefallenen Tannenzweigen im Böhmischem Walde bei Harta.
- Serpula lacrymans* (Wulf.). Auf bearbeitetem Holze in Häusern: Harta, Hohenelbe, Ober-Hohenelbe.
- Polyporus vaporarius* (Pers.). An Stümpfen von *Tilia* in der Weissbach bei Harta.
- P. destructor* (Schrad.). An Kieferstrünken im Mangelwalde bei Harta, an bearbeitetem Holze an einem Wassergerinne in Harta.
- P. borealis* (Wahlb.). An alten Fichten im Weisswassergrunde (970 m).
- P. adustus* (Willd.). An Stümpfen von *Alnus glutinosa* und *Acer pseudoplatanus* in der Weissbach bei Harta, von *Fagus silvatica* im Sattler bei Langenau.
- P. versicolor* (L.). An Stümpfen von *Alnus* in der Weissbach und im Gänshals bei Harta, von *Betula* im Böhmischem Walde bei Harta; an Stümpfen und abgefallenen Aesten von *Fagus* im Sattler bei Langenau (var. *lutescens*).
- P. albidus* Trog. An Fichtenstümpfen in der Weissbach bei Harta.
- P. suaveolens* (L.). An Stämmen von *Populus tremula* im Mangelwalde bei Harta.
- P. melanopus* (Pers.). An faulenden Baumstümpfen am Fusse der Festung bei Spindelmühle (970 m).
- Ochroporus ferruginosus* (Schrad.). An Laubhölzern in der Weissbach bei Harta.
- O. radiatus* (Sow.). An Stämmen von *Alnus* in der Weissbach bei Harta.
- O. fomentarius* (L.). An *Fagus silvatica* im Silbergrunde bei Schwarzenthal (860 m), im Elbgrunde bei Spindelmühle (920 m).
- O. igniarius* (L.). An *Salix fragilis* und an *Prunus domestica* häufig um Pelsdorf, Harta, Hohenelbe, Langenau.
- O. perennis* (L.). In Wäldern an sandigen Weghängen am Abhange des Ziegenrückens gegen St. Peter (1120 m), am Schüsselberge (890 m), im Walde oberhalb Friedrichsthal (950 m), im Elbgrunde bei Spindelmühle (930 m).
- Daedalea unicolor* (Bull.). An Stümpfen von *Acer pseudoplatanus* im Elbgrunde (1060 m).
- Gleophyllum saepiarum* (Wulf.). An bearbeitetem Kiefernholze am Wehrkopfe in Fuchsberg bei Harta.
- Gl. abietinum* (Bull.). Ebenda an Fichtenholz.
- Boletus scaber* Bull. In lichten Wäldern, auf Heideplätzen, selbst unter einzelnen Bäumen, insbesondere Birken um Harta, Hohenelbe, Langenau verbreitet; bei Harta auch auf Moorboden.
- B. rufus* Schäff. Wie der vorige und häufig mit diesem.
- B. edulis* Bull. In Wäldern und Gebüsch um Pelsdorf, Harta, Hennersdorf, Hohenelbe, Langenau, Forst, am Schüsselberge (880 m), bei St. Peter (840 m), bei Gross-Aupa (740 m).
- B. luridus* Schäff. Unter Buchen im Sattler bei Langenau.
- B. spadiceus* Schäff. Unter Bäumen in Nieder-Hohenelbe.
- B. subtomentosus* L. In der Wustlich bei Pelsdorf und in der Weissbach bei Harta.

- B. piperatus* Bull. Auf lichten Waldstellen in der Weissbach und Wustlich, im Böhmischem Walde bei Harta, an Waldrändern im Elbgrunde bei Spindelmühle (750 m).
- B. bovinus* L. Auf Waldboden in der Wustlich bei Harta und bei Pelsdorf.
- B. granulatus* L. Im Wäldchen im „Sumpf“ bei Harta.
- B. luteus* L. Auf Waldwiesen und lichten Waldstellen um Harta, Pelsdorf, Hohenelbe, Langenau verbreitet.
- Cantharellus infundibuliformis* (Scop.). In Wäldern zwischen Moos im Elbgrunde bei Spindelmühle (780 m).
- C. cibarius* Fries. In Wäldern häufig um Pelsdorf, Hennersdorf, Brana, Harta, Hohenelbe, Ober-Hohenelbe, Langenau, Forst, Hermannseifen; am Ziegenrücken bei St. Peter bis 1100 m in grossen Mengen, am Schlüsselberge (920 m).
- C. aurantiacus* (Wulf.). In Wäldern in der Wustlich und im Böhmischem Walde bei Harta.
- C. muscoides* (Wulf.). In Wäldern zwischen Moos in der Wustlich bei Harta.
- Paxillus involutus* (Batsch). Am Grunde von Baumstämmen in Nieder-Hohenelbe.
- Coprinus micaceus* (Bull.). Auf faulenden Baumwollabfällen bei der Fuchsberger Spinnerei.
- Gomphidius glutinosus* (Schäff.). Auf Waldboden im Mangelwalde bei Harta.
- G. viscidus* (L.). Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta, bei Pelsdorf.
- Hygrophorus conicus* (Scop.). Auf Grasplätzen in Harta.
- H. miniatus* (Scop.). Auf feuchten Wiesen in der Wustlich bei Harta.
- H. ericeus* (Bull.). Auf grasigen, lichten Waldstellen im Sattler bei Langenau.
- H. ficoides* (Bull.). Auf der Weissen Wiese (1390 m).
- Limacium eburneum* (Bull.). Auf Waldboden in der Wustlich bei Harta.
- L. fusco-album* (Lasch.). Auf Nadelwaldboden in der Weissbach bei Harta.
- Lactaria seriflua* (DC.). In Gebüsch in der Weissbach bei Harta.
- L. mitissima* (Fries). An Waldrändern in der Weissbach bei Harta, unter Erlen-gebüsch bei Brana.
- L. subdulcis* (Bull.). An grasigen, lichten Waldstellen in der Wustlich bei Harta.
- L. piperata* (Scop.). Im Mangelwalde bei Harta in grosser Menge, bei Brana.
- L. vellerea* (Fries). In Nadelwäldern bei Brana.
- L. rufa* (Scop.). Auf lichten Waldstellen bei Hennersdorf.
- L. torminosa* (Schäff.). Unter Birken im Gänschals bei Harta, in Laubwäldern am Pinner bei Langenau.
- L. scrobiculata* (Scop.). Auf Waldboden im Sattler bei Langenau.
- L. deliciosa* (L.). In Wäldern und auf Waldwiesen verbreitet, so um Pelsdorf, Hennersdorf, Brana, Harta, Hohenelbe, Langenau, Forst.
- Russula emetica* (Schäff.). Auf feuchten Waldwiesen bei Hennersdorf.
- R. foetens* Pers. An Waldrändern des Mangelwaldes bei Harta.
- R. integra* (L.). In Wäldern bei Pelsdorf.
- Lentinus stypticus* (Bull.). An Stämmen von *Salix fragilis* in Nieder-Hohenelbe.
- L. adhaerens* (Alb. et Schw.). An Tannenstämmen im Gänschals bei Harta.

- L. squarrosus* (Schäff.). An Eisenbahnschwellen in Harta.
- Marasmius perforans* (Hoffm.). In Wäldern auf abgefallenen Nadeln in der Weissbach bei Harta.
- M. androsaceus* (L.). Auf Waldboden im Böhmischem Walde bei Harta, im Elbgrunde bei Spindelmühle (740 m).
- M. rotula* (Scop.). Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta, bei Brana, im Elbgrunde bei Spindelmühle.
- M. alliatus* (Schäff.). Am Waldrande am Pelsdorfer Gehänge.
- Coprinarius (Psathyrella) subtilis* Fries. Auf Dünger im Silbergrund bei Schwarzenthal (860 m).
- C. disseminatus* (Pers.). In Auen an der Elbe im Hutgarten bei Harta.
- Chalymotha (Paneolus) campanulata* (L.). Auf Kuhdünger auf der Weissen Wiese (1400 m).
- Annularia separata* (L.). Auf Kuhdünger auf der Weissen Wiese (1370 m).
- Psilocybe bullacea* (Bull.). An begrastem Wege zwischen Harta und Langenau.
- Hypholoma stipitatum* (Pers.). In Graspiesen in Harta.
- H. macropus* (Pers.). Auf lichten Waldstellen in der Weissbach bei Harta.
- H. appendiculatum* (Bull.). Am Grunde und längs der Wurzeln abgeschnittener Pappeln in grosser Menge in Harta.
- H. fasciculare* (Huds.). An Fichtenstöcken im Mangelwalde, an Erlenstrüngen im Gänsbühl und am Untergraben in Harta.
- H. lateritium* (Schäff.). Auf Waldboden um Baumstümpfe in der Weissbach bei Harta.
- Psalliota (Stropharia) melanosperma* (Bull.). Auf gedüngten Wiesen nächst der Fuchsberger Spinnerei.
- Ps. (St.) stercoraria* (Fries). Auf Kuhmist auf der Teufelswiese (1260 m).
- Ps. campestris* (L.). Auf Triften und in Graspiesen um Harta, Hohenelbe, Forst verbreitet, mitunter in sogenannten Hexenringen.
- Ps. silvatica* (Schäff.). Auf Waldwiesen in der Wustlich bei Harta.
- Dermis (Galera) hypni* (Batsch). Zwischen Moos am Rande des Mangelwaldes und im „Sumpf“ bei Harta.
- D. (G.) tener* (Schäff.). In Hainen an der Elbe in Nieder-Hohenelbe.
- D. semiorbicularis* (Bull.). Auf Hutweiden nächst dem Pelsdorfer Bahnhofe.
- D. sapineus* (Fries). In Wäldern in der Wustlich bei Harta.
- D. crustuliniformis* (Bull.). In Wäldern in der Wustlich bei Harta.
- Inocybe geophylla* (Sow.). Auf Waldboden in der Wustlich und im Böhmischem Walde bei Harta.
- I. cristata* (Scop.). Im Jungwalde in der Weissbach bei Harta.
- I. dulcamara* (Alb. et Schw.). Im Walde in der Wustlich bei Harta.
- Cortinarius acutus* (Pers.). Auf Waldboden in der Wustlich bei Harta, am Schlüsselberge (980 m).
- C. obtusus* (Fries). Auf Nadelwaldboden in der Weissbach bei Harta.
- C. dilutus* (Pers.). Im Jungwalde in der Weissbach bei Harta.
- C. gentilis* Fries. Auf Waldboden nächst der Elbe in Pelsdorf.

- C. armillatus* Fries. Auf Waldboden in der Wustlich bei Harta.
- C. cinnamomeus* (L.). Auf Waldboden in der Weissbach und im Böhmischem Walde bei Harta.
- C. eumorphus* (Pers.). Unter lebenden Zäunen in Harta, in Auen nächst der Elbe in Nieder-Hohenelbe.
- C. albo-violaceus* (Pers.). In Wäldern am Pinner bei Langenau.
- C. violaceo-cinereus* (Pers.). Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta und am Pinner bei Langenau.
- C. vibratilis* Fries. In Wäldern in der Wustlich bei Pelsdorf.
- C. collinitus* (Pers.). Auf feuchtem Waldboden, zwischen Moos in der Wustlich bei Pelsdorf.
- C. decoloratus* Fries. Auf Waldboden bei Hennersdorf.
- C. coerulescens* (Schäff.). Unter lebenden Zäunen in Harta.
- C. subtortus* (Pers.). In Nadelwäldern bei Hennersdorf.
- Naucoria conspersa* (Pers.). Auf feuchtem Waldboden in der Weissbach bei Harta.
- N. furfuracea* (Pers.). Auf Grasplätzen im Hutgarten bei Harta.
- N. (Flammula) amara* (Bull.). Auf Stümpfen von *Alnus* am Untergraben in Harta.
- Pholiota candicans* (Schäff.). Auf Waldwiesen im Böhmischem Walde bei Harta.
- Ph. marginata* (Batsch). Auf Tannenstöcken im Böhmischem Walde bei Harta.
- Ph. mutabilis* (Schäff.). Auf Stümpfen von *Alnus* in der Weissbach, im Gänschals und am Untergraben in Harta, von *Salix fragilis* in Nieder-Hohenelbe, von *Fagus silvatica* am Schlüsselberge (1030 m).
- Ph. radicata* (Bull.). Am Grunde von Eichenstämmen in Harta.
- Ph. flammula* (Alb. et Schw.). Auf Fichtenstümpfen im Hartaer Walde.
- Ph. squarrosa* (Müll.). An Birkenstümpfen im Gänschals bei Harta, an lebenden Stämmen von *Salix fragilis* in Nieder-Hohenelbe.
- Hyporrhodius (Nolanea) pascus* (Pers.). Auf Wiesen in Bradlerbauden (1150 m).
- H. hirtipes* Fl. Dan. Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta.
- H. (Entoloma) hydrogrammus* (Bull.). In Obstgärten in Harta.
- Rhodosporus (Clitopilus) prunulus* (Scop.). Auf Waldwiesen bei Hennersdorf.
- Russulopsis (Clitocybe) laccata* (Scop.). Auf moosigen Waldstellen in der Wustlich und im Böhmischem Walde bei Harta; die var. *pusilla* Schroeter im Böhmischem Walde.
- Agaricus (Pleurotus) petaloides* Bull. An Baumstümpfen in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Omphalia) fibula* Pers. Auf Grasplätzen in Nieder-Hohenelbe.
- Ag. (Omph.) umbelliferus* L. Auf feuchtem Heideboden bei Hennersdorf.
- Ag. (Omph.) epichrysum* Pers. Auf faulenden Erlenstrünken am Untergraben in Harta.
- Ag. (Mycena) capillaris* Schum. Auf abgefallenem Laube im Mangelwalde bei Harta.
- Ag. (Myc.) hiemalis* Osb. Auf Eichenstämmen in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Myc.) corticola* Pers. Auf Stämmen von *Quercus* in der Weissbach bei Harta und auf *Populus pyramidalis* in Harta; auf *Tilia* in Nieder-Hohenelbe.

- Ag. (Myc.) echinipes* Lasch. An abgefallenen Zweigen am Gehänge in Pelsdorf.
- Ag. (Myc.) epipterygius* Scop. Zwischen Moos in Nadelwäldern in der Wustlich und am Fuchsberge bei Harta, bei Pelsdorf; die var. *flavipes* Schr. auf Waldwiesen bei Brana.
- Ag. (Myc.) filipes* Bull. Auf Waldboden im Mangelwalde bei Harta, bei Hennersdorf.
- Ag. (Myc.) laevigatus* Pers. Auf lichten Waldstellen in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Myc.) nanus* Bull. Auf Waldboden bei Brana.
- Ag. (Myc.) roseus* Bull. Auf Waldboden im Mangelwalde und in der Wustlich bei Harta.
- Ag. (Myc.) rosellus* Fries. Auf Waldboden bei Brana.
- Ag. (Myc.) elegans* Pers. Auf Waldboden bei Brana.
- Ag. (Collybia) murinus* Batsch. Auf feucht-schattigem Nadelwaldboden in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Coll.) clusilis* Fries. Zwischen *Sphagnum* im Sumpf bei Harta.
- Ag. (Coll.) extuberans* Fries. Unter Bäumen im Hutgarten bei Harta.
- Ag. (Coll.) dryophilus* Bull. Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Coll.) tenacellus* Pers. Unter *Pinus pumilio* in der Kesselgrube (1120 m).
- Ag. (Coll.) collinus* Scop. Auf Waldwiesen in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Coll.) confluens* Pers. Auf Nadelwaldboden im Böhmischem Walde bei Harta.
- Ag. (Coll.) cautinalis* Bull. An Wegrändern in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Coll.) velutipes* Curt. Auf *Salix fragilis* in Nieder-Hohenelbe.
- Ag. (Coll.) macrourus* Scop. (*A. radicans* Relh.). Auf faulendem Holze im Silbergrund bei Schwarzenthal (870 m).
- Ag. (Clitocybe) salignus* Pers. An *Salix fragilis* in Nieder-Hohenelbe.
- Ag. (Cl.) fragrans* Sow. Zwischen Moos im Walde nächst der Elbe in Pelsdorf.
- Ag. (Cl.) flaccidus* Sow. Auf lichten Waldstellen in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Cl.) sinopicus* Fries. Auf lichten Waldstellen am Schüsselberge (980 m).
- Ag. (Cl.) suaveolens* Schum. Auf Waldboden zwischen Moos bei Pelsdorf.
- Ag. (Cl.) infundibuliformis* Schöff. Zwischen Moos auf Waldboden am Pinner bei Langenau und im Mangelwalde bei Harta.
- Ag. (Cl.) olivinus* Fr. Zwischen Moos in Wäldern in der Wustlich bei Pelsdorf.
- Ag. (Cl.) clavipes* Pers. Auf Waldboden bei Hennersdorf.
- Ag. (Cl.) nebularis* Batsch. Zwischen Moos in Wäldern bei Pelsdorf.
- Ag. (Tricholoma) terreus* Schöff. Auf Waldboden in der Weissbach bei Harta.
- Ag. (Tr.) columbetta* Fries. In Moospolstern in der Kesselgrube (1060 m).
- Ag. (Tr.) rutilans* Schöff. Auf Waldboden in der Wustlich und in der Weissbach bei Harta.
- Armillaria mellea* (Vahl.). Auf Fichtenstümpfen im Mangelwalde und an Erlenstümpfen in der Weissbach bei Harta.
- Ar. bulbiger* (Alb. et Schw.). Auf Waldboden im Böhmischem Walde bei Harta.
- Lepiota amianthina* Scop. In Auen in Nieder-Hohenelbe.
- L. carcharias* Pers. Im Mangelwalde bei Harta.

- L. chypeolaria* (Bull.). Auf lichten Waldstellen in der Weissbach bei Harta.
- L. felina* (Pers.). Auf Waldboden am rechten Elbeufer in Pelsdorf.
- L. umbonata* (Schum.). In einem Blumenkübel im Zimmer in Harta.
- L. cristata* (Alb. et Schw.). In Auen in Nieder-Hohenelbe.
- L. procera* (Scop.). An Waldrändern in der Wustlich bei Harta und bei Pelsdorf.
- Amanitopsis plumbea* (Schäff.). In Wäldern verbreitet; um Pelsdorf, Hennersdorf, Harta, Hohenelbe, Langenau, im Elbgrunde bei Spindelmühle (740 m), am Schlüsselberg (860 m); die var. *plumbea* (Schäff.) in der Weissbach bei Harta; die var. *badia* (Schäff.) in der Weissbach und im Böhmischem Walde bei Harta.
- Amanita pustulata* (Schäff.). Auf Waldboden im Böhmischem Walde bei Harta.
- Am. umbrina* (Pers.). Auf Waldboden in der Wustlich bei Harta.
- Am. muscaria* (L.). In Wäldern gemein.
- Am. bulbosa* (Bull.). In Wäldern und Auen verbreitet.
- Lycoperdon pyriforme* (Schäff.). An Fichtenstümpfen im Mangelwalde bei Harta, bei Pelsdorf; die var. *minus* Schlz. v. Mügg. (Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XX, S. 176) in der Wustlich bei Harta.
- L. gemmatum* Batsch. Auf Triften und in Wäldern verbreitet. Die var. *pratense* Schr. in der Weissbach und im Gänschals bei Harta, bei Pelsdorf; die var. *substipitatum* Schr. in der Weissbach bei Harta, bei Brana; die var. *perlatum* Pers. bei Pelsdorf, im Mangelwald bei Harta, bei Hennersdorf.
- L. uteriforme* Bull. In gemischten Wäldern am Pinner bei Langenau.
- L. caelatum* Bull. An Wiesenhängen am Pinner bei Langenau und am Kalkberge bei Schwarzenenthal (690 m).
- Globaria furfuracea* (Schäff.). In Wäldern in der Weissbach bei Harta.
- Bovista plumbea* Pers. Auf Wiesen und Triften verbreitet, bei Harta, Hohenelbe und Langenau.
- Geaster coronatus* (Schäff.). Auf Nadelwaldboden im Raubbach bei Hohenelbe (520 m).
- Crucibulum vulgare* Tul. Auf feucht liegendem Holze am Wassergerinne der Fuchsberger und Hartaer Spinnerei.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Cypers-Landrecy Viktor von

Artikel/Article: [Beiträge zur Kryptogamenflora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. 43-53](#)