Studia Bot. Hung. IX. 1974.

Nachtrag II. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums"

Klára VERSEGHY
Botanische Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest

ABSTRACT: Catalogue of the type-material in the lichenological collection of the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum. Supplement II

Die Typensammlung wuchs seit dem Erscheinen des Katalogs 1964 so sehr an, dass jetzt ein zweiter Nachtrag herausgegeben werden musste.[+]

Alectoria bicolor (EHRH.) NYL. f.pallidior GYELN. 1931. in Nyt. Mag. Naturv., 70: 41.
Paratypus (33932). Deutschland: Fichtelgebirge, an Granitfelsen. 1808.

Alectoria corymbosa HUE 1908.
in Exped. Antarct. Franc., 1903-5. p. 12.
Fragm. typi (33936). Antarctica: sur les rochers, ile Wandel; Exp. du Francais au pole Sud, 29. XI. 1904.

Arthonia subtilis (VĚZDA) VĚZDA n. comb. 1961.
in Preslia 33:367.
Topotypus (48498). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 111.)
Bohemoslovakia: Sudeti occident.: (Krkonose): in valle rivi "Mumlava" prope pagum Harrachov, alt. 800 m. s. m.) (loc. class.). - In ramulis tenuioribus Picearum. VĚZDA, 26. VII. 1960.

Arthopyrenia subglobosa VĚZDA 1961.
in Acta Mus. Silesiae, ser. A. 10:136.
Topotypus (48502). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 101.)

[+] VERSEGHY, K. (1964): Typen-Verzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Budapest. pp. 143.
VERSEGHY, K. (1968): Nachtrag I. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums.Fragm. Bot., 6:41-55.

Bohemoslovakia: Sudeti orient. (Jeseniky): in monte "Špićak" prope pagum Supikovice, alt. 500 m. s. m. (loc. class.) - In lateribus umbrosis rupium calcarearum VĚZDA, 17. V. 1961.

Bacidia intermediella VĚZDA 1971.
in Acta Mus. Silesiae, ser. A. 10:107.
Isoparatypus (48505). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 109.)
Bohemoslovakia: Moravia: in vallecula sylvatica, loco dicto "U trojáku" haud procol pago Mokra Hora prope urbem Brno, alt. 250 m. s. m. (loc. class.) - Ad corticem Fraxini excelsioris. VĚZDA, 10. IV. 1961.

Bacidia neglecta VĚZDA 1961.
in Acta Mus. Silesiae, ser. A. 10:110
Isoparatypus (48507). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 110.)
Bohemoslovakia: Moravia: in sylvis cultis supra pagum Mokra Hora prope urbem Brno, alt. 300 m. s. m. (loc. class.) - Ad ramulos siccos Picearum. VĚZDA, 20. III. 1961.

Biatorella ochrophora (NYL.) ARN. var. planiuscula VĚZDA 1960. in Schaed. Lich. Sel. Exs. Fasc. I. no. 19.
Isoparatypus (48555). Bohemoslovakia: Moravia occid., Mor. Krumlov: in valleculo rivi "Mlynsky potok" prope opp. Rouchovany, alt. 350 m. s. m. - Ad corticem Sambuci. VĚZDA, 18. IV. 1960.

Caloplaca caliacrae CRETZ. 1938.
in Acta pro Fauna et Flora Univ., ser. II. Bot. 3 (1-2):4 (no. 78) Isotypus ? (55881). (CRETZOIU: Lich. Romaniae Exs. no. 78.) Caliacra: ad Cap-Caliacra, exp. S-W, alt. 5-10 m. s. m., ad tegulas. CRETZOIU, 24. IV. 1938.

Caloplaca lallavei (CLEM.) FLAG. f. fulva SZAT.
Nomen nudum
Syntypus (27659; 27660; 27661). Hungaria: com. Veszprém: prope pagum Jutas, sub radicibus montis "Grosser Berg" in pascuo ad rupem calc., alt. 200 m.s.m. GYELNIK, 13. VIII. 1925.

Caloplaca likensis ZAHLBR. 1938.
Flora Velebitica III. p. 371.
Paratypus (34103). (DEGEN: Plant. Hung. exs. no. 741.)
Kroatien: com. Lika-Krabava. Hügel Zir bei Raduč, an Kalkgestein in warmen Lagen alt. 650-700 m.s.m. BAUMGARTNER, 24. IV. 1914.

Caloplaca vitellinoides VERS. 1973.
Studia Bot. Hung., 8:49.
Holotypus (28057). Hungaria: Ad rupes andesiticas toffineas prope pag. Szentendre, com. Pest. TIMKÓ, 10. X. 1925.

Cyphelium subtigillare RÄS. 1932.
apud PLITT in Bryologist 35:82.
Isotypus (35463). Jamaica: ad corticem arborum. OSCUTT, 1927-28. det. TIBELL.

Evernia prunastri (L) ACH. var. densa MOT. 1960.
in Fragm. Florist. et Geobot., 6/4/:617.
Holotypus (76857). Dalmatien: West-Curzola, bei Smokvica, an Macchien Gesträuch östl. von Gipfel. BAUMGARTNER, 28. III. 1910.

Gorgadesia mira C. TAV. 1964.
in Rev. Biol., 4:132.
Isotypus (51065). (C. N. TAVARES: Lich. sel. exs. Lusit. no. 182.) Portugalien: Cabo Verde: S. Tiago: Ponte Moreia, ad rupes maritimas septentrionem spectantes. L.A. GRANDVAUX BARBOSA, 14. XII. 1955.

Lecanora černohorskyana CLAUZ. et VĚZDA 1970.
in Preslia 42:216.
Topotypus (75998). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 895)
Gallia: Vauclause: Gordes, prope Les Dilais, alt. 350 m s. m. - Ad lapides arenario-calcareos. CLAUZADE, 15. VIII. 1968.

Lecanora congesta CLAUZ. et VĚZDA 1969.
in Portug. Acta Biol., (B), 9:331.
Paratypus (75828). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 779)
Gallia: Bouches du Rhone: Marseille, insula Maire. Ad saxa calcarea maritima, in septentrionem spectantia. CLAUZADE, VI. 1968.

Lecanora sienae LESD. 1948.
in Bull. Soc. Bot. France 95:196.
Topotypus (49775). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 94)
Italia: Toscana, Monteliscai: cupressicola in villa Solaia, loco "Casalbosco" (loc. class.). SBARBARO, 25. IV. 1961. det.: VĚZDA.

Lecidea flavosorediata VĚZDA 1961.
in Preslia 33:366
Isoparatypus (49800). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 112)
Bohemoslovakia: Sudeti occident. (Krkonoše): iugum montium "Prichovicky hreben" prope opp. Sumburk, alt. 490 m. s. m. (loc. class.) - Ad corticem Fraxini excelsioris. VĚZDA, 14. VIII. 1961.

Lecidea umboniza NADV. 1960.
apud VĚZDA in Schaed. Lich. sel. exs. fasc. I. no. 13.
Isoparatypus (49783). Bohemoslovakia: Carpati, montes Tatra Magna, pars occident. (iugum Červené vrchy): in summo cacumine montis "Temniak" alt. 2000 m s. m. - Ad saxa calcarea locis ventis expositis. VĚZDA, 10. VIII. 1958. det.: VĚZDA.

Lecidella carpathica KOERB. var. latypizella (NADV.) H.HERTEL 1970.
in Herzogia, 1/4/:435. Syn.: Lecidea latypizella NADV. 1961. Paratypus (76008). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 905.) Bohemoslovakia: Pannonicum. Distr. Košice: Zadielsky kamen prope Turna nad Bodvou, alt. 600 m s. m. - Ad lapides magnos calcareos. VĚZDA, 2. VI. 1966.

Ochrolechia crozalsiana CLAUZ. et VĚZDA 1970.
in Acta Mus. Siles., ser. A. 19:25.
Isotypus (75996). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 893.) Gallia: Corsica. Distr. Piedicroce: Prope pagum Piedipartino, alt. 700 m s. m. - Ad saxa granitica in silva clara Castanearum. VĚZDA, 28. VI. 1969.

Opegrapha rinodinae VĚZDA 1969.
in Česká Mykol., Praha 23:104.
Paratypus (72973). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 774.) Bohemoslovakia: Carpati, Tatra Magna, iugum Belanské Tatry: in monte "Zdiarská Vidla", alt. 2100 m s. m. - in thallo Rinodinae nimbosae (FR) TH. FR. parasymbiontice vigens. VĚZDA, VII. 1965.

Parmelia dubia (WULF.) SCHAER. var. caesiocinerea LESD. 1923.
in Bull. Soc. Bot. France 70:843.
Topotypus (49989). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 97.) Italia: Liguria occident.: Spotorno, loco "Prelo". - Ad maceriam (loc. class. huius var.) SBARBARO, 30. III. 1961. det.: VĚZDA.

Parmelia gigas KUROK. 1964.
apud HALE et KUROKAWA in Contr. U. S. Nat. Herb., 36:177.
Isotypus (72870). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 671.)
Colombia: Laguna Verjou, prope Bogotá. - Saxicola., BRO. ARISTE J., 1922. det.: J. H. HALE.

Parmelia mougeotii SCHAER. f. incurvoides SERVIT 1936.
in Vestnik Král. České Společ. Nauk 2:9.
Topotypus (49971). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 21.) Bohemoslovakia: Bohemia orient., Hlinsko: in cacumine collis "Mrákotinsky kopec" prope pagum Mrákotin, alt. 570 m s. m. (loc. class. hui. form.) - Ad saxa schistosa Calluneto. VĚZDA, 17.IV. 1960. det.: VĚZDA.

Parmelia rosaeformis (ACH.) GYELN. f. rufescentisorediosa GYELN. 1931.
in Feddes Rep., 29:289/417.
Holotypus (24224). Bohemoslovakia: Zlatno. VANGEL, 20. VI. 1909.

Parmelia rubrireagens GYELN. 1938.
in Ann. Mycol. 36:288.
Fram. typi (23563). Australia: New South Wales, Face of Cliff Rocky Hill. Goulburn. W. W. WATTS, III. 1901.

Phaeographis lyellii (SM.) ZAHLBR. 1905.
Engler-Prantl: Natürl. Pflanzenfam. 1/1:99.
Topotypus (75829). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 800.)
Magna Britania: Hampshire, New Forest. - Ad corticem laevigatum arboris.) LYELL, 18. IV. 1808. det.: VĚZDA.

Psychia biziana (MASS)ZAHLBR. var. leptophylla VĚZDA 1964.
in Schaed. Lich. Sel. Exs. no. 298.
Isoparatypus (50947). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 298.)

Italia: Liguria Genuensis: Voltri, in Villa De Ferrari Galliera. - Ad cort. coniferarum. Leg. F. CEVASCO, comm. C. SBARBARO. 15. IV. 1961.

Physcia rondoniana CLAUZ. et VĚZDA 1970.
in Acta Mus. Siles. ser. A. 19:26.
Isotypus (76001). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 898.) Gallia: Corsica. Distr. Bastia: Brando, in vicinitate viculi Castello, alt. 120 m. s. m. - Ad saxa silicea schistosa. CLAUZADE, RONDON, LAMBINON et VĚZDA, 26. VI. 1969.

Polyblastia suzae SERV. 1936.
in Beih. Bot. Cbl., 55 (B):264.
Topotypus (76005). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 902.) Bohemoslovakia: Sudeti orient. (Jeseniky). Distr. Sumperk, supra pagum Raskov, alt. 550 m s. m. - Ad saxa serpentina locis umbrosis. J. VICHEREK et VĚZDA, 8. V. 1970. det.: VĚZDA.

Porina guentheri (FW) ZAHLBR, var. eitneri (ZAHLBR.) KEISSL. 1938.
in Rabenh. Kryptog.-Fl., ed. 2, 9/1/2/:335. Porina eitneri ZAHLBR. 1922.
Topotypus (50466). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 32.) Bohemoslovakia: Sudeti occident., montes Jizerské hory: in summo monte "Bukovú" alt. 990 m s. m. - Ad saxa basaltica umbrosa. VĚZDA. 25. VIII. 1960. det.: VĚZDA.

Protoblastenia lilacina POELT et VĚZDA 1970.
in Acta Mus. Siles., ser. A. 19:26.
Isotypus (75991). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 888.) Jugoslavia: Dalmatia, insula Korcula: Zrnova Banja alt. 20-30 m s. m. - Ad lapides calcareos in margine vinearum acumulatos. VĚZDA, 17. VIII. 1969.

Ramalina carpathica KOERB. var. teplicskaënsis GYELN. 1930.
in Magy. Bot. Lap., 29/1-12/:31.
Isotypus (53671: 56673). Hungaria: com. Liptó. - Ad saxa gneissacea, alpis Dzurova prope Teplicska. LOJKA, 29. VIII. 1872.

Ramonia luteola VĚZDA 1967.
in Folia Geobot. Phytotax., Praha 2:313.
Isotypus (72051). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 581.)
Bohemoslovakia: Carpati, iugum montium Tatrae Minoris: ad latera occidentalia montis "Latiborska hola", alt. ca. 1250 m s. m. - Ad corticem Acerispseudoplatani. VĚZDA, 6. X. 1966.

Solenopsora carpatica PIŠUT et VĚZDA 1970.
in Acta Mus. Siles., ser. A. 19:25.
Isotypus (75999). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 896.) Bohemoslovakia: Carpati, montes Fatra Magna: In rupibus Velka skala dictis, ad latera montis Sidorovo prope urbem Ruzemberok, alt. 600 m s. m. - Ad parietas rupium calcarearum. VĚZDA, 3. X. 1968.

Squamaria silicea GYELN. f. aquatica GYELN. 1931.
in Feddes Rep. 29:40/344.
Holotypus (76855). Hungaria: com. Hont: prope Kismaros, in valle Csömöle völgy, montium Börzsöny ad rup. vulcanic. aquat. alt. 150 m s. m. GYELNIK, 23.IV.1926.

Teloschistes : chrysophthalmus (L.) TH. FR. var. subpulvinaris GYELN. 1963.
apud VERSEGHY in Nova Hedw., 4:582.
Holotypus (30619). Africa australis, prov. Cape, distr. Uitenhage, Dimbrody Mission near Port Elizabeth. O. A. HÖEG, 1929.

Toninia affinis VĚZDA. 1971.
in Schaed. Lich. Sel. Exs. no. 985.
Isotypus (76225). Romania: Dobrogea, distr. Constanţa: in valle fl. Casimcea prope locum Lasaul dictum, alt. 80 m s. m. - Ad lapides calcareos humiles solo exientes in declivibus stepposis. VĚZDA, 8. VIII. 1970.

Toninia sbarbaronis LESD. 1936.
in Bull. Soc. Bot. France 82:315.
Topotypus (50631). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 163.) Italia: Liguria occident.: Finale loco "Varezzi" (loc. class.) - Ad rupem vix e terra emergentem. SBARBARO, 28. IV. 1962. det.: VĚZDA.

Usnea grandis MOT. 1937.
Lich. Gen. Usnea. Pars System. II. p. 465.
Holotypus (76856). Ins. Java, Mt. Rantie, ca. 650 m s. m. ad arbores. ZOLLINGER, 1856.

Usnea setulosa MOT. var. rubra RÄS.
Nomen nudum
Holotypus (26468). Chili: Pucon, ad lago Villarrica sub radic. m. Vulkan Villarica, epiphyta. C. C. HOSSEUS, 8. II. 1935.

Verrucaria scabra VĚZDA 1970.
in Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5:320.
Isotypus (75979). (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 876.) Bohemoslovakia: Carpati, Tatra Minor: in decl. orientali montis "Kosariska" dicti in parte superiore vallis "Biela voda" alt. 1300 m s. m. - Ad lapides schistosis siliceos in torrente minore. VĚZDA, 7. X. 1966.

Xanthoria parietina (L.) TH. FR. var. irregularis GYELN. 1963.
apud VERSEGHY in Nova Hedw., 4:581.
Holotypus (30620). Africa australis: prov. Cape distr. Worcester, near the town. O. A. HÖEG, 6. XI. 1929.

Polycoccum galligenum VĚZDA 1969.
in Česka Mykol., Praha, 23: 107.
Paratypus (72974.) (VĚZDA: Lich. sel. exs. no. 775.) Bohemoslovakia: Moravia austro-occident.: Moravsky Krumlov, in valle fluvii Rokytna prope pagum Budkoviče, alt. 300 m s. m. - In thallo Physciae dubiae (HOFFM.) LYNGE parasitans. VĚZDA, 7. IV. 1964.

VERSEGHY, K.: A Természettudományi Múzeum Növénytára zuzmógyűjteményének típuskatalógusa. II. kiegészítés

A tipusgyüjtemény állandó növekedése az 1964-ben megjelent katalógus óta a második pótlás kiadását tette szükségessé.

Angekommen: 9. 1. 1973.

DR. KLÁRA VERSEGHY
Természettudományi Muzeum Növénytára
1146 Budapest
Vajdahunyadvár