

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ГЕРБАРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(LECB). ЧАСТЬ 2. СЕМЕЙСТВО RESTIONACEAE

SPECIMINA TYPICA IN HERBARIO UNIVERSITATIS
PETROPOLITANAE (LECB) CONSERVATA. PARS 2. FAMILIA
RESTIONACEAE

Статья является продолжением серии публикаций, посвященной коллекции типовых гербарных образцов, хранящейся в Гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) (LECB). В результате критического изучения сем. *Restionaceae* в LECB выявлены 42 автентичных образца, которые относятся к родам *Boeckia*, *Cannomois*, *Colopsis*, *Dovea*, *Restio*, *Thamnochortus* и *Willdenowia*.

В настоящее время, одним из крупнейших по количеству выявленных типов в LECB является сем. *Restionaceae* (42 образца из 39 таксонов). Как оказалось, среди них представлено больше всего видов и разновидностей описанных К. Кунтом (Kunth, 1841) и К. Г. Неес фон Эсенбеком (Nees von Esenbeck, 1830). Кроме того, имеется некоторое количество автентиков и других авторов, таких как Е. Штойдель (Steudel, 1858) и М. Мастерс (Masters, 1865).

Ниже мы приводим список всех выявленных к настоящему времени (к концу 2004 г.) автентичных образцов из сем. *Restonaceae* и хранящихся отдельно в коллекции типов Гербария СПбГУ (LECB). Большинство типов относятся к таксонам из Южной Африки, которые были описаны по образцам из эксикатных коллекций И. Дрежа (J. F. Drège), и в меньшей степени К. Эклон (C. F. Ecklon) (1795–1868) и К. Цейхера (C. Zeyher) (1799–1858). Дубликаты этих коллекций хранятся во многих Гербариях мира (Index Herbariorum, 1990). В настоящее время они выявлены и в Гербарии СПбГУ (LECB) (Бубырева и др., 2003а, 2003б). Большая часть образцов Ecklon, Zeyher и Drège, была получена из Берлина и хранится в коллекции Г. П. Бонгарда. Кроме того, часть типов была обнаружена в коллекции Э. Линдемана и совсем немного в основном фонде LECB. Большинство этикеток Drège и Ecklon et Zeyher краткие, но очень характерные для данных эксикат¹. Информацию об эксикатах из коллекции и расшифровку указанных на этикетках номеров местобитаний и экотопов можно найти в специальных работах (Drège, 1843, 1846–

¹ См. комментарии, данные в нашей предыдущей статье, опубликованной в этом же томе издания «Новости систематики высших растений».

1847). Необходимо подчеркнуть, что публикуемый ниже список, скорее всего не полный и в будущем может быть дополнен новыми названиями.

В приведенном ниже аннотированном списке названия таксонов расположены в алфавитном порядке. Для каждого названия приведены номенклатурная цитата (принятое в настоящее время название растения не указывается), категория типа, полный текст гербарной этикетки (в квадратных скобках даются наши дополнения и расшифровки), цитата из протолога; необходимых случаях даются примечания.

Сем. *Restionaceae* R. Br.

1. *Boeckia striata* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 449.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Boeckia? striata* Kunth. En. N 1 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2479»¹ (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2488 bb. 2022. 2479. 2480.) ...Descr. floris feminei (nec fructus) juxta specimina sub. no. 2022 emissa; reliqua secundum n. 2488 bb. Culmi in n. 2479 et 2480 vix pedales».

2. *Cannomois simplex* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 448.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Isotypus*: «*Cannomois cephalotes* Beauv. Kunth. En. N 1 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и на образце «2514» (LECB!).

По протологу: «Cap. bonae spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2514.)».

3. *Colopsis hirtella* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 426.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Isotypus*: «*Colopsis hirtella* Kunth. En. N 4 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и этикетка на образце: «2500» (LECB!).

По протологу: «*Restio hirtellus* Kth. olim. — Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2500.)».

4. *C. oxylepis* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 427.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Colopsis oxylepis* Kunth [Herb. Drège, Afr. austr.] N 39.» (LECB!).

По протологу: «*Restio oxylepis* Kth. olim. — Cap. b. spei. (Drège, Res. Cap. n. 39 et 2501 ex parte.)».

5. *C. peronata* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 426.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Colopsis peronata* Kunth. En. N 5. fem. 2499 [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*Restio peronatus* Kth. olim. — Cap. bonae spei. (Drège, Rest. Cap. n. 1623? [mas] et 2499 [femina])».

6. *Dovea binata* Steud., 1855, Syn. Pl. Glum. 2: 248.

¹ К данному и многим другим образцам, цитированным в работе, прикреплены ярлычки с указанием номера (скорее всего эксикатного). Эти номера приведены нами при таксонах после квадратных скобок.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Isotypus*: «*Dovea binata* Steud. 2477 [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «Hrbr. Drège 2477. [pl.] Afr. austr.».

7. *D. ebracteata* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 458.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Dovea ebracteata* Kth. En. N. 2 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «125» (LECB!).

По протологу: «*Restio equisetaceus* Reichenb. in Sieb. herb. Cap. 232. (specimen herb. Luc. suppetens incompletum.) — Cap. bonae spei. (Drège, Rest. Cap. n. 125)».

8. *D. macrocarpa* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 458.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Dovea macrocarpa* Kunth. En. N 1 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2523» (LECB!).

По протологу: «Cap. bonae spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2523)».

9. *Restio asperiflorus* Nees, 1830, Linnaea, 5: 656.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Elegia asperiflora* N. ab E. 1.12 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*Restio asperiflorus* Z. et N. ab E. in N. Act. Ac. N. Cur. XV, 2. ined. In planitie Capensi mensem Decembri mense Legit Ecklonius florentem. Femina in horto Schwetzingensi colitur, e seminibus ab Ecklonio missis progenita, floruitque Decembri anni 1829».

Примечание. Вид был описан в роде *Restio*, но позднее (Kunth, 1841), переведен в род *Elegia*.

10. *R. bifurcus* Nees ex Mast., 1865, Journ. Linn. Soc. 8: 247.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Restio bifurcus* N. ab E. 75.5 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*R. bifurcus* Ness, MS. in herb. Sonder. Hab. C.B.S. Ex. sp. s. Gnadenthal, Eck. et Zeyh. ♂ et ♀. n. 39! In planitie Capensi Eck. n. 564c. ♂! Cape Flats, Zeyher ♂ et ♀, 1011; Drège nn. 46, 364, 1608♀!; Dr. Thom. in herb. Hook. 49, ♂! Cape Town, Harvey, ♂!».

11. *R. curviramis* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 395.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «N 57 *Restio curviramis* Kunth. En. N 23. [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 57) ... Descriptio ones sequuntur, prioris (Drège, Rest. Cap. n. 1626) ... Descriptio speciminis alterius (Drège, Rest. Cap. n. 2490)».

12. *R. echinatus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 384.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Isotypus*: «*Restio echinatus* Kunth. En. N 2 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и на образце «N 49» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n.49)».

13. *R. ferruginosus* Link ex Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 393.

Описан из Южн. Африки (Капская провинция). *Syntypus*: «*Restio ferruginosus* Link. Kunth. En. N. 20 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «1619b» (LECB!).

Syntypus: «*Restio ferruginosus* Link. Kunth. En. N 20 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и на образце «N. 1».

По протологу: «Link in herb. reg. Berol. ...Cap. b. sp. ... (Descr. juxta specimen Drègeanum n. 1619b) ... (Descr. juxta specimen floriferum a. 1816 ex horto quodam Anglicosine nomine acceptum quoad ad fructum adhinet, inservit specimen Drègeanum (Rest. Cap. n. 1.))»

14. *R. fraternus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 386.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio fraternus* Kunth. En. N. 6 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «1623» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 1623 et 45.))».

15. *R. fuirenoides* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 386.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio fuirenoides* Kunth. En. N 7 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2504» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2504.))».

16. *R. garnotianus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 392.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio garnotianus* Kunth. En. N 18 b [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2473» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Cel. Garnot legit et mecum communic. Drège, Rest. Cap. n. 1628 et n. 2473.))».

17. *R. impolitus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 404.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio impolitus* Kunth. N 34 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» и на образце «N 67» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 67.))».

18. *R. kunthii* Steud. 1855, Syn. Pl. Glum. 2: 251.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio triflorus* Rottb. Kunth En. N. 14 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «N. 69» (LECB!).

По протологу: «*R. triflorus* Kunth et Drège hrbr. n. 69. a planta synonyma Rottboellii quoad descriptionem et iconem diversa species Afr. austr.»

19. *R. miser* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 392.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio miser* Kunth. En. N. 19 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «1627» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 1627.))».

20. *R. obtusissimus* Steud., 1855, Syn. Pl. Glum. 2: 252.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «[Herb. Drège, Afr. austr.]» N. 22. *Restio obtusissimus* Steud. Martey. 94» (LECB!).

По протологу: «Hrbr. Drège nr. 22. [pl.] Afr. austr.»

21. *R. ocreatus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 385.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio ocreatus* Kunth. En. N 3 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2505» (LECB!).

По протологу: «*Cap. b. spei*. (Drège, Rest. Cap. n. 2505 et 47.)».

22. *R. oligostachyus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 399.

Isotypus: «*Restio oligostachyus* Kunth. En. N 27 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «N. 37» (LECB!).

По протологу: «*Cap. b. spei*. (Drège, Rest. Cap. n. 37.)».

23. *R. pseudoleptocarpus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 399.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio Pseudo-Leptocarpus* Kunth. En. N. 28 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «N 28» (LECB!).

По протологу: «*Leptocarpus imbricatus* Sieb. herb. Cap. n. 221 (mas.), nec. Brown. — *Cap. b. spei*. (Drège, Rest. Cap. n. 28 [mas et fem.] et Garnot [femina])».

24. *R. pseudoleptocarpus* forma *gracilior* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 399.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio Pseudo-Leucocarpus* Kunth. En. N 28. forma *gracilior* masculine, 24 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «N 82» (LECB!).

По протологу: «*Restionaceae* a Drège sub no. 82 edita est probabiliter forma *gracilior*».

25. *R. propinquus* Nees, 1830, Linnaea 5: 653. — *Elegia propinqua* (Nees) Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 473.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Elegia propinqua* N. ab E. ♂ et ♀ 56.5 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*Habitat ad C. b. sp.: in fissura rupis ad planitiem montis tabularis, altit. IV; in latere orientalis ejusdem montis prope Witteborne altit. II; et locis arenosis lapidosis III. altitudinis montis Leonis Floret Jun., Jul., Aug., Sept., Jan. Ecklon.-Vidi et in Hb. cl. Güntheri*».

26. *R. purpurascens* Nees ex Mars., 1865, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 8: 249.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio purpurascens* N. ab E. 59.5 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*R. purpurascens*, Nees, MS. in herb. Sonder. Femina tantum. Hab. C. B. S. Ex sp. s. ♂ Dr. Lind in herb. Mus. Brit. ♂ Hottentotshollandberg (Maio), Eck. et Zeyh. 59.5!».

27. *R. quinquefarius* Nees, 1830, Linnaea 5: 639.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio quinquefarius* N. ab E. 78.8 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*In plano montis tabularis; April; tum in planitie Capensi, locis arenosis; Augusto; c.f. mat. ♂, ♀ Ecklon*».

28. *R. rottboellioides* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 394.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio rottboellioides* Kunth. En. N 22 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2494» (LECB!).

По протологу: «*Cap. b. spei*. (Drège, Rest. Cap. n. 2494)».

29. *R. setiger* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 385.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio setiger* Kunth. En. N 4 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2503» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2503)».
30. *R. subfalcatus* Nees ex Mast., 1865, Journ. Soc. London (Bot.) 8: 231.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio subfalcatus* N. ab E. ♂ et ♀ 76 [Herb. Ecklon et Zeyher, Afr. austr.]» (LECB!).
По протологу: «*R. subfalcatus*, N. ab E. MS. in herb. Sonder. absque descriptione. — *R. dichotomus*, Thunb. fide Nees in herb. Sonder. sed vix. Hab. C. B. S. Ex sp. s. Olifant's River ♂ et ♀. Ecklon, 76! ♂. Drège, 75!; Eck. et Zeyh. 50!».
31. *R. tenuissimus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 394.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio tenuissimus* Kunth, N 21 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «1970» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 1625 [mas.] et n. 1970 [femin.])».
32. *R. tetrasepalus* Steud., 1855, Syn. Pl. Glum. 2: 251.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Restio tetrasepalus* Steud. N. 27 [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).
По протологу: «Hrbr. Drège nr. 27. ad *Staberoham stenopteram* a Kunthio reducta species ipso autore dubitante. Afr. austr.».
33. *R. venustulus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 388.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Restio venustulus* Kunth En. 11 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «9450» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 9450)».
34. *R. vilis* Kunth, 1841 Enum. Pl. 3: 389.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus?: «*Restio vilis* Kunth. En. N. 13. ♂? [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2476 ♂ et ♀) ... Superunt alia specimina mascula (Drège, Rest. Cap. n. 75.)».
35. *Thamnochortus aemulans* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 439.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Isotypus: «*Thamnochortus aemulans* Kunth En. N. 15 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «1652» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 1652)».
36. *T. platypteris* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 429.
Описан из Южн. Африки (Капская пров.). Syntypus: «*Thamnochortus platypteris* Kunth N. 139 [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).
Syntypus: *Thamnochortus platypteris* Kunth En. N. 1 [Herb. Drège, Afr. austr.]» и «2512» (LECB!).
По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 139 et 2512 [femina])»
T. scirpoides Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 438.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *I s o t y p u s* : «*Thamnochorus scirpoides* Kunth En. N. 14 и «2023» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2023)».

37. *T. strictus* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 438.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *S y n t y p u s* : *Thamnochorus strictus* Kunth. En. N. 13 [Herb. Drège, Afr. austr.] и «N 101» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 101. et 1642)».

38. *Willdenowia arescens* Kunth, 1841, Enum. Pl. 3: 454.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *S y n t y p u s* : «*Willdenowia arescens* Kunth, En. N 3 [Herb. Drège, Afr. austr.] и «2522» (LECB!).

По протологу: «Cap. b. spei. (Drège, Rest. Cap. n. 2522. mas et femina)».

Работа выполнена при финансировании грантом Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (проект № НШ-2198.2003.4).

Литература

- Бубырева В. А., Бялт В. В., Орлова Л. В. Коллекция Г. П. Бонгарда в Гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (LECB) // Бот. журн. 2003а. Т. 88, № 2. С. 125–133.
- Бубырева В. А., Бялт В. В., Орлова Л. В. Эдуард Эммануилович Линдеманн и его коллекция в Гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского университета (LECB) // Бот. журн. 2003б. Т. 88, № 11. С. 156–164, рис. 1–3.
- Drège J. F. Standoerter-Verzeichniss der von J. F. Drège in Südafrika gesammelten Pflanzen / Drège J. F. Zwei phlanzengeographische Documente von J. F. Drège nebst einer Einleitung von Dr. E. Meyer // Flora (Regensburg), 1846–1847. Bd 19. Besondere Beigabe Bd. 30 S.
- Drège J. F. Vergleichungen der von Ecklon und Zeycher und von Ecklon u. Zeycher von Drège gesammelten südafrikanischen Pflanzen // Linnaea. 1846–1847. Bd 19. S. 599–680.
- Index Herbariorum. Pt. I. The Herbaria of the World. 8 ed. New York, 1990. 693 p.
- Kunth C. S. Enumeratio Plantarum. Stutgardiae et Tubingiae, 1841. Vol. 3. 644 p.
- Masters M. T. Observation on the morphology and anatomy of the genus Restio Linn., together with an Enumeration of the South African species // J. Linn. Soc. London (Bot.). 1865. Vol. 8. P. 211–255, pl. xiv–xv.
- Nees von Esenbeck C. G. Beitrag zur Kenntniss der Familien der Restionaceen in Rücksicht auf Gattungen und Arten // Linnaea. 1830. Bd 5. S. 627–666.
- Steudel E. G. Synopsis Plantarum Glumacearum. Pars 2. Stuttgartiae, 1855. 348 p.

В. В. Бялт: Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2.
E-mail: byalt66@mail.ru

В. А. Бубырева: Санкт-Петербургский государственный университет
199034, С.-Петербург, Университетская набережная, 7.
E-mail: bubyreva@mail.ru