Н. Н. Цвелёв **N. Tzvelev**

ELYTRIGIA IKONNIKOVII TZVEL. (POACEAE) — НОВЫЙ ВИД ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

ELYTRIGIA IKONNIKOVII TZVEL. (POACEAE) — SPECIES NOVA EX ASIA MEDIA

В настоящей статье описывается новый для науки вид рода *Elytrigia* Desv. из Средней Азии, названный в память выдающегося исследователя гор Средней Азии и одного из его коллекторов — С. С. Иконникова, скончавшегося летом 2005 г. при трагических обстоятельствах.

Elytrigia ikonnikovii Tzvel. sp. nova. — Planta perennis, 25–40 cm alta, longe rhizomatosa. Vaginae foliorum inferiorum pilosae. Laminae foliorum canescenti-virides, 1.5–3 mm lt., saepe convolutae, supra nervis valde elevatis et scabris. Spicae 3–7 cm lg., rachide glabra, sed secundum carinas scabra. Spiculae 5–8 mm lg., 2–3-florae, glabrae. Glumae 4–7 mm lg., subaequales, acutae, carinatae, nervis 3–4. Lemmata 6–8 mm lg., acuta. Paleae carinis sat longe scabrae.

T y p u s : «Badachshan, in valle fl. Gunt, terrasa arenosa, 2900 m, 17 IX 1957, N 1562, S. Ikonnikov, G. Ladygina» (LE).

Affinitas. A specie proxima — *E. repens* (L.) Nevski laminis foliorum supra valde costatis et spiculis minoribus, a *E. lolioides* (Kar. et Kir.) Nevski glumis lemmatis subaequalibus differt.

Nomen in memoriam speciei collectoris, botanici rossici gloriosi S. S. Ikonnikovii datum est.

Многолетнее длиннокорневищное растение 25–40 см выс. Влагалища нижних листьев волосистые. Листовые пластинки сероватозеленые, 1.5–3 мм шир., часто вдоль свернутые, сверху с сильно выступающими шероховатыми жилками. Колосья 3–7 см дл., с голой, вдоль килей шероховатой осью. Колоски 5–8 мм дл., 2–3-цветковые, голые. Колосковые чешуи 4–7 мм дл., почти одинаковой длины, острые, килеватые, с 3–4 жилками. Нижние цветковые чешуи 6–8 мм дл., острые. Верхние цветковые чешуи по килям с довольно длинными шипиками.

T и п : «Бадахшан, в долине р. Гунт, песчанистая терраса, 2900 м, 17 IX 1957, N 1562, С. Иконников, Г. Ладыгина» (LE).

Родство. От наиболее близкого вида — *E. repens*, отличается листовыми пластинками сверху с сильно выступающими ребрами и

более мелкими колосками, а от *E. lolioides* — колосковыми чешуями, почти равными нижним цветковым чешуям.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2