В. В. Бялт **V. Byalt**

OXALIS SALTERIANA BYALT (OXALIDACEAE) — НОВОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ OXALIS OREOPHILA SALTER

OXALIS SALTERIANA BYALT (OXALIDACEAE) — NOMEN NOVUM PRO SPECIE OXALIS OREOPHILA SALTER

В 1944 г. Сальтер (Salter, 1944) в своей известной монографии южноафриканских кислиц (*Oxalis* L.) описал вид кислицы с вершин Pakhuis Pass в области Кланвильям, Западная Капская пров., ЮАР (Clanvilliam Div., W. Cape Prov. RSA) под названием *O. oreophila* Salter. Однако автор, по-видимому, не знал, что предложенное им название является более поздним омонимом *Oxalis oreophila* Cory (1936). Раньше это название было использовано Кори как новое название в роде *Oxalis* для *Inoxalis monticola* Small (1907), описанного из Техаса и Сев. Мексики. И, несмотря на то, что название, предложенное Кори оказалось излишним и сейчас является синонимом *O. neomexicana* Knuth (1919), название *O. oreophila* Salter должно быть заменено в соответствии со статьей 53.1 (Примечание 1) «International Code…» (Greuter et al, 2000). В связи с этим нами предлагается новое название — *Oxalis salteriana* Byalt**.**

Oxalis salteriana Byalt nom. nov. **—** *Oxalis oreophila* Salter, 1944, Journ. S. Afr. Bot., Suppl. Vol. 1 : 300, non Cory, 1936.

T y p u s : South Africa, Cape Prov.: Clanvilliam Div., summit of Pakhuis Pass, Salter n. 5397 (BOL, holo).

Species in memoriam florae Africae Australis et familiae *Oxalidaceae* investigatoris cl. T. Salter denominata est.

Название дано в память Т. М. Сальтера, который был большим знатоком флоры Южной Африки и монографом семейства *Oxalidaceae* этого региона.

Вид является эндемиком области Кланвильям, в Западной Капской пров. (ЮАР); известен только по типовому образцу. Встречается на горных склонах в верхнем поясе гор.

Литература

C o r y V. New names and combinations for Texas plants // Rhodora. 1936. Vol. 38. P. 404–408.

Greuter W. et al. International code of botanical nomenclature (Saint Louis code). Königstein, 2000. xviii, 474 p.
Knuth R. *Oxalidaceae* americanae novae // Nottizbl. Bot. Gart. Mus., Berlin, 1919. Bd 7. N 67. S. 289–318.
Salter T. M. The genus *Oxalis* in South Africa. A taxonomic revision // J. S. Afr. Bot. 1944. Suppl. l. P. 1–355.
Small J. K. *Oxalidaceae* // North American Flora. Lancaster, 1907. Vol. 25. Pt 1. P. 25–58.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: byalt66@mail.ru

А. А. Светлова **A. Svetlova**

ЛЕКТОТИПИФИКАЦИЯ LINUM HIRSUTUM L. (LINACEAE)

LECTOTYPIFICATIO SPECIEI LINUM HIRSUTUM L. (LINACEAE)

Linum hirsutum L., 1753, Sp. Pl.: 277.

Описан из Австрии и «Татарии» («Habitat in Austriae, Tatariae editis graminosis»). Lectotypus (Svetlova, hic designatus): Herb. Linn. N 396.11 (LINN, photo LE!).

Протолог *L. hirsutum* L. включает 4 элемента, составляющих первоначальный материал, на котором был основан этот вид. В качестве лектотипа мы выбираем здесь образец N 396.11 из гербария К. Линнея, снабженный пометкой автора описания этого вида (Linnaeus, l.c.) — «3 hirsutum» (цифра 3 соответствует порядковому номеру *L. hirsutum* в работе Линнея «Species Plantarum»).