А. П. Карпова **A. Karpova**

НОВЫЙ ВИД РОДА STROGANOWIA KAR. ET KIR. (CRUCIFERAE) ИЗ КАЗАХСТАНА

GENERIS STROGANOWIA KAR. ET KIR. (CRUCIFERAE) SPECIES NOVA E KAZACHSTANIA

Stroganowia kazachstanica A. Karpova sp. nova. — Planta perennis, herbacea, glauco-viridis. Caulis erectus, 60 cm alt., a medio ramosus. Folia radicalia petiolata, lamina ignota. Folia caulina anguste obovata ad lineari-lanceolata, 3–5 cm lg., 0.7–1.5 cm lt., basi solitarie pubescentia, in petiolum non alatum, 0.8–1.5 cm lg., attenuata; folia apicalia sublinearia. Inflorescentia terminalis, paniculatiformis, diffusa. Pedicelli pubescentes, 5–7 mm lg. Sepala herbacea, dimorpha, pubescentia, 1.5–2 mm lg., chlorina, post anthesin pallide rosea inconspicue albo marginata. Petala roseola, 2.6–3 mm lg., 1.4–1.6 mm lt., unguiculata. Stamina 2 mm lg.; filamenta ad basin dilatata. Anthera extrorsa, 0.8 mm lg. Pedicelli fructifer appressi, 0.8–1 cm lg. Stylus 0.5–0.8 mm lg. Siliculae ellipticae, 6.3–7.8 mm lg., 3.2–4 mm lt.; valvae convexae, insigniter uninerviae; repla elliptica, 4–4.5 mm lt. Semina elliptica, 5 mm lg., 3 mm lt. Embryo pleurorrhizus. (Vide fig.)

T y p u s : «Kazachstania australis, montes Duona-Tau, inter Seslavino et Tiulkubas, 9 VIII 1982, N 51, M. Pimenov, M. Vassiljeva, S. Daushkevich» (MW!).

Affinitas. Speciei *S. minor* Botsch. et Vved. affinis est, a qua caule erecto a medio ramoso; panicula magis diffusa; foliis glabris; pedunculis longioribus, pilis rectis pubescentibus, sepalis dimorphis chlorinis (rarius pallide roseis) inconspicue marginatis; staminibus conformibus, filamentis ad basin dilatatis differt.

Distributio. Specimine typico cognita.

Многолетнее травянистое сизо-зеленое растение 60 см выс. Стебель прямостоящий, от середины сильно ветвящийся. Прикорневые листья черешчатые, листовая пластинка неизвестна. Стеблевые листья узко-обратнояйцевидные до линейно-ланцетных, 3–5 см дл., 0.7–1.5 см шир., в основании с единичными волосками, оттянутые в небольшой, 0.8–1.5 см дл., некрылатый черешок; верхние листья почти линейные. Соцветие — верхушечная раскидистая метелка. Цветоножки опушенные, 5–7 мм дл. Чашелистики диморфные, опушенные, 1.5–2 мм дл., желто-зеленые, по отцветании бледно-розовые, со



Рис. Фотография типа *Stroganowia kazachstanica* A. Karpova

слабо заметной белопленчатой каймой. Лепестки розоватые, 2.6–3 мм дл., 1.4–1.6 мм шир., с ноготком. Тычинки 2 мм дл.; тычиночные нити к основанию расширенные; пыльники 0.8 мм дл. Столбик 0.5–0.8 мм дл.; Плодоножки прижатые, 0.8–1 см дл. Стручочки эллиптические, 6.3–7.8 мм дл., 3.2–4 мм шир.; створки выпуклые; срединная жилка выступающая; перегородки эллиптические, 4–4.5 мм шир. Семена эллиптические, 5 мм дл., 3 мм шир. Зародыш краекорешковый. (См. рисунок).

Тип: «Южный Казахстан, горы Дуона-Тау, между Сеславино и Тюлькубасом, 9 VIII 1982, N 51, М. Г. Пименов, М. Г. Васильева, С. С. Даушкевич» (MW!).

Родство. Близкородствен *S. minor* Botsch. et Vved., от которого отличается наличием прямостоящего, от середины сильно ветвящегося стебля; более раскидистыми соцветиями; голыми листьями; более длинными цветоносами, опушенными прямыми волосками; диморфными желто-зелеными (редко бледно-розовыми) чашелистиками, более узкой и менее выраженной каймой по их краю; одинаковыми по длине, расширенными к основанию тычиночными нитями.

Распространение. Известен по типовому образцу.

Выражаю благодарность А. Н. Сенникову за перевод описания нового вида на латинский язык и В. И. Дорофееву за фотографирование типового образца.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: karpova_nastia@mail.ru