И. О. Бузунова **I. Buzunova**

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ТАКСОНОВ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE, ОПИСАННЫХ ИЗ КИТАЯ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ГЕРБАРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В. Л. КОМАРОВА (LE). IIa. ПОДСЕМЕЙСТВО MALOIDEAE WEBER

SPECIMINA TYPICA TAXORUM FAMILIAE ROSACEAE E CHINA DESCRIPTORUM IN HERBARIO INSTITUTI BOTANICI NOMINE V. L. KOMAROVII (LE) CONSERVATA. IIa. SUBFAMILIA MALOIDEAE WEBER

В настоящей статье продолжается публикация сведений о типовых образцах таксонов подсемейства *Maloideae* Weber семейства *Rosaceae*, описанных с территории Китая и хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова в С.-Петербурге (LE) (Бузунова, 2005).

Типовой материал представлен, главным образом, сборами Вильсона (E. H. Wilson) и Генри (A. Henry), основная коллекция которых хранится в Америке (A) и Англии (K), что учитывалось при определении категории типового образца. Аннотированный список типовых образцов таксонов располагается в алфавитном порядке. Приводятся номенклатурная цитата, принятое в настоящее время название растения, категория типового образца, провинция Китая, полный текст гербарной этикетки и цитата из протолога.

1. *Amelanchier asiatica* Endl. ex Walp. var. *sinica* C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 736, fig. 410 i, i[1], 412 c, d. (= *A. sinica* (C. K. Schneid.) Chun, 1921 fide T. T. Yü et T. Ch. Ku, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 403).

Syntypi: Китай, Хубэй, «W. China, Changyang, V 1900, [fl.], N 513, E. H. Wilson»; Китай, Сычуань, «China, prov. Szechuan (S. Wushan), 1889, [fl.], N 5521, A. Henry (sub nom. *A. asiatica* C. Koch var. *glabra*)». — (LE).

По протологу: «...aus China: N-Schensi lg. Giralda, N 968, 4966, 5058, 5060, 6133; diese var. scheint auch in Jap. (ob nur kultiviert?) aufzutreten. Die Formen lg. Henry N 5521 aus Sztschwan und Wilson, N 515 aus W.-Hupei...».

2. *Eriobotrya henryi* Nakai, 1924, Journ. Arn. Arb. 5: 70.

Syntypus: Китай, Юньнань, «Yunnan, Szemao, 7000', [fr.], N 13018, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan, Szemao, 7000', N 13018, A. Henry».

Примечание. Выбор лектотипа этого вида осуществил Видаль (Vidal, 1965), однако, при этом он допустил ошибку, так как не выбрал конкретный экземпляр и не указал место хранения лектотипа: «Lectotypus (A, K)», что требует повторной лектотипификации таксона.

3. *E. prionophylla* Franch. (*Photinia*), 1889, Pl. Delavay.: 225, pl. 46. (= *Photinia prionophylla* (Franch.) C. K. Schneid., 1906, Feddes Repert. 3: 153).

Syntypus: Китай, Юньнань, «Yunnan, Kiao che tong supra Kiang-yn, 1888, [veg.], N 3545, Delavay» (LE).

По протологу: «Yunnan, in collibus calcareis supra Mo-so-yn (Delavay, N 1077); ad Kiao-che-tong supra Kiang -yn; fl. 30 maj 1888 (Delavay, N 3545)».

Примечание. Приведенный выше текст написан рукой В. Л. Комарова на стандартной, напечатанной типографским способом этикетке С-Петербургского Ботанического сада. Гербарный образец представляет собой фрагмент растения — один лист длиной около 7 см и является, по-видимому, фрагментом типового экземпляра, полученным В. Л. Комаровым среди прочих дублетов во время его поездки в Париж в 1906 г.

4. *Malus centralasiatica* Vassilcz., 1959, Бот. мат. (Ленинград) 19: 202, fig. p. 201.

H o l o t y p u s : Китай, Цинхай, «La Che Tze Shan Mountains, south of Sining, alt. 3350 to 3900 m, 3 VIII 1923, [fr.], N 724, R. C. Ching» (LE).

По протологу: «La-Che-Tze-Shan mountains, south of Sining, alt. 3350 to 3900 m, 3 VIII 1923, [fr.], N 724, R. C. Ching».

5. *M. setok* Vassilcz., 1959, Бот. мат. (Ленинград) 19: 199, fig. p. 201.

H o l o t y p u s : Китай, Вост. Тибет (Сикан), «Кам (Тибет), бассейн р. Меконг, рр. Бар-чю, Рэ-чю, Ному-чю, Цза-чю, Цзэ-чю, 10500–11000', 2 XI 1900, [пл.], В. Ф. Ладыгин» (LE).

По протологу: «Kam, in systemate fluminis Mekong, alt. 3150–3300 m, 2 XI 1900, fr., V. Ladygin».

6. *M. theifera* Rehder, 1915, in Sarg., Pl. Wilson. 2, 2: 283.

Syntypus: Китай, Хубэй, «Prov. Hupeh, 1889, [fr.], N 6509, A. Henry» (LE).

По протологу: «…; Western Hupeh: without precise locality, A. Henry (N 6509)».

7. *Micromeles caloneura* Stapf, 1910, Kew Bull. 1910: 192; id., 1910, in Curtis, Bot. Mag. 136: tab. 8335. (= *Sorbus caloneura* (Stapf) Rehder, 1915, in Sarg., Pl. Wilson. 2, 2: 269 fide T. T. Yü et L. T. Lu , 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 299).

Syntypus: Китай, Сычуань, «Prov. Szechuan, 1889, [fr.], N 7027, A. Henry» (LE).

По протологу: «China, Szechuan: Northern Wushan, Henry, 7027; in woods, at 2400 m. above sea-level, Wilson, 3496a».

8. *M. folgneri* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 318; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 704, fig. 386 p, q, 387 n-n^2. (= *Sorbus folgneri* (C. K. Schneid.) Rehder, 1915, in Sarg., Pl. Wilson. 2, 2: 271 fide T. T. Yü et L.T. Lu, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 306).

Syntypi: Китай, Хубэй, «Patung district, Ichang, X 1887, [fl.], N 4065, A. Henry (sub nom. *Pyrus aria* L. var.)»; «ibid., N 5024, [fr.], id.». — (LE).

По протологу: «China, Hupeh, lg. Henry N 4065 et 5024».

9. *M. keissleri* C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 701, fig. 388 c, 389 d, d^1. (= *Sorbus keissleri* (C. K. Schneid.) Rehder, 1915, in Sarg., Pl. Wilson. 2, 2: 269 fide T. T. Yü et L. T. Lu, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 305).

Syntypi: Китай, Хубэй, «C. China, Western Hupeh, V 1900, [fr.], N 593, E. H. Wilson (for J. Veitch a. Sons)»; Китай, Сычуань, «Prov. Szechuan, 1889, [fr.], N 7166, A. Henry (sub nom. *Pyrus* aff. *granulosa*)». — (LE).

По протологу: «aus Sz'tschwan, lg. Henry, N 7166 und W.-Hupei, Wilson, N 593».

10. *M. schwerinii* C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 702, fig. 388 b.

Syntypus: Китай, Сычуань, «Prov. Szechuan, [fl.], N 8957, A. Henry» (LE).

По протологу: «Das Fr.-Expl. aus S.-Shensi, lg. Giraldi, N 986, sieht den Bl.-Expl. aus Sz'tschwan, lg. Henry, N 8957 so ähnlich, das ich es unbedingt zuziehe, nur kahlen, …».

11. *Osteomeles schwerinae* C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 763, fig. 430 m, 431 o-r; id., 1906, Feddes Repert. 3: 222.

Syntypi: Китай, Юньнань, «China, Yünnan, Mengze, 5 000', [fl.], N 9315A, A. Henry»; «ibid., 4 600–5 500', [fr.], N 9315, id.». — (LE).

По протологу: «China: Yünnan, lg. Henry, N 9315, 9315A, Mengtze 15–1800 m».

12. *Photinia davidsoniae* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 185.

Syntypi: Китай, Хубэй, «Western Hupeh, V 1900, [fl.], N 462, E. H. Wilson (for J. Veitch a. Sons)»; «ibid., XI 1907, [fr.], N 484, id.»; «ibid., XII 1907, [fr.], N 685, id.». — (LE).

По протологу: «Western Hupeh: near Ichang, alt. 300–600 m, April and December 1907 (N 685, type); south-west of Ichang, alt. 300 m, November 1907 (N 484); mountains south of Ichang, May and October 1900 (Veitch Exped. Nos. 167a, 391a, 462), Wilson; Ichang and immediate neighborhood, A. Henry (Nos. 1649, 7604)».

Примечание. Как видно из протолога, в качестве типа вида указаны два гербарных образца (N 685, type), собранные в разное время (IV 1907 и XII 1907), что по Международному кодексу ботанической номенклатуры (Грёйтер и др., 2001) требует выбора лектотипа вида. На гербарном листе, хранящемся в LE, помещена рукописная пометка «Isotypus. N. T. Hiep, 1982», что противоречит кодексу.

13. *P. fortuneana* Maxim., 1873, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 19: 179. (= *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li, 1944, Journ. Arn. Arb. 25: 420 fide T. T. Yü et W. F. Chiang, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 180).

Holotypus et isotypus: Сев. Китай, «China borealis, 1845, [fl.], A.69, Fortune» (LE).

По протологу: «Hab. In China boreali (Fortune! A.69. a. 1845)».

Примечание. На гербарном листе с голотипом вида помещены оригинальные рисунки К. И. Максимовича.

14. *P. glomerata* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 190.

Syntypi (2): Китай, Юньнань, «Yunnan, Szemao forests, 4800', [fl.], N 11716, A. Henry» (LE).

Syntypus: «ibid., [fr.], N 11716a, id.» (LE).

По протологу: «Yunnan: forests around Szemao, alt. 1500–1600 m, A. Henry (Nos. 11716, flowers, 11716a, fruits)».

15. *P. lancifolia* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 191.

Isotypus: Китай, Юньнань, «China,Yunnan, near Meng-lieh, 3500', [fl.], N 12833, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan, near Meng-lieh, alt. 1100 m, A. Henry (N 12833, type); Szemao, alt. 1300 m, A. Henry (N 13412)».

16. *P. schneideriana* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 188.

Syntypi: Китай, Хубэй, «Western Hupeh, V 1907, [fl.], N 476, E. H. Wilson»; «ibid., X 1907, [fr.], N 476, id.». — (LE).

По протологу: «Western Hupeh: Changyang Hsien, woodlands, alt. 1300–1600 m, May and October 1907 (N 476, type); Chang-lo Hsien, woods, alt. 1000–1500 m, May 1907 (N 2973 in part, flowers only), Wilson».

17. *P. subumbellata* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 189.

Syntypi: Китай, Хубэй, «China, Western Hupeh, V 1907, [fl.], N 488, E. H. Wilson»; Китай, Сычуань, «China, prov. Szechuan (S. Wushan), 1889, [fl.], N 5518, A. Henry (sub nom. *P. variabilis* Hemsl.)». — (LE).

По протологу: «Western Hupeh: Changyang Hsien, alt. 1300 m, May and October 1907 (N 488, type); Hsing-shan Hsien, side of stream, alt. 1600–2000 m, October 1907 (N 398), [Wilson]; without precise locality, A. Henry (Nos. 4064, 6370, 7664). Szechuan: A. Henry (N 5518). Kiangsi: Kuling, side of streams, alt. 800–1300 m, July and August 1907 (Nos. 1664, 1673) [Wilson]».

18. *Pourthiaea parvifolia* Pritz., 1900, Engl. Jahrb. 29: 389. (= *Photinia parvifolia* (Pritz.) C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 711, fig. 392 o, o[1], 393 g).

Syntypi: Китай, Хубэй, «China, prov. Hupeh, 1889, [fl.], N 5830, A. Henry (sub nom. *Photinia variabilis* Hemsl.)»; «ibid., alt. 15–25000', VI 1900, [fl.], N 1001, E. H. Wilson (for J. Veitch a. Sons)». — (LE).

По протологу: «China: Hupei, lg. Henry N 5830 and Wilson N 1001».

19. *Pyrus betulifolia* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 27, N 161. Lectotypus (Buzunova, hoc loco): Сев. Китай, «Ch[ina] b[orealis], [fr.immat.], A. Bunge (Hb. Ledeb. mis. Bunge)» (LE).

Syntypi: Сев. Китай, «China, 1831, [fr.immat.], D[ed.] Bunge (Hb. Meyer)»; «*Pyrus betulaefolia* Bge. [fl., fr. immat.], Bunge, Enum. Pl. Chin. N 161. Acc. a. D[ed.] Bunge (Hb. Meyer)». — (LE).

По протологу: «Hab. in rivulorum margines prope Ssi-jui-ssy, Tan-schan [A. Bunge]».

Примечание. В гербарии LE хранится 3 гербарных листа с образцами *Pyrus betulifolia*, которые мы можем рассматривать как типовые. На этикетке при образце, который выбран в качестве лектотипа вида, название таксона сопровождается литерой «m» [mihi]. На втором листе имеется этикетка с надписью, сделанной рукой Бунге (China 1831), весь остальной текст, включая название таксона, подписан рукой Мейера. На третьем листе черновая этикетка не сохранена, весь текст подписан рукой Мейера, однако, нет сомнений в том, что это часть того же сбора: одна ветвь в стадии начала плодо-

ношения, как и у двух предыдущих образцов; вторая в стадии цветения.

20. *P. discolor* Maxim., 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9, 1: 103. (= *Sorbus discolor* (Maxim.) Maxim., 1873, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 19: 173 fide T. T. Yü et L. T. Lu, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 322).

H o l o t y p u s : Сев. Китай, «China bor[ealis], [Peking, 1843, veg., Kirilow] (Hb. Fischer)» (LE).

По протологу: «...e China borealis».

Примечание. Текст на гербарной этикетке «Peking, 1843, Kirilow» написан рукой В. И. Грубова.

21. *P. kansuensis* Batalin, 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13, 1: 94. (= *Malus kansuensis* (Batalin) C. K. Schneid., 1906, Feddes Repert. 3: 178; id., 1912, Ill. Handb. Laubholzk. 2: 1001 fide T. T. Yü et T. Ch. Ku, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 389).

L e c t o t y p u s (Buzunova, hoc loco; «typus» fide V. I. Grubov, II 1960, in sched.): Китай, Сычуань, «China borealis, prov. Szetschuan septentrionali, vallis fl. Honton, inter Ksernzo et Tsin-yüan, 12 VIII 1885, [fr.], Potanin» (LE).

Syntypus: Китай, Хубэй, «Prov. Hupeh, 1889, [fr.], N 6754, A. Henry» (LE).

По протологу: «China borealis, prov. Szetschuan septentrionali, in valle fl. Honton inter Ksernzo et Tsin-yüan, 12 aug. fructif. (Potanin). Hupeh, N 6754A (Aug. Henry) fructif.».

22. *P. transitoria* Batalin, 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13, 1: 95. (= *Malus transitoria* (Batalin) C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 726 fide T. T. Yü et T. Ch. Ku, 1974, in Fl. Reip. Pop. Sin. 36: 393).

L e c t o t y p u s (Buzunova, 2000): Китай, Цинхай, «China occidentalis. Terra Tangutorum (prov. Kansu). Jugum S. a fl. Tetung in sylvis frondosis et abruptis regionis inferioris humosis parce, 16/28 V 1873, [fl.], N 55, N. M. Przewalski» (LE).

Syntypi: Китай, Цинхай, «China occidentalis. Terra Tangutorum (prov. Kansu). Latus N. jugi S. a fl. Tetung parce ad latera aperta v. parce arboribus tecta, 20 VIII / 1 IX 1872, [fr.], N 414, N. M. Przewalski»; «ibid., ad ripa fl. Tetung parce, 27 VII / 8 VIII 1880, [fr.], N754, id.»; Китай, Ганьсу, «China borealis, prov. Kansu, ad fl. Tao-ho, 28 V 1885, [fl.], G. N. Potanin»; «ibid., circa monasterium Dshoni, 31 V 1885, [fl.], id.». — (LE).

По протологу: «China borealis, prov. Kansu orientale; jugum S. a fl. Tetung in sylvis frondosis et abruptis regionis inferioris humosis parce, (16)28 mai 1873 flor. et 20 aug. (1 sept.) 1872 fructif., ad ripa fl. Tetung parce 27 jul. (8 aug.) 1880

(Przewalski); ad fl. Tao-ho 28 mai 1885 flor., circa monasterium Dshoni 31 mai 1885, flor. (Potanin)».

23. *P. wilhelmii* C. K. Schneid., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 665, fig. 363 n, 364 v; id., 1906, Feddes Repert. 3: 120.

I s o t y p u s : Китай, Юньнань, «China, Yunnan, Mengtze, 5500', [fl.], N 10035A, A. Henry» (LE).

По протологу: «...aus Yunnan (Henry N 10035A), Gebirgswälder 1800 m».

24. *Sorbus aestivalis* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 469.

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «Western Szechuan, VII 1908, [fl.], N 3002, E. H. Wilson» (LE).

По протологу: «Western Szechuan: Wa-shan, alt. 2300–3200 m, July 1908 (N 3002), Wilson».

25. *S. expansa* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 457.

Syntypus: Китай, Хубэй, «Western Hupeh, V 1907, [fl.], N 406, E. H. Wilson» (LE).

По протологу: «Western Hupeh: north and south of Ichang, woods, alt. 1300–2300 m, May and October 1907 (N 406), Wilson».

26. *S. foliolosa* (Wall.) Spach var. *pluripinnata* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 315; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 680, fig. 374 e, e[1]. (=*S. pluripinnata* (C. K. Schneid.) Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 481).

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «China, prov. Szechuan, 1889, [fr.], N 8960, A. Henry» (LE).

По протологу: «China, Sz'tschwan, lg. Henry, N 8960».

27. *S. glomerulata* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 470.

Syntypi: Китай, Хубэй, «Western Hupeh, VI 1907, [fl.], N 3001, E. H. Wilson»; «ibid., VII 1907, [fr.], N 3001, id.». — (LE).

По протологу: «Western Hupeh: Changyang Hsien, woodlands, alt. 1600–2300 m, June and July 1907 (N 3001), Wilson».

28. *S. helenae* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 462.

Syntypus: Китай, Сычуань, «Western Szechuan, VI 1908, [fl.], N 3010, E. H. Wilson» (LE).

По протологу: «Western Szechuan: Mupin, woodlands, alt. 2600–3000 m, June 1908 (N 3010), Wilson».

Примечание. Вид опубликован без указания на место сбора гербарного образца по которому описан новый таксон. Однако ниже

автор приводит описание двух форм: *S. helenae* f. *subglabra* Koehne и *S. helenae* f. *rufidula* Koehne, из которых вторая форма представлена в LE гербарным образцом, соответствующим протологу, и может быть обозначена как синтип вида.

29. *S. hupehensis* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 316; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 680, fig. 374 r, 375 n, n[1].

I s o t y p u s : Китай, Хубэй, «C. China, Western Hupeh, VI 1901, [fl.], N 2082, E. H. Wilson (for J. Veitch a. Sons)» (LE).

По протологу: «China: W. Hupeh: lg. Wilson n. 2082, Juni 1901 (Type in Herb. Berlin)».

30. *S. koehneana* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 316; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 681, fig. 374 o.

Syntypus: Китай, Хубэй, «China, prov. Hupeh, 1889, [fr.], N 6766, A.Henry (sub nom. *Pyrus aucuparia* L. var., *P. foliolosa* Wall.?)» (LE).

По протологу: «Hupeh: lg. Henry n.6766; ob auch N.-Shensi: lg. Giraldi n. 1086?».

31. *S. laxiflora* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 466.

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «Western Szechuan, VII 1908, [fr. immat.], N 3008, E. H. Wilson» (LE).

По протологу: «Western Szechuan: Ta-pao-shan, north-east of Tachien-lu, alt. 3000–3800 m, July 4, 1908 (N 3008), Wilson».

32. *S. unguiculata* Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 474.

Syntypi: Китай, Сычуань, «Western Szechuan, VI 1908, [fl.], N 864, E. H. Wilson»; «ibid., X 1908, [fr.], N 864, id.». — (LE).

По протологу: «Western Szechuan: …; Mupin, woodlands, alt. 2000–2800 m, June and October 1908 (N 864, flowering branches; the fruiting branches belong partly here, partly to *S. multijuga microdonta* Koehne), Wilson».

33. *S. vilmorinii* C. K. Schneid. var. *setschwanensis* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 318. (= *S. setschwanensis* (C. K. Schneid.) Koehne, 1913, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 3: 475).

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «China, Western Szechuan, VI 1908, [fl.], N 3007, E. H. Wilson» (LE).

По протологу: «Western Szechuan, Niu-tou-shan, west of Kuan Hsien, woodlands, alt. 2600–3000 m, June 30, 1908 (N 3007, type); Ching-che Hsien, woodlands, alt. 2800 m, September 15, 1908 (N 874); Wa-shan, woodlands, alt. 2300–3000 m, October 1908 (N 864 b) E. H. Wilson; without locality, 1890, A. Henry (N 8975)».

34. *S. wilsoniana* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 312; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 671, fig. 367 k; 368 p, q.

I s o t y p u s : Китай, Хубэй, «C. China, Western Hupeh, VI 1900, [fl.], N 985, E. H. Wilson (for J. Veitch a. Sons)» (LE).

По протологу: «aus W.-Hupei, Patung, lg. Wilson n. 985».

35. *S. xanthoneura* Rehder, 1915, in Sarg., Pl. Wilson. 2, 2: 272.

Syntypus (?): Китай, Хубэй, «Prov. Hupeh, 1889, [fr.], N 6830A, A. Henry (sub nom. *Pyrus aria* L. var?)» (LE).

По протологу: «Hupeh: without precise locality, A. Henry (N 6830)».

Примечание. Номер гербарного образца в протологе указан без литеры «А». Можно предположить, что образец собран с того же растения, но в другой фенологической фазе, однако, в настоящий момент достоверно определить категорию типового образца не представляется возможным.

36. *S. zahlbruckneri* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 6, 4: 318; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 685.

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «China, prov. Szechuan (N. Wushan), 1889, [fr.], N 7021, A. Henry (sub nom. *Pyrus alnifolia*?)» (LE).

По протологу: «China, Szetschwan, lg. Henry N 7021».

37. *Stranvaesia amphidoxa* C. K. Schneid., 1906, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 6, 4: 319; id., 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 713, fig. 394 k, l. — *Photinia amphidoxa* (C. K. Schneid.) Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 190.

I s o t y p u s : Китай, Сычуань, «China, prov. Szechuan (S. Wushan), 1889, [fl.], N 5565, A. Henry (sub nom. *Photinia variabilis* Hemsl.)» (LE).

По протологу: «China, Sz'tschwan, lg. Henry, N 5565».

38. *S. nussica* (D. Don) Decne. var. *oblanceolata* Rehder et E. H. Wilson, 1912, in Sarg., Pl. Wilson. 1, 2: 193. (= *S. oblanceolata* (Rehder et E. H. Wilson) Stapf, 1924, in Curtis, Bot. Mag. 149: tab. 9008).

Syntypus: Китай, Юньнань, «China, Yunnan, Szemao, forests, 5000', [fl.], N 11615, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: forests around Szemao, alt. 1500–1600 m, A. Henry (N 11615, 11615a, 11615b, 11615e, 11615f)».

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 06-04-48299а).

Литература

Бузунова И. О. Сем. *Rosaceae* Juss. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). СПб., 2000. С. 201–210.

Бузунова И. О. Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae,* описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). II. Подсемейство *Maloideae* Weber // Новости систематики высших растений. СПб., 2005. Т. 37. С. 200–207.

Грёйтер В. и др. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Сент-Луисский кодекс), принятый Шестнадцатым Международным ботаническим конгрессом, Сент-Луис, Миссури, июль–август 1999 г. / Пер. с англ. Т. В. Егоровой. СПб., 2001. 210 с.

Vidal J. E. Notes sur quelques Rosacees Asiatiques (III). Revision du genre *Eriobotrya* (*Pomoideae*) // Adansonia. 1965. Vol. 5. Fasc. 4. P. 537–580.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: buzunova2004@mail.ru