М. А. Михайлова **M. Mikhailova**

НОВЫЙ ВИД РОДА CORYDALIS DC. (FUMARIACEAE) ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

NEW SPECIES OF THE GENUS CORYDALIS DC. (FUMARIACEAE) FROM KYRGYZSTAN

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Гербарий высших растений
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2
mem_spb@mail.ru

Из Кыргызстана описан новый вид *Corydalis kovakensis* Mikhailova. Показаны его отличия от близких видов *C. schelesnowiana* Regel et Schmalh. и *C. bosbutooensis* Lazkov.

К л ю ч е в ы е с л о в а: новый вид, *Fumariaceae*, Кыргызстан.

Corydalis kovakensis Mikhailova sp. nova. — Planta herbacea perennis (10)20–40(50) cm alt. caudice et radice palari. Caudices residues fuscis petiolorum emortuorum vestiti. Caules imprimis basi angulati. Folia ternata vel biternata, segmentis integerrimis vel lobulatis, petiolis 2–4.5 cm lg. Inflorescentia simplex racemosa, 10–17 cm lg. Bracteae cordatae, late ellipticae, apice vix mucronulatae, superia 1.5–2 mm lg., 1–1.5 mm lt., basalia 3–4 mm lg., 3.5–4 mm lt., herbaceae. Pedicelli 7–15 mm lg. Sepala irregulariter triangulata apice attenuata, 1–1.5 mm lg., paleacea. Corolla flava, 13–15 mm lg., ad pedicellum 2 mm lt.; calcari 3–4 mm lg., nectario calcari ad 2–2.5 mm breviore differt. Capsulae oblongo-lineares, (13)14–17(18) mm lg., 2.5–3 mm lt. Semina reniformia, 1.5–1.8 mm lg., 0.8–1 mm lt., nigra, nitida, excrescentia, instructa caruncula affixa. — Fig.

H o l o t y p u s: «Kyrgyzstan, prov. Dzhalalabad, fl. Naryn, in adjacentibus pagi Casarman, in clivis conglomeratis secundum flumen, 1300 m s. m., 7 VII 2008, A. V. Soczivco» (LE).

A f f i n i t a s. A *C. schelesnowiana* Regel et Schmalh. pedicellis longioribus, 7–15 mm lg. (nec 1.5–3(5) mm lg., non ultra 7 mm lg.) differt; a *C. bosbutooensis* Lazkov — bracteis cordatis, late ellipticis, apice vix mucronulatis, herbaceis (nec non triangulatis, interdum apice valde attenuatis, scariosis).

A r e a g e o g r a p h i c a. Kyrgyzstan, massivum montium Moldo-Too.

Травянистый многолетник (10)20–40(50) см выс., с каудексом и стержневым корнем. Каудекс покрыт буровато-серыми основаниями отмерших черешков. Стебли, особенно в основании, гранистые. Ли-




Рис. *Corydalis kovakensis* Mikhailova (Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., р. Нарын, в окрестностях пос. Казарман, на конгломератовых склонах вдоль реки, 1300 м над ур. м., 7 VII 2008, А. В. Сочивко).

стья тройчатые или дважды тройчатые, с цельнокрайными или лопастными сегментами, с черешками 2–4.5(5) см дл. Соцветие простое, кистевидное, 10–17 см дл. Прицветники сердцевидные, широкоэллиптические с остроконечием на верхушке, верхние 1.5–2 мм дл., 1–1.5 мм шир., нижние 3–4 мм дл., 3.5–4 мм шир., травянистые. Цветоножки 7–15 см дл. Чашелистики неправильно треугольные с оттянутой верхушкой, 1–1.5 мм дл., пленчатые. Венчик желтый, 13–15 мм дл., в месте прикрепления цветоножки 2 мм шир.; шпорец 3–4 мм дл., нектарник не доходит до конца шпорца на 2–2.5 мм. Коробочки продолговато-линейные, (13)14–17(18) мм дл., 2.5–3 мм шир. Семена почковидные, 1.5–1.8 мм дл., 0.8–1 мм шир., черные, блестящие, с наклонным выростом, к которому прикрепляется карункула. — Рис.

Г о л о т и п: «Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., р. Нарын, в окрестностях пос. Казарман, на конгломератовых склонах вдоль реки, 1300 м над ур. м., 7 VII 2008, А. В. Сочивко» (LE).

П а р а т и п ы (paratypi): Киргизия, Тянь-Шаньская обл., уроч. Ковак, ущ. Сары-Булун, юго-вост. каменистый склон, 24 VIII 1953, Л. И. Попова; Тогуз-Тороузский р-н, предгорья, юж. склон Ковак-Тоо, лев. берег р. Табылгыты, каменисто-щебнистый обрыв, сев.-зап. эксп., 22 VIII 1957, Р. А. Айдарова,

А. У. Убукеева; Центральный Тянь-Шань, р. Кокомерен, киш. Орток, 18 VIII 1966 [без указ. колл.]. — LE.

Р о д с т в о. От *C. schelesnowiana* Regel et Schmalh. отличается цветоножками 7–15 мм дл., (а не 1.5–3, редко 5, но не более 7 мм дл.); от *C. bosbutooensis* Lazkov — сердцевидными или широкоэллиптическими с остроконечием на верхушке, травянистыми прицветниками (а не пленчатыми треугольными с оттянутой верхушкой).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кыргызстан, массив Молдо-Тоо.

Литература

М и х а й л о в а М. А. Критический обзор подсекции *Strictae* (Fedde) Fedde рода *Corydalis* Vent. (*Fumariaceae*) // Новости систематики высших растений. Т. 18. Л., 1981. С. 191–196. — М и х а й л о в а М. А. О некоторых среднеазиатских видах рода *Corydalis* Vent. (*Fumariaceae*) // Новости систематики высших растений. Т. 19. Л., 1982. С. 81–98.

Summary

A new species *Corydalis kovakensis* Mikhailova is described from Kyrgyzstan. Its distinctions from related species *C. schelesnowiana* Regel et Schmalh. and *C. bosbutooensis* Lazkov are specified.

K e y w o r d s: new species, *Fumariaceae*, Kyrgyzstan.