ОБЗОР ВИДОВ СЕКЦИИ *ROSULATAE* KRESTOVSK. РОДА *STACHYS* L. (*LAMIACEAE*)

Т. В. Крестовская

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Гербарий высших растений
ул. Профессора Попова, 2, Санкт-Петербург, 197376, Россия
tatyana.krestovskaya@binran.ru, stachys@mail.ru

Статья посвящена обзору видов секции *Rosulatae* Krestovsk. рода *Stachys* L., включающей 3 вида, распространенных на территории Западной Азии. Предложен ключ для определения видов, приведены сведения о типовом материале, осуществлен выбор лектотипа для *Stachys inanis* Hausskn. et Bornm., уточнены данные об экологии и географическом распространении видов.

К л ю ч е в ы е с л о в а : *Stachys*, секция *Rosulatae*, систематика.

Эта статья является частью таксономического обзора рода *Stachys* L. для территории Евразии. Она посвящена обзору видов секции *Rosulatae* Krestovsk., в состав которой входят 3 вида: *S. inanis* Hausskn. et Bornm., *S. munzurdagensis* Bhattacharjee и *S. diversifolia* Boiss. Поскольку R. Bhattacharjee (1980) описала этот таксон в ранге подсекции, но не обозначила тип его названия, нами (Krestovskaya, 2014) название секции было действительно обнародовано, но не были приведены сведения о ее представителях.

Виды секции имеют небольшие ареалы, расположенные на территории Турции (Восточная и Южная Анатолия) и Западной Сирии. *S. inanis* (эндемик района Оваджик провинции Тунджели) и *S. munzurdagensis* (эндемик провинции Эрзинджан) включены в список редких видов IUCN — «Red List of threatened plants» (Walter, Jillett, 1998). Эти виды преимущественно произрастают на известняках, на высоте 1500–1800 м над ур. м., в климате с сухим и жарким летом и холодной зимой. *S. diversifolia* произрастает на меньших высотах (200–1500 м над ур. м.), в условиях более мягкого зимнего климата, в разреженных сосновых, а также буковых и дубовых лесах. Виды секции имеют достаточно своеобразный облик, характеризующийся мало- и мелкооблиственными стеблями, прикорневой розеткой листьев, малоцветковыми «мутовками» (у *S. diversifolia* редуцированными на одной из сторон соцветия). По этому признаку *S. diversifolia* сближается с видами секции *Distantes* (Bhattacharjee) Krestovsk.

Stachys L. sect. ***Rosulatae*** Krestovsk. 2014, Новости сист. высш. раст. 45: 92. — *Stachys* L. subsect. *Rosulatae* Bhattacharjee, 1980, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 38, 1: 87, nom. inval., sine typo.

Многолетние травы, одревесневающие в основании, с прикорневой розеткой листьев, преимущественно голые или коротко прижато опушенные. Нижние стеблевые листья яйцевидные или эллиптические, с сердцевидным или клиновидным основанием. Прицветники малочисленные, незаметные, щетинистые, реже травянистые, иногда заостренные.

Typus: *S. diversifolia* Boiss. (Krestovskaya, 2014).

3 вида. Распространение: Зап. Азия (Турция, Сирия).

Ключ для определения видов секции *Rosulatae*

1. Ложные мутовки 1–2-цветковые ..... 2.
+ Ложные мутовки 4–6-цветковые ..... 2. *S. munzurdagensis*.
2. Соцветие однобокое; прицветники удлиненно-ланцетовидные, 2–4 мм дл., с выраженным остроконечием ..... 3. *S. diversifolia*.
+ Соцветие не однобокое; прицветники отсутствуют ..... 1. *S. inanis*.

1. ***S. inanis*** Hausskn. et Bornm. 1925, Feddes Repert. 22: 188; Bhattacharjee, 1982, in P. H. Davis, Fl. Turkey, 7: 250.

Описан из Турции (Эрзинджан). Lectotypus (Krestovskaya, hic designatus): «Mesopotamia: Egin, Pasch-Tasch Gebirge, 26 VI 1889, № 948, Sintenis» (JE 00002238 photo!, isolectotypi: E!, LE!, S!, W!); syntypus «Egin, Salachlu, in collibus nudis, 25 VI 1890, № 2756, Sintenis» (JE 00002236 photo!).

На известняковых осыпях и в степях, на высоте 1500–1600 м над ур. м. — Турция (Вост. Анатолия: провинция Эрзинджан).

2. ***S. munzurdagensis*** Bhattacharjee, 1974, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33: 290; ead. 1982, in P. H. Davis, Fl. Turkey, 7: 250.

Описан из Турции. Holotypus: «Munzur Da, above Ovacik, on limestone screes, 1800 m, 16 VII 1957, D. 31164, P. H. Davis, I. Hedge» (E!, isotypi: BM!, K!, LE!, W!).

На известняковых осыпях, на высоте 1800 м над ур. м. — Турция (Вост. Анатолия: провинция Тунджели).

Вид известен только по сборам из locus classicus.

3. ***S. diversifolia*** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 12: 80; id. 1879, Fl. Orient. 4: 733; Mouterde, 1979, Nouv. Fl. Liban Syrie, 3, 2: 150; Bhattacharjee, 1982, in P. H. Davis, Fl. Turkey, 7: 251.

Описан из Зап. Сирии. Lectotypus (Bhattacharjee, 1982: 251, «holotypus») «[Latakia] in dumosis regionis montanae in via inter Latakieh et Aleppum loco 6–7 meucis (24–28 km) a priori distanti, VI 1846, Boissier» (G, isolectotypi: LE!, P 00743630!, P 00743631).

На каменистой почве, по берегам рек, в лесах из *Pinus*, *Fagus* и *Quercus*, на высоте 200–1500 м над ур. м. — Турция (Хатай), Зап. Сирия (Сев. Латакия).

Specimina examinata nonnulla: Турция: «Syria borealis, montes Amanus, 800–3000′, № 4671, IX 1913, M. Haradjian» (W); «Syria, mts. Amanus (near Jebel Musa), 2 VII 1931, Eig a. Zohary», «Syria, env. of Soukluk (near Alexandretta), devasted forest of *Pinus halepense*, 800–850 m, 9 VIII 1931, iid.» (HUJ); «Turkey, Hatay: Valley above Yesilkent, 305 m, river bank, below rocks, № 590, 11 VIII 1969, J. Darrah» (E); «Turkey, Adana, 7 km s Yarpuz, offener Laubmischwald, 1550 m, 13 VII 1978, Fr. Sorger» (W).

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания согласно плану НИР Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (тема № 01201160361 — «Флора внетропической Евразии»).

Литература

Krestovskaya T. 2014. To the systematics of the genus *Stachys* L. (*Lamiaceae*) // Novosti sist. vyssh. rast. Vol. 45. P. 91–95 [In Russian with English abstract] (Крестовская Т. В. 2014. К систематике рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*) // Новости систематики высших растений. Т. 45. С. 91–95).

Bhattacharjee R. 1980. Taxonomic studies in *Stachys* II // Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh. Vol. 38, № 1. P. 65–96.

Walter K. S., Gillett H. J. (eds.) 1998. 1997 IUCN Red List of threatened plants compiled by the World Conservation Monitoring Centre / IUCN — The World Conservation Union. Gland, Switzerland; Cambridge, UK. 862 p.

THE REVIEW OF SPECIES OF THE *STACHYS* L. SECTION *ROSULATAE* KRESTOVSK. (*LAMIACEAE*)

T. V. Krestovskaya

Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences
Professora Popova Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia
tatyana.krestovskaya@binran.ru, stachys@mail.ru

A review of the genus *Stachys* L. section *Rosulatae* Krestovsk. is given. The key for the species determination is made. The section is represented by 3 species. The data on the species ecology, geographical distribution and types are given: *S. inanis* Hausskn. et Bornm. and *S. munzurdagensis* Bhattacharjee are endemics of Turkey (Eastern Anatolia), *S. diversifolia* Boiss. is endemic of Southern Anatolia and West Syria. Lectotype of the name *S. inanis* is designated.

K e y w o r d s : *Stachys*, section *Rosulatae*, taxonomy.