Streptopus amplexifolius (L.) Dc. — Rokytnice: Studená Hora a Hleďsebe: Paseky: řídce v bukovém lese.

Thalictrum aquilegiifolium L. — U cesty ze Studené hory k Hleďsebe; v lesích u Harrachova.

Tragopogon pratensis L. — Rokytnice: dosti hojně na louce u lesa poblíž chaty Na Stráži; jinak v okolí Rokytnice a jinde roztroušen, ale nad 600 m n. m. jsem ho neviděl.

Trientalis europea L. — Roztroušeně při lesních cestách u Hleďsebe pod Janovým vrchem nad Rokytnicí (asi 900 m n. m.); rovněž u Hufského vodopádu při cestě na Dvorečky

Trifolium aureum Poll. — Na mezích a okrajích cest v okolí Rokytnice a Jablonce roztroušeno, velmi řídce při silnici u Sklenařic. Čelakovský v Prodromu uvádí: „. . . . v Krkonoších však ode mne a Knafa ml. neshledán."

Triforium spadiceum L. — Velmi roztroušeno na lukách u Rokytnice a jinde.

Triticum aestivum L. s. s. — Na různých místech v okolí Rokytnice celkem nečetně zplanělé. V okolí není pěstováno.

Turritis glabra L. — Roztroušeně u Jablonce podél silnice k Rokytnici.

Vicia sativa L. ssp. *obovata* (Ser.) Gaud. — Nehojně v polích u Hleďsebe a na rumišti v Rokytnici zplanělá.

Vinca minor L. — Rokytnice: ve vlhkém smrkovém lese pod Studenou horou a pod vrchem Stráž (asi 500 m n. m.).

Adresa autora: E. Güttler, Praha 2, Svobodova 11.

Pinus peuce Griseb. vysázená v Krušných horách

Při mapování krušnohorských rašelinišť v r. 1959 jsem našel na několika místech *Pinus peuce* a to jak na rašeliništích, tak i na minerální půdě. Na jihovýchodním okraji rašeliniště „Schwarzenteich" 2 km východně od Horní Blatné je větší porost jedinců, z nichž část je vysázena na rašeliništi, část na minerálním substrátu. Nekteří jedinci mají normální sloupcovitě kuželovitý vzrůst, někteří klečovitý. Stáří tohoto porostu je asi 15 let.

Druhým místem je rozlehlé rašeliniště za rybníkem dnes zvaným Mrtvý rybník (v německé liteatuře Bärischerteich, nebo Mauriciteich). Jedna skupina je vysázena na rašelině asi 1 m mocné v okolí kóty 1034 m — asi 800 m svv. od rybníku, druhá skupina na okraji rašeliniště při silnici Jáchymov—Myslivny pod Špičákem asi 600 m západně od kóty 1116. V obou skupinách pouze ve sloupcovitě kuželovitém vzrůstu. Stáří porostu asi 15—20 let.

Třetí naleziště je na Klínovci ve výši asi 1220 m při silnici. Tyto exempláře jsou nižšího vzrůstu, což je patrně způsobeno drsnými klimatickými podmínkami na západním návětrném svahu Klínovce.

Borovice rumunská byla v Krušných horách pravděpodobně vysázena pokusně za okupace.

Z. Dohnal

Sambucus ebulus L. na Džbáně

V Příspěvku ke květeně Blatenska a přilehlých území — II (Preslia 33 : 154—196) uvádějí autoři výskyt *Sambucus ebulus* L. na Blatensku a souhrnně v celých Čechách a připojují bodovou mapu rozšíření v Čechách. Autoři popisují nápadnou absenci v některých pahorkatinách, která z hlediska klimatologie, geologického podkladu a geomorfologie není ještě vysvětlena. Jako území, kde *Sambucus ebulus* chybí, je uváděn také Džbán.

Pro upřesnění považuji za nutné upozornit na nález *Sambucus ebulus* L. v severovýchodní části Džbánu, který tak opravuje a doplňuje názor citovaných autorů.

Sambucus ebulus tu roste uprostřed lesů, při silnici vedoucí z Milého a Boru na hlavní silnici ve směru Řevníčov—Hříškov. Jde o malou lokalitu (2 × 1 m) v nadmořské výšce 460 m, asi 100 m od hraniční tabule středočeského a severočeského kraje. Napočítal jsem zde 20 exemplářů, které se nacházejí na zarostlém okraji silnice u příkopu, na okraji mladé borovinv s přimíšeným modřínem a dubem. Půda je mělká, šedobílá, písčitokamenitá (opuka), pH 6,4. V blízkosti roste hojná *Genista germanica* a *Calluna vulgaris*. *Sambucus ebulus* tu kvete a je plodný a proto lze předpokládat, že se objeví na Džbáně i jinde, protože jej tu ptáci roznesou. Dokladový exemplář mám uložen ve svém herbáři.

I když jde o velmi malou lokalitu *Sambucus ebulus*, je tento nález na Džbáně vzácný a první. Vzhledem k tomu, že se nachází při komunikaci, jde zřejmě o nález druhotný. Je však pravděpodobné, že v rozlehlém Džbáně se najdou ještě další lokality.

J. Houda