Flora der Nebroden.

Von
Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

III. Subclasse. Dialypetalae Endl.

XVI. (XXI.) Ordnung. Umbelliflorae.

LXXII. Fam. Umbelliferae Jss.

Sanicula europaea L. sp. pl. 339, Guss. * Pr., * Syn. et * Herb.!, Bert. Fl. It. (Sic.), Gr. G. I 757, Rchb. D. Fl. Tfl. 6 I!, W. Lge. III 4.

In schattigen Hainen der Waldregion (600—1400 m.) nicht häufig: Bosco di Castelbuono (Herb. Guss.!), S. Guglielmo (Mina in Guss. Syn. Add. et H. Mina!), Piano delle Castagne, Fiumara (H. Mina!), am Passo della Botte! Mai, Juni ♃.

Eryngium campestre L. sp. pl. 337, Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G. I 756, Rchb. D. Fl. Tfl. 11!, W. Lge. III 11.

Auf lehmigen Feldern und Rainen, wüsten Stellen, in Oelgärten, vom Meere bis 1400 m. sehr gemein: Ueberall um Castelbuono und hoch hinauf (Herb. Mina!), am Fiume grande, um Cefalù, Finale, Dula, Liccia, Pedagni, Isnello, Geraci, Polizzi, zu Ferro soprano! Juli—September ♃.

\+ *E. dilatatum* Lam. Presl fl. sic., Guss. * Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), W. Lge. III 12, *mutifidum* Guss. Prodr., non Sibth.

Auf trockenen Hügeln und an Bergorten: Um Polizzi und Mandarini (Mina in Guss. Syn. Add.); im Herb. Mina sah ich es nur von Palermo. August—October ♃.

E. triquetrum Vhl. Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et * Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.). NB. Ueber *trig.*, *dich.* u. *tric.* vide Strobl Fl. d. Etna.

Auf Feldern, Brachen, Rainen und lehmigen Hügeln bis 1500 m. sehr verbreitet: Um Roccella (Herb. Guss.!), Polizzi, Petralia, Mandarini (Herb. Mina!), von Polizzi bis zum Salto

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0528-2

della Botte sehr gemein, ebenso auf Ferro soprano, um Gangi! Mai—Juli ♃.

Er. dichotomum Dsf. fl. atl. Tfl. 55!, Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et * Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), W. Lge. II 11.

Auf Rainen, lehmigen Hügeln und Feldern vom Meere bis 900 m.: Um Roccella (Herb. Guss.!), häufig am Fusse von Polizzi! Mai—Juli ♃.

Er. tricuspidatum L. sp. pl. 337, Biv. cent. I, Presl fl. sic., Guss. Pr. Syn., et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), W. Lge. III 8.

Auf dürren, steinigen Feldern, Rainen und Bergabhängen, in Olivengärten vom Meere bis 1200 m. höchst gemein, z. B. um Cefalù, Finale, Castelbuono, Isnello, am M. Elia, Wege nach Dula, Geraci, von Polizzi zu den Favare di Petralia! Juni—September ♃.

Er. maritimum L. sp. pl. 337, Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G. I. 757, Rchb. D. Fl. Tfl. 8!, W. Lge. III 9.

Am Meerstrande um ganz Sizilien, auch längs der Nebrodenküste: Besonders am Ausflusse des Fiume grande, seltener um Cefalù! Juli, August ♃.

+ *Er. Barrelieri* Boiss. Gr. G. I 753, *pusillum* L. sp. pl. 337 p. p., Dsf., Tenore, Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Todaro fl. sic. exs. No. 1231! *Pusillum* L. umfasst 2 Arten, das *tenue* Lam. mit vierspitzigen, kurzen Bracteen und *Barrelieri* Boiss. mit ganzrandigen Bracteen von der Länge der Hüllblätter; letztere findet sich auf lehmig kalkigen, feuchten Wiesen Siziliens an verschiedenen Stellen, wurde aber in den Nebroden noch nicht gefunden. Mai, Juni 2-jr.

Echinophora spinosa L. 344, Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G. I 748, DC. Pr. IV 234, Rchb. D. Fl. Tfl. 190!, W. Lge. III 14! Variirt in Sizilien: *α. glabrescens*, ziemlich kahl, *β. pubescens* Guss. Pr., DC. Pr. Stengel flaumig, Blätter rauh, Doldenstrahlen flaumig rauhhaarig.

Am sandigen Meerstrande ganz Siziliens, auch im Gebiete: var. *α.* am Ausflusse des Fiume grande! Juni—October ♃.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0529-0

Apium graveolens L. sp. pl. 379, Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), Gr. G. I 739, Rchb. D. Fl. 13 II!, W. Lge. III 93. *A. graveolens* L. *α. sylvestre* Presl fl. sic.

In Gräben, an Bächen, Wasserleitungen und feuchten Stellen (ganz Siziliens, sowie speziell) der Nebroden ziemlich häufig: Um Petralia (Herb. Mina!), Dula, Isnello, besonders aber in den Nusspflanzungen etc. um Polizzi! Juni—September 2-jr., 0—800 m.

Sium angustifolium L. sp. pl. 1672, Guss. * Pr., * Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), W. Lge. III 95, *Berula angustifolia* Kch. Gr. G. I 726, Rchb. D. Fl. Tfl. 37!

In Bächen und Gräben der Tiefregion nicht häufig: Um Caltavuturo (Guss. Pr. et Syn.), gegen Finale!, Madonie (Herb. Mina!). Mai, Juni ♃.

S. stoloniferum Guss. * Suppl., * Syn. et * Herb.!, *nodiflorum* var. Guss. * Pr., Bert. fl. it (Sic.), *Heliosciadium nodiflorum* Presl fl. sic., non (L.).

In Bächen und Quellen der Waldregion bis 1300 m. sehr häufig: Madonie (Guss. Syn. et Herb.!), von Polizzi bis zu den Favare di Petralia, wo es die Bäche oft ganz überwuchert, in der Fiumara di Passoscuro ob Castelbuono! Mai—Juli ♃.

S. intermedium Ten. Syll., Guss. Suppl., * Syn. et Herb.!, *nodiflorum* Guss. Pr., *nodiflorum* var. Bert. fl. it., *Apium nodiflorum β. ochreatum* W. Lge. III 93, *Heliosciadium nod.* β. *ochreatum* DC. Pr. IV 104.

In Bächen, Quellen, auch in Sümpfen der Tief- und Waldregion bis 1300 m, noch häufiger: Um Castelbuono überall (Herb. Mina p. p.!), Fiumara di Passoscuro, Ferro, unterhalb Geraci, bei den Favare di Isnello, von Polizzi bis zu den Favare di Petralia mit der vorigen! April—Juli ♃.

S. inundatum (L. sp. pl. als *Sison*) Sm., Guss. Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), Todaro fl. s. exs.!, *Apium inundatum* Rchb. D. Fl. 14 I, II!, W. Lge. III 94, *Heliosciadium inundatum* Kch. Gr. G. I 736, DC. Pr. IV 104, *Meum inundatum* Spr. Guss. Prodr.

In Sümpfen und an überschwemmten Stellen der Bergregion Nordsiziliens; auch in den Nebroden, aber sehr selten: Madonie (Herb. Mina!). Mai, Juni ☉.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0530-1

Sison Amonum L. sp. pl. 362, Guss. Pr., * Syn. et * Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G. I 732, Rchb. D. Fl. Tfl. 18!, W. Lge. III 89.

An buschigen Rändern der Wassergräben und Bäche, an feuchten, schattigen Zäunen (500—800 m.): Gemein bei den Mulini von Polizzi und gegen die Pietá hinauf!, in den Nusspflanzungen von Polizzi (!, Gasparrini in Guss. Syn. et Herb.!); nach Bonafede's und Mina's Mittheilung auch um Castelbuono. Juli, August 2-jr.

Ptychotis ammoides (L.) Koch W. Lge. III 90, Presl fl. sic., *verticillata* (Dsf.) Duby DC. Pr. IV 108, Guss. Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), Gr. G. I 734, *Seseli verticillatum* Dsf. Guss. Pr., *Petroselinum ammoides* Rchb. D. Fl. 17 I! Die Varietät mit rauhpunktirten Früchten ist *Pt. trachysperma* Boiss.

Auf trockenen, grasigen Abhängen, in Feldern, an Rainen, Wegrändern, zwischen Buschwerk vom Meere bis 1400 m. äusserst gemein: Um Cefalù, Castelbuono, Isnello!, Bocca di Cava, Regione Milocco (!, Herb. Mina!), von Castelbuono bis Ferro, unterhalb Cacacidebbi, am Pizzo della Canna, im Piano di Zucchi!, Pizzo del Corvo (Mina Cat.). April—Juni ☉.

Ammi majus α. genuinum Gr. God. II 731, W. Lge. III 89, *A. majus* L. Presl. fl. sic., Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.), DC. Pr. IV 112, Rchb. D. Fl. Tfl. 23! Untere Blätter einfach fiederschnittig. *β. intermedium* (DC. Pr. IV 113), Gr. G., W. Lge. Untere Blätter doppelt fiederschnittig, Segmente keilförmig, gezähnt. *γ. glaucifolium* Gr. G., W. Lge, Bert. fl. it., *Ammi glaucifolium* L. Presl fl. sic., Guss. Pr., Syn. et Herb.!, DC. Pr. IV 112. Untere Blätter doppelt fiederschnittig, Segmente linear, ganzrandig oder sparsam gezähnt.

Unter Saaten, auf dürren Feldern, an trockenen, grasigen Abhängen, Weg- und Gartenrändern vom Meere bis 600 m. var. *α.* sehr gemein: Am Fiume grande, um Polizzi, von Castelbuono zur Bocca di Cava, gegen Isnello, Dula und Geraci!, var. *γ.* selten längs des Küstenstriches! Mai—Juli ☉.

A. Visnaga (L.) Lam. Presl fl. sic., Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G. I 732, DC. Pr. IV. 113, W. Lge. III 90, *Visnaga β. lejospermum* Guss. Pr., Syn. et * Herb.!, *Daucus Visnaga* L. sp. pl. 348.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0531-7

Auf Fluren und lehmigen Feldern nach der Saat in Sizilien häufig, im Gebiete nur um Roccella gefunden (Herb. Guss.!). Juli—September ☉.

(Fortsetzung folgt.)

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar.

358. St. Petersburg. Acta Horti Petropolitani. Tom. IX. Fasc. II. 1886.

359. St. Petersburg. Catalogus systematicus Bibliothecae Horti imp. botanici Petropolitani. Editio nova. 1886.

360. Batavia. K. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië. Tijdschrift, Deel XLV. Batavia 1886.

361. Halle. Kais. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher. Nova Acta. Vol. 47, 48. Halle, 1885, 86.

362. Messina. Malpighia rassegna mensuale di Botanica redatta da A. Borzì, O. Penzig, R. Pirotta. Anno I. — Fasc. I. Luglio 1886.

363. Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westfalens. 43. Jahrg. 1. Hälfte. Bonn 1886.

364. Upsala. Reg. Soc. Sc. Upsal. Nova Acta. Ser. III. Vol. XIII. Fasc. I. 1886.

365. Nimwegen. Nederlandsche Botanische Vereeniging. Nederlandsch Kruidkundig Archief. Tweede Serie. 4. Deel. Nijmegen, 1886.

366. Karlsruhe. Grossh. Bad. Pflanzenphysiologische Versuchsanstalt. 2. Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1885. Karlsruhe, 1886.

254. Penzig, O.: O. Beccari's neuere Arbeiten über die myrmekophilen Pflanzen des malaiischen und papuasischen Archipels.

255. Deichmann Branth: Lichener fra Novaia-Zemlia. S. A.

256. Brügger, Chr. G.: Mittheilungen über neue und kritische Formen der Bündner- und Nachbar-Floren. Chur, 1886. Selbstverlag des Verf.

Redacteur: **Dr. Singer.** Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (**F. Huber**) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0532-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 69

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: Flora der Nebroden 526-530