Orchideae describuntur

auctore

H. G. Reichenbach fil.

1. *Disa Cooperi*: similis *Disae crassicorni* Lndl. (*megaceratiti* Hook. f) minor, inflorescentia densiori, sepalo impari supra marginem liberum anticum apiculato, calcari teneriori arcuato longiori, sepalis lateralibus oblongis supra apicem apiculatis, tepalis ligulato-flexuosis, angulo in margine inferiori implicito, labello unguiculato obtusangulo rhombeo.

Orange Free State Cooper 1098! Natal. Mrs. Fannin! Lydenburg Atherstone! (Hab. sp. 4 et vid. in hb. Kew.)

2. *Disa (Repandra) extinctoria*: pedalis, polyphylla, foliis lanceo-acuminatis in squama abeuntibus, racemo cylindraceo, bracteis a lata basi lanceis acuminatis ovaria aequantibus, galea oblonga acuta calcari gracili incurvo porrecto prope aequilongo, sepalis lateralibus ligulatis obtuse acutis, apiculo intus insidente, tepalis triangulis obtusis, labello lineari.

Lydenburg Decb. 72. — Jan. 74. Dr. W. G. Atherstone (Hb. Kew et propr.).

3. *Disa (Repandra) stachyoides*: spithamaea, foliis ligulatis arrectis densis ad racemum usque, racemo denso, bracteis ligulatis acutis ovariis aequalibus, galea apice abrupte calcarata, calcari cylindraceo retusiusculo ovarii dimidium aequante, sepalis lateralibus ligulatis acutis, apiculo ante apicem insidente, tepalis a lata basi triangulis basi inferiori obtusangulis, labello lineari acutiusculo.

Lydenburg Decb. 73. Jan. 74. Dr. W. G. Atherstone (Hb. Kew. et propr.).

4. *Satyrium Atherstonei*: aff. *Satyrio trinervi* Lindl., pedale, foliis ligulatis acutis arrectis in vaginas abeuntibus, racemo denso cylindraceo, bracteis triangulis acutis deflexis flores superantibus, rhachi ac ovariis velutinis, sepalis lateralibus ovato-falcatis, tepalis cum sepalo impari ligulatis obtusis brevioribus, labello fornicato-acutiusculo, calcaribus conico-cylindraceis ovario brevioribus.

Lydenburg. Dr. W. G. Atherstone Jan. 74. (Hb. Kew; propr.)

5. *Satyrium Lydenburgense*: aff. *S. cassideo* Lndl. habitu gracili, foliis in basi geminis oblongo-ligulatis angustis, vaginis quibusdam in caule, racemo laxifloro, bracteis ovato-triangulis deflexis, sepalis lateralibus ligulatis porrectis, tepalis sepaloque

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03646-0330-1

impari minoribus, labello cassideo obtusangulo limbo reflexo apice lobulato, calcaribus ovario subaequalibus, gracilentis.

Lydenburg. Dr. Atherstone (Hb. Kew).

6. *Cyrtopera Oliveriana*: foliis fasciculatis lineari-lanceis aridis nervosis abbreviatis, pedunculo elongato, bracteis lanceis ovaria pedicellata superantibus vel aequantibus, sepalis oblongo-ligulatis obtusis, tepalis latioribus ovatis obtuse acutis, columnae pede ultra sepalorum basin angulato extenso, labello trifido, laciniis lateralibus semioblongis ad medium versus, lacinia antica ligulato-obtusa, lineis callosis incrassatis geminis a basi per discum, anthera exumbonata.

Ill. Olivier, de nobis meritissimo dica a. Port Natal. Buchanan (N. 13 herb. Kew).

7. *Cymbidium Buchanani*: aff. *Cymbidio aculeato* triplo—septuplo majus, foliis lineari-lanceis usque pedalibus nervosis, acuminatis, pedunculo scariose vaginato, vaginis amplis acuminatis cucullatis 5—6, racemo capitato, bracteis lanceo-setaceis flores subaequantibus, sepalis lanceis, tepalis oblongis obtusis subbrevioribus, labello basi lato, medio dilatato trifido laciniis lateralibus extrorsum rotundatis, lacinia antica semiovato-obtusa, seriebus 2 verrucularum per discum, nunc basin versus coalescentibus in laminas, anthera umbonata.

„Three oter divisions green, 3 inner crinson, verging into black." Buchanan.

Afr. austr. or. Krebs! Buchanan! Cooper! Herb. Kew et propr.

8. *Eulophia leontoglossa*: foliis fasciculatis paucis linearilanceis nervosis duris, pedunculo plurivaginato, vaginis apice bene foliaceis, inflorescentia nutante capitata, bracteis linearibus acutiusculis ovaria pedicellata superantibus, sepalis tepalisque ligulatis obtuse acutis, labello cuneato dilatata trifido, laciniis lateralibus angustatis obtusis, lacinia mediana triangula apiculate serrulata, carinis 5 obscuris in basi, in lacinia antica cristatis callis parvis triangulis, calcari cylindraceo obtuso ovarii pedicellati $^2/_5$ aequanti.

Lydenburg. Atherstone (Herb. Kew et propr.) Magalisbug Burke! (Herb. Hook.)

9. *Eulophia carunculifera*: foliis fasciculatis abbreviatis rigidis nervosis acuminatis (ad 6), pedunculo basi vaginato elongato (pedali) basin usque laxe racemoso, bracteis lineari ligulatis acutis ovaria pedicellata non aequantibus, sepalis tepalisque lineari-ligulatis acutis, labello trifido, laciniis lateralibus antrorsis

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03646-0331-6

triangulis, lacinia antica semiovata retusa cum apiculo seu oblonga acuta, carinis incrassatis crenulatis ternis a regione antebasilari in discum laciniae mediae, ante ejus basin interrupta, anthera minutissime umbonata.

P. Natal. Buchanan. (Herb. Kew S. propr.)

10. *Eulophia Cooperi:* foliis anthesi brevissimis fasciculatis, triangulo-lanceis ad 7, pedunculo valido ultra pedali vaginis amplis scariosis ore triangulis 4, racemo longiusculo, bracteis lanceis acuminatis scariosis ovaria pedicellata superantibus seu aequantibus, sepalis tepalisque lanceis acutis, labelli calcari arcte cylindraceo brevissimo, lamina trifida, laciniis lateralibus obtusangulis supra medium disco ibi calcarato-angulato impresso (!), lacinia antica ligulata apice cucullata, carinulis medianis 5 gibberibus hemisphaericis uniseriatis, anthera exumbonata.

„Flowen green and purple."

Orange Free State. 977 b. S. Cooper Coll. 1862.

Salices novae

auctore

Michaeli Gandoger.

(Fortsetzung.)

Grex *Salicis purpureae* L. sp. 144.

34. *Salix Deucalion* Gdgr. Flore Lyonn. p. 207. — Exs., Gandoger, Flora Gallica exs. Nr. 1197. — *S. Lambertiana* Gdgr. plant. exsicc. olim! non Smith.

Hab. Gallia orient., Rhône, secus rivulos prope Arnas (Gdgr.).

Amenta numerosa, patule arcuato-deflexa; cortex livide virens, folia denticulata apice attenuata. Arbor 8—10-pedalis.

35. *Salix deprompta* Gdgr. Flora Lyonn. p. 207.

Hab. Gallia orient., Rhône, secus rivulos ad Liergues (Gdgr.).

A praecedente differt squamis saepius rubris superne glabris etc.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03646-0332-2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 64

Autor(en)/Author(s): Reichenbach Heinrich Gustav

Artikel/Article: Orchideae deacribuntur 328-330