Subgenus III. *Loretia* Doval-Jouve ut genus propr. in Revue des sciences naturelles, Montpellier juin 1880 p. 38 edit. separat. Spiculae in ramis primariis et secundariis solitariae. Flores fertiles in eadem spicula plures; glumae inaequales, (inferior multo minor, interdumque subnulla), cum paleis distichae. Stamina 3, antherae magnae, inter glumellas per anthesim contentae, post anthesim expulsae. Caryopsis elongata inferne attenuata, superne sublatior.

Huc *V. setacea* Parl., *incrassata* Parl., *tenuis* Parl., *ligustica* Link, *geniculata* Link etc.

Fungi Egyptiaci

collecti per **Dr. G. Schweinfurth** — determinati per **F. de Thuemen.**

Ser. III.

(Conf. Ser. I. in „Grevillea" VI. p. 102. — Ser. II. id. VIII. p. 49.)

43. *Peronospora Alsinearum* De By. in Ann. sc. nat. 1863. XX.
Ad folia viva *Alsinearum* speciei indeterminatae. — Abuksa in Fajum. XII. 79.

44. *Cladosporium herbarum* Lk. Obs. mycol. p. 37.
In *Zillae myagroidis* Forsk. capsulis aridis. — Wadi Dugla pr. Cairo. II. 80.

45. *Oidium erysiphoides* Fr. Syst. mycol. III. p. 432.
In *Meliloti parviflori* Desf. foliis vivis in hortis. — Ismaila IV. 80.

46. *Coniothecium tamariscinum* Thuem. nov. spec.
C. ramulos vel longe lateque ambiens et nigrificans vel, plerumque in junioribus, maculas irregulares, fuligineas, varias efficiens; sporis subglobosis, simplicibus vel plerumque uniseptatis, in globulos saepe sarcinaeformes, irregulares conglutinatis, haud raro solitariis, fuscis, impellucidis, 6—9 mm. diam.
In ramis vivis *Tamaricis manniferae* Ehrbg. — Wadi Gjaffara pr. Bulbes. IV. 80.

47. *Ustilago Vaillantii* Tul. Mem. s. l. Ustilag. p. 90. var. *Letourneuxii* Fisch. Waldh.
In antheris *Bellevalliae trifoliatae* Ten. — Mariut. (leg. Ar. Letourneux).

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03644-0479-3

48. *Ustilago trichophora* Kunze in Flora 1830 p. 369.
In *Tricholaenae Teneriffae* Boiss. ovariis. — Wadi Chafura in deserto medio. III. 80.

49. *Ustilago hypodytes* Fr. Syst. mycol. III. p. 518.
Ad *Diplachnes fuscae* Beauv. (*Leptochloa fusca* Kunth) vaginas culmosque. — In fossis siccis pr. Belbes in Nili Delta. V. 80.

50. *Ustilago Carbo* Tul. Mem. s. l. Ustilag. p. 78.
In *Avenae sterilis* Lin. floribus. — Ad marginem canalis pr. Tel-el-Kebir in Wadi Tumilat. V. 80.

51. *Ustilago Carbo* Tul. Mem. s. l. Ustilag. p. 78.
In ovariis *Danthoniae Forskaelii* Trin. — In collis arenosis pr. Rosette. VII. 80.
Sporae massam valde compactam, subfirmam formans (in statu siccitatis); potius varietas propria!

52. *Ustilago Ischaemi* Fuck. Symb. mycol. p. 40.
In *Cymbopogonis* speciei incertae ovariis. — Africa centralis: Geriba-Ghalfas in terra Djur. IX. 69.

53. *Aecidium Suaedae* Thuem. nov. spec.
Aec. pseudoperidiis densis, longissime cylindraceis, pulchre aureo-fulvis, sursum sensim dilatatis, ore pallido, membranaceo-diaphano, crenulato-inciso; sporis globosulis vel elliptico-globosis, episporio subcrasso, paullulo verruculoso, dilute flavidis, 21—24 mm. diam.
In foliis vivis *Suaedae verae* Forsk. — In paludibus salsis pr. Salehieb, Wadi Tumilat. V. 80.

54. *Uredo Avicullariae* Alb. et Schweinz. Consp. fung. Nisk. p. 127 no. 358.
Ad *Polygoni Bellardi* Alb. folia viva. — Tel el Kebir in Wadi Tumilat. V. 80.

55. *Uredo Schanginiae* Thüm. in Grevillea VI. p. 104.
Ad *Schanginiae hortensis* Moq. Tand. folia viva. — Fort Sulkowski pr. Cairo. V. 80.

56. *Uromyces Rumicum* Fuck. Symb. mycol. p. 64.
Ad folia viva *Rumicis dentati* Lin. — Gassatin in Wadi Tumilat. V. 80.

57. *Uromyces Medicaginis* Pass. in Thümen, Herb. mycol. no. 156.
In foliis vivis *Medicaginis sativae* Lin. — Birket-es-Ssabb. X. 79.

58. *Uredo Ficus* Cast. in Cat. pl. Mars. II. p. 87 et in Desm. pl. cryptog. Ser. II. no. 1362.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03644-0480-4

In *Ficus caricae* Lin. foliis vivis. — Ramleh pr. Alexandriam X. 79.!

Sporae eximie variae: ovoideae vel cuneatae vel ellipsoideae, episporio subtenui, densissime et subtilissime echinulato, hyalinae vel pallidissime flavidulae, 18—26 mm. long., 12—16 mm. crass. — Fortasse *Melampsorae* speciei fungus stylosporiferus!

59. *Erysiphe lamprocarpa* Lév. in Ann. sc. nat. 1851. XV. p. 162.

Ad folia viva *Plantaginis Lagopi* Lin. — Kafr-Hamran in Nili parte Pelusia. V. 1880.

60. *Sphaerella Carlii* Fuck. Symb. mycol. p. 103.

In foliis vivis *Oxalidis corniculatae* Lin. — Cairo in horto magno Chalig. III. 80.

Asci numerosissimi cum sporis maturis!!

Flora der Nebroden.

Von

Prof. P. Gabriel Strobl.

(Fortsetzung.)

Gynandriris Sisyrinchium (L.) Parl. Fl. It., Cesati etc. Comp., Gren. God., Willk. Lge. *Iris Sis.* L. Presl Fl. Sic., Guss. Prodr., Syn. et Herb.!, Parl. Fl. Pal. 1, Bert. Fl. It.

Auf trockenen, steinigen Kalkabhängen, an Meerufern, sandigen Bachrändern vom Meere bis 900 m., in der Tiefregion zwischen Cefalù und Finale häufig!, höher oben seltener; von Mina um Castelbuono bis Monticelli öfters gesammelt! April, Mai ♃.

Hermodactylus tuberosus Salisb. Parl. Fl. It., Cesati etc. Comp., Gren. God. *Iris tuberosa* L. Presl Fl. Sic., Guss. Prodr., Syn. et * Herb.!, Bert. Fl. It., Parl. Fl. Pal. 1, Rchb. D. Fl. 776.

An buschigen und waldigen Bergabhängen zwischen 400 und 1100 m., besonders in Eschen- und Kastanienwäldern häufig: Am M. S. Elia ob Cefalù, im Kastanienwalde ob S. Guglielmo, an der Fiumara von Castelbuono, um Bocca di Cava!, um Barraca (Mina!); selten höher hinauf bis gegen die Buchenregion! März, April ♃. Sandstein, Kalk.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03644-0481-0

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 63

Autor(en)/Author(s): Schweinfurth Georg August

Artikel/Article: Fungi Egyptiaci 477-479