zeigten, nicht auffallend reichlich erfolgt und von Parasiten konnte ich auch keine Spur wahrnehmen. In den Pelorien des zuerst beschriebenen Exemplars fand ich den Blüthenkäfer, *Meligethes aeneus* Fab. in grosser Zahl, jedoch ist derselbe auf allen Pflanzen so gemein, dass seinem Erscheinen hier keine besondere Bedeutung beizumessen ist.

Rosae novae
Galliam austro-orientalem colentes

auctore Michaele Gandoger.

(Fortsetzung.)

64. *Rosa oncophylla* Gdgr. Essai p. 32 — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 251 — *R. collina* Cariot Etude des fl. 4e éd. II, p. 183; ej. 5e éd. II, p. 192, non Jacq.! — Frutex validus, saturate virens; aculeis condensatis, subverticillatis, copiosis, falcato-dilatatis; foliolis ample ovatis, basi cordatis, apice rotundatis, supra pilosulis, subtus praeter costam basi glandulosam omnino villosis, simpliciter serratis, petiolis aculeatis, villoso-glandulosis; stipularum dilatatarum auriculis divergentibus; pedunculis corymbosis, dense hispidis, 17—20 mill. longis; calicis tubo ovato, glabro, vel basi infima setuloso; sepalis deciduis, late pinnatis, eglandulosis, apice foliaceis; stylis e disco plano in capitulum magnum, lanatum ample conglobatis; petalis magnis, roseis; fructu pulposo, obovato, utrinque depresso, sordide rubro.

Hab. in dumetis et silvaticis agris Lugdunensis Le Pont d'Alaï, Craponne, Charbonnières, St Cyr-au-Mont-d' Or, etc.

Haec est *R. collina* Auct. gall. non Jacq. a typo Jacquiniano habitu validiore, ramis magis aculeatis, foliolis majoribus, sepalis haud glandulosis optime recedens.

65. *Rosa eriogyna* Gdgr. Essai p. 31 — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 122! — *R. Friedlanderiana* Cariot Etude des fl. 4e éd. II, p. 183; ej. 5e éd. II, p. 192!; Hort. Lugdun. Gall. 1867—1873! non Bess.! —

Robusta, copiosissime aculeata, aculeis elongatis, dilatato-aduncis; foliolis magnis, obovato-cordatis, apice vix attenuatis, adultis supra mox glabris, subtus praeter costam glandulosam

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0424-4

omnino villosis, crebre inaeque subbiserrato-glandulosis; petiolis villosis, aculeatis, copiose glandulosis; stipularum dorso glandulosarum auriculis divergentibus; pedunculis hispidis, corymbosis; calicis tubo laevi, obovato; sepalis deciduis, foliaceo-pinnatis, margine copiose pectinato-glandulosis; stylis e disco conico lanatis; petalis amoene roseis, basi flavescentibus; fructu parvo, coriaceo, ovoideo, basi rotundato, apice attenuato, coccineo.

Hab. passim et rarissima in silvaticis Agris Lugdunensis ad Francheville, Dardilly, Charbonnières, Craponne.

R. Friedlanderiana Bess. Enum. pod. p. 63 vera, alia est species hujus gregis a *R. eriogyna* Gdgr. foliolis omnino nec inaeque biserratis recedens.

66. *Rosa nova* Gdgr. Essai p. 33 — *R.* . . . . . Déségl. Essai p. 90, in nota. —

Aculeis condensatis, falcatis rectiusculisve; foliolis coriaceis, late ellipticis, saturate viridibus, supra glabris, subtus ad nervos pubescentibus, subbiserratis; petiolis sparse pilosis, subglandulosis, aculeatis; stipulis subtus pubescentibus, auriculis divergentibus; pedunculis hispidis; calicis tubo laevi, ovato; sepalis pinnatipartitis, deciduis, margine pectinato-glandulosis, corolla brevioribus; stylis glabris, disco plano; petalis magnis, amoene roseis; fructu ovato, glabro, obscure sanguineo.

Hab. ad sepes prope Angers (Maine-et-Loire) et in fruticetis Galliae austro-orientalis.

Species ab antecedente stylis glabris statim dignoscitur.

67. *Rosa stictosepala* Gdgr. Essai p. 33 (nomen solum). — Aculeis sat raris, dilatato-aduncis; foliolis obovato-oblongis, utrinque sensim attenuatis, supra sparse pilosis, ad costam eglandulosis, subtus omnino hirtellis, serraturis apertis inaeque subbiserratis; petiolis inermibus, villosis, minute glandulosis; stipulis pubescentibus, eglandulosis, auriculis rectiusculis; pedunculis 1—3nis, hispidis, 10—15 mill. longis; calicis tubo oblongo, omnino et minute glanduloso; sepalis deciduis, elongatis, dorso rubiginosis, margine parce denticulato-glandulosis; stylis e disco subconico, lanatis; petalis . . . . . ; fructu oblongo, basi depresso, apice valde attenuato, purpureo, minute glanduloso.

Hab. in colle dicta Du Paradis ad Salins (Sabaudia).

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0425-0

R. eglandulosa Gdgr. Essai p. 33 (*R. Friesii* Lagg. et Puget in Christ Ros. der Schw. p. 137 non Scheutz) in Adenophoris (Canineae collinae Crép.) a me collocata melius ad Crepinias Trichophylleas e. Pilos. Gdgr. (Canineae pubescentes Crép.) adnumerari videtur et prope *R. macrostigma* Gdgr. supra descripta (vid. Nr. 54) collocanda est, cujus differt foliolis ovatis, nervosis, ad costam parce glandulosis, inaeque subbiserratis, petiolis glandulosis, sepalis post anthesim erectis, serius deciduis, petalis saturate roseis, fructu apice longius attenuato — Hab. in regione montana Helvetiae ad Fribourg, Uri, etc.

68. *Rosa intersita* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 72! —

Ramis elongatis, copiose aculeatis, aculeis validis, dilatato-aduncis; foliolis parvis, ellipticis, supra sparse pilosis, subtus praeter costam parce glandulosam totoque villosis, nervosis, argute biserratis; petiolis villosis, aculeatis, sparse glandulosis; stipularum angustarum auriculis rectis; pedunculis 1—3nis, sparse pilosulis; calicis tubo ovato, glabro; sepalis brevibus, villosis, deciduis, late longeque pinnatis; stylis brevibus, parce hirsutis, raris, disco plano; petalis ex albo subroseis, haud ciliatis; fructu parvo, rotundato, nitide rubro, glabro.

Hab. in collibus apricis prope Gleizé (Rhône).

Pertinet ad gregem *R. tomentellae* Lem. — Recedit ab affini *R. Jacobi* Gdgr. in Bull. Soc. Murith. du Valais (1876) p. 35 foliolis minoribus, obtusioribus pallidioribusque, petiolis omnibus aculeatis, stylis glabrioribus, petalis subcarneis et fructu subgloboso nec ovoideo.

Sect. *Chavinia* Gdgr. Essai p. 34 (*Glanduloseae* Crép.)

69. *Rosa alnorum* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 5! — Radix reptans; humilis, bipedalis, flexuosa, gracilescens; aculeis conformibus sparsis, rectiusculis, subulatis nec glanduliferis; foliolis amplissime obovatis, saturate viridibus, subtus toto rubiginosis, ad nervos villosis, argute 3—4 serrato-glandulosis; petiolis pubescentibus, rubiginosis, minute aculeatis; stipulis sat angustatis, subtus glandulosis, auriculis divergentibus; pedunculis 1—2nis, incrassatis, hispidis; calicis tubo ovoideo, basi setuloso; sepalis deciduis, parce pinnatis, dorso et margine rubiginosis, apice filiformibus; stylis e disco subplano lanatis; petalis magnis, purpureis, fructu ovato, rubro, basi hispido.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0426-5

Hab. in alnetis collium ad Arnas (Rhône) ubi frequens.

Facies *R. Pugeti* Bor., et prope *R. quercetorum* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 16 collocanda.

70. *Rosa lancaefolia* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 124! —

Aculeis conformibus, dilatatis, omnibus rectis; foliolis parvis, oblongo-lanceolatis, acutis, subtus rubiginoso-purpureis totoque villosis, supra glabris, argute biserratis; petiolis aculeatis, glanduloso-pubescentibus; stipularum basi praesertim angustarum auriculis divergentibus; pedunculis corymbulosis, brevibus, parce hispidis; calicis tubo ovato, glabro; sepalis deciduis, dorso rubiginosis, pinnatis, apice filiformibus; stylis e disco plano lanatis; petalis purpureis, haud ciliatis; fructu glabro, purpureo, subgloboso.

Hab. in ericetis subumbrosis lapidosisque ad Arnas (Rhône).

Pertinet, ut et duae sequentes, ad gregem *R. Jundzillianae* Bess.

71. *Rosa leptoriphaea* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 291! —

Tripedalis, ramis gracilibus, flexuosis; aculeis sat raris, elongatis, rectis, vix dilatatis; foliolis late ovato-ellipticis, subtus praeter nervos villosos omnino rubiginosis, biserratis; petiolis inermibus, villoso-glandulosis; stipularum angustarum auriculis divergentibus; pedunculis 1—2nis, hispidis; calicis tubo elongato, basi hispidulo, apice tenuiter constricto; sepalis deciduis, dorso glandulosis, pinnatis, apice sat dilatatis; stylis e disco subplano subhirtellis; petalis magnis, purpureis; fructu anguste oblongo, apice longe strangulato, sepalis serius destituto, purpureo.

Hab. in quercetis silvae Talenceanae prope Arnas (Rhône).

72. *Rosa Satyrus* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 359!

Frutex 4—5 pedalis, ramis elongatis; aculeis validis, dilatatis, inclinatis, interdum rectis; foliolis ample oblongo-lanceolatis, acutis, amoene virentibus, subtus praeter nervos villosos hinc inde passim hirtellis totoque rubiginosis, biserratis; petiolis rubiginoso-pubescentibus, parce aculeatis; stipularum latarum auriculis divergentibus; pedunculis hispidis, corymbosis; calicis tubo oblongo, basi interdum hispidulo; sepalis elongatis, dorso glandulosis, pinnatis, apice filiformibus; stylis e disco plano

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0427-1

subglabris; petalis magnis, eximie roseis; fructu ovato, purpureo.

Hab. ad oras silvae Talenceanae prope Arnas (Rhône).

Ad eamdem gregem accedunt species affines sequentes: *R. Gouttardi* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 15, *R. quercetorum* Gdgr. loc. cit. p. 16, *R. angustata* Gdgr. loc. cit., *R. stupens* Gdgr. Dec. plant. nov. fasc. I. p. 3, *R. Hollandrei* Gdgr. Essai p. 35, *R. polonica* Gdgr. loc. cit., et *R. formosissima* Gdgr. loc. cit. — In herbario, insuper, multae adhuc adsunt formae omnino novae ulteriusque descripturae.

Sect. *Chabertia* Gdgr. Essai p. 35 *(Rubiginoseae* D. C.)

a. *Sepiaceae* Crép. Prim. p. 23; Gdgr. Essai p. 36.

73. *Rosa pseudo-campta* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 546! —

A *R. geocampta* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 17, differt ramis floriferis saepius inermibus, foliolis brevioribus, apice haud aut vix dilatatis, petiolis superioribus minus aculeatis, tubo calicis fructuque semper ovoideis nec breviter oblongis.

Hab. in vinetis lapidosis circa Arnas (Rhône).

Pertinet ad gregem *R. sepium* Thuill., sicut et species 3 sequentes.

74. *Rosa buxifolia* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 562! —

Aculeis validis, falcato-dilatatis, ad ramos floriferos copiosis; foliolis obovato-oblongis, utrinque aeque attenuatis, supra hinc inde glandulosis, undique glaberrimis, subtus omnino rubiginosis, biserratis; petiolis aculeatis, rubiginosis, saepius omnibus villosis; stipulis angustatis; pedunculis 2—6 nis, lacvibus, 6—8 mill. longis; calicis tubo oblongo, glabro, sepalis deciduis, anguste copioseque pinnatis, dorso eglandulosis; stylis e disco plano sparse pilosulis; petalis albis; fructu oblongo, utrinque attenuato, purpureo.

Hab. in collibus apricis et montosis supra Ville-sur-Jarnioux (Rhône), alt. 1400'.

75. *Rosa myrsinites* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 2! —

Humilis, dumoso-ramosa, aculeis dilatato-falcatis, ad ramos floriferos saepe nullis; foliolis ampluiscule oblongo-lanceolatis, basi acutis, supra hinc inde glandulosis, subtus glabris et rubiginosis, biserratis; petiolis rubiginosis, parce aculeatis, fere

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0428-7

omnibus sparse pilosis; stipulis parvis; pedunculis 1—4nis, laevibus, 8—9 mill. longis; calicis tubo obovato, glabro; sepalis virentibus, deciduis, dorso eglandulosis, angustule pinnatis; stylis hinc inde subhirtellis, disco plano; petalis albis; fructu ovoideo, utrinque depresso, rubro.

Hab. in silvaticis ad Talencé prope Arnas (Rhône).

76. *Rosa capitellata* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 560! —

Ramis sat foliosis; aculeis validis, falcato-compressis, ad ramos floriferos copiosissimis saepiusque sparsis; foliolis ampliuscule obovato-oblongis oblongisve, utrinque aeque attenuatis, supra sparse glandulosis, subtus praeter costam villosam rubiginosis, glabris, biserratis; petiolis pubescentibus, rubiginosis, superioribus solis sat aculeatis; stipulis glabris; pedunculis 3—5 capitellatis, laevibus, 4—6 mill. longis; calicis tubo ovoideo, glabro; sepalis, copiose et sat late pinnatis, elongatis, deciduis, dorso eglandulosis; stylis subhirtellis, disco plano; petalis albis; fructu ovoideo, utrinque laeviter depresso.

Hab. in apricis montosis supra Ville-sur-Jarnioux, (Rhône), 1400.'

Huc. quoque spectant affines: *R. acanthothamnos* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 16, *R. geocampta* Gdgr. loc. cit. p. 17, *R. daphnoidea* Gdgr. loc. cit., *R. calocarpa* Gdgr. l oc. cit., *R. stenorhyncha* Gdgr. loc. cit., *R. osmoidea* Gdgr. loc. cit. p. 18, *R. oenacantha* Gdgr. loc. cit., *R. Joadi* Gdgr. loc. cit., et *R. Sanlavillei* Gdgr. loc. cit. p. 19.

Insuper, ad tribus *Sepiaceae* subtrib. b. Hebegynae Gdgr. Essai p. 37, numerosae a meipso conditae accedunt species, scilicet: *R. Cupaniana* Gdgr. Essai p. 37, *R. cedrorum* Gdgr. Dec. plant. nov. fasc. I. p. 42, *R. Djurdjurensis* Debeaux in Gdgr. loc. cit., *R. Boulluii* Gdgr. in Bull. soc. dauph. (1874) p. 14, *R. sparsiflora* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 18, *R. stargardiensis* Gdgr. Essai p. 37, *R. bohemica* Gdgr. loc. cit. p. 38, *R. suecica* Gdgr. loc. cit., *R. Pasqualei* Gdgr. loc. cit., *R. cladophora* Gdgr. Flore Lyonn. p. 85, *R. Argus* Gdgr. loc. cit., *R. didymacantha* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 19, *R. Apollo* Gdgr. loc. cit., et *R. peraffinis* Gdgr. loc. cit. p. 20.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0429-5

b. *Eurubiginosae Hypostyloidae* Gdgr. Essai p. 38
(Rubiginosae Micranthae Crép.)

77. *Rosa Mesto* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 565! —

Valida, ramis rubentibus, elongatis, aculeatis; aculeis conformibus, robustis, dilatato-falcatis; foliolis late ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice breviter attenuatis, supra hirtellis et subsparse glandulosis, subtus omnino villoso-rubiginosis, biserratis; petiolis pubescentibus, rubiginosis, aculeatis; stipulis sat latis, subtus dorso rubiginoso-aculeolatis, auriculis parum divergentibus; pedunculis hispidis, corymbulosis; calicis tubo oblongo, glabro; sepalis deciduis, dorso parce rubiginosis, pinnatis, apice foliaceo-elongatis; stylis e disco conico glabris, exsertis; petalis majusculis, purpureis (nunquam ciliatis ut in sequentibus); fructu sanguineo, apice attenuato, oblongo.

Hab. in collibus prope Arnas (Rhône).

Haec, cum duabus sequentibus, ad gregem *R. septicolae* Déségl. et *Lusseri* Lagg. et Puget spectant; ab eis autem recedunt primo intuitu ramis floriferis aculeatis nec inermibus.

78. *Rosa heteroclita* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 202! —

Frutex ramosissimus; aculeis conformibus, validis, falcato-dilatatis, ad ramos floriferos foliosos sat copiosis saepiusque geminatis; foliolis obovato-ellipticis, acutis, basi sensim attenuatis, subtus omnino villoso-rubiginosis, acute biserratis; petiolis glanduloso-villosis, aculeatis; stipulis mediocribus; pedunculis 1—3nis, hispidis, 7—10 mill. longis; calicis tubo laevi, ovoideo, sepalis deciduis, dorso glandulosis, latiuscule breviterque pinnatis; stylis exsertis, glabris, disco plano; petalis purpureis; fructu ovoideo, basi rotundato, apice attenuato, purpureo, parvo.

Hab. in pascuis et vinetis ad Arnas (Rhône).

79. *Rosa dichroopetala* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 270! —

Turiones intense rubri; ramis arcuatis, numerosis; aculeis conformibus, elongatis, copiosis, adunco-dilatatis ad ramos floriferos geminatis; foliolis ovato-ellipticis, basi vix attenuatis, superne breviter contractis, subtus omnino villoso-glandulosis, acute duplicato-serratis; petiolis villoso-rubiginosis, inferioribus inermibus; stipulis subtus villoso-glandulosis; pedunculis 2—4nis

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0430-6

hispidis, 14—20 mill. longis; calicis tubo oblongo, basi infima setoso; sepalis deciduis, dorso fere eglandulosis, latiuscule pinnatipartitis; stylis exsertis, glabris, disco subconico; petalis basi albis, superne roseis, haud ciliatis; fructu oblongo, utrinque sed apice praesertim attenuato, sanguineo.

Hab. in collibus apricis ad Gleizé (Rhône).

Ad hanc subtribus pertinent *R. cyanescens* Gdgr. Dec. plant. nov. fasc. II., p. 23, *R. podostigma* Gdgr. loc. cit. p. 24 et *R. oblongicalyx* Gdgr. loc. cit. p. 23; Bull. soc. dauph. p. 112, et Soc. dauph. plant. exsicc. Nr. 1197! prope *R. Lemanii* Bor. collocandae.

c. *Eurubiginosae Mesostyloidae* Gdgr. Essai p. 39
(*Rubiginosae micranthae* Crép.)

80. *Rosa collaris* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 539! —

Dumoso-condensata, ramis gracilibus, copiose aculeatis, aculeis conformibus, validis, falcato-aduncis; foliolis parvis, ellipticis, supra glabris, subtus praeter costam villosam ad nervos hinc inde hirtellis, rubiginosis, biserratis; petiolis glanduloso-pubescentibus, plus minus aculeatis; stipularum dilatatarum auriculis divergentibus; pedunculis 1—5nis, hispidis; calicis tubo oblongo, glabro; sepalis deciduis, pinnatis, dorso glandulosis; stylis glabrescentibus, disco plano; petalis roseis; fructu oblongo, basi attenuato, apice longe strangulato.

Hab. in campestribus circa Arnas (Rhône).

Recedit a *R. rhipidophora* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 21, ramis magis aculeatis, foliolis minus attenuatis, fructu oblongo apice longe attenuato-strangulato.

81. *Rosa leptophylla* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 83!

Ramis elongatis, flexuosis; aculeis conformibus, falcato-dilatatis, ad ramos floriferos copiosis; foliolis late obovatis; basi rotundatis, apice obtusiusculis, tenuibus, subtus villoso-rubiginosis, biserratis; petiolis aculeatis, villoso-rubiginosis; stipulis angustatis, subtus glandulosis; pedunculis dense aculeolatis, 2—3nis; calicis tubo ovato totoque hispido; sepalis deciduis, late partitis, dorso muricatis; stylis subglabris, disco plano; petalis parvis, saturate purpureis, basi lutescentibus, haud ciliatis, calice brevioribus; fructu ovato, apice attenuato, hispido, dein atropurpureo.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0431-2

Hab. in frondosis circa Arnas (Rhône).

R. Bourdini Gdgr. Flore Lyonn. p. 85 a *R. leptophylla* cui proxima, differt foliolis minoribus, elliptico-rotundatis, aculeis minoribus, tubo calicis pedunculisque hispidis nec aculeolatis, disco stylari sat conico, petalis pallide roseis et fructu minore, ovato-rotundato, apice minus attenuato, serius persistente.

82. *Rosa pervaga* Gdgr. apud Cottet in Bull. soc. Murith. du Valais, 1873, III, p. 43 (nomen solum) — Ramis articulatis; aculeis dimorphis, aliis setaceo-glanduliferis, aliis falcato-dilatatis tunc ad ramos floriferos nullis; foliolis late ovato-subellipticis, subtus praeter nervos villosos, omnino rubiginosis, crassiusculis, biserratis, serraturis late triangularibus, apertis; petiolis inermibus, tomentoso-glandulosis; stipulis brevibus, subtus villoso-glandulosis, auriculis divergentibus; pedunculis 2nis, hispidis, 5—8 mill. longis; calicis tubo breviter ovoideo, basi setoso; sepalis brevibus, dorso parce muricatis, deciduis, apice dentato-subdilatatis; stylis parvis, subglabris, disco sat conico; petalis roseis, haud ciliatis; fructu breviter ovoideo, apice attenuato.

Hab. in apricis montosis ad Vaugneray, Alix, Gleizé (Rhône) et in Sabaudia prope Pringy. Habui etiam e pluribus locis Helvetiae occidentalis, nempe ad Fribourg, Bovernier, Sion, etc. lecta.

Ad subtribus Eurubiginos. Mesostyloid. adnumerandae sunt species sequentes: *R. calophylla* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 21. *R. paucifoliata* Gdgr. loc. cit., *R. elongatula* Gdgr. Flore Lyonn. p. 85, *R. anisoacantha* Gdgr. Essai p. 39, et *R. spadana* Gdgr. loc. cit.

83. *Rosa stilbophylla* Gdgr. Essai p. 39 (nomen solum).

Valida, elata, aculeis conformibus, robustis, dilatato-aduncis; foliolis late ovato-orbiculatis, supra nitidis et hinc inde hirtellis, subtus praeter nervos villosos rubiginosis, profunde biserratis; petiolis aculeatis, rubiginosis, minute et saepius unifariam villosis; stipulis dilatatis, subtus plus minus glandulosis, auriculis magnis; pedunculis gracilibus, sat brevioribus, parcissime hispidis; calicis tubo laevi, oblongo; sepalis deciduis, dorso parce glandulosis, profunde late pinnato-foliaceis, elongatis; stylis e disco plano hirsutis; petalis roseis, haud ciliatis; fructu magno, obovato-oblongo, glabro.

Hab. in dumetis prope Ecully (Rhône).

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0432-8

A speciebus praecedentibus stylis villoso-hirsutis basi pedicellatis, nec glabrescentibus sessilibusque statim distinguitur.

d. *Eurubiginosae Apostyloidae* Gdgr. Essai p. 39
(*Rubiginosae Suavifoliae* Crép.)

84. *Rosa scleroxylon* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 304!

Ramis tortuosis, duris, copiose aculeatis, aculeis 2nis, inclinatis vel rectiusculis, elongatis, conformibus; foliolis sat late obovato-oblongis, utrinque breviter attenuatis, subtus omnino rubiginoso-villosis, serraturis duplicatis, acutis, divergentibus: petiolis aculeatis, tomentoso-glandulosis; stipulis latiusculis, subtus rubiginosis, auriculis lanceolatis, rectis; pedunculis 1—2nis hispidis, calicis tubo ovato, glabro; sepalis brevibus, dorso vix muricatis, latiuscule pinnatis, deciduis; stylis sessilibus, lanatis, disco plano; petalis parvis, purpureis, haud ciliatis; fructu parvo, subgloboso-conico, basi rotundato, apice valde constricto, rubro.

Hab. secus vias ad Ouilly prope Villefranche (Rhône).

Pertinet, cum 4 sequentibus, ad gregem *R. rubiginosae* L.; haec affinis est *R. hyponemae* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 22, a qua fructu globoso-conico nec ovato praesertim differt.

85. *Rosa leptopoda* Gdgr. apud Cottet in Bull. soc. Murith. du Valais, (1873) III. p. 43 (nomen solum). — Aculeis conformibus, elongatis, aduncis, parum dilatatis, ad ramos copiosis; foliolis parvis, ovato-obtusiusculis, supra sparse hirtellis, subtus praeter nervos villosos totoque rubiginosis, profunde biserratis; petiolis parce aculeatis, sparse pilosis, rubiginosis; stipulis dilatatis, subtus glandulosis; pedunculis gracilibus, elongatis, minute hispidis; calicis tubo globoso, glabro; sepalis deciduis, dorso eglandulosis, brevibus, subpinnatis; stylis e disco plano villosis; petalis purpureis, haud ciliatis; fructu parvo, globoso, glabro, sanguineo.

Hab. in apricis prope Vaugneray (Rhône) et in collibus Helvetiae occidentalis unde pluries accepi.

86. *Rosa acanthophora* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 75! —

Caulium vetustorum aculeis copiosissimis, griseis, validis, inclinatis, ad ramos floriferos 2—5nis; foliolis parvis, obovatis, basi subrotundatis, apice breviter attenuatis, subtus omnino villoso-rubiginosis, inferioribus supra sparse glandulosis, biserratis; petiolis subinermibus, villoso-rubiginosis; stipulis subtus ad

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0433-4

auriculas parce glandulosis; pedunculis 2—3nis hispidis, 7—8 mill. longis; calicis tubo laevi, breviter ovoideo; sepalis deciduis, rubentibus, dorso vix muricatis, apice longe angusteque productis; stylis e disco plano villosis; petalis parvis, purpureis, haud ciliatis; fructu parvo ($7^1/_2$—10 mm. lato), breviter ovoideo, vel ovato, apice semper attenuato, rubro.

Hab. in collibus apricis prope Gleizé (Rhône).

87. *Rosa rhipidothamnos* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 255! —

Differt a *R. ostryaefolia* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 23, 1° ramis elongatis, remotis; 2° aculeis in apicem ramorum floriferorum nunquam setaceis; 3° foliolis paulo angustioribus, ovatis, nec obovatis, inferioribus supra saepius glandulosis; 4° fructu obovato-oblongo, utrinque semper depresso.

Hab. in collibus aridis ad Gleizé (Rhône).

88. *Rosa brachystephana* Gdgr. Essai p. 40 (nomen solum) — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 15! — Caulibus vetustis copiosissime aculeatis; aculeis rectiusculis vel inclinatis, parum dilatatis, dimorphis, ad ramos floriferos setaceo-glanduliferis; foliolis ellipticis, obscure viridibus, supra eglandulosis, subtus praeter nervos villosos totoque rubiginosis, biserratis; petiolis inermibus, villoso-rubiginosis; stipulis parvis; pedunculis 1—3nis, hispidis, 9—12 mill. longis; calicis tubo ovoideo, glabro; sepalis deciduis, brevibus, parce angusteque pinnatis, dorso vix glandulosis; stylis lanatis, disco plano; petalis purpureis, haud ciliatis; fructu magno, oblongo, vel breviter oblongo, glabro, utrinque sed basi praesertim attenuato.

Hab. in collibus saxosis ad vineta prope Gleizé (Rhône).

Ad eamdem subtribus pertinent etiam sequentes affines, nempe: *R. hyponema* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 22, *R. brachystylis* Gdgr. loc. cit., *R. rufescens* Gdgr. loc. cit., *R. scleroacantha* Gdgr. loc. cit. p. 23, *R. ostryaefolia* Gdgr. loc. cit., *R. dicranodendron* Gdgr. loc. cit., et *R. altissiodurensis* Gdgr. Essai p. 40.

Rosa alixensis Gdgr. Flore Lyonn. p. 85, (Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 317!) a *R. ostryaefolia* Gdgr. cui satis est affinis ab ea recedit ramis magis tortuosis, brevioribus, foliolis minoribus, rotundatis, nervosis, ad costas tantum villosis, sepalis virentibus, serius deciduis, petalis subminoribus, fructu minore, ad apicem magis attenuato.

(Schluss folgt.)

Personalnachrichten.

Prof. Dr. Pfeffer in Basel übersiedelt mit 1. October nach Tübingen; an seine Stelle ist berufen Dr. H. Voechting, bisher ausserordentlicher Prof. in Bern, der gleichfalls mit 1. Oct. seine neue Stelle antritt.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0434-9

auriculas parce glandulosis; pedunculis 2—3nis hispidis, 7—8 mill. longis; calicis tubo laevi, breviter ovoideo; sepalis deciduis, rubentibus, dorso vix muricatis, apice longe angusteque productis; stylis e disco plano villosis; petalis parvis, purpureis, haud ciliatis; fructu parvo ($7^1/_2$—10 mm. lato), breviter ovoideo, vel ovato, apice semper attenuato, rubro.

Hab. in collibus apricis prope Gleizé (Rhône).

87. *Rosa rhipidothamnos* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 255! —

Differt a *R. ostryaefolia* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 23, 1° ramis elongatis, remotis; 2° aculeis in apicem ramorum floriferorum nunquam setaceis; 3° foliolis paulo angustioribus, ovatis, nec obovatis, inferioribus supra saepius glandulosis; 4° fructu obovato-oblongo, utrinque semper depresso.

Hab. in collibus aridis ad Gleizé (Rhône).

88. *Rosa brachystephana* Gdgr. Essai p. 40 (nomen solum) — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 15! — Caulibus vetustis copiosissime aculeatis; aculeis rectiusculis vel inclinatis, parum dilatatis, dimorphis, ad ramos floriferos setaceo-glanduliferis; foliolis ellipticis, obscure viridibus, supra eglandulosis, subtus praeter nervos villosos totoque rubiginosis, biserratis; petiolis inermibus, villoso-rubiginosis; stipulis parvis; pedunculis 1—3nis, hispidis, 9—12 mill. longis; calicis tubo ovoideo, glabro; sepalis deciduis, brevibus, parce angusteque pinnatis, dorso vix glandulosis; stylis lanatis, disco plano; petalis purpureis, haud ciliatis; fructu magno, oblongo, vel breviter oblongo, glabro, utrinque sed basi praesertim attenuato.

Hab. in collibus saxosis ad vineta prope Gleizé (Rhône).

Ad eamdem subtribus pertinent etiam sequentes affines, nempe: *R. hyponema* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 22, *R. brachystylis* Gdgr. loc. cit., *R. rufescens* Gdgr. loc. cit., *R. scleroacantha* Gdgr. loc. cit. p. 23, *R. ostryaefolia* Gdgr. loc. cit., *R. dicranodendron* Gdgr. loc. cit., et *R. altissiodurensis* Gdgr. Essai p. 40.

Rosa alixensis Gdgr. Flore Lyonn. p. 85, (Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 317!) a *R. ostryaefolia* Gdgr. cui satis est affinis ab ea recedit ramis magis tortuosis, brevioribus, foliolis minoribus, rotundatis, nervosis, ad costas tantum villosis, sepalis virentibus, serius deciduis, petalis subminoribus, fructu minore, ad apicem magis attenuato.

(Schluss folgt.)

Personalnachrichten.

Prof. Dr. Pfeffer in Basel übersiedelt mit 1. October nach Tübingen; an seine Stelle ist berufen Dr. H. Voechting, bisher ausserordentlicher Prof. in Bern, der gleichfalls mit 1. Oct. seine neue Stelle antritt.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0434-9

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: 61

Autor(en)/Author(s): Gandoger Michael [Jean Michel, Abbé]

Artikel/Article: Rosae novae 422-432