Rosae novae
Galliam austro-orientalem colentes

auctore Michaele Gandoger.

(Schluss.)

Sect. *Pugetia* Gdgr. Essai, p. 40 (*Tomentoseae* et *Villoseae* Auct.)

89. *Rosa idanensis* Gdgr. Essai p. 42 (sine descript.) — *R. faetida* Cariot. Etude des fl. 2ª éd. II, (1854), non Bast. — Ramis floriferis glabris, aculeatis, aculeis dilatatis, sat aduncis; foliolis ellipticis, apice attenuatis, undique molliter tomentosis, subtus ad costam interdum parce glandulosis, serraturis duplicatis, cuspidatis, convergentibus; petiolis aculeatis, tomentosis, vix glandulosis; stipulis subtus pubescentibus, eglandulosis, auriculis divergentibus; pedunculis 2—5nis, hispidis, elongatis; calicis tubo obovato, hispido; sepalis dorso muricatis, pinnatis, apice parum dilatatis, post anthesim erectis, serius deciduis; stylis e disco plano villosis; petalis roseis; fructu obovato, hispido, obscure purpureo.

Hab. in regione silvatica superiore montis Reculet (Ain), 4000'.

Differt a *R. tunoniensis* Déségl. foliolis ellipticis, pedunculis subcorymbosis, fructu minore sepalis promptius destituto, etc.

90. *Rosa trichoclada* Gdgr. Essai p. 42 (nomen solum) — Sat humilis, ramis flexuoso-gracilibus, apice dense molliterque cano-tomentosis; aculeis rectiusculis subdilatatis, ad ramos floriferos geminatis; foliolis oblongis utrinque acutis, molliter cano-tomentosis, subtus totoque rubiginosis, biserratis; petiolis tomentoso-glandulosis, minute aculeatis; stipulis subtus tomentoso-glandulosis; pedunculis gracilibus, parce hispidis, basi villosis, elongatis; calicis tubo obovato-oblongo totoque hispido; sepalis late partitis, deciduis, apice subfoliaceis, dorso rubiginosis; stylis e disco subconico glabris; petalis roseis; fructu ovoideo, apice strangulato, setuloso, obscure rubro.

Hab. in regione montana prope Argonnex Sabaudiae, 3—4000'.

Haec, cum duabus sequentibus, prope *R. cuspidata* M. Bieb. collocanda est.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0447-2

91. *Rosa ianthinochlora* Gdgr. Flore Lyonn. p. 84; Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 25, in nota. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 246! — Elata, copiose aculeata, ramis robustis, elongatis, glabris, glaucescentibus; aculeis validis, dilatato-inclinatis; foliolis ample obovato-oblongis, basi rotundatis, apice breviter attenuatis, supra coerulescentibus, subtus rubiginosis, undique molliter tomentosis, attritu maleolentibus, argute biserratis; petiolis tomentoso-glandulosis, aculeatis; stipulis subtus glanduloso-tomentosis; pedunculis 2—4nis, setulosis, elongatis; calicis tubo breviter ovoideo totoque hispido; sepalis deciduis, dorso glandulosis, latiuscule parceque pinnatis, corollam subaequantibus; stylis e disco subplano subglabris; petalis pallidissime roseis, basi valde ciliatis, fructu ovato, apice contracto, basi depresso, sordide rubro totoque setuloso.

Hab. in sepibus ad vias prope Arnas (Rhône).

92. *Rosa Deucalion* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 266! —

Gracilescens, 4—5-pedalis, ramis glabris, basi denudatis, flexuosis, copiose aculeis rectiusculis ornatis; foliolis sat parve obovato-ellipticis, undique argenteo-tomentosis, subtus rubiginosis, argute biserratis, odoratis; petiolis parce aculeatis, tomentoso-glandulosis; stipulis subtus tomentoso-rubiginosis, cinereis, auriculis acutis, divergentibus; pedunculis 2—3nis, setulosis. 10—18 mill. longis; calicis tubo ovoideo totoque setoso; sepalis deciduis, pinnatis, dorso muricatis, apice angustatis; stylis e disco subplano glabro; petalis mediocribus, pallide roseis, haud ciliatis; fructu parvo, ovoideo, apice valde strangulato.

Hab. secus vias ad Arnas (Rhône), in unico loco perrara.

A praecedente habitu graciliori, foliolis minoribus, argenteis, petalis pallidis, haud ciliatis, fructu minore, apice valde constricto optime recedit. — Ad Pugetias Tomentosas (Tomentoseae Auct.) etiam pertinent: *R. rosella* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 24, *R. lactescens* Gdgr. l. c., *R. hebecarpa* Gdgr. l. c., *R. asphaltitica* Gdgr. l. c. p. 25, sicut et species novae a meipso in Essai p. p. 41—42 indicatae.

93. *Rosa ancylacantha* Gdgr. Essai p. 43 (nomen solum) — Aculeis ad ramos floriferos glabros remotosque validis, late dilatatis, falcato-aduncis, saepius geminatis; foliolis rigidis, ample (17—21 mill. lat.) obovatis, utrinque rotundatis, subtus minute rubiginosis, undique tomentosis, biserratis; petiolis aculeatis, rubiginoso-tomentosis; stipulis latis, subtus vil-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0448-8

loso-glandulosis, dorso aculeatis, auriculis acutis, divergentibus; pedunculis 1—4nis, brevibus, usque ad $^2/_3$ super. sparse aculeatis, in tertiam partem sup. laevibus; calicis tubo subrotundato, glabro; sepalis pinnatis, erecto-persistentibns dorso bruneo-muricatis, apice dilatatis; stylis e disco plano lanatis; petalis amoene roseis; fructo globoso, glabro, basi valde decurrente-attenuato, glauco-purpureo, erecto.

Hab. in regione montana Sabaudiae prope Saint-Martin supra les Teppes. Species curiosissima inter Pugetias Villosas (Villoseae Auct.) distinctissima nulloque modo inter descriptas vere affinis! Foliolis aculeisque facies omnino Chabertiae (Rubiginoseae) sed sepala persistentia et foliola undique molliter tomentosa.

94. *Rosa phalacroidea* Gdgr. Essai p. 44 (nomen solum)! — Ramis bruneo-purpureis, aculeis rarissimis, rectis, ad ramos floriferos glaucos subpilosulosque 1—2; foliolis opacis, coriaceis, plicatis, supra atrovirentibus glabrisque, subtus pallidis et praeter costam villosam ad nervos hinc inde hirtellis, argute cuspidato-biserratis, foliolis inferioribus solis subtus minute glandulosis; petiolis inermibus, tomentosis, parce glandulosis; stipulis maximis, subtus hirtellis sparseque glandulosis, auriculis magnis, divergentibus; pedunculis setosis, valde elongatis; calicis tubo oblongo, hispido; sepalis carnosis, subpinnatis, dorso rubiginosis, apice dilatato-dentatis, erecto-conniventibus persistentibusque; stylis e disco plano lanatis; petalis roseis; fructu ample oblongo-conico, basi rotundato, apice sensim attenuato, setoso, rubro, erecto.

Hab. in nemore dicto Offiège supra Brenthonne Sabaudiae, 4000′.

Planta curiosa fructus *Rosae montanae* Chaix et foliola (eglandulosa) *R. psilophyllae* Rau referens; facies Chaviniae Scabratae Gdgr. (Glandulosae Auct.); petioli et aculei tandem Pugetiae Villosae (Villoseae Auct.). — Collocari debet in mea subtribu conspicua Phalacroidearum Essai p. 43 (Villoseae Auct. ex parte) et prope *R. spinulifoliam* Dematra est ponenda.

Ad eamdem gregem pertinent *R. cechica* Gdgr. Essai p. 44, *R. Foxiana* Gdgr. loc. cit., *R. oligocephala* Gdgr. loc. cit. (nomen) *R. acanthochlamys* Gdgr. loc. cit., (nomen), *R. Echidne* Gdgr. in Bull. soc. Murith. du Valais (1876) p. 35, et plures numerosiores ad huc indescriptae species quas herbarium ostendit.

95. *Rosa subcrassa* Gdgr. mss. —

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0449-7

Ramis floriferis purpureis, aculeatis; aculeis subulatis verticillatisque; foliolis ample obovato-oblongis, utrinque rotundatis, pallidis, praeter costam subtus glandulosam undique glaberrimis, profunde arguteque biserrato-glandulosis; petiolis inermibus, glandulosis basi subpilosulis; stipulis dilatatis, subtus eglandulosis; pedunculis solitariis, brevibus, incrassatis; calycis tubo subgloboso, glabro; sepalis basi infima laevibus, dein supra glandulosis (ad dorsum), apice in acumen subdilatatum eglandulosum productis; petalis purpureis, haud ciliatis; stylis lanatis; fructu magno, subgloboso, glabro, arcuato-nutanti, purpureo.

Hab. in regione alpina totius Europae, v. g. in Gallia ad montes Pilat, Pierre-sur-Haute, Loire (Gdgr!); ad Pringy in Sabaudia (Puget!); in Dalphinatu, Hautes-Alpes (Burle!), Barcelonnette (Proal!), Col de Cende (Bernardin!); in Pyrenaeis orient., Mont Louis (Debeaux, sub nom. *R. filispina*! et *tenuispina*!), Canigou (Bordère); — Austria, in alpibus Salisburg., tirolens., styriacis; — Dalmatia, in monte Velebith (Visiani!), ad Clissa (Studuiczka!). — Istria, Monte Maggiore (Freyn!). — Specimen etiam hujus speciei accepi a Dr. Augustinowicz in Sibiria Baicalensi lectum. —

Haec species pertinet ad Sect. Ozanonia (Alpineae Auct.) et affinis est *R. monspeliacae* Gou.

Literatur.

Von C. T. Nyman, dem Verfasser der Syllogе Florae Europaeae

erschien soeben unter dem Titel

„Conspectus Florae Europaeae“

das erste Heft (Ranunculaceae — Pomaceae), dem bald das 2., den Rest der Calycifloren enthaltend, folgen wird. Wir erlauben uns, unsere geehrten Leser hierauf aufmerksam zu machen mit der Beifügung, dass der Conspectus 4 gleichstarke Hefte umfassen wird. Das erschienene 1. Heft kann gegen $2^1/_2$ Reichsmark in Postanweisungen franco bezogen werden vom Verfasser:

C. J. Nyman, Stockholm, Brunkebergs torg 2.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0450-8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: 61

Autor(en)/Author(s): Gandoger Michael [Jean Michel, Abbé]

Artikel/Article: Rosae novae 445-448