processibus angustissimis linearibus anguste lacunosis; operculo e basi brevi conica rostrato-acuto subincurvo. — In Florida legit Chapmann (hb. Delessert) *C. seductrice* affine.

Hypnum Vernieri, dioicum perexiguum flavescens prostratum repens laxe cespitosum ramosum ramulis erectis; foliis laxis elegantissime papillatis e basi concava lanceolatis longissime acuminatis integris anerviis dense areolatis cellulis angustis linearibus versus basin latioribus alaribus marginalibus interdum 2 ovatis et 2 quadratis majoribus; fol. perich. lanceolatis longe acuminato-filiformibus: seta exilima purpurea incurva longissima, theca minutissima vix visibili erecta mox globosa mox incurvo-cylindrica; perist. externo dentibus pugioniformibus trabeculatis linea verticali dilutiore rotatis ad apicem longe filiformibus, per. interni processibus latioribus basi dilatatis e membrana pellucida orientibus, cilio nullo; operculo minutissimo e basi globosa leviter conico. — Ad ligna emortua ins. Taiti adpressum legit D. Vernier missionarius. — Aff. *H. tenuiseto* Sull.

H. (*Plagothecium*) *Chapmanni*, monoicum prostratum laxum dilute lutescens nitens e basi ramosum ramis e basi fasciculatis simplicibus gracillimis flexuosis plus minus elongatis vestitis foliis imbricatis aequalibus semiapertis lanceolatis enerviis integerrimis apice acute-subobtusis, cellulis 1—3 brevioribus terminatis confertis anguste linearibus, alaribus utrinque 4—5 quadratis agglomeratis colore intensioribus, foliis perich. latioribus caeterum conformibus; setis e basi ramuli & frondis orientibus laevissimis purpureis erectis flexuosis gracillimis; theca anguste ovato-conica erecta; perist. externi dentibus pugioniformibus dense trabeculatis serratis ad apicem non prolongatis, interni e membrana orientis subaequantis processibus plicatis laxe transversim lineatis nonperforalis cilio uno interno lineari angusto tenuissime longe acuminato ad apicem flexuoso; operculo conico elongato obtuso. — In Florida legit ill. Chapmann (hb. Delessert).

Beiträge zur Flora der Hawai'schen Inseln

von Dr. Heinrich Wawra.

Corrigenda. *)

Bei *Labordia Waiolani* st. acute l. arcte — Standort: Oahu, Schluchten des Waiolani 1683.

*) Conf. Flora Jahrg. 1874 & 75.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03641-0287-8

Bei *Labordia Waialealae* st. extrinatae l. striatae. — Standort: Kauai, Wälder am Waialeale 2120. — st. Seeseite l. Leeseite.

„ *Phyllostegia* st. die ja nach l. die je nach.
„ *Phyllostegia Honolulensis* st. subcarinosus l. subscariosus.
„ *Stenogyne Kamehamehae* st. secta l. recta. — st. zweilappiger l. zweilippiger.

„ *Stenogyne Haliakalae* st. glabrae labio superiore basi l. glabrae basi — Standort: Maui, am Haliakala im dichten Wald, 1928, 2311.
„ *Stenogyne purpurea* st. 2070 l. 2076.
„ *Stenogyne Kaalae* Standort: Oahu nordwestlicher Gebirgszug; 2258.

„ *Cyrtandra paludosa β.* var. *arborescens* adde 1720 — st. Otanapepe l. Hanapepe.
„ *Cyrtandra oenobarba* st. cylindracei tubo l. cylindracei laciniis tubo — st. subtus venarum l. subtus ad venarum.
„ *Cyrtandra Kalichii* st. intro l. intus.
„ *Cyrtandra Honolulensis* adde 1981.

„ *Lobeliadeae* st. Kapselfrüchten l. Kapselfrüchtigen — st. globoso vel obovoideo l. globoso vel ovoideo.
„ *Delissea clermontioides* st. kräftiger l. käsiger.
„ *Delissea Kealiae* st. stigmate piloso l. stigmate pilosis.

„ *Delissea filigera* st. Kauai Wälder von Waihee l. Maui Wälder von Waihee, 1955 — st. fand neue l. fand nur.
„ *Rollandia Humboldtiana* st. brevissima l. brevissime.
„ *Clermontia macrocarpa* st. iis homomorphis l. iis calycis homomorphis.

„ *Cyathodes Douglasii* var. *β struthioloides* st. Seeseite l. Leeseite.
„ *Vaccinium reticulatum α* fm. *grandifolia* Standort: Kauai, dicht bewaldete Stellen von Halemanu. 2121.
„ *Solanum aculeatissimum* st. 1807 l. 1809.
„ *Dubantia plantaginea* st. Waialeale l. Pohakupili.
„ *Hesperomannia arborescens* adde Nro. 2222.
„ *Lipochaeta heterophylla* adde (1896).
„ *Acaena exigua* st. früchtenlose l. früchtelose.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03641-0288-4

Bei *Pelea oblongifolia* st. pavenius t. pare uno.
„ *Pelea Kaalae* st. Petala acut. valvata l. Petala aest. valvata.
„ *Melicope grandifolia* st. Ovarium und Antheren l. Ovarium oder Antheren.
„ *Melicope barbigera* st. an den Zweigen l. an einzelnen Zweigen.
„ *Edwardsia chrysophylla* Standort: Maui Bergwiesen des Haliakala 1884.
„ *Cassia* st. 2053 l. 2035.
„ *Eurya Sandwicensis* fm. *grandifolia* adde (2367).
„ *Pittosporum terminalioides* var. *glabrum* st. 1709 l. 1709 a.
„ *Pittosporum terminalioidis* var. *spathulatum* st. 1709 l. 1709 b.
„ *Cuphea Balsamona* adde Nro. 1869.
„ *Alphitonia excelsa* st. schnitzen l. schnitzten.
„ *Geranium cuneatum* var. *α Menziesii* st. 2316 a. l. Aus Hillebrands Herbar 2316 a.
„ *Geranium cuneatum* var. *β hypoleucum* st. Maui am Haliakala 1048 l. Kauai am Waialeale 2148.
„ *Geranium arboreum* st. Gray l. c. 3121 t. 30 l. Gray l. c. t. 30.
„ *Metrosideros polymorpha* st. Metrosiderosarten, l. Metrosiderosarten nicht.
„ *Metrosideros polymorpha* var. *γ* st. 1703 l. 1702.
„ *Metrosideros macropus* st. von M. übereinstimmt l. von *M. rugosa* übereinstimmt.
„ *Broussaisia angusta* st. Freyc. S. Pacif. l. Gray S. Pacif.
„ *Sida Sectum* st. 1805 l. 1803.
„ *Sida Diellii* st. vollblättrige l. wollblättrige.
„ *Gassipinum* spec. st. 1875 l. 1857.
„ *Capparidcae* st. *Sandwicensis* l. *Sandwichiana*.
„ *Senebiera didyma* st. Punch-Canal l. Punch Bowl und Maui am Haliakala.
„ *Kadua parvula* st. Art jener aus l. Art jenen aus.
„ *Gouldia* st. bei den Gattungen l. beider Gattungen.
„ *Gouldia Sandwicensis* st. und die der einen Gruppe vielfache Berührungspunkte mit jener der andern l. und die Arten der einen Gruppe vielfache Berührungspunkte mit jenen der andern — st. var. *i. parviflora* l. var. *i. parvifolia*.
„ *Gouldia Sandwicensis* var. *d. cordata* st. brevissima l. brevissime.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03641-0289-2

Bei *Gouldia Sandwicensis* var. *g. coriacea* st. hat keine Beeren l. hat kleine Beeren.

„ *Coprosma longifolia* st. ultra medium membranaceam l. ultra medium in ochream amplam glabram grosse dentatatam membranaceam coalitae.

„ *Coprosma Waimeae* hat die Diagnose zu lauten: Arbuscula ramulis gracilibus parce foliosis, foliis coriaceis ellipticis obtusis, stipulis e basi latissima cuspidatis glabris; floribus . . . . . drupis ternis in pedunculo axillari plerumque geminato petiolo sublongiore subglobosis pulposis pro genere majusculis.

„ *Nertera depressa* adde Nro. 2049.

„ *Pharbitis insularis* adde Nro. 2195.

„ *Jacquemontia Sandwicensis* st. 1925 l. 1923 — st. Boransia l. Boramia.

„ *Alyxia olivaeformis* st. protractione l. protractiore.

„ *Myrsine Gaudichaudii* st. ovatis vel obtusis l. ovatis acutis vel obtusis.

„ *Myrsine Gaudichaudii* var. *β hirsuta* st. excurvatum l. excavatum.

„ *Myrsine Lessertiana* st. 2189 l. 1689.

„ *Morus indica* st. Haliakala l. Haliakala 1865.

„ *Plantago princeps* var. *laxifolia* st. (interaxilläre) l. (intraaxilläre) und st. Bürsten l. Borsten.

„ *Euphorbia Remyi* st. 12 lin. longae l. 1 lin. longae.

„ *Claoxylon Sandwicense* st. nervis secundariis l. nervi secundarii.

„ *Pisonia inermis* st. 2750 l. 1750.

„ *Wickströmia* st. Consistenz, der Farbe l. Consistenz, Farbe.

„ *Rumex giganteus* var. *hirsutus* st. Halemanu l. Halemanu 1880 b.

„ *Polygonem glabrum* st. 1880 b. l. 1836.

„ *Batis maritima* st. umwachsen l. anwachsen.

„ *Peperomia hypoleuca* fm. *glabra* st. 1815 l. 1715.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03641-0290-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: 58

Autor(en)/Author(s): Wawra Heinrich

Artikel/Article: Beiträge zur Flora der Hawai 'schen Inseln 285-288