prennis dann *Festuca-Lolium elatiori-perennis* genannt hat. Die Pflanze hat den Gattungscharakter von *Festuca*.

Lolium linicolum A. Br. (1834) ist als *L. remotum* Schrank (1788) beschrieben.

Aspidium aculeatum Schwartz (*A. angulare* Willd.) ist mit Unrecht als var *β.* mit *α. vulgare* (*A. Pluckenetii* Lois, welches zu *A. lobatum* Schwartz gehört), unter dem Namen *A. aculeatum* vereinigt.

Equisetum elongatum et *pannonicum* Willd. (1810) sind als *Equisetum ramosissimum* Desf. beschrieben.

Observations botanicae et descriptiones plantarum novarum Herbarii von Heurckiani. Recueil d'observations botaniques et de descriptions de plantes nouvelles publié par M. le Dr. Henri van Heurck. Antwerpen und Berlin 1870.

Diese Publicationen sind dazu bestimmt, alle neuen Arten, Varietäten, Formen und Monstrositäten, welche sich im Herbar von Henri van Heurck befinden zu publiciren. Es werden demzufolge zwanglose Hefte erscheinen und bei deren Bearbeitung sich insbesondere Dr. Müller Arg., Henri van Heurck und A. Martinis betheiligen. Diese Arbeit wird gerne gegen andere Druckwerke vertauscht.

Der Inhalt des vorliegenden nett ausgestatteten Heftes ist nachfolgender:

Bemerkung über die botanischen Sammlungen des Henri van Heurck von Arthur Martinis. Sie befinden sich zu Antwerpen 8, rue de la Santé und bestehen aus einer Bibliothek, mikrographischen Sammlung und Herbarium. (p. 5—20).

Auszug aus einer monographischen Arbeit über *Vanheurckia* einer neuen Diatomeengattung, aus der Familie der *Naviculeen* von Alphonso de Brébisson (p. 21—28).

Lycopodiaceae novae von A. Spring (p. 28—30); zwei neue *Selaginella*-Arten gesammelt von Spruce in Brasilien und eine von Demel, auf den Fidji-Inseln.

Rosae novae von F. Crepin. (p. 30) mit Angabe der Herbarnummern der betreffenden Collectionen aber ohne Diagnosen, diese folgen später.

Carices novae von H. van Heurck und Müller Arg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03651-0441-7

prennis dann *Festuca-Lolium elatiori-perennis* genannt hat. Die Pflanze hat den Gattungscharakter von *Festuca*.

Lolium linicolum A. Br. (1834) ist als *L. remotum* Schrank (1788) beschrieben.

Aspidium aculeatum Schwartz (*A. angulare* Willd.) ist mit Unrecht als var *β.* mit *α. vulgare* (*A. Pluckenetii* Lois, welches zu *A. lobatum* Schwartz gehört), unter dem Namen *A. aculeatum* vereinigt.

Equisetum elongatum et *pannonicum* Willd. (1810) sind als *Equisetum ramosissimum* Desf. beschrieben.

Observations botanicae et descriptiones plantarum novarum Herbarii von Heurckiani. Recueil d'observations botaniques et de descriptions de plantes nouvelles publié par M. le Dr. Henri van Heurck. Antwerpen und Berlin 1870.

Diese Publicationen sind dazu bestimmt, alle neuen Arten, Varietäten, Formen und Monstrositäten, welche sich im Herbar von Henri van Heurck befinden zu publiciren. Es werden demzufolge zwanglose Hefte erscheinen und bei deren Bearbeitung sich insbesondere Dr. Müller Arg., Henri van Heurck und A. Martinis betheiligen. Diese Arbeit wird gerne gegen andere Druckwerke vertauscht.

Der Inhalt des vorliegenden nett ausgestatteten Heftes ist nachfolgender:

Bemerkung über die botanischen Sammlungen des Henri van Heurck von Arthur Martinis. Sie befinden sich zu Antwerpen 8, rue de la Santé und bestehen aus einer Bibliothek, mikrographischen Sammlung und Herbarium. (p. 5—20).

Auszug aus einer monographischen Arbeit über *Vanheurckia* einer neuen Diatomeengattung, aus der Familie der *Naviculeen* von Alphonso de Brébisson (p. 21—28).

Lycopodiaceae novae von A. Spring (p. 28—30); zwei neue *Selaginella*-Arten gesammelt von Spruce in Brasilien und eine von Demel, auf den Fidji-Inseln.

Rosae novae von F. Crepin. (p. 30) mit Angabe der Herbarnummern der betreffenden Collectionen aber ohne Diagnosen, diese folgen später.

Carices novae von H. van Heurck und Müller Arg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03651-0441-7

Carex Vanheurckii zwischen *C. pilulifera* und *globularia Kamtschatka* 4 (p. 30).

C. boliviensis von H. et Müll. Arg. zw. *C. allomacros* St. und C. *Tatanara* Steud. Bolivia Mandon n. 1428. 4 (p. 32.

C. (§ 34 Steud.) *sordida* v. H. et Müll. Arg. Kamtschatka (Chamisso) 4 (p. 33).

Ericae novae von denselben (p. 34—38).

Erica (sect. Ceramia) *Leptoclada* n. sp. Caput Bonae Spei (Zeyh. coll. ult. n. 1108) (p. 3419).

2. *Erica* (s. Leptodend.) *Vanheurckii* Müll. Arg. Cap. Bonae Spei (Zeyh. coll. 1103.) (p. 36 sq.).

Solana nova von denselben (p. 38—95).

1. *Solanum* (ser. Potatoe) *tarapotense* n. sp. (p. 38)? Peruvia orient. Pr. Spruce n. 3938.

2. *S.* (ser. Subdulcamara) *Leptocaulon* n. sp. (p. 40) 4 Bolivia andina Mandon n. 404.

3. *S.* (ser. Anthor.) monadelphum n. sp. (p. 42) Frutex. Peruvia orient. R. Spruce n. 4051.

4. *S.* (ser. Anthoresis) *Pterocladum* n. sp. (p. 44) Frutex Bolivia andina Mandon 415.

5. *S.* (ser. Anthoresis) *receptum* n. sp. (p. 46) Frutex Schiede, Orizaba Bottorin 852.

6. *S.* (ser. Indubitaria) *Lasiantherum* n. sp. (p. 48) Brasilia Spruce.

7. *S.* (ser. Indubitaria) *ochrophyllum* n. sp. (p. 50) Bolivia Mandon 416.

8. *S.* (ser. Leiodendra) *anisophyllum* n. sp. (p. 52.) Peruvia orient. Spruce 4830.

9. *S.* (ser. Leiodondra) *patellare* n. sp. (p. 53.) Peruvia orient. Spruce 4914.

10. *S.* (ser. Leiodendra) *Sieberi* n. sp. (p. 56.) Martinique Sieb. ins. Trinitatis Sieb. n. 22.

11. *S.* (ser. Leiodendra) *leptopodum* n. sp. (p. 57.) Brasilia Spruce n. 1700.

12. *S.* (ser. Leiodendra) *dibrachiatum* n. sp. (p. 59.) Peruvia orient. Spruce n. 4250.

13. *S.* (ser. Eulycianthes) *mendax* n. sp. (p. 61.) And. Peruviae Ecuadorensis Spruce n. 5117., van Heurck n. 5050.

14. *S.* (ser. Gonianthes) *cryptolobum* n. sp. (p. 63.) Patria ignota.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03651-0442-3

15. *S.* (ser. Gonianthes) *cyathocalyx* n. sp. (p. 65.) Peruvia (Spruce n. 6501)

16. *S.* (ser. Ponianthes) *Sprucei* n. sp. (p. 67.) Peruvia Spruce n. 4352.

17. *S.* (ser. Lobanthes) *stenolobum* n. sp. (p. 69.) Peruvia Spruce n. 459.

18. *S.* (ser. Lobanthes) *brachylobum* n. sp. (p. 71) Peruvia Spruce n. 459.

19. *S.* (ser. Juripeba) *Martinisii* n. sp. (p. 73.) Brasilia Spruce.

20. *S.* (ser. Juripeba) *Sendtnerianum* n. sp. (p. 75.) Brasilia Spruce.

21. *S.* (ser. Torvaria) *membranifolium* n. sp. (p. 77.) Olim culta.

22. *S.* (sec. Torvaria) *Mandonis* n. sp. (p. 78) And. Boliv. Mandon n. 422 in hb. van Heurck. et in hb. DC. et n. 425 in hb. DC.)

23. *S.* (ser. Torvaria) *iodotrichum* n. sp. (p. 81.) And Boliv. Mandon n. 419.

24. *S.* (ser. Oliganthes) *erosum* n. sp. (p. 83.) Neilgherries Indiae or. Hohenacker n. 1074.

25. *S.* (ser. Oliganthes) *Vanheurckii* n. sp. (p. 85) Brasilia R. Spruce 1850—51 legit et sub Solano (12).

26. *S.* (ser. Nycterium) *Hohenackeri* n. sp. (p. 87.) In montibus Neilgherries Hohenacker n. 1076 et 1417.

28. *S.* (ser. Melongena) *pachycalyx* (n. sp. Cp. 92) Senegambia Sieber.

29. *Witheringia Fournieri* n. sp. (p. 94). Mexico Schiede.

Eriocauloneae novae von denselben Autoren (p. 96—111)

Eriocaulon brachypus n. sp. (p. 96). And. Peruv. Spruce. n. 5862.

E. Vanheurckii n. sp. (p. 98). India orient. prope Magalor Hohenacker Plant. Metz n. 2407.

E. (ser. Astole Körn.) *Körnickianum* n. sp. (p. 101) Texas Wrigth.

E. (sect. Eueriocaulon) *xeranthemoides* n. sp. (p. 103) In Nigritia Africae occid. Barter. n. 728.

E. (sect. Eueriocaulon) *bifistulosum* n. sp. (p. 105). In Nigritia ubi prope Nupe leg. cl. C. Barker n. 1021.

Lachnocaulon diandrum n. sp. (p. 108) Patria? forte in Texas collector?

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03651-0443-9

Piperaceae novae auctoribus C. de Candolle, H. van Heurck et Müller Arg. (p. 111—117).

Peperomia Casimiri v. H. et Müll. Arg. (p. 111) Ins. Martinique hb. Sieber.

P. subvillosa v. H. et Müll. Arg. (p. 113) Ins. Martinique hb. Sieber.

P. pellucida (Kunth) var. minor. v. H. et Müll. Arg. (p. 115)

P. Vanheurcki Cas. DC. Ins. Martinique hb. Sieb.

Dieser Fascikel wurde am 1. Juni 1870 publicirt. —n—g—

Bemerkungen über die Flora von Neu-Vorpommern und den Inseln Rügen und Usedom von Dr. Th. Fr. Marsson. Leipzig 1869.

Von Ferd. Winter in Weissenburg.

Diese Flora ist mit grossem Fleisse und tüchtiger Sachkenntniss bearbeitet. Nach der Vorrede folgt eine Erklärung der gebrauchten Abkürzungen, bei der ich nur zu bemerken habe, dass darin „C. H. Schulz-Zweibrücken" statt „C. H. Schultz-Zweibruecken" steht und dass der dabei nicht angegebene im Texte aber mit „Schultz" bezeichnete Schriftsteller Fr. Wilhelm Schultz (F. Schultz) ebenfalls aus Zweibrücken ist, und mit dem angeführten C. F. Schultz-Stargard oft verwechselt wird.

Zu bedauern ist, dass eine topographisch-geognostische Beschreibung des Gebietes fehlt; dagegen ist ein guter Schlüssel zum leichteu Auffinden der Gattungen mit Hülfe des Linné'schen Systems und eine „Systematische Uebersicht der Familien" der Beschreibung der Familien, Gattungen und Arten gegeben. Hierauf folgt vor der Beschreibung der Arten eine Characteristik der Familien in deutscher Sprache, dann die der Gattungen und Arten mit lateinischen Diagnosen, wobei jede Art noch ausführlich deutsch beschrieben ist. Auch die Blüthezeit und die Standorte sind gut angegeben. Bei der Synonymie wäre aber einiges zu verbessern, was ich angeben will.

Die als *Thalictrum minus* beschriebene Pflanze scheint mir *Th. Schultzii* Jordan *(Th. minus auctorum*, non Lin.) zu sein. Diesem sind *T. montanum* Wallr., *T. collinum* Wallr., *T. Jacquinianum* Koch, *T. sylvaticum* Koch, *T. flexuosum* Bernh., *T. Kochii* Fr. und *T. saxatile* DC) als Synonyme beigefügt. *T. Jacqui-*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03651-0444-4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: 53

Autor(en)/Author(s): Heurck Henri van

Artikel/Article: Observations botanicae et descriptiones plantarum novarum Herbarii von Heurckiani 439-443