FLORA.

№ 37.

Regensburg. 7. Oktober. **1861.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Dr. J. K. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten in Kurhessen (Forts.). — VERZEICHNISS der bei der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge.

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 552).

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
99	56	Katu-Mulla = Jasmium vimineum Wlld., quod (ex DC. Prdr. VIII. 303, 13) idem ac J. angustifolium Vhl. (vid. supr. tab. 53), quod falsum.	
101	57	Baddukka = Capparis Rheedii DC. Prdr. I. 246, 18; G. Don Dichlam. I. 270, 19; C. Baducca L. (3822)[1]).	
103	58	Solda = Capparis Mariana Jcq.? sec. Dnnst., quae praeter charact. gener. differt (DC. Prdr. I. 245, 1) floribus foliorum longitudine (petiolis G. Don. I. 278. 1), foliis subrotundis subcordatis et ex Don. (l. c.) habitu C. spinosae.	
105[2]	59	Sida Pou = Hiptage madablota Grtn. Wlp. Rprt. V. 294, 1. — Succowia fimbriata Dnnst.	I. II. 585. 1.
107[2]	60	Tsjude-Meram = Graptophyllum hortense Nees DC. Prdr. XI. 328. 1, α album Hsskl. Cat. p. 150. (Justicia picta L. 111.)	II. 824

[1]) Linnaeus p. 105 citat et plures species confudit.

[2]) Pag. 105 et 107 perperam: 109 et 111 sunt dictae.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0579-0

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
109	61	Tsjere-Maram (Tsjera- in Ic.) = Codiaeum medium Rmph. Baill. Recueil (1861) p. 348; Cod. variegatum Bl. Baill. Euph. (1858) p. 385. (Croton variegatum L. 7266), opponente Miquelio in Flor. I.II.383: Cod. moluccanum Decsn.	
		Tom. VII (de fruticibus scandentibus).	
1	1	Natsiadam (Natsjatam in Ic.) s. Natsjam-Crua s. Batta Valli = Menispermum Cocculus L. (7488), quod Anamyrta Cocculus W. A.	
3	2	Tsiereu- (Tsjeru- in Ic.) Caniram s. Ts.-Cansjeram = Cansjera scandens Rxb. Wlp. Rprt. V. 137, 1. Roem. Hesp. 16, 1. — C. Rheedii Gmel. DC. Prdr. XIV. 519, 1.	
5	3	Valli-Caniram = Cocculus radiatus DC. Prdr. I, 99, 35. Tiliacora acuminata Miers — Brauneamenispermoides Wild. sec. Dennst., quae Coccul acuminatus DC. Wlp. Rp. I. 94, 13.	I.II.29. 1.
7	4	Scheru-Valli-Caniram s. Sjerou-Valli-Kansjeram = Cansjera monostachya Roem. Hesp. 16, 1. — C. Rhedii Gmel. DC. Prdr. XIV. 519, 1 β. — C. scandens Rxb. Wlp. Rprt. V. 137, 1.	
9	5	Scheru- (Tsjeru- in Ic.) Katu-Valli-Caniram (Cansjiram in Ic.) = Strychnos minor Bl. Rmph. I. 70, 2. DC. Prdr. IX. 14, 9.	II. 379.
11	6	Schembra-Valli = Vitis indica L. (1640) DC. Prdr. I. 634, 12. (Scembra-, citat L.)	I.II.609. 1.
13	7	Vallia-Pira-Pitica (Wallia- in Ic.) = Vitis erioclada W. et A. Wlp. Rp. I. 443, 29; — V. vitiginea Dennst. (nec Cissus vitiginea L.)	
15	8	Vallia-Tsjori-Valli (Wallia- in Ic.) = Cissus lanceolaria Rxb. DC. Prdr. I. 632, 72, quae Vitis lanceolaria Wll. Wlp. Rprt. I. 443, 17; — Vit. leucostaphyla Dnnst.	
17	9	Tsjori-Valli = Cissus carnosa Lam. DC. Prdr. I. 630, 38, quae Vitis Wll. Wlp. Rprt. I. 442, 13.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0580-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
19	10	Belutta-Tsjori-Valli = Cissus pedata Lam. DC. Prdr. I. 632, 74?, quae Vitis Wll. Wlp. Rprt. I. 443, 19.	
21	11	Schunambi-Valli = Cissus vitiginea L. syst. I. (952); DC. Prdr. I. 628, 5. C. glauca Rxb.; — C. sicyoides L. syst XII. (954.)	
23	12	Molago-Codi = Piper nigrum L. (230) Miq. Piperac. 308, 2.	I.II.451.2.
25	13	Cattu-Molago = Piper Siriboa L.? sec. Dnnst.	
27	14	Cattu-Tirpali = Chavica-Roxburghii Miq. Piperac. 239, 8. Piper longum L. (234) (Miquelius tamum V citat et Cotta- loco Cattu scribit.)	I.II.441.
29	15	Beetla-Codi = Chavica Beetle Miq. Piperac. 228, 2 (Piper Betle L. (231); — Miquelius: Betela- dicit loco: Beetla-)	I.IV.439.2.
31	16	Amolago = Chavica Pseudo-Malamiri Miq. Piper. 244, 10? — (Piper Malamiris L. (232), ubi perperam Amalago citatur); — Pip. Amalago Dnnst. nec L.	I.II.441.2?
33	17	Kata-Kara-Walli = Pisonia aculeata L. DC. Prdr. XIII.II.440. 1 sat quadrat, quae est P. villosa Poir. sec. Miq — Pisonia mitis L. (7710), quae autem fructuem inermem praebet; — Canthium spinosum sec. DC. Prdr. XIII.II 446. 26.	I.I.989.1.
35	18	Valli-Kani = Paederia? Valllikaea Jss. DC. Prdr. IV. 472, 7. — P. densiflorae Miq. similis; Prunsia sarmentosa Dnnst.	II.259.3.
37	19—20	Pee-Amerdu = Cocculus malabaricus DC. Syst. Veg. I. 518. Prdr. I. 97, 9. Heskl, Cat. p. 172; — Tinospora malabarica Miers Wlp. Ann. IV. 124, 2.	
39	21	Cit-Amerdu = Cocculus cordifolius DC. Prdr. I. 97, 8.	
41	22	Ula = Gnetum edule Bl. (Thoa Wild.) Rmph. IV. 6, 2.	II. 1068.
43	23	Pee-Ula = Amyris Protium Wild. sec. Dennst., quae Protium javanicum Brm.	
45	24	Basella = Basella cordifolia Lam. Heskl. Cat. p. 82 (cf. DC. Prdr. XIII.II.222. Char. Gen. et 223. 4.)	
47	25	Curinil s. Curigiril = Rajnera hexpinensis Dnnst.; — annon Apocynea?	

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0581-7

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
49	26	Curigi-Taly (-Tali in Ic.) = Connarus pinnatus Cav. sec. Dnnst., qui est Omphalobium DC. Prdr. II. 86, 8 aut Agelaea Lamarkii Pinch. Wlp Ann. II. 305, 2.	
51	27	Pada-Vara = Morinda umbellata L. Miquelius M. Padavara Jss. huc ducit, quae ex De Candolle (Prdr. IV. 449, 28) est M. tetrandra Jck., quametsi diversam habet Miq. tamen dubius remanuit, annon species utraque sit conjugenda; Candolle iconem nostram potius ad M. parvifoliam referendam dicit (l. c. 29).	II. 244. II. 246. 11.
53	28	Unjala accedit ad Hederam terebinthaceam Vhl. (DC. Prdr. IV. 265, 35); Paratropia venulosa W. A. Wlp. Rprt. II. 433, 3.	
55	29	Itti-Canni = Loranthus lonicerioides L. (2563) R. et S. Syst. Veg. VII. 108, 34, ubi Schultes ad finem quaerit: „an re vera Loranthus?“ — De Candolle (Prdr. IV. 299, 96) plantam hanc Rheedianam hoc loco excludit.	
57	30	Tiri-Itti-Canni = Pothos pentandra Dennst.	
59	31	Cari- (Kari- in Ic.) Vilandi = Smilax ovalifolia Rxb. forma major Knth. En. V. 249, 113; — sec. Poiret = S. zeylanica L. Knth. l. c. 115; — sec. Dnnst. S. China L.	
61	32	Watteu-Valli = Periploca cordata Lam. sec. Dnnst., quae est Hemidesmus indicus R. Br.	
63	33	Tjageri- (Tsjageri- in Ic.) Nuren = Dioscorea triphylla L. (7454) Knth. En. V. 392, 90; Linnaeus Tsiageri-, Miquelius Tspiageri scribit. — planta ♀	III. 573.
65	34	Katu-Nuren-Kalengu = Dioscorea pentaphylla L (7453) Knth. En. V. 396, 93; — planta ♂; — Blume (Enum. p. 20) plantam juniorem hanc dicit.	III. 574.
67	35	Nurem-Kelengu = planta ♀ antecedentis. — Linnaeus: Nureni habet.	
69	36	Kattu-Katsjil (Katsiil apud Linn.) = Dioscorea bulbifera L. (7457); Helmia bulbifera Knth. En. V. 436, 25; — Katu- apud Miquel. l. c., uti in sequenti.	III. 574.
71	37	Kattu-Kelangu (cf. idem nomen Tom. XI. p. 105, t. 51) = Dioscorea aculeata L. (7455);	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0582-3

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		Knth. En. V. 398, 99. — Miq.: Kelangi habet.	III. 575.
71bis	38	Katsji-Kelengu (Katsjil-Kelingu apud L.) = Dioscorea alata L. (7456) Knth. En. V. 387, 76.	
73	39	Erima-Tali = Erycibe paniculata Rxb.? sec. Miq. — E. glaucescens Wll.? DC. Prdr. IX. 464, 2? — Erimatalia Rheedii Roem. et Sch. Syst. Veg. V. 331.	II. 1032.
75	40	Ana-Parvâ (-Parua in Ic.) = Pothos scandens L. (7017), Knth. En. III. 65, 1. Hsskl. pl. Jav. p. 160.	III. 179.
77	41	Tsjangelam-Parenda = Visci species esse videtur, an V. angulatum Heyn.? DC. Prdr. IV. 283, 51?	
79	42	Pu-Valli (-Walli in Ic.) = Pothos drupacea Dnnst.; = Vix ad genus Pothos pertinet frutex hicce, floribus tetrandris tetrapetalis, baccis 1—3-spermis.	
81	43	Pu-Pal-Valli = Achyranthes lappacea L. sec. Juss. cf. R. et S. V. 549, 1. Obs. et Rheed. Tom. X, t. 59, pariter DC. Prdr. XIII.II. 331, 1.	
83	44	Acatsja-Valli s. Mudila- (Medica- in contextu) Tali = Cassyta filiformis L. (2924), Nees Laur. 462, 1. — Linnaeus ac Miquelius: Acatsia scribunt, ulterior p. 85 citat.	I.1.977.
85	45	Kareta-Tsjori-Valli = Cissus trilobata Lam. DC. Prdr. I. 629, 35; — Vitis Rheedei W. A. Wlp. Rprt. I. 442, 11.	
87	46	Modira-Valli = Unona uncinata Dun.? DC. Syst. Veg. I. 490, 13; — Artabotrys odoratissimus RBr. Wlp. Rprt. I. 80, 1, ubi Modica scribitur et perperam uti et apud De Candoll. p. 86 citatur.	
89	47	Valli-Modagam = Fagraea auriculata Jck.; Bl. Rumph. II. 261. Miquel.: Madagam scribit.	II. 372.
91	48	Meriam-Pulli = Cissus repens Lam. DC. Prdr. I. 628, 10. — Vitis W. et A.; — Ingenhousia umbellata Dnnst.	I.II.605.
93	49	Pada-Valli s. Pada-Kelengu (-Kelangu in Ic.) = Clypea (Menispermum Lam.) peltata Hook et Thmps. Wlp. Ann. IV. 132.	I.II.86.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0583-9

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
95	50	Kappa-Kelengu s. Batatas = Batatas edulis Chois. DC. Prdr. IX. 338, 7. (Convolvulus Batatas L. 1229.) Ipoema R. S. IV. 218, 40. Linn. et Miq. habent: Kalengu.	II. 599.
97	51—52	Podava-Kelengu = Dioscorea hirsuta Bl En. 21, 4; — Helmia hirsuta Knth. En. V. 438, 28, qui quaerit, an non potius ad Cucurbitaceas pertinerent tabulae haecce?[1]) — Miquelius Tomum VIII, perperam pro VII citat.	III. 575.
99	53	Panambu-(-boe- in Ic.) Valli = Flagellaria indica L. (2606) Schlt. VII. 1492, 1; Knth. En III. 370, 1.	III. 249.
101	54	Piripu = Delima? Piripu DC. S. Veg. I. 408, 6. Prdr. I. 70, 6; — D. sarmentosa L. (3877).	
103	55	Pujerta-Pu-Pal-Valli = Aganosma elegans G. Don.? — A. Blumei A. DC. (ex Bl.)? DC. Prdr. VIII. 433. 4 et 3. Hsskl. Flor. 1845, p. 268. — Echster caryophyllata Rxb. R. S. IV. 392, 19. — Jasminum pubescens Wild.? sec. Dunst.	II. 446.
105	56	Dama = Boerhavia diandra Brn. (diffusa L. 18) DC. Prdr. XIII. 452, 9. Hsskl. Cat. p. 85; — B. procumbens Hrb. Bnks. R. S. Syst. Mnt. I. p. 71. Obs., qui hanc plantam juniorem luxuriantem dicunt.	
107	57	Mendoni = Methonica superba Lam. Schlt. VII. 365, 1. — Gloriosa L. (2402), ubi erronee tab. 107, fig. 57 citatur, — Knth. En. IV. 276, 1.	III. 550.
109	58	Veetia-Caitu = Tradescantia cristata L. Bl. En. p. 5. — Cyanotis Schlt. VII. 1150, 1; — Knth. En. IV. 102, 1.	III. 544.
111	59	Pongolam = Putranjiva (Mus. Gen. Comm. 258; Endl. Gen 1894) Roxburghii Wll. Baill. Euphorb. 642.	

[1]) „Flores in petiolis oblongis crassioribus spinosis viridi-fuscis, supra exortum foliorum erumpunt, 7—8-petali stellatim cuspidati, viridi-diluti, flosculosa lanugine obsiti, superne oblongis et tenuibus filamentis cuspidati, ac oblongis pilis barbati.“ — Rheed. l. c.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0584-5

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.
		Tom. VIII. (de herbis[1]) pomiferis et leguminosis).	
1	1	Bela Schora = Lagenaria vulgaris Ser. Roem. Pep. 60, 1.	I. 1.669.
3	2	Schakeri-Schora = Cucurbita maxima Duch. Röm. Pep. 88, 15; — Cucurbita Melopepo L. sec. Dnnst.	
5	3	Cumbulam = Beninicasa cerifera Savi DC. Prdr. III. 303, 1; Röm Pep. 62, 1; — Cucurbita Pepo L. β sec. Dennst.	I. 1.655.
7	4	Caca-Palam = Cucumis Dudain L? sec. Dnnst.	Lagenaria vulgaris
9	5	Caipa-Schora = Cucurbita ovifera L.? sec. Dnnst	Ser. Röm. Pep. 60, 1. I. 1.669.
11	6	Mullen Belleri = Cucumis sativus L. varr.	I. 1.671.
13	7	Picinna = Luffa acutangula Rxb. DC. Prdr. III. 302, 3; = L. foetida Cav. sec. Dnnst.	I. 1.668.
15	8	Cattu-Picinna = Luffa Cattupicinna Ser. DC. Prdr. III. 303, 5. Röm. Pep. 64, 9. — L. pentandra Rxb. Wlp. Rprt. II. 200, 1 sec. Wight. Röm. Pep. 65, 13. — Momordica Luffa L.? sec. Dnnst.	— —
17	9	Pandi-Pavel (-Panel in Ic.) = Momordica Charantia L. (7315) DC Prdr. III. 311, 3; Röm. Pep. 56, 20. — Miquelius perperam p. 19 citat.	I. 1.663.
19	10	Pavel = Momordica muricata Wild. DC. Prdr. III. 311, 2. Röm. Pep. 56, 19; — M. Charantia L. β (3715).	
21	11	Balia Mucca-Piri = Momordica dioica Rxb. sec. Dnnst.	
23	12	Erima-Pavel (-Panel in Ic.) = Momordica Missionis Wll. ♂, Röm. Pep. 57, 25; — M. hispida Dnnst. Miq., qui perperam: „Eriva-," scribit.	I. 1.664.4.
25	13	Mucca-Piri = Bryonia scabrella L. β Rheedei Wlp. Rprt. II. 198, 3; — Muckia althaeoides Roem. Pep. 47, 3.	I. 1.658.
27	14	Cavel = Momordica Cavel Dnnst.	

[1]) Poot celbrr., qui tomum VIII. Horti malabarici in ordine redegit, a 1a ad 39am paginam perperam „frutex" pro „herba" scripsit, quod ante usum corrigendum erit.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0585-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
29	15	Pada-Valam = Trichosanthes cucumerina L. (7311, qui „Pacta-" habet), DC. Prdr. III. 315, 12; — Roem. Pep. 95, 13. — Miquelius sphalmate diciti: „Paita-" et citat p. 39.	I. 1.676.
31	16	Scheru-Pada-Valam = Trichosanthes caudata Wlld. (L. hrt. Cliff. 7309), ubi idem sphalma „Pacta" reperitur; — T. cuspidata Lam. DC. Prdr. III. 314, 6. Röm. Pep. 95, 6.	
33	17	Tota-Piri (Toti-Pira in Ic.) = Trichosanthes nervifolia L. (7310, ubi perperam „Pivi") DC. Prdr. III. 314, 4; Röm. Pep. 94, 5.	
35	18	Bem- (Ben- in Ic.) Pavel = Momordica dioica Rxb. ♀ Wlp. Rprt. II. 200, 1; Röm. Pep. 58 (et 222), 26. — M. tuberosa Dunst. Miq.	I. 1.664.
37	19	Nehoemeka = Bryonia laciniosa L. (7344)	
39	20	Modecca (-kka in Ic.) = Modecca palmata Lam. α Narola DC.	DC. Prdr. III. 336. 1. Röm. Pep. 203, 8; priorem varietatem
41	21	Pal-Modecca (Modekka altera in Ic.) = Modecca palmata β Palmodecca DC.	I. 1.703.
43	22	Motta-Modecca = Modecca palmata γ Motta DC.	
		(tab. 20) Linnaeus pro varietate sui Convolvuli paniculati L. (1248) sumserat.	
45	23	Orela-Modecca = Modecca palmata Lam. β integrifolia Miq.; — M. integrifolia DC. Prdr. III. 336, 3. Röm. Pep. 203, 2.	I. 1.703.
47	24	Modira-Caniram = Strychnos colubrina L. (1501, ubi perperam Tom. VII, p. 10, t. 5 citatur) DC. Prdr. IX. 14, 8. I. 70. — Miquelius sphalmate „Madiram" scribit. Bl Rmph.	II. 379.
49	25	Cariloe-Vejon (Vajon in Ic.) = Aristolochia ndica L. (6958 ubi „Catelae-"); = Miquelius habet: „Cateloe Vagon".	I. 1.1066.
51	26	Karivi-Valli (nec Karivalli uti Miq. scribit) = Bryonia umbellata Wlld. (DC. Prdr. III. 305, 22? Wlp. II 198, 6. cf. Röm. Pep. l. infr. cit. adnot. W. et A., — Bryonia Rheedii Bl. DC. Prdr. III. 306, 26; — Karivia Rheedii Röm. Pep. 45, 2.	I. 1.661.

Cont. seq.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0586-6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Horti malabariciclavis nova 577-584